موسوعت موسوعت موسوعت المستران المستران





المعُتُ بجم الستابع

٣١٣ نَبتَة - ٤٤ صُورَة مُلوَّنة ٣ مَالاحِق - ٨ مسَارِد

﴿ مَكتبة لبْتناتْ كَاشِرُونَا

لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتَدى إِقْرَا الثُقافِي)

پراي دائلود کتابهای محتلف مراجعه: (منتدی اقرا الثقافی) بردابهزاندنی جوردها کتیب:سهردانی: (مُنتَدی اقراً الثقافی)

www. lgra.ahlamontada.com



www.iqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردى, عربي, فارسي)

هٰذا المُعجَم

- إنَّه المُعجَم السّابع من عِدَّة مَعاجم، تُشكّل مَجموعة «موسوعة النّباتات الطّبيّة».
- فيه مِن المُعجَم ترتيبه وتنظيمه، ومِن الموسوعة وَضف الحقائق بشرح وافي ومِن زَوايا مُتعدَّدة.
- يُعالِج ٣١٣ مادَّة فَيَذكر التَّسوية العربيَّة مع مُقابِلاتها الإنجليزيَّة والفرنسيّة والألمانيّة واللَّاتينيَّة؛ أمّا الشُّروحات فقد تُوزَّعت على النَّوع والمُركِّبات والخَصائص والاستعمال وطَريقة الاستعمال.
- ذُيِّل المُعجَم بِثلاثَةِ مَلاحق للفصائل النَّباتيَّة والمُصطَلحات الطَّبَيَّة والتُقنيَّة، وبثَمانِيَة مَسارد للمُصطلحات الإنجليزيَّة والفرنسيَّة والألمانِيَّة والعُلميَّة.
- زُوِّد المُعجَم بأربع وأَربعين صورةً مُلوَّنةً، وهي تمتاز بِخَصيصَتَيْن: نُدْرَة بَعْضِها، وأصالتها جميعًا، لِأَنَّها حَصيلة عَمَل مَيْدانِيّ وليست اقتباسًا من أيّ مُعجَم أو مِن بنوك المعلومات.
- بُذِلَت عِناية كَبيرة في تَحريره وتَشكيله وضَبُطه، مِمّا يَجعل مكتبة لبنان ناشرون تُفخر بأن تُقدِّم إلى العالَمَ العربيّ مُعجَمًا مُتخصِّصًا في مَوْضوعه، عامًا في أَهْدافه، بِحَيْثُ يَحتاجه العالِم والأُستاذ، والطالب والمُثقَّف، ويُلبِّي رغبة الناس في معرفة خَصائص النَّباتات، والاستفادة من استعمالاتها، والابتعاد عن مَضارِّها، في عَصْر شَكَّلت فيه العَوْدة إلى النَّداوي بالنَّباتات، مُباشرة أو مُداوَرة بسِمة بارِزة في مسيرة العِلْم بعامة والطبّ بخاصة.

ميشاه جايات

مُوسُوكَتُ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي ال

عَرَبِي - إنجليزي - فركني - ألماني - لاتيني

٣١٣ نَبتَة – ٤٤ صُورَة مُلوَّنة ٣ مَـالاحِق – ٨ مسَـارِد

مُعْمُ مُكْتبة لبناث نَاشِرُونَ

فهرس المواو

1	– المُعْجَم
YV0	- ملاحق Appendices/ Appendices
YVV	١ - الفصائل النَّباتيَّة (عربيّ - فرنسيّ - لاتينيّ - إنجليزيّ)
YA•	٢- المُركّبات الكيميائيَّة في النّباتات (فرنسيّ - عربيّ)
٣•٤	٣- الوَصْفات الطُّبِّيَّة (فرنسيّ - إنجليزيّ - عربيّ)
٣٣٢	- مُسارد Glossaires/ Glossaries
٣٣٥	١- مَسرد عربتي
٣٥٤	٢- مَسرد إنجليزيّ
۳٥٩	٣- مَسرد فرنسيّ
***	٤- مُسرد ألمانيّ
٣٧٨	٥- مَسرد لاتينتي٥
۳۸۰	- مَسارد المَلاحق
۳۸۷	١ – مَسرد عربتي١
۳۹٦	٢- مَسرد فرنسيّ
٤٠٣	٣- مَسرد إنجليزيّ
٤•٧	٤- مَسرد لاتينيّ
٤ • ٩	– مَسرد عربيّ عام
o•Y-39	- مَسرد إنجليزيّ عام General English Index
051	General Scientific Index ale ::: V >

nées (F)

٣- أَثْرُوبِيْن وقَلْويدات الباذِنْجانِيّات Atropine et Alcaloïdes des Sola-

إنّ قلويدات الباذِنْجانيَّات مِثال نيكوتين التَّبْغ، أَثْرويين البلَّادُون، هيوسِيامين البَنْج، أَبُّوأَتْروپين أو أَتْرُوپامِين البلّادون، هيوسين وسقُويُولامين البَنْج، وكذلك الأَكْغُونِين وكوكايين الكوكا (من فَصيلة الكُوكِيّات)، يَجب أن يُنظر إليها، تبعًا لتركيبها، كمشتقّات على بعض التَّباعد من البيرُّول ومن البيريديل.

إن الييرول الذي اكتشفه رُونج Runge في نتاج التَّقطير الجافّ للمواد الحَيوانيّة (مثال زيت دِيْيًل الحيواني) حيث يُوجد موادّ ييريديكية، إن الييرول هو قاعدة خفيفة تجعلها العناصر المهدرجة تنقلب إلى حالة ديهيذرُوپيرول أي پيرولين C4H6NH ومن ثم إلى حالة ترترا هِيدرو بِيرُّول أَي بِيرولِيدِين C4H8NH. الييرول تركيبه C₄H₅N.

أما البيريدين الموجود كذلك في زيت دِیْیًا Dippel فهو قاعدة قویّة ترکیبُها C₅H₅N هو تركيب البَنْزين الذي تُستبدَل منه مَجموعة CH ثُلاثِتة التَّكافُو بـ N واحدة تكون بدورها ثلاثية التكافؤ . Trivalent

عَلاقات مُشْتَرَكَة بَيْن قَلْويْدات البلادُون والبَنْج والدّاتُورة، إلخ.

عندما نُؤَسْتِر التروپين C6H15ON بواسطة حامض ترُوييك C9H10O3

١- أَيُّوزام مُضاد للإسهال Apozème antidiarrhéique (F)

فُوسفات كلسي قاعدي 1. لُبٌ خُبز قمح ۲. تُحت نيترات البيثموث. ٦. شراب الراتانيا صبغة القِرُّفَة لُوْدَانُم سِيدِنْهاملُوْدَانُم سِيدِنْهام نَمزُج. يُؤخَذ بمقادير مُتساوية على

٢- أَبُّوزام مُضادّ لليَرقان **Apozème** anticitérique (F)

ثلاث دُفعات خلال ٢٤ ساعة، لكي

يَحلّ النَّقيع الأبيض.

جَذر شَيْلَك جَذر فُوَّة جَذر سَوْخَس٥٤ جَذر راسَن دُرْدِيًّات حامِض البوتاسيوم٨ ... ماء

نَغلى الجذور في الماء لمدَّة ٤٥ دقيقة، نُمرِّر ونُضيف الدُردِيّات. يُشرَب هٰذا المُستحضر خلال النهار.

أثر

نُحصل على أثرُوبينات يمين ويسار وخامِلَة أي مُرازَمَة C₁₇H₂₃O₃N₆ وذلك تبعًا لما نَستعمل الحامض التروبيك الحَدَقَة، جَفاف الفَمّ). اليمين أو اليسار أو المُرازَم. إن الأُتْروپينَيْن، اليمين واليسار، ينصهران عند ١٠٨,٥° سغ؛ الأتروبين اليسار هو مُماثل للهيو-سيامِين في نبات البَنْج وفي نَبات البلّادون؛ بَينما الأتروپين الخامِل فهو مُماثِل للأتروبين الطَّبيعيّ.

> إن الهيُوسين C₁₇H₂₁O₄N الَّذي نَجدُه في مياه تحضير الهيوسيامين (في نَبات البَنْج) والذي يُطلَق عليه كذلك اسم سقُويُولامين يَسار، ليس ترويايين، ذلك أنه يَنشطِر بواسطة الحامض الكلورهيدريك المخَفَّف والسَّاخن إلى حامض تروبيك وإلى سقُوپُولين C₈H₁₃O₂N قاعدة تَنصهر عند ۱۱۲° سغ وتَغلي عند ۲٤۲° سغ.

> السقوپولامين المُستخرَج من سُكُرّان الــِـابـان (۱) Scopolia japonica هــو مُتَجازئ الهيوسين؛ كما أن هاتين المادَّتين بالذَّات هما مُماثلتين بالنسبة لمعظم العُلماء.

> إن الأيُّوأَتْرويين C₁₇H₂₁O₂N أي الأنْرُوپامِين الذي وُجد في جذر البلادون قد لا يوجد مُسبقًا في هذا النَّبات؛ ولكن من المرجِّح أنه يَتشكّل على حساب الأثرويين أثناء تحضيره. وهو بالتالى يَعمل باتجاه الأثرُوبين ذاته

من دون أن يكون أكثر سُمِّيّة منه؛ وقد يَخلو من بعض التأثيرات الثَّانويَّة (تَمدُّد

البَلّادُونين C₁₇H₂₁O₂N قد يَحصل من جرّاء تَحوُّل الأَبُّوأَتْروبين بواسطة الحرارة ويكون مُتَجازِنًا له. المادَّتان وُجِدتا في مياه تَحضير الأَثْرُوبين.

الدُوبُوَازِين (راجع المعجم الرابع ص ٩٣ رقم C₁₇H₂₃O₃N (١١٤ الموجود في نَبات الدُوبُوازيا Duboisiamyoporoides ۸٦ ص الثالث ص ٨٦) R. Br. رقم ١١٩) يُعتبر مُماثلًا للهيوسيامين (أَتْروبِين يسار). الدّاتُورين C₁₇H₂₃O₃N الموجود في الداتورة الشائكة Datura stramonium کان یُعتبر فی کودکس ١٩٠٨ على أنّه مُرادف الأَثْرُويين.

٤- أثيل هيدروكُويْراييْن Éthylhydrocupréine (F)

المواصفات - مسحوق أبيض، طعمه مُرّ، قليل الذُّوبان جدًّا في الماء، يَذوب في الكحول، والأثير، والكلوروفورم، والزّيوت؛ مُعطيًا ما يُسمّى بتَفَاعُل «الكينين النَالْيُ ويجِيّ»(٢): . Thalléioquinine

الخصائص - طارد للحُمّى، ولكنّه استُعمِل بنوع خاص كدواء واقي وشاف

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف وهي من تاليوم: Thallium

لرَبو الحساسية، عن الطَّريق الدَمْعِية والأنفيّة. وأُعطي كذلك كدواء نَوعيّ (مُتخصِّص) للإصابات المُتسبِّبة عن المُكوَّرة الرِّنويّة.

طريقة الاستعمال - يُعطى في بيلولات أو كبسولات بمقدار غرام واحد وغرام ونصف بأجزاء من ٢٥٠ غرام، وفي زُرْقات في غِشاء الجَنْب أي غشاء الرَّثة المَصْلِق بعد البَضْع أو البَزْل (محلول بنسبة ٥٪، ٢٥٠ ملل لكل سنة من العيون، في محلول أو مرهم بنسبة ١٪. العيون، في محلول أو مرهم بنسبة ١٪.

٥- أخِيليا بَقْلَةُ العُطَاس، بَقْلَة العُطَاس،
 سَعُوط

Sneezewort, Bastard pellitory (E)
Ptarmique, Achillée Sternutatoire,
Herbe à éternuer, Bouton d'argent,
Herbe Sarrazine, Lin Sauvage (F)
Betramgarbe, Niesgarbe (D)
Achillea ptarmica, Achillea macrocephala, Ptarmica vulgaris (S)

نَبات جذموري مُعمَّر، أرومته مَدّادة، النَّبات ويَستعملونها مِن فَصِيلة المُركَّبات، يَعلو من ٣٠ إلى ٩٠ والعَرافَة والكَهانَة السم. ساقه فَرعاء. صُلبة، فروعُها الصين منذ أكثر من مُنتَصِبة، كثيفة الكساء بأوراق لاطئة، وقد جاء ذلك في مُتعاقبة، خَطِّية الشَّكل السِّنانيّ، غير والتَّغييرات، الذي يُه مُنقَطة، مِنْشاريّة التَّسنين. رؤيساته King. وكانت هذه الرَّهريّة عِنقِيَّة التَّجميع المُرتَخي. أزهاره الاستعمال الطبِّيّ الذي يبضاء. ثماره أكنات. كل أقسام النَّبات بكثير ممّا كان عليه.

مُستحبَّة العطر الذَّكيّ. نَبات واسع الانتشار الأوروبي حتى القُوقاز وسيبيريا. زُرع كنوع طِبِّيّ وتَزيينيّ منذ القرن السادس عَشَر.

المُركِّبات - زيت دُهنيّ. الجذور تحتوي على إينُولين.

الخصائص - مُكعِّبة، طاردة للرِّيح، مُنظِّمة للتَّغيُّط، مُهدِّئة ألم الأسنان، مُهدِّئة آلام الرُّوماتيزم، مُقويَّة، مُنشَطة، مُشَهِّية، مُطَهِّرة، مُبَوِّلة.

الاستعمال - الرِّيزوم، وأحيانًا الأزهار والسّوق المُورِقة. فَقْد الشَّهيّة، وَهن، إصابات بَوليّة، أسنان، مَعِدة، روماتيزم، فَقد اللُّعاب.

طريقة الاستعمال - نُقاعة مِلعقة صغيرة من الرِّيزوم المُجفَّف المُقطَّع في مقدار فنجان ماء غال، يُغطَّى ربع ساعة ويُصفِّى. يُمكِن لَوْك الرِّيزوم ومضغه كالعلكة بهدف إثارة اللُّعاب.

ملاحظة - كان الصّينيُون في الماضي يأخذون خمسين عُودًا مُجفَّفًا من فروع النّبات ويستعملونها في طقوس التّنجيم والعَرافَة والكَهانَة التي كانت مُتَّبعة في الصين منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة. وقد جاء ذلك في كتاب التّحوُّلات والتّغييرات، الذي يُطلقون عليه اسم -Yi وكانت هذه الأخيليا قديمًا شائعة الاستعمال الطبّي الذي أصبح اليوم أقل المتعمال الطبّي الذي أصبح اليوم أقل من حمّا كان عله

أخ ي

أخ ي ٦- أخِيْلِيا دُوْلابِيَّة (١)

Achillée herbe roue (F) Achillea Herba-rota (S)

نَبات بَرِّي، رِئْدي، قَزِم، عَدُوّ الكلس Calcifuge من فصِيلَة المُركَّبات يَعلو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراقُه السُّفلي مُتطاوِلة، مُعنَّقة، العُليا لاطئة ومُفَرَّطة. النَّصل مُنقَّط بغدد عِطْريّة. الرُّؤيسات مُسوَّقة، في أعذاق مُرتخِية؛ ٤ إلى ٧ لُسَيْنات بَيضاء اللَّون. مَهده جبال الألْب الغَربيّة. رائحته قوية جدًّا.

الخصائص - يَشتهر أنّه شافٍ للجُرح ويَدخل في ما يُسمّى Faltrank.

هُوْيُلِيا فَتِيَّة ، أخيليا أجِيراتُم اللهُ الْجِيراتُم اللهُ الْجِيراتُم (E)
Sweet maudlin, Ageratum milfoil (E)
Achillée agérate, Achillée visqueuse,
Eupatoire de Mésué (F)
Balsamgarbe, Gewürzgarbe (D)
Achillea ageratum, Achillea viscosa (S)

نَبات بَرِّيِّ من فَصِيلَة المُركَّبات يَعلو من ٢٥ إلى ٥٠ سم، قاعدته مُتَليِّفة. سامّة بَسيطة، مُنتصِبة، فَرعاء الرَّأس. أوراقه مُتطاوِلة جدًّا، بسيطة أو مُفصَّصة الأسفل؛ النَّصل مُسنَّن، مُنْفَرِج، مُنقَّط بالغدد. الرُّؤيسات صغيرة تَجتمع في

أعذاق مُتراصة. لُسَيْنات قصيرة صفراء اللَّون. مَنطِقة البحر المُتوسِّط.

الخصائص - كان يُستعمَل في الماضي كطارد للدّود ولكنّه أُهمِل اليوم تمامًا.

٨- أخِيْليا نانا(٣)

Achillée nain, Dwarf milfoil (F) Zwerggarbe (D)

Achillea nana (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصيلَة المُركَّبات يَعلو من ٥ إلى ١٥ سم، قَزِم، عَدُو الكلس، مُوبر صُوفي، مُرمَد اللَّون، يَشتهر في جبال الألْب. أرومته مَدّادة. أوراقه السُّفلى مُعنَّقة، العُليا لاطئة، خَطِّية مُتطاوِلة، رِيشيّة التَّشريح. قُلافة صُوفيّة ذات وُريقات مُطَرَّزة باللَّون البُنيِّ. فاحذاق صغيرة بسيطة. لُسَيْنات مُبيَضَة اللَّون. مَهده جبال الألْب، حيث يَشتهر كنبات طبيًى.

(٤) أخِيليا صُوفِيَّة، أخِيليا نَانَا (عَالَمُ الْعَلَيْةِ الْعَلِيْةِ الْعَلِيا اللهِ (F) Génépi bâtard, Achillée laineuse (F) Achillea nana

تَتَوزَّع أنواع الأُخيليا إلى نَباتات كبيرة القَدِّ تَعلو حتى ١٥٠ سم، منها الأبيض والوَرديِّ والأصفر؛ وإلى نَباتات صغيرة القَدِّ تَعلو من ١٠ إلى ٥٠ سم، منها الأبيض والأصفر. الأخيليا الصُّوفيَّة من

⁽١) التَّسمية العربيَّة والفرنسيَّة للمؤلِّف.

⁽۲) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسميتان الفرنسيَّتان الأولى والثانية والتَّسمية الإنكليزيَّة الثانية للمؤلِّف.

⁽٣) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيَّة للمؤلّف.

⁽٤) التَّسميتان للمؤلِّف.

أخ ي

الأنواع القَزِمة، وهو نَبات مُوبِر صُوفي المظهر، مُرمَد اللَّون، أرومته مَدّادة، يَعلو من ٥ إلى ١٥ سم. أوراقه السُّفلى مُعنَّقة، العُليا لاطئة، خَطِّية مُتطاوِلة، ريشيّة التَّفليق. قُلافته صوفيّة ذات وُريقات مُطرَّزة باللَّون البُنِّي. أعْذاقه صغيرة، فَرديّة، لُسَيناتها مُبيضَّة اللَّون. نَبات جَبليّ، عَدوّ الكلس.

المُركِّبات والأقسام - في النَّبتة المُزهِرة، زيت دُهني، جواهر مُرَّة.

الخصائص - مُشهِّية، مُسهِّلة للطَّمث، مُنشِّطة للمَعِدة، مُعَرِّقة، مُقَوِّية عامّة، مُنشِّطة للمَعِدة، مُعَرِّقة، مُقَوِّية عامّة، شافية للجرح من الدّاخل ومن الخارج، طاردة للحُمّى، نافعة في حالات «الحَرّ والبَرْد».

الاستعمال - فقدان الشَّهيَّة، وَهْن، ضَعْف الحيويَّة، نَهَك نَفسانيّ، طَمْث غير كاف، إصابات رِئويَّة مُتَسبِّبة عن البرد، إلتهاب المَعِدة، إلتهاب المعي.

طريقة الاستعمال - لزيادة الشَّهيّة، فنجان قبل الوجبات من نقاعة ٣غ رؤوس مُزهِرة مُجفَّفة في فنجان ماء غال يغطّى ١٥ دقيقة؛ في الوَهْن، فنجان يومي من نقاعة ملعقة صغيرة نبات مزهر مجفّف في فنجان ماء غال؛ في شحّ الطَّمث وآلامه، فنجانان في اليوم، من نقاعة و٢غ نبات في ليتر ماء غال يغطّى ١٠ دقائق، قبل الموعد المرتقب بأسبوع.

(١) أخِيليا مِنْجَلِيَّة ، أخِيليا دِمَشْق (١٠ Falcate milfoil, Damascus milfoil (E) Achillée falquée, Achillée falciforme, Achillée de Damas (F) Damaszengarbe (D) Achillea falcata, Achillea damascena, Achillea sulphurea (S)

نَبات بَرِّى لُبنانيّ مُعَمَّر من فَصِيلَة المُركَّبات يَعلو من ١٥ إلى ٤٥ سم. سُوقه أسطوانيّة غير مُثَلَّمَة. أوراقُه مُبيَضَّة اللُّون، تَنحنى على شَكْل مِنْجَل، طول الأوراق الساقية ١,٥ إلى ٣ سم وغرضها ٠,١ إلى ٠,١٥ سم، العُليا لا تَصل إلى الأعداق، ريشية التّشريح، سَكَماتُها مُتراكِبة، ثُلاثيّة الفُصوص المُستديرة الدَّقيقة الأسنان. الرّؤيسات من ٣ إلى ٤؛ عرض الأعذاق ١,٥ إلى ٤ سم. القُلافات بَيضيّة الشَّكْل أو نِصف دائريّة. القُنابات بَيضيّة مُثَلَّثة، مُزَوْرَقة، لِيديّة. اللَّسَينات ٥ إلى ٧، فاتحة اللَّون الأصفر، طولها ١,٥ إلى ٢ مم. أزهار الأسطوانة من ٢٠ إلى ٣٠ زُهَيرة. الإزهرار من نيسان إلى تموز في الجفاف والفّيافي.

الخصائص - مُضاد لوَسُواس المَرَض. الاستعمال - ذُكر عن هذا النوع أنّه يُستعمَل جدًّا في الهند، وعلى شكل صِبغة كُحوليّة ضِد وَسُواس المَرض ومُعالجة من كان سَوْداويّ الطَّبْع.

⁽١) كل التَّسميات ما عدا اللَّاتينيَّة للمؤلِّف.

الأدنيتينُول هو دواء أساسه الهَلَنيان، أي أَسْتِيرِ اليَصْفُورِ المُزدوجِ النَّخلِيْكِ: Ester dipalmitique de la æanthophylle ou lutéine وهو مَسْحوق أحمر اللَّهِ ن يُستخرَج من أزهار مُختلَف أنواع المُخْمَلِيّة Tagètes، وهي نَباتات تَزيينيّة من فَصِيلَة المُركّبات مَهدها المكسيك وتَنتشر في قُرى لُبنان وحدائقه.

الخصائص - يُخصَّص هذا الدّواء لمحاربة إضطرابات حِدَّة النَّظَر وعلى الأخصّ لتحسين الرّؤية اللَّيليّة غير العاديّة أو غير الكافية وتَحسين ضَعْفها: سائقو السَّيَّارات، عُمَّال لَيليُّون، عُمَّال إلى خُزيران في المراعي. مَناجم، إلخ.

طريقة الاستعمال - خالِ من السُّمِّيَّة، يُعطى على شكل مُلبَّسات مُعَيَّرة من ٥ ملغ الرَّبيعيّ هو الّذي يُعتبَر مَخْزَنيًّا. من الهَلَنيان Héléniène ، يُؤخَذ منها من ٢ إلى ٤ في اليوم، مُلَبَّسة أو اثنتين في ١٣- أدُونِيس الهيرينيه مُنتصَف كلّ وجبة، لمدَّة عشرة أيّام، نَتُوقُّف بَعدها لفترة عشرة أيَّام، ونُعاود العلاج لمدة عشرة أيام أخرى وبالمقادير ذاتها.

> ١٢ - أدُونِيس صَيْفِي، عَيْنُ الحَجَل، عَيْنُ التُّدْرُج

> Summer adonis, Summer pheasant's eye, Talladonis (E) Adonis d'été, Adonide estivale, Œil de

نبات حولي من فَصِيلَةِ الحَوْذانِيَّات، أمْرَط أو ذات أوبار مُتفرِّقة على بعض الأوراق وعلى الكأستات. ساقه منتصبة تَعْلُو مِن ١٥ إلى ٤٥ سم. أوراقه السُّفلي مُعنَّقة، مُقَطَّعة إلى شيور حادّة مُتفاوتة الطّول. قُطْر الزَّهرة ١,٥ إلى ٣ سم. الكأسيّات ٥، لاصقة بالتّاج، مُخضرّة أو مُحمرة اللُّون، مَرْطاء أو قليلة الوَبْر من الخارج. البَتَلات ٦ إلى ٨، قِرْمِزيّة واضطرابات تَكَيُّف أو تَكييف العَيْن، اللَّون الأحمر، مُلطَّخة القاعدة عادة بالأرجوانيّ الأسود. الأسدية بَيضانيّة، سوداء اللُّون البِّنَفسجيُّ. يُزهر من آذار

الخصائص - ذُكِرَ أنّ عَمَله هو مُتقارب من عَمل الدِّيجيتال، عِلمًا بأنَّ الأدونيس

Adonis des Pyrénées (F) Adonis Pyrenaica (S)

نَبات حَولتي من فَصِيلَة الحَوْذانِيَّات يَعلو نحو ٣٠ سم، بَتَلاته صفراء اللُّون، من ٨ إلى ١٠ تَتَفتَّح على صُخور المراعي الألبية الجَنوبيّة وفي جبال الپيرينيه في تموز.

١٤ إِذْ خِر، طِيْب العَرَب، تِبْن مَكّة، تِبْن الجَمَل
 الجَمَل

Camel's hay, Scenanth (E)
Schænanthe, Jonc odorant, Foin de
chameau, Vétiver (F)
Cameleshov, Citronengras (D)

Andropogon Schænanthus (S)

مادَّة تصل إلى أوروبا من العَربيَّة السَّعوديّة؛ تكثر جدًّا في براري الهند وماليزيا. وهي أنواع من القَصَب القصير، الحُزْميّ الانتشاب. تنسب إلى النوع .Andropogon schænanthus L فصيلة النَّجيليّات. سوقه وأوراقه تعطي دهنا عِطريًا يُستعمل استعمال دهن .A دهنا عِطريًا يُستعمل استعمال دهن .A المناطق ضِد القُرحات والرّوماتيزمات. تدخل في تركيب الترياق.

الخصائص - مثيرة، مهيِّجة، عَصبيّة، لم تعد مستعملة.

هناك زيوت دهنية مختلفة تصنع في سيلان وسنغافورة بكميات كبيرة وتُنسب إلى أنواع مختلفة من جنس Andropogon (أي Cymbopogon). وهيي زيوت تستعمل في تزوير الزيوت الدهنية عامة، وزيت الورد الدهني خاصة، وتستعمل كذلك كعطور أساس. تحتوي على ٥٥ إلى ٧٥٪ من الجيرانيول ومن السيترونيلال.

إن الزيت الدهني المسمّى دهن الجيرانيوم الهندي هو زيت باهت اللون

الأصفر، رائحته تذكّر برائحة الورد؛ كثافته تختلف من ٨٨٨، إلى ٨٩٦، يعطي محلولًا صافيًا مع ٣ أجزاء وأكثر من كحول ٧٠ درجة. ذَوَابيّته كاملة في ٤ أحجام من محلول سالسيلات (بالتساوي)، مضافًا إليها حجم واحد من الماء. يحتوي هذا الدهن على جيرانيول، منه ٩٤،٥٪ بحالة حُرّة، وعلى سيترونيلُول وعلى بقايا مَتِيْل مَبْنَانُون.

دهن حشيشة اللَّيمون الذي ينتج من A. citratus D.C. (شائعة الـزراعة التَّزيينيّة في لبنان) له رائحة اللَّيمون البارزة جدًّا، لونه أصفر أو محمر اللون البُنِّيّ، كثافته ٩٠٨٠ إلى ٩٠٩٠؛ وهو مؤلِّف بنوع خاص من سيترال (حتى مؤلِّف بنوع خاص من سيترال (حتى احجام من سالسيلات صودي مضافًا إليها نصف حجم ماء، فإنه يذوب بمعظمه نصف حجم ماء، فإنه يذوب بمعظمه (٩٩٪).

(۱) اَرْطَمَاسِیَا سَوْدَاء، اَرْطَمَاسِیَا اَنْثَی (۱۰ وَهُوَاءِ) آرْطَمَاسِیَا اَنْثَی (۲۰ Génépi noir, Génépi femelle (F) Artemisia Spicata Jacq. (S)

عِدّة أنواع تُدعى Génépi، تَنبت على صخور الجبال العالية حتى ٣٤٠٠ مترًا. خصائصها الطبّيّة ذاتها. وهي أنواع معشوشبة مُعمَّرة من المُركَّبات، تَنمو في باقات صغيرة تعلو من ٤ إلى ١٥ سم.

أرط

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

دقائق، قبل الموعد المرتقب بأسبوع.

١٦ - أرْقِطْيُون مُزَغْبَر، أرْقِطْيُون صَغِير مُزَغْبَر (١)
 مُزَغْبَر (١)

Downy bachelor's buttons, Pubescent bachelor's buttons (E)

Bardane pubérulente (F)

Weicherklette, Weicherkleinklette (D) Arctium minus pubescens, Lappa ninor pubescens (S)

المُركِّبات والأقسام - في النَّبتة المُزهِرة والجذور، زيت دُهني، جواهر مُرَّة.

سوقها مُزهِرة فَرديّة؛ أوراقها سَيريّة مُرمَدّة

اللُّون الأبيض، حَريريّة المظهر، عديدة نحو القاعدة ومُعنّقة؛ أزهارها أنبوبيّة

صفراء في رؤيسات كُرويّة صغيرة. رائحتها رائحة الأبنث القويّة؛ طعمها

مُرّ. الأرطماسيا السوداء تنمو في باقات

مُنعزلة ذات سُنْبُلة زَهْريّة أو سنبلتين

طويلتين، مُقَوَّستين، وَحيدتي الاتِّجاه،

رؤيساتها مُسودّة اللّون، صغيرة، لاطئة،

أوراقها شبه بسطة.

الخصائص - مُشهِّية، مُسهِّلة للطَّمْث، مُنشِّطة لِلمَعِدَة، مُعرِّقة، مُقوِّية عامة، مُنشِّطة لِلمَعِدة، مُعرِّقة، مُقوِّية عامة، شافية للجرح من الدّاخل ومن الخارج، طاردة للحمّى، نافعة في حالات «الحَرّ والبَرْد».

الاستعمال - فقدان الشهية، وَهُن، ضَعْف الحيوية، نَهَك نَفسانيّ، طَمْث غير كاف، إصابات رِئويّة مُتَسبِّبة عن البرد، إلتهاب المعنى.

طريقة الاستعمال - لزيادة الشهية، فنجان قبل الوجبات من نقاعة ٣غ رؤوس مزهرة مجفّفة في فنجان ماء غال يغطّى ١٥ دقيقة؛ في الوهن، فنجان يومي من نقاعة ملعقة صغيرة نبات مزهر مجفّف في فنجان ماء غال؛ في شحّ الطمث وآلامه، فنجانان في اليوم، من نقاعة و٢٥غ نبات في ليتر ماء غال يغطّى ١٠

نبات لبناني نادر نسبيًّا معمَّر غير شَوك من فصيلة المُركّبات. ساقه متفرّعة تعلو من ٣٠ إلى ٨٠ سم وأكثر. أوراقه معنقة، ينضاوية قلبة القاعدة، طحلاء أو مرطاء الصفحة السفلي، القاعدية منها عريضة تطول نحو ۳۰ سم وأكثر وتعرض نحو ٢٠ سم وأكثر. رؤيساته الزهرية في عناقيد صغيرة، عرضها من ١٥ إلى ٣٥ ملم، مرطاء أو خفيفة الكساء العَنْكَبُوتي. قنابات القلافة ضيّقة جدًّا عرضها أقلّ من نصف ملم. رؤيساته الزهرية أقوى من رؤيسات الأرقطيون الصغير، يبلغ قطرها ٢٥ إلى ٣٥ ملم. زُهَيْراتها تصل إلى مستوى القنابات القُلافية كحدّ أقصى. مآبرها زائدية الرأس والقاعدة. الأكنات متطاولة، خشنة ومتدرِّنة. القنزعة من الحرائر المُشَبَّكة العابلة جدًّا. إزهراره من حزيران إلى تشرين الأول. يرغب الأماكن الرطبة.

⁽١) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيَّة للمؤلِّف.

المُركِّبات - الجذر يفقد فعاليته بكاملها تقريبًا بالتجفيف، وهو يحتوي على إيْنُولِيْن (٢٧ إلى ٤٥ بالمئة)، زيت دهني حتى ٢٠، بالمئة، لُعاب، مواد عَفْصيّة، راتنج، كربونات البوتاسيوم، كربونات الكلسيوم، مغنيزيا، الكلسيوم، نيترات البوتاسيوم، مغنيزيا، هيتروسيد يدعى لَيِّيْن أو لَبُّوسِيْد، وعلى الكِنيسِلِين مبيد للبكتيريا والجراثيم وفعّال في القضاء على المُكوَّرة العُنْقُوديَّة. في البُدور يوجد هيتروسيد يُدعى أرْقِطيين أو لَرُقطيين أو أرْقِطين أو كُر قِطيد أو على المُكوَّرة العُنْقُوديَّة. في المُدور يوجد هيتروسيد يُدعى أرْقِطين أو كُل أقسام الأرقطيون تحتوي على خميرة مُوَّكُسِدة فَعَالة جدًّا وهذا ما يؤكّد الفائدة الكبرى من تَشْبِيت هذا النبات

ومستحضراته الطبية. في الجذور أيضًا

يوجد أرْقطُوز تركيب Arctose

 $(C_6H_{10}O_5)_n$

الخصائص - الأرقطيون قد يَحلّ غالبًا محل الفشاغ؛ وهو مُنقّ؛ مُعرِّق، مُبَوِّل يزيل الحامض البَوْليّ، مُفرِز للصّفراء، مسهل المعدة، مضاد للسّفْلِس، مضاد للسُّكِّري، مضاد للسمّ، دواء موضعي. الجذر مبيد للجراثيم والبكتيريا، مبيد للمُكوَّرة العُنقُوديَّة، والمُكوَّرة العُنقُوديَّة المُدَهَبَة، والمُكوَّرة العُقديَّة، والمُكوَّرة العُقديَّة، والمُكوَّرة الرُوراق الرُّنويَّة. مضاد فعال للدمامل. الأوراق السّد فعالية من الجذر، فهي مُهدِّئة بارزة أشد فعالية من الجذر، فهي مُهدِّئة بارزة جدًّا للحكيَّة القُوبائيَّة. الأرقطيون المُعالَج بواسطة الأثير كان يعطى دواءً أو أساسًا

لدواء سِرِّي يستعمل ضد الصَّلَع والجَلح والمَرط وتساقط الشعر. البذور زَيْتيَّة، تشتهر على أنها مُبوِّلة أكثر من الجذور، وهي تستعمل مُسْتَحْلَبَة. يشتهر جذر الأرقطيون أنه شفى الملك هنري الثالث من السَّفْلِس.

الاستعمال الداخلي - داء الدمامل، داء الجَمْرة، خراجات الحنجرة والأسنان، الجَمْرة، خراجات الحنجرة والأسنان، إنتان المُكَوَّرات العُنْقُوديَّة، الأمراض الجلدية النَّازَّة والمُتَقَبِّحة، العُدِّ أي حَبّ الشباب، قُوبات، أكزيمات، قروح، قَرَع، حَصْبَة، نِقْرِس (خاصة في قرَع، حَصْبَة، نِقْرِس (خاصة في أرْضيّات تناسليّة جِنسيّة)، روماتيزمات، سِفْلِس، سُكّري، رُمال بَوْليّ، لَدْغ الأفاعي. المَرَط، تساقط الشعر. الأوراق المَغليّة لها فعالية بارزة في تهدئة الحكَّة القُوبائيّة الشديدة.

الاستعمال الخارجي - سَيَلان الوجه الزَّهَميّ، الأكزيمات، القرحات الواهِنة الغُدِّيّة، القروح الملوَّثة المُتَقَيِّحة.

طريقة الاستعمال الداخلي - يستعمل غضًا غير مُجَفّف. نقيع ٤٠ غرامًا من الجذور في ليتر ماء يُغلى ١٠ دَقائق ويؤخذ منه في الحَصْبة: ملعقة صغيرة كل ٥ دقائق. يكتمل الطَّفْح تمامًا خلال ساعتين. يتمّ الشفاء خلال ٣ أيام (تَوَقِّي مجاري الهواء)؛ في الرُّمال والإصابات الأخرى: ٢ إلى ٣ فناجين في اليوم؛ في النَّقرِس: نقيع ٢٠ غرام جذور في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق ويؤخذ مِقدار ليترين خلال

أرق

النهار بين الوجبات. مسحوق الجذور يؤخذ منه ۲ إلى ٤ غرامات في سائل ما. البذور مُبوِّلة في نُقاعة ٤ إلى ٦ غرامات في ماء غالٍ يُغطّى ١٠ دقائق. المستخلص المائع في بيلولات: مستخلص أرقطيون مائع مُثَبَّت ٠,٢٠ غرام، مسحوق السُّوس كمية تكفى لبيلولة واحدة؛ من ٥ إلى ١٠ بيلولات في اليوم. صبغة أو مستخلص جذر الأرقطيون المُثبَّتَة، وهو مستحضر يُنصح به جدًّا، ١٠ إلى ٣٠ نقطة، ٢ إلى ٣ مرات في اليوم. في اليابان تُغلى الجذور في الماء والملح وتؤكل كخضار على غرار السَّلْسَفِيل.

طريقة الاستعمال الخارجي - يستعمل غضًا غير مُجَفَّف. الأوراق الغَضّة المَمْعُوسة في لصوقات على لَدْغ الأفاعي (لُوجَانْدر، بلينو، برِيسَّمُورِيه)؛ الأوراق توضع على الصدر في الإصابات الرِّنويّة المزمنة، الزُّكامات السّابِغة، كما توضع على كافة الأوجاع كالروماتيزمات والنقْرس وسواها. الأوراق المسلوقة في لصوقات على النقرس. الأوراق الممروثة في زيت الزيتون قد تُسرِّع التئام قرحات الساق (محاولة معالجة السرطانات المتقرّحة). الجذور الغَضّة إذا أمكن، ٣ كمشات في ليتر ماء يُغلى ٢٠ دقيقة وتُغسل به مرارًا الإصابات الجلدية كالسّيلان الزّهميّ في الوجه، والأكزيمات الناشفة، والحصف، وحَبّ الشباب. لُوسيون للرأس وتمسيد الفروة ضدّ تساقط ﴿١) التَّسمية للمؤلُّف.

الشعر. كحولتور الأوراق الغُضّة يوضع على بعض الإصابات الفَمِّيَّة البَلْعُومِيَّة. فعالية ثابتة ومؤكَّدة في معالجة الدَّمامل، بمقدار ٢ إلى ٣ غرامات في اليوم من المستخلص المائع المائي، كما يمكن أيضًا أخذ ٠,٦٠ إلى ١,٨٠ غرام من مستخلص الأرقطيون المُثبَّت. إن اشتراك الأرقطيون مع القَصْدِير للهدف عينه، كان يُسْتَغَلُّ بأسماء مختلفة: كاسِّيتُول، كُولُّوبياز القَصْدير، إلخ.

١٧- أرُورُوت البرازيل^(١) Arrow-root du Brésil (F)

يُستخرج دقيق المَنيُوك أو المَنيْهُوت، والذي يُسمّى أيضًا مَنْديوكا، وأروروت بَاهِيا، البَرازيل، والرِّيو، أو الپّارَا، من الجذور المُتدرِّنة من جنس مَنيْهُوت؛ منها المَنيهوت المُرّ Manihot utilissima M. dulcis = والمنيهوت الحُلو M. aipi وهي نَباتات من فَصيلة الفَرْبِيُونيّات. ويَحتوي النَّوع الأوَّل على نِسبة بَارزة من حَمْض السِّيَانيدْريك. ولكنّ هذا الجَوهر يَختفي بواسطة التَّخمير.

طريقة التحضير - تُبشر الدرنات على لُوحة مُزركَشة برؤوس صغيرة حادّة، ومن ثُمّ يُترك اللُّبّ لكي يَتَخمَّر طوال ٢٤ ساعة. يُوضع بعد ذلك في أكياس من الشُّعر عريضة الثِّقوب، ويُستخرَج منها

٦ بالمئة من هذا الغش.

يُخلَط جزء واحد من الأروروت المُراد فحصُه مع ثلاثة أجزاء من سائل خاص للفَحص التَّجريبيّ، مُؤلَّف من جزأي حامض كلورهيدريكي بثقل نَوعيّ المُقطَّر؛ ومن جزء واحد من الماء المُقطَّر؛ فإذا كان الأروروت نقيًّا، لا يطرأ عليه أيّ تَلَف أو إنساد؛ أمّا خِلافًا لذلك، فإن دقيق البطاطا، والنَّشاء، يَتَماسك على شكل مُجَمَّدة شَفّافة تُصبح مائِعةً فيما بعد؛ يَترسَّب الأروروت بعد راحة بضعة ساعات، ويُعاد التِقاطُه وجَمعُه على ورق التَّصفية، وغسله، ووزنه. أمّا المواد المَعدِنيّة فيمكن كَشفها بواسطة الحَرْق.

(اطلب دراسة مَنِيْهُوت في المعجم السادس ص ٢٣١ رقم ٢٧٩).

ارْيَل أَحْمَر ، عِرْق إنجبار Sea lavender, Wild marsh beet (E)
Statice, Béhen astringent, Béhen rouge, Katran, Lavande triste, Lavande de mer, Romarin des marais, saladelle, statice maritime (F)
Echter widerstoss (D)
Statice limonium (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة الرَّصاصِيَّات ينبت على الشَّواطئ البَحريّة. أرومته ليفيّة القاعدة، مُخضوضرة. أوراقه كلُّها قِرصيّة الانتشاب الكثيف، كاملة، خطيّة إلى سِنانيّة أزهاره زرقاء اللَّون في سنابل

بالعَصْر الدَّقيق الذي يُطلَق عليه بعد غَسلِه وتَجفيفه إسم «نَشاء المَنِيُوك» وتَجفيفه إسم أمّا ما تبَقّى من الكتلة فيُجفّف ويُسحق، ومن ثم يُفرش على لوحات حديديَّة مُسخَّنة. عند ذلك يَتكتَّل على على شكل حُشَيْرات صُلْبَة جدًّا تُشكِّل ما يُسمّى تَبيُّوكا Tapioca.

المواصفات - إن حبوب دقيق المنيهوت، أي نشاء المنيهوك، تبدو عمومًا على شكل أرْصُوصَة، أي على شكل جَرَس مُزوَّد بتَوْجيهات بلوريّة؛ وتكون السُّرَّة في العادة بارزة جدًّا. وتكشف التبيوكا حبوبًا مُتماثلة مُتشابهة وتكون مُشوَّهة الشَّكل نَوعًا ما بسبب التَّسخين وتكون دائمًا تقريبًا مُتكتِّلة.

إن أفضل طريقة لتفريق مُختلف أنواع الأروروت وتمييزها عن بعضها هي الفَحص المِجْهري، حيث يمكن بهذه الطَّريقة إيّاها أن نكشِف عن إمكان إضافة نشاءات أو دقيق البطاطا.

ونُورد بالتّالي الطُّرق التَّجريبيَّة التّالية: إذا دقَّقْنا الأروروت وهَرَسْناه في الهَاوَن، مع خَلطِه بكمِّيّة مُساوية من حامض الكلورهيدريكي، وفي حال وجود دقيق البطاطا، يَتكوَّن في الهاون لعاب سَميك لدرجة تَسمح معها بِرَفْع الهَاون بواسطة مِدقَّتِه المَغموسة في اللَّعاب المذكور؛ وتَفوح، إضافة إلى ذلك، رائحة الحامض النَّمْليك. إن هذه الطَّريقة تَسمح بالتَّعرُّف على حوالي ٤ إلى الطَّريقة تَسمح بالتَّعرُّف على حوالي ٤ إلى

أزي

كثيفة هاميّة الارتكاز. شمراخ عار، مُنبسِطة وأكبر من الدّاخِليّة المُنتصِبة. الفصوص. ٥ بتلات حُرّة تقريبًا؟ • أسدية؛ ٥ أقلام. الثَّمرة جافَّة وحيدة الشَّماليَّة وجُزُر الأنْتِيل. الحُدّ ة.

> المُركِّبات - قُدِّر في جذور هذا النَّبات ١٧ بالمئة من العفص.

> > الخصائص - قابض.

الاستعمال - أعيد تسجيله في الفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٤.

ملاحظة - في كاليدونيا الجديدة عُشبة تنبت على الشُّواطئ الكلسيّة الصَّخريّة من فصيلة الرَّصاصِيّات هي: أَرْيَل أَسْترالي (١) Static australis Spreng، جـنذورهـا عافِصَة وقابضة.

١٩ - أزيميْنَة مُفَصَّصة، بَابَاوْ (٢)

Papaw (E) Asiminier, Anone trilobée (F) Pappaw baum (D) Asiminia triloba, Anona triloba (S)

الأزيمينة جنس أشجار أو شُجَيرات من فَصِيلة القشطيّات، أوراقُها مُتعاقبة، واسعة، غِشائية، شَبكية العُروق، بَسيطة، مُعبلَة. أزهارُها إبطيّة الإرتكاز، فَرديّة أو قَليلة العَدد، قصيرة السُّويْقات، ٣ كأسِيّات مُعْبلة، ٦ بَتَلات، الخارجيّة

بسيط، له غمد غشائي تحت الرّأس الأسدية عديدة، قصيرة الخُيوط. الثّمار الزَّهريّ. الكأس أنبوبيّة نصلها خُماسيّ عِنبيّة الشَّكل، لَحميّة، كثيرة البُزُور الكبيرة. حَوالى ١١ نوعًا في أمريكا

أمَّا الياياو فَشَجِرة صغيرة من جَنوب شرق الولايات المتّحدة الأمريكيّة تعلو من ١٠ إلى ١٢ مترًا، ولا تَبلغ في أوروبا أكثر من ٢ إلى ٣ أمتار. فُروعُها الفَتيَّة مَكسوّة بزغب أشقر، ومن ثم تُصبح مَرْطاء ونُنِّتة اللُّونِ. أوراقُها مُعْمِلة، يَيضويّة مُتطاولة، قصيرة الرّأس المُستدِقّ ومُعَنَّقة، طولُها ١٥ إلى ٢٠ سم، مَرطاء. الزُّهرة أرجُوانيّة اللُّون القاتم الكامد. إزهرارُها على الخشب الفَتى. الثَّمرة مَأْكُولَة، طُولُها ٥ إلى ٨ سم، مُخضَرَّة اللُّون الأصفر ومن ثم بنُّيَّة، تَفوح منها رائحة مُستحبّة. البزرة من ٢ إلى ٣ سم.

الخصائص - يُستخرَج من عَصير ثمارها بعد تخميرها شرابٌ لذيذ الطُّعم والنَّكهة قلم المادّة الكُحوليّة.

٧٠- أستر أمِيْل نَقْرُوني، أثير أمِيْل نَتْرُوني، نيتريت الأمِيْل

Ester amylnitreux, Ether amylnitreux, Ether amylazoteux, Nitrite d'amyle **(F)**

إكتشفه بالأرد.

المواصفات - نيتريت الأميل هو الأثير النَترونيّ في الكحول الإيزوأميليك. وهو

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة الأولى لإدوار غالب.

سائل باهت اللَّون الأصفر، طعمه لاذع ورائحته كرائحة النَّمار. كثافته ٨٨٠٠. يَغلي بين ٩٦ و٩٩° سغ. لا يذوب بالماء ولكنّه مَزُوج بالكحول، والأثير، والكلوروفورم. عندما يكون حديث التَّحضير فهو مُتَعادِل بشكل محسوس مع دُوّار المَحلول؛ ولكن بعد مضيّ فترة من الزَّمن يَفسد بسبب تَشبُّعه بالمواد النَّترونيّة، والنَّثريكيّة، وبالحامض النَّاردينيّ، إلخ؛ فيُصبح حامضًا وغير المستحبّ الرَّائحة.

النّتاج النّجاريّ ليس نَقيًّا: فهو يَحتوي دائمًا، وبنسب مختلفة، على أستيرات الكحولات الأميليّة المُختلِفة (الفَعّالة والهامِدة) التي تتألَّف منها كحول التَّخمّر الذي يُستخدم لفصله: يحتوي بالإضافة إلى ذلك على بقايا من تلك الكحولات غير المؤسّتَرة والموادّ المُفْسِدَة المشار إليها أعلاه.

خطِر Zableau C خطِر

الحفظ - في قارورات مسدودة بأحكام (أو أفضل من ذلك في أمبولات مختومة)، بمعزل عن الرّطوبة، وعن الضّوء، وعن الحرارة.

الخصائص والاستعمال - في استنشاقات (عِدَّة نقاط)، يُحدِث نيتريت الأَمِيْل بسرعة احتقانًا حادًّا في القسم العُلويّ من الجسم وخاصة على الوجه (احمرار حاد وشبه فَوْري في الوجه مع

إحساس بالحرارة والدّوخة، وإسراع النبض الواضح الجَلِيّ بالخفقات الصُدْغِيّة). فهو بالواقع مُوسِّع عُرُوقيّ نشيط وبالتّالي مُنقِص للتوتّر الشَّريانيّ. وهو يقوم، بالإضافة إلى ذلك، بعمل مثير ومُكَرِّز على نسيج القلب العَضَليّ وعلى المراكز العَصبيّة ال إِنْتراقَلْبيّة(۱) أو الضُمْقَلْبِيّة(۱) العَصبيّة ال إِنْتراقَلْبيّة(۱) أو بجرعات مُرتفِعة، أن يُحدِث الزُّلَة، وفقد الوَعْي، والتَّخَلُّجات، وال ابَيْلة وفقد الوَعْي، والتَّخَلُّجات، وال ابَيْلة المحيثامُ وغلُوبِينيّة (۱)، (أي المحيثامُ وغلُوبِينيّة (۱)، (أي عرمور تأكُسَد فيه الحديد، فصار من يَحْمور تأكُسَد فيه الحديد، فصار من حال إلى حال آخر، مما يجعله غير صالح لنقل الأوكسجين).

طريقة الاستعمال - يُستعمل نيتريت الأمِيْل على الأكثر ضدّ نَوْبات ذَبحة الصَّدر، في استنشاقات، وبجرعات من إلى ١٠ نقاط (على منديل أو كمادة)؛ ولكن الإدمان يوجب بعد فترة وجيزة أخذ جرعات من ١٥ إلى ٢٠ وحتى إلى ٥٠ نقطة. إن نَوبات الرّبو الحادّة، والشقيقة المُبْهَمة، والإغماءات، وتخصيصًا الإغماء الكلوروفورميّ، قد تُقاضى كلها بنتريت الأمِيْل.

نُصِح به ضِد حالات نَفْث الدَّم، وبجرعات مُرتفِعة، من ٥٠ إلى ١٠٠ نقطة مثلًا في اليوم، في حال التهاب الرُّئة.

ا س ت

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

أ س ت

ومن الملائم، لإجراء تلك الاستنشاقات، أن نَحوز على الدواء في أمْبُولات تحتوي حوالى الغرام الواحد، نكسر أحد طرفيها لكي نعد النقاط المطلوبة.

يمكن كذلك وصف إعطاء أَمْبُولات، تحتوي الواحدة من ١٠ إلى ١٥ نقطة، مصنوعة من زجاج رقيق ومَكسُوّة بنسيج من القماش ينزعه المريض بأصابعه لحظة نَوْبة ذَبحة الصَّدر.

إن نيتريت الأمِيْل هو مُضادّ للاستطباب عند المُصابين بتَصَلُّب الشَّرايين وفي كافة الحالات الاحتقانيّة.

۱۱- أستر بَنْزيل سالِسيليك، سالِسيلات Ester benzylsalicylique, البَنْزيل Salicylate de benzyle (F)

 $OH^{(1)}-C_6H_4-CO_2^{(2)}-CH_2-C_6H_4 = 228,23.$

المواصفات - يحتوي على ٦٠,٥ بالمئة حامض سالسيليك. وهو سائل عديم اللَّون، زَيتي القِوام، أثقل من الماء، رائحته وطعمه خفيفان وغير كريهان. يَتجمَّد في الحرارات الدُّنيا، حوالى ١٠ إلى ١٢ سغ، ويذوب (ينصهر) عند ٢٤ سغ؛ وهو يُبْدي ظاهرة المُيُوعَة تحت مُرتفِعة جدًّا. وهو لا يذوب في الماء، يذوب على البارد في ١٠ أجزاء كحول، يذوب جدًّا في الكحول الغالى.

الخصائص والاستعمال - دواء مُضادّ للرّوماتيزم ومسكّن بديل لسالسيلات المنبل ولكنّه خالٍ من رائحتها الكريهة. وهو أقل تبخّرًا من هذه الأخيرة، وعمله يدوم أكثر. استعماله في مَرُوخات، وبلاسم، ومراهم بنسب من ٥-١٠ أو بلاسم، في آلام عرق النسا وفي التهابات الأعصاب، في حِقن في الموضع المؤلم بالاشتراك مع الكافور: أمبولات الـ Camphrosaly.

عَشْرِبُ حَشِيشَة - ۲۲ Scorpion astragal (E) عُقْرَب (۱) Astragale mareotique, Herbe à scorpion (F) Skorpion astragel (D) Astragalus mareotieus (S)

الأسطراغالوس جنس نباتات حَوليّة أو مُعمَّرة أو ليفيّة القاعِدة من فَصِيلة القرنيّات. أوراقُها فَردِيّة التَّرتيب الرِّيشيّ وخالِية من الشَّوك، أو ثُنائيَّة التَّرتيب الرِّيشيّ وتَنتهي برأس السُّويق الشَّائك. أزهارُها إبطيّة الارتكاز، مُزَنَّدة أو لاطئة، في ضُمّات مُتراصّة. في لُبنان أكثر من ١٥٠ نوعًا من الأسطراغالس. أسطراغالس العَقْرَب يَحمل أوراقًا ريشيّة التَّرتيب، مُؤلَّفة من وُريقات ضيِّقة ريشيّة التَّرتيب، مُؤلَّفة من وُريقات ضيِّقة اللَّون الأزرق. قَرنُها يَتَقوَّس إلى نِصف اللَّون الأزرق. قَرنُها يَتَقوَّس إلى نِصف

⁽١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية العربيَّة الغانية والتَّسمية اللاتنيَّة.

دائرة، وهو منتظم السّماكة، أَمْرَط تقريبًا وقصير المِنْقار. حَشيشةُ عَقْرَب هو الاسم التُّونسيّ.

الخصائص - مضاد للسع العَقْرَب. الاستعمال - حَشيشة العَقْرب يَجب أن تُستعمَل بَعد لَسْع العَقْرب فورًا. تُسْحَقُ الأوراق المُجفَّفة سَحْقًا جيِّدًا وتُوضع على مكان اللَّسْعَة.

Astragal (E) أَسْطرَاغَالُوس نَجْمِي – ٢٣ Astragale à gousses velues (F) Astragal (D) Astragalus eæscapus (S)

الأسطراغالوس جنس نَباتات حَوليّة أو مُعَمَّرة أو جُنيبات صغيرة من فصيلة القَرْنِيّات الفَراشِيّة. أوراقُها ريشيّة مُفْرَدة وسَرْحَة، أو ريشيّة مُزدوِجة تَنتهي برأس العُنُق الشّائكة. أزهارُها إِبْطيّة، مُزَنَّدة أو لاطِئة، حُزميّة التَّجميع المرصوص. الثَّمرة قَرْن لاطئ أو محمول على الشّعال، يكون دَرْزُه السُفليّ شُويْقة، مُختلِف الأشكال، يكون دَرْزُه السُفليّ العُلويّ مُزَوْرَقًا غالبًا، ودَرْزُه السُفليّ مُستطيلًا بثَنْيَةٍ تَجعلُ القرنَ مُزدوج الخُدُور تمامًا أو جزئيًا.

الأسطراغالوس النَّجميّ له جَذْرٌ بَسيط يَبلغ حَجم الإصبع، يُغطّيه لحاءٌ قاتم اللَّون البُنِّي، ومَدِيثُوليوم méditullium ليفيّ، مُصفرّ اللَّون، عَديم الرّائحة، عَقُول الطَّعم القَابِض المُرّ. وهو نَوعٌ مَبذول في مُختلف المناطق الأوروبيّة، وعلى الأخصّ في جبال الأَلْب.

الخصائص - مُضادّة للسِّفلِس، مُضادّة للرِّوماتيزم، مُنشِّطة، مُعَرِّقة.

الاستعمال - سفلس، روماتيزم، رُهن.

طريقة الاستعمال - نصّح به كازان عام المربقة الاستعمال - نصّح به كازان عام وهو علاج أصبح اليوم طيَّ النَّسيان. إلا أنّه، وحسب جُوردان، قد يكون هذا النّوع مُنشِّطًا ومُعرِّقًا بشكل واضح جَلِيّ. وكان قد صَدَر في دستور ١٨١٨ للأدوية إلى جانب أسطراغالوس إكريت (١٨ A. Creticus أصطراغالوس كُثَيْراء A. tragacantha وأسطراغالوس مُنتجان لصَمْغ الكُثيراء.

مُلاحظة - عام ١٩٧٥، أعيد إدراج النَّوعين التّاليين، في دستور الأدوية الفَرنسيّ، وهما: .A. Creticus Lam. لأنه يُنتجُ صَمْغَ الكُثيراء، مَنتشِر عَشَراتُ لجذره الطبّيّ. لهذا، وتَنتشِر عَشَراتُ الأنواع الطّوعيّة في لبنان من الشَّواطئ البَحريّة وحتى أعالى الجبال.

۲۱- أَسْقُولُوسِيد، بِيْكُولُورِيْن (۲۶ Esculoside, Bicolorine, Eccalochrome (F)

 $C_{15}H_{16}O_{9}$ 1,5 $H_{2}O$ = 267,3. غلوكوسيد يُستخرَج من أوراق وقشور القَسْطَل هِنْدِي من فصيلة القَنْدَليَّات Aesculus hippocastanum ويسمكن

أ س ق

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسميتان للمؤلِّف.

أس ق الحصول عليه كذلك اصطناعيًا.

المواصفات - مسحوق مُتبلِّر، خفيف اللُّون الزِّبْدِيِّ، عديم الرّائحة، طعمه مُرّ، قليل الذُّوبان بالماء البارد، يَذُوب في ٦ أجزاء من الماء الغالي، في الكحول، في الدِّيُوكْسَانٌ، غير ذَوَّابِ في الأثير.

يكون للأشقُولوسيد بحالته البلُّورية اسْتِشْعاع أزرق اللُّون تحت ضوء وُوْد Wood. ويَتمتَّع محلوله الماثيّ المُخَفَّف بتَفَلْوُر خفيف جدًّا في ضوء النَّهار، فيكون باهت اللُّون الأزرق في ضوء النَّهار، ويُصبح شديدًا تحت ضوء وُوْد، يختفي في محيط حامض ليعود فيظهر في محيط قِلُو ي .

الخصائص والاستعمال - مُنَدِّل للنَّفُوذِيَّة الشُّعْرية يُستعمل في حالات النَّزيف الحَشُويّ (فُرْفُريّات وعَائِيّة، تَجنّب النَّزيفات عند مُتوتِّريّ الأوعية الدّمويّة، وعند الرُّضَّع)، أوديمات، نَضْحَات أو رَشْحات مَصْلِيّة، أكزيما نازّة.

طريقة الاستعمال - أولًا: على شكل محلول قابل للحقن بنسبة ٠,٥٠ بالمئة في أُمْبُولات من ٢ مل مُعيَّرة بمقدار ٠,٠١ غرام من الأسقولوسيد في الأمْبُولة (عن طريق ضمْعَضلي): ۰,۰۱ إلى ۰,۰۲ غرام اليوم.

ثانيًا: على شكل مضغوطات مُعيَّرة من ١٠ ملغ، يؤخذ منها ٣ إلى ٨ مضغوطات في اليوم، بعيدًا عن الوجبات.

يستعمل المتيل أشقولوسيد (C₁₆H₁₈O₉OH=372,3) الذي يحصل

بالطريقة الاصطناعية، بالاشتراك مع حامض الأشقوربيك، أي القيتامين «ث»، ومع الڤيتامين «پ» (أسْقُولُورْبيْن) في معالجة داء الحَضَر الوقائية والحالات المناظرة، تناذرات نزيفيّة، مُعالجة الأمراض العَظميّة، حالات فقر الدَّم، حالات قِلَّة الكُرَيْضات: Leucopénies، حالات عَدُوائيَّة (٢ إلى ٤ مضغوطات في اليوم).

٢٥- إِشْقِيْل بَحْرِي، عُنْصُل بَحْرِي، بَصَل الفار، قَضِيْب الرَّي

Medicinal Squill, Sea oignon (E) Scille, Squille, Charpentaire, Oignon marin (F)

Echte meerzwiebel, Mauszwiebel (D) Urginea Scilla Steinh, Urginea maritima (L),

Scilla maritima L. (S)

بصَلة مُغلَّفة كبيرة الحجم من فصيلة الزُّنْبَقِيَّات، طعمها حامز، طولها حتى ٢٠ سم وعرضها القاعدي نحو ١٥ سم، قد تزن عدّة كيلوغرامات؛ وهي مُغَشَّاة بعدد كبير من قواعد الأوراق التي تتراكب دائريًا وتُدعى أسفاطًا أو حراشف. مهدها مناطق المتوسط.

تصل هذه البصلة إلى الأسواق الفرنسية من الجزائر وإيطاليا وإسبانيا حيث يُميَّز منها ضربان: واحد حراشفه حمراء يُعرف بالإشقيل البَحري الذِّكر أو الإشقيل الإسباني، وهو الأكثر شهرة واستعمالًا، والثَّاني حراشفه بَيْضاء

ويُعرف بالإشقيل البَحريّ الأنثى أو الإشقيل الإيطاليّ. إن فارق الألوان ليس بالوحيد بين الضَّربين على الأرجح؛ ففي فرنسا تعطى الأفضليّة إلى الضَّرب الأحمر.

تُجمع البصلة في الخريف وهي في أوج قوتها، تُرمى قشورها الخارجية الكثيرة الجفاف، وقشورها الوَسَطِيَّة الكثيرة اللَّعاب، ولا يُحْتَفظ سوى بالقشور اللَّعاب، ولكي نجفِّفها نفصل القشور الوسطى. ولكي نجفِّفها نفصل القشور عن بعضها، نُقطعها إلى شرائح عَرَضية رقيقة أو إلى سيور نُنضَدها ونُجفِّفها في المِحَمِّ أو في الشَّمس.

شكل القشور مسطّح ومحدَّب، ومظهرها قليل الشَّفافية وهي جافّة؛ لونها إلى الأصفر الباهت أو المتورِّد حسب نوع النَّبات. يَحتوي النَّسيج الخَلويّ الكثير من أوكسالات الكلسيوم. رائحة معدومة، طعم مرَّ جدًّا. المسحوق ورديّ اللَّون البُنِّيّ.

غُرِف الإشقيل كمبوّل قبل الميلاد بستة عشر قرنًا، وهو جزء من المادّة الطبيّة منذ زمن طويل. استعمله أبقراط من الداخل ومن الخارج. عرفه ديوسقوريدس؛ طواه النسيان قرونًا عديدة وأعيد اعتباره عام ١٩١٧ وذُكِرت خصائصه المقوِّية للقلب عام ١٩١٢.

المُركِّبات - يحتوي الإشقيل، بالإضافة إلى سُكِّر يشتق من اللَّقُولوز، ومواد لُعابية، ودَكْستريْن، وأوقصالات

الكلسيوم Raphides، على جواهر فَعَالة إ ش ق مختلفة: ١° - هَيتروسيد يُدعى سِلَّايين أو سِلُّوتوكسين، فَعَال جدًّا عندما يستخرج من النبات الغَضَّ؛ ٢° - مادّة مُلوِّنة راتنجيَّة تدعى سِلِّييكْرِيْن، تتحلى بخصائص مبوِّلة؛ ٣° - جوهر مُقيِّئ ومسهِّل قوي يدعى سِلِّين، يذوب في الكحول والأثير الغالي؛ ٤° - هيتروسِيد من مجموعة الصابونيات يدعى صابُوسِيد من مجموعة الصابونيات يدعى

المخاطية؛ إن هذا الذَّمَاء nécrobiose قد يحدث بالتالي بواسطة الإشقيل الطازج، ولا يحدث بالإشقيل المجفَّف؛ ٥° - مواد مختلفة غير محددة

جيدًا وتتقارب من المواد السابقة:

سِلْتِیْن، سِلْنیْن، سِلّاماریْن؛ ۲° - مادة

الأستيلي، ويتحلَّى وهو طازج بنوع

خاص، بعمل ذَمَائِيّ nécrobiotique

شديد على خلايا البشرة والأغشية

راتنجانية سامّة جدًّا، لا تذوب في الماء، تذوب في المحاليل البوتاسيّة المُشَعشَعة، وتقتل الثَّدْييّات خنقًا. وحدّد كل من ستُوْل وسُوتَر هيتروسيدات جديدة، سِلَّارانات أو سِلَّاروسيدات،

أحدها يدعى سِيلاران A، يتبلّر في شذرات بيضاء؛ يعمل كمقوّ للقلب، ومبوّل مُزيل الأزوت. وهو مُياسِر،

تركيبه الكيميائي 3,600، وعو ميوسر، تركيبه الكيميائي A، وهو بالتحليل المائي السلاريدين A، وهو تكتُون تركيبه الكيميائي C₂₄H₃₀O₃

ات وسُكِّرًا يَدعى سِلَّابيوز C₁₂H₂₂O₁₀

إش ق ينشطر إلى رَمْنُوز وإلى غلوكوز.

السِّلَّاران B عديم الشكل؛ وهو أقل كمية، ولكنه أكثر سمّية من السابق؟ ويتركَّب على الأرجح من مزيج طبيعتي من السّلارانات A وB. كما انكت عدد آخر من الكيميائيين على دراسة تركيب الإشقيل (١٨٧٩)، (١٨٩٣)، (١٩١٤)، إلخ.

هيدرات الكربون المُياسِر (لڤولوزان) دعاه ریش ورامُون سِکُیْن، ومن ثم دعاه شميدبَرْغ سِنِسْتريْن.

إن الإشقيل الأبيض لا يصلح كمبيد للجرذان، كما يقول وِنْتُون؛ المادّة الفعّالة لهذا الغرض ليست السّلاران الذي يقاومه الجرذ نسبيًّا. أطلق عليه Bijlsma عام ۱۹۳٦ إسم راتوڭسِيْن . C12H21O9

حَدُّد كل من سُتُول ورَنْز حديثًا السِّلْرُوسيد في الضَّرب الأحمر بتركيب كيميائي C32H44O12 وهو يتقارب من الهيتروسيدات المقوية للقلب، ولكنه فضلًا عنها، يَتحلَّى بخصائص مُبيدة للجرذان.

لا يوجد للإشقيل تقدير كيميائتي.

إن مُعايَرة الإشقيل البيولوجيّة ومستحضراته درست عام ۱۹۲۷، ١٩٣٣، ١٩٣٥، ١٩٣٦ من قبل عدّة علماء اقترحوا جميعًا بأخذ السِّلاران A كمِعْيار وإجراء التَّجارب على الهر، والكلب، أو الكُوباي بطريقة الحَقْن

المستمرّ البطيء. إن الجرعة المميتة الدنيا بالملغرام لكل كيلوغرام من الكلب هي ٠,٥٣ ملغ سِلّاران A (٢,٨٢ وحُدات - كُلْب)، ١٦٧، ملغ للمادّة B (٥,٩ وحُدات - كَلْب)، ٠,٣٥٣ للمادّة C (٣-٤ وحدات - كَلْب).

السِّلاران A مَرِّتان أقلَّ سُمِّيَة من الوَبائِيْن، بينما سمّيّة السّلاران B مماثلة له وسمِّيَّة السِّلّاران C تتوسّطهما.

يَتخلَّى الإشقيل عن قسم من جواهره إلى الماء، ولكن حالّاته الفُضلي هي الكحول والخلّ. نقاعته المائيّة تُصبح قاتمة اللُّون الأرجوانيّ بسبب أملاح سَسْكى أوكسيد الحديد. أما للمحافظة على خصائص الإشقيل الفعالة تصور وانْزَل طريقة تثبيت أنجزها في مكان القطاف بالذَّات (Scille stablactivée).

٢٦- أُفْلُوس خَوْخِيّ الوَرَق، رَبَاطِيّة خَوْخِيَّة الوَرَق(١)

Black-Horn (E) Viorne à feuilles de prunier (F) Pflaumenblatt Schlinge (D) Viburnum prunifolium (S)

الأفلوس جنس جنبات من فصيلة الخَمَانِيَّاتِ. أوراقها متقابلة، وأحيانًا دَوَّارِيّة. أزهارها عدَقية التَّجميع، مِظلّية أو عُثكولية الشَّكل؛ الأزهار العقيمة تكون عمومًا كبيرة القدّ، والأزهار المُخصية

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة للمؤلِّف

أصغر منها. أنواعه نحو ١٢٠ بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، منها واحد في لُبنان.

تُستعمل قشرة الأفلوس الخوخيّ للتداوي في الولايات المتّحدة حيث تُسمّى Black Hom وتقع في قطع صغيرة غير منتظمة، مسطّحة ومقَوَّسة بعض الشَّىء، لا تَتَخطّى سماكتها فقط الملم الواحد؛ وهي مغطَّاة بفِلِّين مُرمَدُّ اللَّون، ثؤلولي الشكل، قليل الالتصاق بالطَّبقات المتاخمة التي يكون لونها كالصدأ، وجهها الداخلي باللُّون ذاته أو أبهت لونًا، شديد التَّثليم في القشور الكبيرة. مكسرها قصير ومُحبّب. على مقطعها العَرَضَى نسيج حَشَوي مصفر اللُّون البُّنِّي وممرَّكُ بحزوز شُعاعيَّة وملطَّخ بتنقيطات كبيرة بَيضاء اللَّون وخشبيَّة الرقعة. الطَّعمُ مُرّ وقابض خفيف. الرائحة تُذكّر برائحة الناردين. مسحوق قشور الأفلوس بُنّي اللُّون المُسودّ.

المُركِّبات - قشرة الساق تحتوي على راتنجات عِدّة مُرّة يُطلق عليها إسم فيبُرْنِين، عفص، حامض ماليك، حامض شاليريانيك، حامض قاليريانيك، زيت دهني ٠٣٠٠٪.

الخصائص - مقوي الجهاز العصبي، مسكِّن رحميّ وعصبيّ، قابض، مبوّل، مضاد لعسر الطمث وتقطعه.

الاستعمال - قشور الأغصان: طمث مؤلم، حوادث عصبية أثناء الحَمْل،

التخوّف من احتمالات الإجهاض، أف ل تقلّصات عضلية.

طريقة الاستعمال – نقيع ٣٠ غرام في ليتر ماء غال، يؤخذ منه ٣ فناجين في اليوم. مستخلص مائي كحولي ٥٠,٠ إلى ١٠,٠غ؛ مستخلص مائع (دستور ١٩٣٧) من ١٠ إلى ٢٠ نقطة في اليوم (للفتيات من ١٢ إلى ١٥ سنة)، نصف ملعقة صغيرة كل ٣ ساعات للبالغين (في حال التخوّف من الإجهاض). صبغة دستور ١٩٦٥ (أ):٢ إلى ١٥غ في اليوم.

٢٧- أُفْلُوسْ لانْتَانا (١)

Wayfaring-tree (E)
Viorne Mancienne (F)
Schlinge (D)
Viburnum lantana (S)

جَنْبَة من فصيلة الخَمَانِيَّات تعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. أغصانها خَمليّة، رَماديّة الأوبار، منبسطة. أوراقها سميكة النَّصل، شبه بيضاء الصَّفحَة السُّفلى، بارزة العروق، معنَّقة، متقابلة، بيضيّة كاملة، مسنَّنة الهوامش. أزهارها بيضاء، صغيرة، نجميات كاذبة متراصة. النَّمرة عُنيبة مُسطّحة الشَّكل، خضراء، ومن ثم حمراء اللَّون، فسوداء عند النضج. رائحة قويّة (الأزهار) طعم حامز (الثمار).

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

أف ي

Viburnique

الخصائص - قابضة، منعشة.

الاستعمال – الأوراق. الثمار. ذبحة،

طرق الاستعمال - لمعالجة الذبحة لمصدرها) التّالية: يُصار إلى التغرغر بمقدار ليتر كامل يوميًّا مورفين، من ٣ إلى ٢٣٪ ،C17H19O3N من نقيع ٢٠ غرام أوراق مجفّفة في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق ويغطّى عشرة، يصفّى ويُحلّى بالعسل. لتقوية اللثة والوقاية من تُعْرِية الأسنان، يصار إلى غسل الفم عدّة مرّات تيبايين، من ٠,٢ إلى ٠,٥٠٪ في اليوم بنقيع ٣٠ غرام أوراق في ليتر ماء يغلى ٣ دقائق، يُصفّى؛ الانتباه إلى عدم ابتلاع السائل.

> ملاحظة - حصر الاستعمال الدّاخليّ بناءً لوصفة طبيَّة.

٢٨- أَفْيُون مخزنى (مركباته الكيميائية) Composition chimique de l'opium officinal (F)

تركيب الأفيون مُعقَّد جدًّا. عناصره المُركِّبة عديدة:

١° - من المواد العديمة الفائدة: ماء ١٥ إلى ٢٠٪، موادّ مَعدِنيّة، إلى ١٥٪، لُعاب، یکتین، سکاکر ۲۰ إلى ۲۰٪، شموع، مطَّاط ٦٪، مواد هَيُولينائيَّة.

٣° – حوامض ممزوجة مع القِلَويدات: حامض سولفوريك، أستيك، لبني أولَكتيك (١ إلى ٢٪) وحامض ميكونيك (٣ إلى ٥٪) إنّ وجود هذا الحامض كافّة قِلُويدات الأفيون؛ قِلُويدات

المُركَّبات - حامض أُفلوسي، الأخير يَسمح بالتَّعَرُّف إلى الأفيون ومستحضراته وتحديدها.

٣ - عدد كبير نسبيًّا من القِلُويدات (١٠) إلى ٢٠٪)، القِلَويدات الأساسيّة منها توجد بالنِّسب (التي تختلف جدًّا تبعًا

 OH_2

کودایین، من ۰٫۳ إلى ۳٪ C₁₈H₂₁O₃N, OH_2

 $C_{19}H_{21}O_3N$

يَيَّاڤُرين، أقل من ١٪ $C_{20}H_{21}O_4N$ لُودانَوُزين، بقايا $C_{21}H_{27}ON_4$ $C_{22}H_{23}O_7N$ / الى Λ الى من ۲ إلى من ۲ إلى من ۲ نَرْسَايِين، من ١,١ إلى ١,٤٪

C₂₃H₂₇ON₈, 3OH₂

بعض القِلُويدات، كالمورفين، الكودايين، النَّركوتين (نوسكايين)، البيَّاقُرين، والنَّرسايين، يمتلك خصائص فيزيولوجية مُحَدَّدة جدًّا؛ المورفين له عمل مزيل للألم ومُنوِّم؛ الكودايين، أقلّ سُمِّيَّة من المورفين، هو مُهْبط لمركز الشعال ومزيل خفيف للألم؛ النوسكايين هو سَمّ مُخَلِّج مُشَنِّج، وهو يُقوّى عمل المورفين؛ البيّاڤرين له عمل مُضادٌ للتَّشَنُّج، النرسايين عمله مزيل للألم ومنوّم خفيف نسبيًّا؛ التيبايين هو مُخدِّر ومخَلِّج، وهو الأكثر سُمِّيَّة من

أخرى، كاللودانين، واللودانوزين، والكودامين، والكريبين، واليروتوبين، ليست لها أيّة فائدة طبّيّة.

إن الجسم الأكثر شهرة من هذه الأجسام هو المورفين الذي تستخدم مُعَايَرته لتقدير القيمة العِلاجيّة والتجاريّة للعقار. في أقربازين ١٩٦٥ يُستعمل مستخلص الأفيون، ومسحوق الأفيون.

مُخَيِّل

جدول

Stupéfiant

Tableau B

الاستعمال - يُستعمل العمل المُخدِّر للأفيون على الأكثر في حالات الأرق المُتسبِّبة عن الوجَع. استُعمل الأفيون كدواء مُهدّئ، في المغص الكلوي والكَبدي، وفي مغص الرصاص، آلام الأعصاب، محاربة عسر التَّنفُّس للمصابين بداء الربو أو المصابين بانتفاخ الى ٤ نقاط من اللُّودانُم. الرِّئة. وهو يُهدّئ السُّعال ويُخفّف الإفرازات في البرونشيت الحاد. وهو مُسكِّن جَيِّد للآلام المتعلِّقة ببعض حالات عُسر الهضم، وبالسّرطان وقُرْحة المعِدة. وهو مُضادّ رائع الفَعاليّة للإسهال.

> الأفيون لم يعد مُستعملًا تقريبًا في التداوى. ولكن القِلُويدات، وخاصة الكودايين، والييّاڤرين والنوسكايين تحتفظ بمكانها الهام في التداوي. المورفين يُعطى أو يوصف بتناقص متسمرً.

> الأفيون غير صالح وغير مرغوب فيه في حال العَجْز الكلويّ، الأوديما الحادّة في الرِّئة، الإصابات الحالبِيّة، تَجمُّع الدمّ (Hyperhémic ou Hyperémic)

المراكز العَصبيّة مع احتمالات أو مَيْل للسَّكْتَة أو النُّقطة، وفي الأمراض المُعدِية الخطيرة. عند النساء العَصبيّات، والشيوخ، وخصوصًا عند الأولاد، فهو لا يُستعمل سوى مع الكثير من الحيطات والحذر. «الأولاد هم حسّاسون إلى أقصى درجة على عمل الأفيون. وكان البعض يمنع استعماله للأولاد قطعيًا. وفى كل حال، يجب أن لا يُعطى للأولاد سوى وهو في محلول كبير وبمقادير مجزّأة جدًّا. ونجعله مقابلًا للآلام المِعويّة فقط (مغصات، آلام حشوية)، وللإسهال، والتهاب المعي، وبشكل استثنائي، وبعد عمر سنتين، للإصابات التَّنفُسية». سُجِّلت حالات موت عند الأولاد من جراء إعطائهم ٢

٧٦- أقراص عِلاجِيَّة، بُرْشَان عِلاجِيّ، بَرْشَام خُبْز فَطِير

Cachets médicamenteux, Capsules de painazyme (F)

اقترح غِيَّارْمُون الأقراص العِلاجيَّة عام ١٨٥٣، ومن ثم اقترحها لِيمُوزان ثانية عام ۱۸۷۲، وهي أقراص تتألُّف من وَرَقتين من الخُبز الفَطير (بلا خميرة) تُقَطّعان بشكل مستدير أو بَيفوي، وتكونان منبسطتى الأطراف ومُقَعَرتين في القسم المُخَصَّص لاحتواء الأدوية الصّلبة الذّرورة لتسهيل ابتلاعها وحَجْب

ا ق ر

 أ ك س مَذاقِتها. تُصنع الأقراص من ستّة أحجام أساسية. يوضع المسحوق في إحدى الالتهاب المَفْصِل، راتافيا الكاراييب. الورقتين، تُبَلِّل أطراف الورقة الثّانية جذر الغاياك ١ غ الخبز الفَطير المُخصَّص لصُنع الأقراص نمرث ومن ثمّ نصفّي. يجِب أَن يُحضَّر من عجينة قوامها نشاء ملعقة كل صباح ضدَّ النقرس. الذَّرة الصَّفراء يُضاف إليه ١٥ إلى ٢٠٪ من نشاء القمح مما يُعطى قرصًا أكثر لَيونة وأفضل حفظًا فيما لو كانت العجينة مؤلِّفة من نشاء القَمح فقط أو الذَّرة الصَّفراء فقط (كودكس ١٩٤٩).

> تُحفظ الأقراص والبُرشان في معزل عن الرّطوية.

أَقْراص فَحْم، بلَّادُون:

يَذَكُر مُلحق كتاب الوصفات الوَطَنيَ الفرنسي عام ١٩٧٦ التَّركيبة التَّالية:

فحم نباتيفحم نباتي مسحوق بلّادُون غ · , • ۲

تُخفظ في وعاء محكم القفل، بمعزل عن الرَّطوبة والضُّوء والحرارة. مُضادًّ للإسهال.

۳۰ إكسيرات Elixir (E) Elixirs (F) Heiltrank (D)

إكسير كلوروفورمي

كلوروفورم۸غ
كحول ٢٤ غ
شراب سكري بسيط ٢٢٥ غ
مُهدّئ ضدّ بعض العُصابات التشنجية
الاختلاجية والعَقليّة.

إكسير مضاد للرَّثْيَة، إكسير مضاد

في تركيبة الأكسير المضاد لاعتلال المفصل في «إيل دو فرانس» يُضاف المُرّ والسَّوْلُع إلى راتنج الغاياك أي عود الأنبياء. مُرِّمُرِّمُرِّمُرِّمُرِّمُرِّمُرِّمُرِّم

راتنج غاياك <u> ۽ ۽</u> ۽ سَوْلَع

نحلّ كل مادة على حدة، في ليتر كحول ٥٢ درجة ونمزج الصبغات معًا. ملعقة إلى ملعقتين على الريق في معالجة النقرس.

٣١- أَلْبِيْزِيَة أَبُو سِنّ، أَلْبِيْزِيَة طارِدة للدُّود Vermifuge albizzia (E)⁽¹⁾

Albizzie anthelminthique, Acacia à musenna (F)

Wurmabführend albizzia (D)(1) Albizzia anthelminthica (S)

جَنْبَة بَرِّيَّة طَبِّيَّة زرَاعيَّة تَزيينيَّة من فَصِيلَة القَرْنِيَّاتِ الفَرَاشِيَّةِ. سِنْف ثمارها ولحاء شوقها وفروعها طاردة للديدان وتستعمل في بَعض العِلاجات المِعَويّة.

Algues marines (F) أَلْغ بَحْري -٣٧

الخصائص - مُنشِّطة للتّبادُلات، مُنشِّطة

(١) التَّسمة للمؤلِّف.

للغُدد الصَّمّاء، مُضادّة للتَّشَيُّخ، مُوازِنة عامّة (مُصلِحة للأرضيّة العامّة)، داعمة للدِّفاعات الجَسديّة الطَّبيعيّة، مُمَعدِنة، مُنشِّطة للدّورة الدَّمويّة، مُضعِفَة (للبَدين بإعادة تَوازِن الأرضيّة العامّة)، مُضادّة للداء الخَنازير، مُضادّة للسَّلعَة أي تَضَخُّم الغُدَّة الدَّرْوماتيزم، مُضادّة للرّوماتيزم، مُضادَّة للعَدْوى.

الاستعمال الدّاخليّ والخارجيّ -

- للوَلَد: لَمُفاوِيّة، العُقْدَة أيّ الغُدَد اللَّمْفاويَّة، إلتهابات الحَرْقَوة أي الأنْف والبُلْعوم المُزْمِنة، المُرشَّحُون أو المُهَيِّأُونَ لِلسِّلِّ، المُعرَّضُونَ للأمراض بشكل عام، خَسْف المعادِن من الجسم، التَّعب العام الجسدي والفِكري، فَقُر الدم، الكُساح، إضطرابات النّمو، الزُّور والجَنف (أي إلتواء العَمود الفَقْريّ)، التّأخيرات المُحرِّكة، عَقابيل النَّقاهة من مَرَض أو على أثر عَمليّة جراحيّة، فُقْدان الشَّهيّة، إضطرابات عَصبيّة، نَرْفَزة، أرَق، البُلوغ والمُراهَقة، إضطرابات غُدِّيّة (في العَجْز الدَّرْقيّ)، عَقابيل حالات الشَّلَل، لا تَكَيُّف يَكثُر في المُدُن الكبري، حَساسِيّات مُختلِفةً ومُتكاثِرة يومًا بعد يوم.

للبالغ: التَّعب العامِّ الجَسديِّ والفِكريِّ، الإنحراف المِزاجيِّ التَّقليديِّ Patraquerie أضطرابات غُدِّية، التَّناذُر: تَعَب - نَرْفَزة، إضطرابات

عَصبية، إثارة، أرَق، خَسف المعادِن من الجسم، فَقر دمّ، نُقاهات سابِغَة أي بَطيئة، التَّشَنُّج وكافّة الاضطرابات الّتي تُرافقه، إضطرابات سِنّ القُعود، رُوماتيزمات مُزمِنة، رُوماتيزمات إنحطاطِيّة : مِثال إعتلالات المفاصِل، رُوماتيزمات إلتهابيّة مِثال إلتهاب المفصل المُزمِن التَّطَوُّريّ، وإلتهاب مفاصِل الفَقْرات: Spondylartrite بعيدًا عن النَّوبات الحادَّة وفي حَمَّامات؛ حَرَض أي داء المفاصل، أوجاع مُختلِفة، أوجاع أعصاب بَيْضِلْعِيَّة، أوجاع حَوْضِيّة، بَدانَة، إلتهاب النّسيج الخَلَوي، تَصلُّب الشَّرايين، إرتفاع التَّوتُّر، لَمْفاوِيّة، رَبُو، إصابات رِنويّة مُزمِنة فِتال البرونشيت وانتفاخ الرِّئة، إلتهابات الحَرْقَوة المُزمِنة، إصابات الجَيْب المُزْمِنة، إصابات نسائية غير إلتهابية حادة، إضطرابات الحَيْض التي تَتَرافق بآلام أم لا، عَقَابيل الكُسور العَضميّة، والإصابات العَظميّة المفصليّة وحالات الشَّلَل، إضطرابات هَضميّة مِثال فَرْط الحُموضة المِعويّة، إسهال، إلتهابات المِعَى، إلتهابات القُولُون، بَعض حالات الإمساك، حساسيّات مُختلِفة، شَقيقات، بَعض إضطرابات الدُّورة الدُّمويّة كالهَبْوات، والمَيْل للإصابة بالدُّوالي أي القاريس، والسُّيقان المُتعَبَّة، وانتفاخ العُرْقُوبِ أي الكاجل، بعض الإصابات الجلدية مثال السَّيَلان الزَّهَمِي، حَبِّ الشَّباب،

الحَصَف، التَّصَدُّف، الحَكَات الشَّديدة، الأَكزيمات الجافَّة، الشَّرَث، الخَصَر.

تَضَادًات الإستطباب - في الحمّامات - قد يُعطي الألغ بناء لوصفة يُحدِّدها الطَّبيب ويُؤخَذ من الدّاخل. الأمراض المُعدِية في طورها الحادّ، الالتهابات التطوُّريّة، بَعض الأمراض الجلديّة كالأكزيمات النّازَّة، خالات السّلِ الرِّنويّ، الخُراجات الرِّنويّة، عَدَم مُعاوَضَة القَلْب، إصابات قَلبيّة كليويّة، رُوماتيزم مفصليّ حادّ، فَرْط التَّكرُق أي داء بازْدُو، أمراض عَقْلية.

- الاستعمال الدّاخليّ:

" - في التَّغذية: إنّ للألْغ أهمِّية كُبرى منذ القِدم لدى شُعوب الشَّرقَين الأوسط والأقصى، وكذلك لدى بعض الشُّعوب الشَّماليّة. أمّا في أوروبًا فلقد بدأ الرّأي العامّ يُولي لهذا الأمر اهتمامًا أكثر من ذي قبل حيث يَبدو أنّ الألْغ يَتَبَوَّء حاليًّا مكانته الهامّة في مجال الحِمْية الغِذائيّة.

الصِّينيُّون واليابانِيُّون والهاواييُّون يستهلكون كمِّيَّات كبيرة من الألغ بهدف مُوازَنَة وجباتهم اليَوميَّة التي تَعتمد الأرزِّ والأسماك المُجفَّفة أساسًا لها. وتُستهلَك الألغيات في تلك البُلدان، وهي مُقوِّية عامّة، لخصائصها المُنشِّطة جِنسيًّا ولفعاليَّتها في الصِّراع ضِدِّ التَّشَنُّج. وتَشتهِر اللّامينارِيَة السُّكَرِيّة بخصائصها النَّاعِظة، وتُلقَّب بحزام نَبْتون أو حَمّالة النَّاعِظة، وتُلقَب بحزام نَبْتون أو حَمّالة

سَيْف نَبْتون.

اليابانيُّون يَزرعون أَلْغة حمراء تُدْى Porphyra tenera مَرْجَانَة طَرِيَّة (١)، مَرغوبة جدًّا وتُستَهلك مُجفَّفة باسم «نُورِي» Nori. تُمَدِّ طبقة من الأرزّ المَسلوق واللَّحم أو السَّمَك على ورقة أرْجُوانَة، تُلَفّ الورقة وتُقطَّع إلى شرائح تُؤكل في الشَّوارع على غِرار السندويش في البلاد الأخرى. ويُستعمَل النُّورِي كذلك في عدد من الأطباق والأحسية والشَّرائد وشَوربات الخُضر والصَّلصات...

وتَدخُل أنواع الجاليديوم، تحت إسم كَنتُن Kanton، في تَحضير الأحسية على أنواعها والمربيات والسكاكر والحَلُويات. أوراق اللهمينارية اليابانيّة (۱) Japonica والدّينيّة (۱) Religiosa تُؤكّل في الصّين واليابان، بإسم كُمْبُو Kombou، مَبروشة مع كلّ الوجبات وفي كلِّ الأطباق؛ كما يُحضَّر منها أيضًا شاي الكُمْبُو. الأَسْكَنْديُّون يَستهلكون ألْغَة حمراء تُدعى Rhodymenia palmata ولامينارية بُنّية تُدعى ألارية مأكولة (غالب) Alaria esculenta ضلعها سُكَّريّة الطَّعم. في إيرلَنْدة وسكَوتُلَنْدَة يُصنَع خُبز الألغ من أنواع المَضْرُوعَة (غالب) Himanthalia. في فرنسا يُستهلَك الألغ في المطاعم الصِّينيّة واليابانيّة والڤيتناميّة

⁽١) التَّسمية للمؤلُّف.

بنوع خاصّ. كما تُوجَد الألغيات أيضًا في الصِّناعة الغِذائيّة: بعض الكريمات، الفُرنِيَّات الفَوريّة، مُختلَف مُستحضَرات الترويقة، شَوربات الخضر والمُربَّيات. إنّ أهمِّيّة الألْغ سَوف تَتَصاعد في المُستقبَل كمصدر غذائيً هامّ.

" - يُمكِن استعمال الألْغ لأهداف على شكل مسحوق يُوضَع في علاجِيّة على شكل مسحوق يُوضَع في أقراص أو في مَضغوطات، وهي تَدخل في تركيب عدد كبير من المُستحضرات الصَّيدليّة. وتُعتبر الألْغيات في أكثر الأحيان إسهامًا مَعدنيًّا بفضل عدد ضروريّاتها الكبير، وغذاءً مُرَكَّزًا غنيًّا بكافة العَناصر التي تحتوى عليها.

وتَحتوي بعضُ ضروب الألغ، بالإضافة الى غِناها المَعدنيّ، على مَواد لُعابيّة يجعلها عَمَلها المُنظِّم للمَعِدة بنوع خاصّ، يَجعلها ثمينة في حال الإمساك أو الإسهالات، وكذلك في مُختلِف إصابات الأمعاء كإلتهابات القُولُون والمِعَى، عن طريق إواليّات مُعقَّدة. إنّ إعطاء الألغ في مَضغوطات يَبدو والحالة هذه أكثر مُلائمة من أكله في المطبخ.

" - إن إضافة خَميرة غِذائية إلى مساحيق مُختلِفة من الألْغ أدَّت إلى نَتائج جيِّدة جدًّا عند عدد كبير من الأفراد المُتْعَبين أو المُصابين بإحدى الإصابات الّتي ذُكِرت أعلاه تحت عُنوان "الاستعمال". إنَّ هٰذه الطُّرق في استعمال الألْغيات تَجعل نُقاعاتها ونقيعاتها غير المُستحبَّة عمومًا والّتي

كانت تُحَضَّر في الماضي تَجعل منها إذًا مُستحضرات بالية وباطلة.

- الاستعمال الخارجي:

يَعود استعمال حَمّامات الألْغ في فرنسا، عامّة كانت أم مَوضِعيّة، إلى آخر القرن التّاسع عشر. وهي حَمّامات بمتناول كلّ من كان يملك مَغْطسًا. يُقدِّم الأَلْغ بذلك طريقة عِلاجيّة بَسيطة وفَعّالة، ذلك أن تأثيرها الخارجي يَتم بفضل البَشرة الَّتي يَعتبرها البَعض على أنّها أهمّ غُدَّة في الجسم وليست مُجرَّد كساء خارجي له. حَمّامات الألْغ تُمعدِن بفضل الحرارة وتُعتبر مجالاتها العلاجية عديدة جدًّا؛ فهي تُؤدّي إلى تَوَسُّع الشُّريِّنات والأوعية الشُّعْريَّة، بما فيها الشُّرايين الإكليلية، فتُحدِث بذلك تكثيف التَّحوُّل الغِذائق الخليوي، وامتصاص النُتُوحات أي العَرَق، والالتئام النَّسيجيّ، وإلى تكثيف الوظائف الغُدديّة . . . وهي بذلك تُثير دِفاعات الجسم الطَّبيعيّة وتُلَطِّف وَهُن الدِّفاع أو تُلغيه، مُؤدِّية في النِّهاية إلى تَجَدُّدُ الجسم وإحيائه.

٣٣- ألْوَة، صَبْر، مَقْر، سَوْلَع (عُصَارة

Aloes (E) (-JI

Aloès (F)

Aloe (D)

Aloe (S)

مُواصفات عُصارة الصَّبْر - أيًّا يَكن مَصدر الصَّبْر، يَجب أن لا يحتوي على أكثر من ٣٠ بالمئة من المَواد غير القابلة

أ ل و

ألو

للذُّوبان في محلول نُشادريّ نسبته واحد بسبب عمله الإحتقانيّ على أعضاء من عشرة. عُزل، في الألْوَة أو الصَّبْر، الحامِض الصَّبْريّ Acide aloétique الّذي يَتَحوَّل إلى حامِض كريزامِّيْك إذا عُولِج بالحامِض النِّيتريك السّاخن. وإذا صُهر وسُولفات الحديد. الصَّبْر مع البُوتاس، فإنَّه يُعطى أورْسِيْن الحامِض پ. أوڭسِي بَنْزَويك. إنّ هذه الحوامِض تكون مُرَكَّبة من الـ«أَلْوَارَاتِنْجُو عَفْصُولِ» Aloerésinotannol في القسم الرّاتِنجيّ الَّذي يُشَكِّل حَوالي ١٢ بالمئة من الصُّبْر أو الألْوَة.

> وعَزَل منه الألْويْن أي السَّوْلَعِيْن كلُّ من سميث وستَنْهَاوْس عام ١٨٥١، ومن ثمّ عَزَله غروڤز عام ١٨٥٦. وقام ليجيه Léger، بین ۱۹۰۰ و۱۹۲۰، بدراسة مُعَمَّقة لمشكلة الألْوِينات (سَوْلَعِيْنات)، وتَبَيَّن له أن الأجسام الّتي حُدِّدت كانت أمزجة تَحتوي على البَرْبالُويْن وعلى الإيزوبَرْبالُويْن بنسب مُختلِفة. وعزَل في سَوْلَع النَّاتَالُ النَّاتَالُويْن والهُومُونَاتَالُوينَ. الخصائص والاستعمال - الصَّبِّر مُسهِّل، ماسِط، مُقوِّ، حسب المقادير. إنَّ عَمله كدواء مُسهِّل يَتَّجه بشكل والحالة هذه كدواء سامٌ. أساسيّ إلى المِعَى الغَليظ. وهو يُعطَى للأفراد المُهَدَّدين باحتقان الدِّماغ، وفي حالات الإمساك العَصِيَّة، ولتنشيط المجرى الهَضْميّ، ولإحداث الصَّفراء. وهو كذلك مُطمِث، ومُضادّ للدّود، ومُدِرّ ومُفرغ للصَّفراء.

> > إن استعمال الصَّبْر غير مَرغوب فيه في الحَبَل وعِند المُصابين بالبَواسير، وذلك

الحَوْض الصَّغير. ولكى نُلَطُّف عَمل الصَّبْر على الأمعاء ونُخفِّفه، نُضيف إليه مَواد أخرى، كالمُخدِّرات، والرَّاوَند،

إنَّ لبعض المَوادِّ خاصِّيَّة فريدة في تَنمية وتكبير عَمَل الصَّبْرِ المُسهِّل، بالرُّغم من أنَّها لا تُمتلِك هي بذاتها تلك الخاصِّيّة المُسهِّلة. وهُناك موادّ عديدة تَمتلِك لهذه الخاصّة، ومنها بنوع أخص سُولفات الكينين. كذلك، إنّ مقدار ٠٠،٠٣غ. من الصَّبْر، بالإشتراك مع ٠٠١٠غ أو ٠٠١٥غ من سُولفات الحديد، يُؤدِّي إلى إحداث مَفْعول يُوازى مِقدار ١٠,١٠ أو ١,١٥ من الصَّبْر لوحده؛ كما إنَّ مَيْل هٰذَا الأخير لتهييج المَعْي المُستقيم أي الشَّرْج Rectum قد يَخَفّ كثيرًا. هناك عَمل فريد آخر يُقدِّمه الصَّبْر ويُعرَف بالتَّالي منذ زَمن طويل، ألا وهو أنَّ جُرعة قَويَّة جدًّا، مُبالغٌ فيها، لا تُعطى مَفعولًا أكثر ممّا نُعطى الجُرعة المُسهِّلة الملائمة، وإنَّه، وعلى عكس ما يحدث مع بَقيّة الأدوية الماسِطة، لا يعمل

طريقة الاستعمال - مُسحوق الصَّبْر. دستور ١٩٤٩، بمقدار ٠,٠٥ غرام إلى ٠,٢٥ غرام كدواء مُقوًّ؛ ومن ١٥,٠٠غ إلى ٠٥،٥٠غ كدواء مُسهِّل مُدِرّ ومُفرغ للصَّفراء، في جُرعة واحدة أو جُرعتين؛ المقدار الإعتيادي، حسب دستور الأدوية: ٠,١٠غ لجُرعة واحدة. مَقاديرِ قُصوى: ٠,٣٠غ لجُرعة واحدة وغرام إصدارات دستور الأدوية عام ۱۸۱۸ إلى ۱۹۳۷ ضمنًا.

أمت

اَلُوَةَ بِارِّي، اَلُوَةَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ (``Perry's aloe, Red sea aloe (E)
Aloès de Perry (F)
Aloë perryi (S)

نَوْع من الألْوة من فَصِيلَة الزَّنْبَقِيَّات يَنبت على شواطئ البَحر الأحمر وفي جُزُر المُحيط الهندي، وهو من الأنواع الرَّئيسيَّة التي تَهم العَطّار. عُصارة أوراقه تُركَّز وتُجَفَّف وتُحفَظ.

المُرَكِّبات - عُصارة تَحتوي على عددٍ كبيرٍ من الموادّ الأنْتراسانيكيّة Anthraceniques وعلى سَليت دُهنيّ، ومَوادّ راتنجيّة.

الخصائص والاستعمال - الألْوَة بمقادير خفيفة هي مُقوِّيَة مُرَّة، مُنشَّطة للشَّهيَّة، مُدرَّة للصَّفراء؛ بمقادير أقوى تُصبح مُسهِّلة. يَجب الحذر من إحتمال التَّعوُّد أو الإدمان عند الّذي يَتعاطاها.

الألوة من الخارج تُعالج إلتهابات الأدَمة أو تَقرُّحات البَشَرة. وهي تَتميَّز بعمل مُثَبِّت للبَكتيريا والجراثيم Bactériostatique.

٣٥- أَمَتِيْن (كلورهيدرات اله)، إيهاسِيْن (كلورهيدرات اله)

Émétine (chlorhydrate d') (F)

 $C_{29}H_{40}O_4H_2$. 2HCl. 5,5 $H_2O = 653$

واحد لكلّ ٢٤ ساعة (بالغون)؛ إصدارات دست صِبغَة الصَّبْر البسيطة، غرام إلى غرامين ١٩٣٧ ضمنًا. وأكثر؛

الصبغة المُركَّبة، من ٥ إلى ٢٠غ وأكثر. ويُشكِّل الصَّبْر أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، جزءًا من عدد كبير جدًّا من الأدوية المُركَّبة. الشَّكل البِيلُوليّ، هو الشَّكل البِيلُوليّ، هو الشَّكل البيلُوليّ، هو الشَّكل الدي يَبدو الأكثر مُلائمة للاستعمال الدّاخليّ.

مُستخلَص الصَّبْر المُنَقَّى، الَّذي يُشير البه بَعضُ الفَرْماكوبيات، هو من الصَّبْر المحلول في الماء البارد، عن طريق المَرْث، ومن ثمّ يَتقرَّب من شكل المُستخلَص؛ إنّ تلك المُمارسة تُعتَبَر سيِّئة، إذ إنّ الصَّبْر المُنْتَخَب ليس بحاجة إلى التَّنْقية، وإنّ تلك التَّنْقية المُقترَحة يَجعله يَفقِد من خصائصه.

حُضِّر أيضًا مُستخلَص الصَّبْر الكبريتيك، وذلك بتبخير في حَمَّام مريم، حتى الوصول إلى القِوام الشَّرابيّ السُّكْريّ، محلول مُستخلِصَ الصَّبْر (١١٥ جزءًا) جزءًا) في الماء المُقطَّر (٤٥٠ جزءًا) يُضاف إليها حامِض كبريتيك نَقيّ (١٤ جزءًا)؛ المُستخلَص المُجفَّف على النَّار المباشرة، يُصبح مسحوقًا.

الطِّبِ الخَيْلِيِّ يُستعمَل الصَّبْر بشكل مُتَكرِّر جدًّا.

كحولة فيوراڤنْتي، كحولة غَرّوس، مَشروب بيطريّ مُسهِّل (دستور ١٩٤٩). صِبْغَة الصَّبْر البسيطة وصِبغَة الصَّبْر المُركَّبة (إكسير إطالة العُمر) وَرَدَت في

⁽١) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينية للمؤلّف.

أمت

هو قاعدة ثُنائيّة الحامض قابلة لكي تُعطي مجموعتين من الأملاح. الكلورهيدرات المَخزنيّ هو ملح مُتَعادِل.

يَتبلَّر كلورهيدرات الأمتين المُتعادِل مع عدد مُتباين من ذرّات الماء (٣ إلى ٨ الموص). إن الملح المَخزنيّ في دستور أدوية ١٩٤٩ كان الهيدرات ذو ٣,٥ كلورهيدرات الأمتين في دستور أدوية ١٩٦٥، كان الهيدرات ذو ٥,٥ أدوية ١٩٦٥، كان الهيدرات ذو ٥,٥ كلورهيدراتان للأمتين، واحد بخمس كلورهيدراتان للأمتين، واحد بخمس ذرّات ماء، والآخر بسبع. هذان الملحان هما اللّذان ذَكَرَتْهُما الفرماكوبيا الأوروبيّة الحديثة.

المواصفات - إن الملح المَخْزَني هو مسحوق أبيض، عديم اللَّون، عديم الرَّائحة، يقع في صُفَيْحات مِجهريّة بلَّوريّة. يذوب في الماء، غرام واحد لكل ٧ ملل ماء، ويبلغ دالِف المحلول المائيّ بنسبة غرام واحد في ٥٠ ملل ماء، يبلغ ٢٥٦؛ يذوب في الكحول. نقطة انصهاره إذا جُفِّف عند ١٠٥ سغ تنحصر بين ٢٥٣ و ٢٦٥ سغ مع تَحَلَّل.

الحفظ - بمعزل عن الضَّوء في قارورات مُقفَلة جيِّدًا.

الاستعمال - مُذابة مَحقونة من كلورهيدرات الأمّتين، بنسبة ٤٠,٠٤.

لكل ملل. يقضي كلورهيدرات الأمتين على المُتَمَوِّرة الطَّفيليَّة التي تُدعى ذات العمل Entamœba hystolytica المَرَضي جدًّا والمسؤولة عن داء المُتَموِّرات عند الإنسان؛ وكانت تُسمّى قىدىمًا: Entamœba dysenteriæ) في الأنسجة ولكن فعله على الكَيْسَات فضعيف جدًّا. وبالإضافة إلى ذلك، فهو مهيِّج للأغشية المُخاطية. وإذا كان كلورهيدرات الأمتين مقشعا بمقادير خفيفة، فإنه يصبح مُقيَّنًا بمقادير أقوى؛ استُعمل كلورهيدرات الأمّتين في الزُّحار الأمِيبيّ، نَفْث الدمّ، إلتهاب الرِّنة وحتى في بعض حالات البرونشيت. وهو غير فَعَّالَ فِي الزُّحارِ العَصَوِيِّ أي الباسيليِّ. من الواجب إعطاء جُرعات قويّة دفعة

من الواجب إعطاء جُرعات قوية دفعة واحدة لقتل الأميبات؛ وتُعطى، في أكثر الأحيان، زرقات تحت جِلديّة أو ضُمعَضَلية، من ٤٠,٠ غرام إلى ٢٠٠٠ غرام في اليوم؛ ونستعمل أحيانًا الحقنات الشَّرجيّة، أو كذلك البيلولات المُقَرْتَنَة أو المُغَلْتَنَة (١) Glutinisées. حاليًّا قليل الاستعمال جدًّا، ويُستبدل بالديهيدروأمَتِيْن، الأفضل والأقل سُمَّية.

المقادير - المقادير الاعتياديّة للبالغين تحت الجلد: ٠,٥ ملغ إلى ملغ واحد لكل كيلو ولجرعة واحدة؛ ملغ واحد بالكيلو وفي ٢٤ ساعة؛ المقادير القصوى: ملغ

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

واحد للكيلو ولكل ٢٤ ساعة؛ المقدار العام لمعالجة واحدة كاملة: ١٠ إلى ١٥ ملغ لكل كيلو.

للأولاد عن طريق تحت الجلد من صفر إلى ١٥ سنة ملغ واحد للكيلو وفي ٢٤ ساعة. جرعة قصوى لمعالجة واحدة وكاملة: من ٦ إلى ٣٠ شهرًا: ٥ ملغ للكيلو، من ٣ أشهر إلى ١٥ سنة: ١٠ ملغ للكيلو. مراقبة طبية. معالجات من ١٠ أيام يفصلها عن بعضها ٤٥ يومًا على الأقل .

سام - جدول Tableau C

الحيطات - إن إعطاء جرعات قويّة جدًّا يُؤدّى إلى هُبوط التَّوتُّر الدَّمويّ، عَدَم انتظامات قَلْبيّة، غَثَيانات، تَقبُّوءات، إسهال. تَضاد الاستطباب عند المَقْلُوبين والكُوتِيْن (١) Les rénaux .

٣٦- إِمْرُوْس أَغْبَر، كُورُونِيلًا غَبْراء Glaucous Coronilla, Evergreen Coronilla (E)

Coronille glauque, Coronille toujours vert (F)

Blaugrün Kronwicke, Grüner Kronwicke (D)

Coronilla glauca, Coronilla Sempervirens (S)(2)

جَنبة مُعمَّرة من فصيلة القَرْنيّات الفَراشيّة

(١) التَّسمية للمؤلِّف.

(٢) كل التّسميات للمؤلّف ما عدا العربيّة واللّاتييّة. (٣) التّسمية الأولى والثانبة للمؤلّف.

تَعلو من ١٫٥ إلى ٣ أمتار . أوراقها دائمة، مَرْطاء، مُفرَدة التَّركيب الرِّيشيّ من ٥ إلى ٧ وُريقات. أزهارها جميلة اللُّون الأصفر، جَشُويّة التَّجميع المُزَنّد، عَطِرة خلال النَّهار فقط، كأسها قصيرة الشَّكل الجُرَيْسي، أسنانها العُليا طويلة الالتحام أكثر من سواها، زُورقها حادٌ. القُرون رقيقة، مُتطاولة، مضغوطة، قليلة الانخفاض بين البزور، مهدها منطقة البحر المتوسط.

المُركِّبات - تحتوى البزور على كُوزُونيلُيْن وهو مزيج من هيتروسيدات مُختلفة، وعلى كُوروتُوكُسِيجانِيْن Corotoxigénine تَركيبُه الكيميائيّ .C₂₃H₃₂O وهو هيتروسيد.

الخصائص - المادتان مقويتان للقلب. الاستعمال - الإصابات القلسة.

فننطسة ٣٧- أناسيْكُلُوس ڤالَنْسِيا، قَالَنْسِيا، قُرَيْطُفَة (٣)

Anacycle de valence (F) Anacyclus velentinus (S)

الإسم التّونسيّ الشُّعبيّ قُريْطُفَة، وهو نَبات قليل الوَبْر من فَصِيلَة المُركَّبات، سوقُه مُنتصِبة، أوراقها ثُنائية التّشريح الرّيشي، ضَيِّقة التَّفصيص. الرّؤيسات الزَّهريَّة مُزَنَّدة ومُؤلَّفة من أزهار صفراء اللُّون كلُّها أنبوبيّة، الطُّرفيّة منها ذات

أنا

لُسَيِّنات قصيرة جدًّا لا تَتَخطَّى القُلافة. الثِّمار أكنات بيضاء اللَّون، الخارجيّة منها مُزَيَّنة بجناح عَريض، شَفَّاف ورقيق جدًّا، الأخرى لَها أجنحة ضيِّقة جدًّا. من هذا الجنس في لُبنان ثَلاثة أنواع أحدها إزهارها من كانون الأوّل إلى نيسان. هو عاقِر قَرْحا أو عُود القَرْح.

> الخصائص - يَشتهر لهذا النَّبات في النَّبات تنثر رائحة نَتِنة. تَسكين آلام المَعِدة والأمعاء، كما يشتهر في مُعالجة الإسهال.

> > طريقة الاستعمال - تُجفّف الأزهار وتُسحق ومن ثمّ تُخلَط مع السَّمِيد ويُحضُّر منها عَصيدة صالحة للتَّداوي. كما يُستعمَل أحيانًا نقيع الأزهار المَغلِيّة ويُؤخَذ منه فِنجانان أو ثلاث في اليوم.

٣٨- أَنَاغُوْرُس طَبِّيّ، يَنْبُوت نَيْن، خَرُّوتْ الخِنْزير، جَرُّوْد، أُمْ كَلْب

Stinking wood, Bean-clover (E) Anagyre fétide, Anagyris, Bois puant, Pudis (F) Stinkbaum, Stinkholz (D) Anagyris fœtida (S)

جَنْبَة بَرِّيّة طَبِّيّة ليفِيّة القَرْنِيَّات الفَرَاشِيَّة، ٣٩- أَنْغُسْتُورَة كَاذِبَة (١) فَرْعاء من قاعدتها، تَعلو ٢ إلى ٣ أمتار. فُروعها مُتَلَوِّيَة. أوراقُها ثُلاثية الفُصوص البَيْضاويَّة أو الإهْلِيلَجيَّة الشَّكْل، طولها ٤ إلى ٥ سم، كَلِيْلَة أو حادَّة الرَّأس قليلًا. أزهارها عَناقيد مِحوريّة مُقَنَّبَة مُزَنَّدة. الكأس مُحَدَّية، خُماسيّة الأسنان القصيرة المُثَلَّثة الشَّكل. أصفر اللُّون

الباهِت، طوله ٢ إلى ٣ سم. الأسدية عَشرة خُرَّة. قرون طويلة تبلغ ١٠ سم، بُزورها بَيضويّة الشَّكل، طولها ٨ ملم، لَونها من البَنفُسجي إلى المُحْمّر.

المُركِّبات والخصائص - جميع أقسام

تَشتهر الأوراق والبزور على أنَّها أدوية مُقَيِّنُة ومُسهِّلة. استخرج منها كُلِّ من هاردي وغالوا عام ١٨٨٥ الأناجيرين Anagyrine، وهو قِلَوِيد سامٌ جدًّا، تركيبه الكيميائي المُرَجَّع C18H20ON2 : ويُوجَد كذلك السِّتيزين والسَّهَارْتابين؟ كما يُوجَد في البزور أيضًا الزَّيت ومادّة صاغتة صفراء.

مُلاحظة - نَبات لُبنانيّ ساحليّ وحيد النَّوع يَرغب الأراضي المُهملَة والمَواقع المَشْغُولَة حَديثًا، وهو ينحسر انتشارًا عن ذي قَبْل جاء عنه في «الموسوعة في علوم الطّبيعة»: القليل من نَقيع أزهاره وأوراقه يُنَشِّطُ الإيلاع والباه، والكثير منه مُقَيِّئ.

Angusture fausse (F) Cortex pseudo-angusturae (S)

الأنغستورة الكاذبة هي قِشرة أعطيت عَرَضًا من نَبتة من فَصِيلَة اللَّوغَانِيَّات هي ستريكْنُوس القَيء أو شُجَرة جَوْز القَيء

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

Strychnos Nux-Vomica. وهي قِشرة طبِّيّة أعيد تسجيلها في الفَرْماكوبيا عام ١٩٧٥.

المواصفات - إنها إذًا سَمّ قَوي من المهمّ جدًّا عدم الإشكال بينها وبين المقشرة المُسمّاة أنغستورة حقيقية (أطلبها). وهي تَختلف عنها بشكل جَوهريّ ذلك أنّ حوافي قِطَعها ليست مقطوعة بحدً مائل، وإنها عديمة الرّائحة وأشد مرارة، كما أنّه يُمكننا أن نُشاهد على مَقْطَعها العَرضيّ، فُرْضَةً أو خطًّا أبيض اللّون، ليفيّ القِوام، يَقع في أبيض اللّون، ليفيّ القِوام، يَقع في نُسيج القِشرة الحَشَوِيّ اللّحائيّ، الذي يُميّزها بشكل قاطع عن الأنغستورة الحقيقيّة الّتي لا وجود له فيها.

المُركِّبات - تحتوي هذه الأنغستورة خاصة على البروسِيْن وعلى القليل من الستريكنين.

تجربة اختبار - نُقطة من حامِض نيتريك، تُوضع على السَّطح الدَّاخليَ لِقشرة الأنغستورة الحقيقيّة، تُعطي بُقعة مُصْفَرَّة اللَّون وقليلة التَّلوُّن؛ أمّا مع قِشرة الأنغستورة الكاذبة -S. Nux فيتحصل على بُقعة دَمويّة اللَّون الأحمر، وهو تَلوين يُحدِثه البروسِين Brucine.

٤٠ - أَنِيْسُون نَجْمِيِّ صَغِير الزَّهْر، بَدْيان صَغِير الزَّهْر (١) Little leafed star anis,

American staranis (E)
Badianier à petites-fleurs (F)
Kleine blütsternanis, Kleine blütbadianenbaum (D)

Illicium parviflorum (S)

أ ن ي

يَضم جنس بَدْيان ستة أنواع من فَصِيلة المَغْنوليّات؛ وهي شُجيرات ذات أوراق دائمة. أوراقُها وثمارُها عِطريّة، منها برائحة اليانسون ومنها برائحة الغار أو الكَبَابَة وأخرى برائحة السّاسَفْرَا أو الكُزْبَرة.

في الولايات المتّحدة الأمريكيّة يَستعملون الأنيسون النّجميّ الصّغير الزّهر، وهو برائحة الساسَفْرا وثماره سامّة.

۱۶- أَنِيْسُون نَجْمِيّ يَابانِيّ، أَنِيْسُون Venerate Star anis tree, (۲) Japanese star anis tree (E)

Badianier du Japon, Badianier vénéré (F)

Verehren Sternanisbaum, Japanisch badianenbaum (D)

Illicium religiosum (S)

يَتم الخَلط بَين الأنيسون النَّجْميّ الحقيقي أي الصِّينيّ والأنيسون النّجميّ اليابانيّ الذي قد يَتسبَّب استعمال ثماره بحوادث خَطِرة. يمكن التَّعرُّف إلى لهذه الثَّمار من قياساتها، ذلك أنها أصغر من

⁽١) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيّة للمؤلّف.

⁽٢) كل التسميات للمؤلّف ما عدا التسمية الفرنسية الأولى والتسمة اللاتمنة.

أ ن ي

ثمار الأنيسون الصّينيّ بثُلث مَرة؛ كرابلها ثمانية، قليلها فقط يَبلغ النَّضْجَ التامّ. أُريَّفة الصِّينيّ تكون مَبتورة بشكل عريض في قسمها العُلويّ، وتَبدو على شكل أسطوانة عريضة نسبيًا تَتعلَّق بها الثَّمار. أمّا عند اليابانيّ، وعلى عكس ما تَقدَّم، تَضيق الأُريَّفة Columelle تَدْريجيًّا في قسمها العُلويّ وتَنتهي برأسٍ حادّ. ومن جهة أخرى إن ثمار الأنيسون اليابانيّ جهة أخرى إن ثمار الأنيسون اليابانيّ ليست لها إطلاقًا رائحة الأنيسون اليابانيّ الصِّينيّ وطَعمه المُمَيَّزين جدًّا. ذلك أنها تُذكّر بالحريّ برائحة الغار أو الكيابَة.

تَجْرِبَة - نغلي جُرَيْبًا (ثمرة جرابيّة) خاليًا من البزور ومكسَّرًا في مقدار ٢ إلى ٣ ملل كحول ٩٠ درجة لمدّة عِدّة دقائق؛ إن السّائل المُصَفَّق يَجب أن يضطَّرب مع أنيسون الصِّين بسبب وجود الأنيتول، إذا أضَفنا إليه بعض الماء المُقطَّر، ويَبقى صافيًا مع أنيسون اليابان.

المُركِّبات - إن غِلاف ثمار الأنيسون الباباني يحتوي على شِيْكِيْمِيْن C5H10O5 وعلى مِيْكِيْمِيْن كَيْمِيْنِيْك: وعلى حامض شِينْكِيْمِيْنِيْنِيْك: Shikiminique الذي يُكسبه سُمِّيَته، وعلى جوهر مُرّ يُدعى شِيْكِيْمِيْنِيْنِيْن. لا يلعب الأنيسون المُوقَّر في اليابان سوى دورًا مَأْتَميًا على علاقة بخصائصه السامة المعروفة جيِّدًا في ذلك البلد.

مُلاحظة - كُشِف الأنيسون النَّجميّ السامّ في أوروبا عام ١٨٨٩، ١٨٨٠، ١٨٨٤، بفضل الحوادث التي تَسبَّب

بها؛ ولقد تكرّر ذلك مرارًا منذ ذلك الحين، خاصة عام ١٩٠٧ وعام ١٩٢٢. ومن هذه النّاحية تَجدر الإشارة إلى أن وجوده في الأنيسون النّجْمي الحقيقيّ يَجب ألّا يُنْظَر إليه دائمًا وكأنّه غش أو تَزوير، ولكن هذا الخلط بين النّوعين كان يحدث عفويًا في أكثر الأحيان لأن التمييز بينهما كان يَصعُب الأحيان لأن التمييز بينهما كان يَصعُب الأنيسون النّجميّ السام المُستورد إلى الصّين يأتي من اليابان حيث لا يوجد الأنيسون المُوقَر. الأنيسون المُوقَر.

هُناك سبب آخر يُجيز الاعتقاد بأن خلط الأنيسونين كان سببه الظّلام الذي خَيم طويلًا على المَصدر البوتانيكيّ لهذا النَّوع أو ذاك. فحوالى أواخر القرن السّابع عشر عَرَف كَمْپْفَر Kaempfer شَجَرة اليابان من دون أن يَرتاب بسُمِّية بُزورِها. كارُل لِينَّيوس أشرك بين النَّوعين. عام ١٨٣٧ أشار سِيبُولُد النَّوعين. عام ١٨٣٧ أشار سِيبُولُد شجرتين مُختلفتين وأن إحداهُما سامة. في الشَّجرتين المذكورتين سوى مجرد وبالرّغم من ذلك لم يَرَ بَايُون Baillon في الشَّجرتين المذكورتين سوى مجرد في الشَّجرتين لنوع واحد. النّباتان مُمَيَّزان اليوم تمامًا، وذلك منذ العام ١٨٨٨ اليوم تمامًا، وذلك منذ العام ١٨٨٨ وحتى الآن.

أنِيلِين (ألوان ال-)

Aniline (couleurs d') (F)

يَتميَّز الأنيلين بعدد المَوادِّ المُلوِّنة الَّتي يُقدِّمها للصِّناعة.

واحد من أهم تلك المواد هو بنفسج الأنيلين Violet d'aniline (أنيلايين، النيلين، أنبيزيْن، فينامين، قِرْمِز الأنيلين، حَرْمَلِين، إلخ). وهي أوَّل مادَّة عُرِفت وتم اكتشافها عام ١٨٥٦ في پكين. مادَّة مُتبلِّرة تقاوم جيِّدًا تأثير الضَّوء، تَذوب في الماء، وأكثر منه أيضًا في الحامِض الأستيك، الكحول، روح الخشب، أو المريج من المادتين الأخيرتين (كحول في مزيج من المادّتين الأخيرتين (كحول في مزيج من المادّتين الأخيرتين (كحول

إنّ أحمر الأنيلين مَثلًا، الّذي أطلِق عليه في البداية عددٌ كبيرٌ من الأسماء (فُوشِين، لأنّه يُذكِّر بلون الفُوشيا)، أزَلايين، ما جَنْتا، رُوبين، إلخ. إكتشفه هُوفْمَن عام ١٨٤٣، وحُضَّر صِناعيًّا عام ١٨٥٩. ألوان الأنيلين الخضراء الأكثر استعمالًا: أخضر بالألْدَهد، إكتشفه

أوزاب Usèbe عام ١٨٦٢. أخفسر أن ي بيودور الأثيل (عام ١٨٦٦)؛ أخضر بالبُود..

أزرق الأنيلين إكتشفه عام ١٨٦٠ كلَّ من جيرار ودُولير. أزرق باريس (١٨٦١). بَنَفسَج باريس (١٨٦٦). أسود الأنيلين إكتشفه لايتُفُوت عام ١٨٦٣، وهو لون أسود مُخمليّ جميل جدًّا وغنيّ جدًّا، لا يذوب بالماء والكحول والأثير والبنزين والقلى والحوامِض؛ وهو يَتميَّز جدًّا بلا إمْحائيَّه ولا يُوضع أو يُستعمَل إلّا عن طريق الطَّبع.

الاستعمال - إنّ استعمال ألوان الأنيلين شائع جدًّا في الصِّناعة والإقتصاد المَنزليّ؛ وهو يُستخدَم أيضًا لصُنع أنواع مُختلِفة من الحبر المُلوَّن، ولتلوين المُلبَّس أي اللَّوز المُسكَّر، والمشروبات الروحيّة، والمُربَّيَات، وعُصارات الفاكهة، وبَعض الخمور والشَّرابات، ومُختلَف مَنتوجات صِناعة العُطور.

ر ب

٤٢ - پَارَيْرَا براڤا، كُونْدُودَنْدَرون لِبْدِيّ، كُوكُولُس كُونْدُودَنْدَرُون، كُوكُولُس عَرِيض الوَرَق^(۱) Pareira brava (E) Pareira brava (F)

Chondodendron tomentosum, Cocculus Chondodendron, Cocculus plathyphylla (S)

الپاريْرا براڤا إسم يُطلق على جذر نبات من فصيلة القَمَريّات كان يُعْتَقد لزمن طويل من فصيلة القَمَريّات كان يُعْتَقد لزمن طويل أنّه جذر مند التضح فيما بعد أنّه بالواقع جذر الكوندودندرون، وهو جذر مصدره البرازيل، يختلف حجمًا من قدر الإصبع إلى حجم الذّراع، ليفيّ، مُتَلَوّ، أسود اللّون البُنّي من الخارج، مصفر اللّون البُنّي الفاتح من الدّاخل، يُبدي في مقطعه العَرضيّ طبقات مُتراكِزة مُؤلَّفة من خُزْمات من الألياف، وهي طبقات من كُزْمات من الألياف، وهي طبقات يسهل فصلها. الجذر عديم الرّائحة ومُرّ الطّعم.

المُركِّبَات - كوندودندرين، پالورين. وجد وِيغَّرْز في الجذر عام ١٨٣٨ قلويدًا

دعاه سِيْسَّمْهالِين Cissampeline بالُوزِين Pélosine وهو قلويد قد يكون مماثلًا للبَابَايَارِيْن الموجود في نبات من فصيلة الغارِيّات يدعى Nectandra فصيلة الغارِيّات يدعى Rodici في الواقع أن الهارَايْرا براڤا يحتوي على في الواقع أن الهارَايْرا براڤا يحتوي على قلويدين هما: ألفا وبيتا كُنْدُودَنْدرين، قلويدين هما: الفا وبيتا كُنْدُودَنْدرين، مماثلان إلى الألفا والبيتا بَابَايَاريْن، تركيبهما الكيميائي C₃₆H₃₈O₆N₂.

الخصائص - مُضاد للتَّسنَّج، مُضاد للألم. الجذر مبوِّل، ولكنّه نادرًا ما يُستعمل نقاعة بنسبة ٢٠ بالألف، أو يستعمل على شكل مستخلص مائع يُؤخذ منه غرام إلى ٤ غرامات في اليوم.

الاستعمال - مغص الكبد، مغص الكلية، ذُبحة الصدر، ربو، طمث مؤلم، ولادات، إلتهاب المثانة الپروستاتي، آلام روماتيزم.

طريقة الاستعمال – خمس نقاط من الصبغة في ٢٠٠ غرامًا من الماء. ملعقة كبيرة كل نصف ساعة في حال النوبات؛ مرتان في اليوم كعلاج وقائي، لفترات من ٨ أيام تفصلها فترات من التوقف تدوم ٤ أيام. كما يؤخذ من هذا الدواء تحاميل مُسكّنة.

ملاحظة - إن ما يسمّى Cappeba هو جذر الكوندودندرون كاپيبًا(٢) الذي

⁽٢) التَّـمية للمؤلِّف.

يختلف بالكاد عن جذر الباريرا، وهو مبوّل قوي. وذكر أن الكُرار يعطي قلويدًا طبيًا يدعى د - توبوكورارين يستعمل كمسترخ عضلي، ويستخرج من أنواع مختلفة من جنس ستريكنوس، إلا أن مصدره الأساسي هو جذر الپاريرا براڤا الذي أعيد تسجيله في الفرماكوبيا عام ١٩٧٥.

Batiator (۱) بَتْبَاتُور، بَتْجَنْجُور (۲۰ (Racine de), Batjenjor (F)
Vernonia nigritiana (S)

القُرْنُونِيَا (٢) جنس نَباتات مُعمَّرة قَوية من فَصِيلة المُركَّبات، تَعلو من ١,٥ إلى ٢ مترًا. أوراقُها مُتعاقبة، بسيطة، بيضيّة سِنانيَّة. رُؤيساتُها سَنَميّة أو عِذْقيَّة التَّجميع العَريض. أزهارُها أنبوبيّة، خُماسيّة السُّيور، مُزدوجة الأقلام المُستطيلة المِخْرَزِيّة الرَّأس. ثمارُها أكنات مُزَوّات ومقطومة. والبَنْياتور هو جذر النَّوع: فَرْنُونِيا زَنْجيَّة (٢).

المواصفات - البَتْيَاتُور جَذْر طويل، نَحيل، أسطوانيّ ومُجَعَد طوليًّا، مُرْمَد اللّون، واضح المِكْسَر، حامِز الطَّعم الخَفيف، رائحتُه مَعدومة أو مُغثِية خفيفة، يَكثر استعماله على السّاحل الأفريقيّ الغربيّ.

المُركِّبات - يَحتوي الجذر على

(٢) التَّسمة للمؤلُّف.

هیتروسید یدعی قَرْنُونِیُوسید، وتُستخرج بر منه مادّة تُدعی قَرْنُونِیْن، تَرکیبُها الکیمیائی C10H24O7.

الخصائص - دافع للحمّى، مُقَيِّئ.

الاستعمال - أكثر ما يُستعمل كدواء دافع للحمّى على السّاحل الأفريقيّ الغربيّ؛ إذا سُحق يُمكن إعطاؤه بالمقادير المُقيِّئة ذاتها الَّتِي تُعطى من عِرْق الذَّهَب؛ وهو يُقَدِّم خَدَمات كبيرة للزُّنوج الَّذين يُكثِرون من استعماله في مُعالجة حالات الإسهال والديسنتيريا.

٤٤ - بَرْنُوف، رَاسَن البَراغِيث،
 شَاهْبَانَج، طباق البَرَاغِیْث، طَیُّون الذُّبَاب
 Flea-wort, Flea-bane, Ladies' gloves
 (E)

Conyse, Conyze, Aunée conyze, Herbe aux puces, Herbe aux mouches (F) Dürrwurz, Grosses flöhkraut (D) Conyza squarrosa, Inula conyza, Inula vulgaris (S)

نَبات بَرِّي زَغِب ولِبْدِي قليلًا، مُحول أو مُعمَّر من فصيلة المُركِّبَات الأنبوبيّة الزَّهر يَعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مُعَنْكَلة أو مُعَذَّقة عديدة الرؤوس. أوراقه إهليلجيّة سِنانيّة، الجَذريّة منها مُخفَّفة إلى عُنُق طويل، السّاقيّة لاطئة. رؤيساته مُخروطيّة الشَّكل المُنْقلِب إلى نِصف كُرويّة، قصيرة الزِّنادات. قُنابات القُلافة حادة، ورَقية بمثلّث صغير أخضر على رأسها. أزهاره عديدة الصّفوف، لا

⁽١) التَّسميتان للمِؤلِّف.

ب س ك تَنَخطَّى القُلافة، ثُلاثية التَّشريم، قصيرة

الخصائص والاستعمال - أعيد تسجيله في دستور أدوية ١٩٧٥ . كان هذا النَّبات يُعتبر في الماضي مُطمِثًا وشافيًا للجرح. أوراقه كانت تُخلط أحيانًا، وبشكل عَرَضَى، مع أوراق الديجيتال، من قِبل جامعي الأعشاب؛ يمكن كشفها والتعرُّف عليها بسهولة.

اللِّسان، مُصفَرَّة أو مُحمرَّة اللَّون

الخفيف. الأكنة خشنة.

٤٥- بسكويت طارد للديدان بالسَّنتُونِيْن Biscuits vermifuges à la santonine **(F)**

سَنتُونِين صِرْف٥٠ غ عجينة بسكويت جامدةكمية كافية لصنع ألف بسكويتة. كل بسكويتة تحتوي على ٥٠,٠٥ غرام من السُّنتونين. يعطى منها بسكويتة إلى بسكويتتين، حسب عمر الأولاد.

بسكويت طارد للديدان بالسنتونين ۱ دسّغ

عجينة بسكويت، كمبة كافية

لصنع بسكويتة، نعطي ربعها أو نصفها أو بكاملها، وحسب قوة الولد، لكى بأكلها.

إن مقادير أقْرَباذِين ١٩٤٩ القصوى هي ما يتبع: أولاد من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٠,٠١ غرام مقابل كل سنة من العمر، حد أقصى ١٠١٠ غرام للمجموع وفي ٢٤

ساعة. أما بموجب الفرماكوبيا الفرنسية الحديثة فيجب الامتناع عن إعطائها للأولاد.

٤٦ - يسيِّدِيَا مُشْكِرَة، خَشَب الكَلْب(١) Jamaica dogwood (E) Piscidie, Bois de chien (F) Piscidia Erythrina (S)

شُجيرة مُعمَّرة من فَصيلة القَرْنيَّات مُنتشِرة جدًّا في أمريكا الجَنوبيّة، الأنتيل، وخاصة في المارتينيك. أوراقها، وثمارها، ولحاؤها تمتلك خصائص مُسْكِرة وهذا ما أكسبها إسمها الفرنسي. أهل تلك البلاد يستعملونها في إسكار السمك كما يحدث ذلك في مناطق أخرى بواسطة ثمار السنديل أي سَمّ السَّمَك. الإنكليز يُسمُّونها «خشب الكَلَب،، وهو الاسم الذي يُطلقونه أيضًا على قُرْنُوس فلوريدا. القشرة هي المستعملة.

المواصفات - تقع قشرة الجذر في قطع طويلة بعض الشيء وغير منتظمة بالمرّة: وتكون القشرة عمومًا مَلْويّة إلى الدّاخل أو مُرتَّبة على شكل أنابيب، صفحتها الخارجيّة رماديّة اللُّون عليها أثلام طُوليّة متقاطعة متصالبة، قليلة العُمق ومزرقّة اللُّون، صفحتها الدّاخليَّة رماديَّة اللُّون، مُخَطَّطة طوليًّا. طعم القشرة حامز.

المُركّبات - تحتوى القشرة الجذرية

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

على پسيدين، وهو مادة متبلّرة، لا تذوب في الماء، قليلة الذَّوبان في الكحول البارد، ذَوّابة جدًّا في الكحول السّاخن؛ وعلى حامض پسيندي، ومن الأرجح أنها تحتوى كذلك على مركِّب فعّال آخر.

الخصائص وطريقة الاستعمال – الأطبّاء الأمريكيّون يستعملون قشرة الپسّيديا كمخدّر ومهدًئ، على شكل مستخلص مائع بمقدار ۱ إلى ٣غ. أو مستخلص رخو بمقدار ١,٠٠ إلى مستخلص رخو بمقدار ٢,٠٠ إلى ١٠,٠٠ إلى ٢غ. في اليوم، وصبغة بمقدار ٢

Campeachy wood, Log بَقَم أَسْوَد - ٤٧ wood (E)

Campêche, Hématoxyle (F)
Campeche baum, Campecheholsz (D)
Hæmatoxylon campechianum (S)

شَجرة شائكة حُرجيّة صَناعيّة من سبط قبيلة السِّيْزَالْبِينِيّات وفصيلة الفَرْنيّات تعلو من ٧ إلى ١٢ مترًا، مهدها أمريكا الاستوائية والأنْتِيْل، تستج الهيماتُوكْزيلين. مجموعات من الأوراق الرّيشيّة الصَّغيرة تبرز على العِقد الشّائكة في الفروع والأغصان. الورقة من ٢ إلى أزواج من الوريقات العميقة التَّقطيع. ومجموعات كثيفة من الأزهار الصَّغيرة ومجموعات كثيفة من الأزهار الصَّغيرة قرونًا متطاولة ومستدقّة الطَّرفين. قطورها قابضة ومُضادة للديسنتيريا.

المُرَكِّبات - هيماتوكزيلين

(إيماتوڭزيلين)، مرادفه هيماتوكزيلول بق ن Hé(Hæ)matoxyline ، وهو مُشْتَق عديم اللُّون أو أبيض اللُّون Leucodérivé تركيبه الكيميائي هو C₁₆H₁₄O₆، يُقابل الهيماتايين، يُستخرج من جِلْب خشب البَقَم الأسود، وهو كاشف تحليلي ومُثَبِّت الصِّباغات ومُلَوِّن يُستعمل في علم الحياة ودَلِيْل كيميائي مُلَوَّن. هيماتَاييْن وهو مادَّة مُلَوِّنة حمراء تركيبها C16O12O6 تَنتج من تَأْكُسُد الإيماتوكزيلين؛ وهو مادّة تُستعمل أيضًا ككاشف تَحليليّ. خَشَب البَقَم أي الخَشب الأزرق أي خشب الهند: Bois de campêche هي خُطَيْبات أو كَسْرات أو مسحوق أو مستخلص أثيري مائي من خشب البَقَم الأسود، يُستخدم لصنع أنواع اللُّكُّ وأنواع الحبر، ويحتوي على الهيماتوكزيلين. مُستخلص البَقَم Extrait de campêche، هو كتلة لامعة، مُسودّة اللُّون البُنِّي، تَحصل من إنهاك خَشَب البقم إنهاكًا مَنْهَجيًّا، وهو يحل محلّ الخشب ذاته وبفائدة أكبر في كافّة أوجه استعماله.

Devil's-bit scabious (E) بَقَنْقُومُون – الله Scabieuse, Mors du diable, Tête de loup (F)

Tenfelsabbiss (D)
Succisa pratensis (S)

نَبات عُشبيّ منتصب من فصيلة الدِّبْسَاسِيَّات يعلو حوالى ٤٠ سم. جذوره حُزْمِيّة مسودة اللَّون. ساقه هزيلة

ب ل خ

متفرِّعة. أوراقه كاملة، بيضويَّة متطاولة، ضُمِّيَّة التَّجميع القاعديِّ. أزهاره في رؤيسات كُرويَّة الشَّكل، مزنَّدة. الكأس رباعيّة الفصوص، وكذلك التّاج الذي يكون لونه إلى الأزرق أو الورديّ. الثَّمرة أكنة مُضلَّعة.

المُركِّبات - عفص، سكابيوزِيْن، صمغ، صابونين، سَكّاروز.

الخصائص - منقً، مطمث، مبوّل، معرّق، شاف للجرح.

الاستعمال - النبات بكامله. أكزيما، التهابات الملتحمة، جرب، كدمات دابغة، قوبات، سفلس.

طريقة الاستعمال - نقاعة، مستخلص سائل، صبغة، شراب، ماء مقطّر. يشيع استعمال هذا النَّبات في الأرياف الأوروبيَّة في كمادات من النَّبات الغض المفروم على الظُّواهر الأكزيمائية وأمراض جلديّة أخرى. ماؤه المُقطَّر، في قطرة عَينيّة، أعطى نتائج جيَّدة في التهاب الملتحمة. أوراقه الرَّبيعيّة الغَضّة تؤكل في بعض المناطق الأوروبيّة مضافة إلى سلطات أخرى. الاعتقاد السائد أنها في معالجة الجرب. لصبغتها عمل خفيف ولكنه أكيد في معالجة الكدمات.

Silk vine (E) بَلَخِيّة يُونَانِيّة - ٤٩ Périploque grec (F) Echte hundsschlinge (D) Periploca græca (S)

- جُنَيْبَة سوقها مُتطاوِلة مُلتفّة نوعًا ما؛ أوراقها مُعَنَّقة: P. græca

- جَنْبَة مُنتصِبة؛ أوراقها لاطئة أو شبه لاطئة: P. angustifolia

البَلَخِيّة اليونانيّة جُنيّبة أنيقة من فصيلة الصُّفُّلَابِيَّات، ليفيّة القاعدة بعض الشَّيء، مَرْطاء. ساقها غليظة، مَدّادة أو صاعدة، مُلتفَّة، تَطول عدَّة أمتار. أوراقها متقابلة، أوراق بعض الفسائل تكون مُخفِقة، خَطِّيَّة، حادّة، الأوراق الباقية بمعظمها، وخاصة تلك التي تجاور الأزهار، تكون بيضيّة إلى متطاولة سِنانيّة، حادّة الرّأس، مستديرة ولكنها غير قلبيّة القاعدة، مُعنّقة، قد تبلغ وتَتَخطّى ٧×٥ سم. أزهارها في سنمات إبطية مُتفرَّعة. سُويقات وزُنيدات مَرْطاء. كأس قصيرة، عميقة الانقسام، فصوصها حادة. التّاج أكبر بكثير من الكأس، قصير الالتحام القاعدي، فصوصه ٤ إلى ٥، منبسطة، متطاولة، مَلْوِيَّة ، بُنِّيَّة أو مُخضرَّة اللَّون، مَرْطَاء في وسطها، عريضة الحوافي الخمليّة بأوبار بيضاء مُحَلَّمة. في وسطها إكليل من ٤ حرشفات شائكة، ذات أذنين تنتهيان بحافة مسودة اللُّون ومُحدَّبة. الثِّمار جِرَابِيّات مَرْطاء، طويلة، مستدقّة الرّأس، متباعدة بعض الشيء.

المُركِّبات - تحتوي، خاصة في قشرتها، وبنسب أقل في أوراقها، على هيتروسيدين هما: پاريپْلُوسِين (پاريپلوكوسيد) تركيبه الكيميائي

 $C_{36}H_{56}O_{13} = 696,8$ تَمَّ اکتشافه عام $C_{36}H_{56}O_{13}$ ارئِپْلُوسِیمارِیْن، ترکیبه $C_{30}H_{46}O_{8}$.

الخصائص والاستعمال - تُستعمل البَلَخِيّة أحيانًا في مناطق مجاورة للبحر الأسود وأوروبّا الوسطى، كمقويّة للقلب ومضادّة للرّبو، على شكل مستخلص مائع أو صبغة. إن هذا الدَّواء هو دواء خطر.

تبدو الهيتروسيدات من دون فائدة على الديجيتالين أو على أنواع الستروفَنْتِين. هنا بعض الصُّقلابيّات المتقاربة من البَلَخِيّة في الهند وأفريقيا الجنوبية، تمتلك جذورًا وسوقًا رائحتها رائحة الوانيلين العذبة أو رائحة الهليوتروپين: Hemidesmus indicus; chlorocodon .whitei

Balsam (E) البلاسم Baumes (F) Balsam (D)

Baume بَلْسَم جَنَفْيَيْڤ، دِهان جَنَفْيَيْڤ de Geneviève ۲٤٠ زیت زیتون ۸٠ غ تربَنْتین ۸٠ غ شمع أصفر ٤٠ غ صَنْدَل أحمر مسحوق ۱۰ غ

مُجِّد في الماضي في معالجة الإنْخِضادات والحُدُور والتَّقَرُّحات.

كافور ٣٠ غ

بَلْسَم دُوْرِیْه Baume Duret

'غ		ريزُورسِيْن
ٔ غ	٥	كبريت مُرسَّب
۱ غ	٦	بُورات الصوديوم
ٔ غ	o	زيت الكاد
ٔ غ	۸	قطران النروج
ٔ غ	٣٥	لانُولين لامائي
		نُحضِّر مرهمًا.

ع	ζ		 	 	 		 	 	 		٠.	٠.	٠.	 ,	 	Č	نور	4)
غ	٤		 	 	 	 	 	 	 					 	٦	وا	اکُ	غَي	
غ	١	٠		 	 ٠.	 	 	 	 	 		٠.		 	 	ر	فو	کا	•
غ	٣	•		 	 	 	 	 	 					 	 	ن	ر ئو	أسِ	ĺ
										•	ĺ	_	١.	•	7	<u>.</u> .	ء :		

نضيف المحلول إلى المرهم بمقادير قليلة ونستعمل زيت الخروع كمادة رابطة:

زید خروع ۲۰

بَلْسَم سَانْشِيز المضاد لداء المفصل Baume antiarthritique, de Sanchez

صابون ۳۰ غ
كافور ٨ غ
روح الخزامي ١٢٥ غ
زیت نعنع طیّار (نقاط)۱۵ نقطة
زيت قرفة (نقاط) ١٥ نقطة
زیت خزامی طَیّار (نقاط) ۱۵ نقطة
زيت كبش قرنفل (نقاط) ١٥ نقطة
زيت جوز الطّيب (نقاط) ١٥ نقطة
زيت ساسفرا (نقاط)۱۸ نقطة
أثير أستيك

ب ل س

ب ل س بَلْسَم عِطْرِيّ baume aromatique

زيت كبش القرنفل ١٢٥ غ زيت جوز الطيبوزيت جوز الطيب روح ثمار العرعر ٦٠ غ نمزج الكل جيّدًا.

اختلفت تركيبة هذا البلسم في كتب الوصفات اختلافًا كبيرًا.

 مزيج زيتي بلسمي ٣٠غ، نشادر سائل زنجبيل ٦غ، ألْوَة ٤غ. ٤غ، زيت بابونج طيّار ٢٠ نقطة، كحول مُكَرّر ١٥غ. كان يستعمل ضدّ ضعف النظر في تمسيدات على الجفون. -ملح قرن الأيّل ٠,٦غ، إفراز القُندُس ٢,٥غ، زيت فَيْجَن ٦ نقاط، زيت جوز طيب ٧غ. في تمسيدات الصدغين في حال الهستيريا. إن هذا البسلم الأخير يُطلق عليه بنوع خاص إسم: البلسم العطرى الأثيري. - زيت جوز طيب ۳۰غ، زیت کهرمان ۲غ، زیت کبش قرنفل ۲غ، زیت خزامی ٤ غرام، زیت عرعر ٤غ. إن ما يسمّى زيت شُرْزَر Scherzer العطريّ ليس إلّا تعقيدًا لتركيبة البلسم السابق. - بلسم البيرو ٢غ، مِسْك ٠٠,٠٦غ، زيت كبش قرنفل ٢,٠٠غ، زبدة جوز الطيب ٧ غرامات.

بَلْسَم الفارس لابُورد Baume du chevalier Laborde

۱۰۰غ	زيتون	زيت
. ۲۰ غ	ِ ملاكِيّة	جذر
. ۲۰ غ	ِ سَلْسَفيل أو دَبَح	جذر
	ر داذی	

عُنيبات غارعارعان عار نغلى ١٢ إلى ١٤ ساعة مع التحريك المستمرّ؛ نرفع عن النار ونبرّد. في اليوم التالي نسخِّن من جديد لمدَّة ٣ أو ٤ ساعات، ومن ثم نضيف بعيدًا عن النار:

تریاق ۸غ، زعفران ۸غ، مستخلص

نغلى مجدّدًا مع تحريك مستمرّ طوال ٧ إلى ٨ ساعات ونمرِّر بالقماش؛ نعيده إلى النار ونضيف:

تربنتين نسخِّن حتى لا يعود الدخان ينثر رائحة التربنتين، نرفعه عن النار ونضيف أيضًا: يخور، أصطرك، وينجوان مسحوقة، من كل واحد ٦ غرام.

نمرّر مرة أخرى ونحفظ.

الاستعمال - مُجِّد كثيرًا في معالجة تشقّقات الثدى والبشرة، وفي معالجة القرحات، وتشققات الصقيع، والروماتيزمات، والمَلْخ، والتواء المفاصل. إن البلسم الإلهي يتقارب منه: Baume divin : منه

۱ه- بُنّ أَخْضَر Coffee-beans (E)

Café vert (F)

Kaffee (D)

Coffea (S)

البُنّ الأخضر هو الحَبّ المُجفَّف المُقَشَّر للبُنّ العَربيّ Coffea arabica، والبُنّ Coffea canephora وضروبهما. وهو يحتوي على الأقل واحد بالمئة من الكافيين أي البُنين الذي يُحْتَسب بالنسبة إلى المادة اللهمائية.

المُواصَفات - البُنّ الأخضر ذو رائحة خفيفة وخاصة، وطعم حامِز ثم مُرّ. حَبّة البُنّ الأخضر تكون بَيضويّة، مُحدَّبة السَّطح الخَلفيّ، مُسطَّحة الوجه الأمامي السَّطح الخَلفيّ، مُسطَّحة الوجه الأمامي الذي تخترقه السُّرة طوليًّا على شكل تَلْم عميق فيه بَقايا من القشرة الملتصِقة بالسُّويداء. ويُراوح طول الحبّة من ١٠ بالسُّويداء. ويُراوح طول الحبّة من ١٠ إلى ٨ ملم، وهي صُلبة ومُخضرة اللَّون.

المُركِّبات - تَحتوي حُبوب البُنّ الخضراء على ما قدره: ٤ إلى ٥ بالمئة أملاح، ٦ إلى ٨ بالمئة مَواد شُكَّريَّة، ١٠ إلى ١٣ بالمئة مواد دُهنيَّة، ١٣ بالمئة پروتينات، زَيتان دُهنيَّان، حامض كافِتانيك أو كلوروجانيك ٦ إلى ١٠ بالمئة، قاعدة پوريك (مُشْتَق من الپورِيْن) ١ إلى ٢٠ بالمئة، الكافيين وهو جوهرها الفَقال.

التَّحْمِيص - يَهدف تحميص البُنِّ إلى

تَطوير وإنماء زيت مُحْتَر يُكسِب البُن طعمه وعَرْفه اللَّذان يَجعلانه مرغوبًا من كاقة الشعوب. إن هذا الجوهر العِطريّ هو الكافِيُون Caféone بنوع خاصّ والذي يبدو أنه يتكوَّن على حساب حامض الكافِتانيك. بالإضافة إلى ذلك، يُلاحظ أن هناك تشكيل مُستمرّ في التَّحميص للمواد التالية: أسيتون، فورفورول، نُشادر سائل، تريمَتِيلَامِيْن، حامض نَملِيك، حامض خَلِيك، ريزورسين نَملِيك، حامض خَلِيك، ريزورسين . Résorcine

الاستغمال - اقترح البُنّ المُحمَّص كمادَّة مُطهِّرة، ولِسَتْر رائحة المِسْك، والحِلْتِيت، واليودوفورم، وإخفاء رائحة وطعم زيت كَبِد سَمَك المُورَة. وكان شراب البُنّ الرُّوحيّ (ليكور) يُستعمل في بعض الأحيان كدواء مُنشِّط في حالات التَّسمُّم بالمخدَّرات، ولسَتْر مرارة الكينا وسولفات المنيازيوم والسَّنَا أو السَّنَى.

البُنُّ المُحمَّص يَجب أن لا يحتوي على أكثر من ٥ بالمئة من الماء؛ ويمكن تغليف البُنّ أو تلبيسه مع السُّكَّر، ومع الزُّيوت، أو مع أيَّة مادَّة أخرى غير ضارّة، وعندما تتَخطَّى مادَّة التَّلبيس نسبة ٢ بالمئة فيجب ذكرها.

غِشَ البُنِّ وتَقْلِيْدُه - إِن غَشَ البُنَّ وتَقْلِيْدُه البُنِّ وتَزْويره يمكنه أَن يَطال حبوب البُنِّ والبَنِّ المَطحون على السَّواء. إِن الحبوب المُزيَّفة تَتَفَيَّتُ وتتفسَّخ في الماء

ب ن ا

130

الغال. ويُصار الكشف عن غش البُنّ المطحون بواسطة الفحص المجهري الخاص، حيث يمكن العثور بنوع خاص على بعض العناصر من حبوب السَّنَا والشَّعير والبَلّوط المَشوي والتين وجُذور الهِندباء والحمّص والترمس والخرّوب. إلخ...

إن استخلاص البُنّ المحمَّص المائيّ الحاصل بعد غليانه لمدّة ربع ساعة، يكون عادة بين ٢٧ و ٣٠ بالمئة. إن هذه الطَّريقة في التَّحديد تسمح الكشف عَمَّا إذا كان هناك إضافة لبعض الموادّ الغريبة أو إضافة بُن كان قد استُنفِذ سابقًا.

إن نسبة الرَّماد غير قابل النَّوبان التي تتركها عيِّنة ما من البُنّ يمكنها أن تَدلّ إلى ما إذا كان البُنّ نقيًّا أو مخلوطًا مع الهندباء؛ مئة جزء من رماد البن تترك في الماء مقدار ٧٠ بالمئة من المواد القابلة للذوبان؛ أما مئة جزء من رماد الهندباء لا تترك منها إلى السائل المذكور سوى مقدار ١٧ بالمئة فقط. أما بالنَّسبة لتقدير البُنيَّن، فيطلب ذلك في دراسته الخاصة.

بَدَائِلُ البُنِّ - عندما أصبح استيراد البُنِّ صَعْبًا خلال الفترة بين ١٩٤٥-١٩٤٥، أصبحت بالتّالي بدائله المُقترحة عديدة جدًّا. وتجدر الإشارة إلى أنّه، بالرُّغم من عدم وجود الكافَيُون، إن حبوبًا مُحمَّصة مُختلِفة تتمتَّع بعَرْف يُذكِّر نوعًا ما بعَرْف ليُذكِّر نوعًا ما بعَرْف البُرِّ.

الشَّعير والبَلّوط الحُلو والتُّرمُس الأبيض هي بعض الأنواع المعروفة تمامًا في هذا المجال ومنذ زمن بعيد. ولقد استُعمِلت الصَّويا في بعض المناطق، الصَّويا في بعض المناطق، والأسطراغالوس بَيُوتي (۱): Astragalus والأسطراغالوس بَيُوتي (۱): bœoticus ليفُول في النورماندي، والتُرمُس البُنّ reticulatus Desvaux الشَّبكيّ (۱)؛ ولقد شوهدت كذلك حُبوب الشَّبكيّ (۱)؛ ولقد شوهدت كذلك حُبوب اللَّصيئقي الجُلبان Lathyrus، وحبوب اللَّصيئقي الباقية أي الغاليون الأبيض Ceratonia siliqua وحبوب الخَرُوب . Ceratonia siliqua

البُنّ المُنتَزَع البُنيْن - لقد اقترر استعمال البُنّ الخالي من الكافيين لتحضير المشروب اليَوميّ لمرضى القلُب وللأفراد العَصَبيّين. إن هذا النَّوع من البُنّ يوجد في الأسواق العالميّة بأسماء وأشكال مختلفة. وللحصول على ذلك يُصار إلى إخضاع البُنّ الأخضر إلى معالجات خاصة، تُلاثم استنزاف البُنيْن بواسطة سائل حال طيّار. ولا يكون الاستخراج كاملاً: ففي المانيا يتسامح القانون بمقدار ففي المانيا يتسامح القانون بمقدار غرام من الكافيين في كل مئة غرام من البن، وفي بلاد أخرى (هولندة) لا يَسمح القانون سوى بنسبة غرام فقط.

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

شبه مالسة. أزهارها إلى البنفسجي، بن ا كامدة، شبه لاطئة، كُرويّة التَّجميع على رأس سويقات قويّة ولِبديّة. الثَّمرة عُنيَّبة

تَزيينيّة سوداء اللُّون.

عَنْ مَنْ وَيَنْ مَنْ وَي ، بَنَا كُس هَنْ وِي ، جِنْسَن Panax de Henri (F) هَنْرِي (۳) Acanthopanax Henryi, Eleuthero-coccus Henryi (S)

جَنْبة من فصيلة الأراليّات تتقارب من الْهُناقَنْتَة اللَّاطئة الزَّهر. فروعها مزيَّنة بأشواك معقوفة نادرة. أوراقها خمليّة الصَّفحة السُفلي، خشنة الصَّفحة العُليا، ثُلائيّة إلى خماسيّة الوُريقات الشِّبه لاطئة. أزهارها مزنَّدة. مهدها وسط الصين.

ه ه - بَنَا قَنْتُة لاسِعة، بناكس لاسِع، Panax piquant (F) (٣) جِنْسَن لاسِع Acanthopanax senticosus, Eleutherococcus senticosus (S)

جَنْبة من فصيلة الأراليّات فروعها جالسة كثيفة الكساء بشوك دقيق. أوراقها من ٣ أو ٥ وريقات مُعَنَّقة، إهليلجيّة أو بَيضيّة متطاولة مستدقّة الطَّرف، واضحة الشّكل المِنشاريّ، فاتحة اللَّون الأخضر وهي فتيّة، مُزوَّدة بأوبار بُنِّيّة اللَّون على عروق الصَّفحة السُّفلي وبأوبار مُتفرِّقة على الصَّفحة العُليا. أزهارها في خيمات طويلة العُليا. أزهارها في خيمات طويلة

جنس نباتات من فصيلة الأرالِيّات يضم Kalopanax و Eleutherococus و وهي أشجار أو شُجيرات تُزرع لأوراقها التَّزيينيّة بنوع خاص. ساقها شائكة عمومًا. أوراقها مُتبادلة، طويلة الأعناق، راحيّة أو مُتصبِّعة، مُعْبِلة. أزهارها صغيرة القَدّ مُخضرَّة اللَّون عمومًا، خيميّة التَّجميع تُشكِّل أحيانًا رؤيسات هامِيّة ضخمة. الثَّمرة عُنَيْبة سوداء اللَّون. منها:

أنواع أوراقها بسيطة راحِيّة، أنواع أوراقها مُتصبَّعة، ثُلاثيّة الوريقات، أنواع ذات ٥ إلى ٧ وريقات، نادرًا ٣.

٥٣- بَنَاقَنْثَة لاطئة الزَّهْر، بَناكس لاطئ الزَّهْر، جِنْسَن لاطئ^(٢)

Panax à fleurs sessiles (F)
Acanthopanax sessiliflorum, Panax sessiliflorum (S)

جَنْبَة من فصيلة الأرالِيّات مهدها منشوريا وشمال الصّين. فروعها قويّة وجالسة، مُزَوَّدة ببعض الأشواك فقط. أوراقها ثُلاثيّة الوُريقات في أكثر الأحيان، وهي متطاولة، سِنانيّة، مُستدقَّة الطَّرف، غير منتظمة التَّسنين،

۱۰۰ بَناقَنْقَة ، بَناكُس شائِك، جِنْسَن
Panax épineux (F)

Acanthopanax (S)

⁽١) التَّسميات العربيَّة والتَّسمية الفرنسيَّة للمؤلِّف.

⁽٢) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيّة للمؤلّف.

ب ن ج

السويقات على أطراف الفروع. منشوريا وشمال الصين.

الخصائص - قيل إن هذه الأنواع هي أنواع مُقوِّية ومُنشِّطة على غرار الجِنْسَن الشَّهير. مُركِّباتها الكيميائية وطُرق استعمالها غير متوفِّرة في المراجع الشائعة.

White نَبْح أَبْيَض، سَيْكَرَان henbane (E) Jusquiame blanche (F) Weisser bilsenkraut (D) Hyoscyamus albus (S)

نَبات حَولتي ومُحول كثيف مُتلبِّد من فصيلة البَاذِنْجَانِيَّات يَعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم، دَبق، ساقه مُنتصِبة، فَرْعاء. أوراقه كلُّها رَخُوة، مُعَنَّقة، قَلبيَّة الشَّكل أو مُزوّات القاعدة، بَيضاويّة الشَّكل الدّائري، مُثلَّثة بشكل مبهم. أزهاره لاطئة، ما عدا الدُّنيا منها التي تكون في الغالب قصيرة الزِّنادات، مُرتَّبة في سُنبلة وحيدة الاتجاه ومورقة، عَقْرَبيّة الشَّكل في البداية، مُتطاولة فيما بعد ومُنتصِبة. قُنابات مُزنَّدة تَتَخطّى الأزهاء، قلبيّة الشَّكل البَيضاوي، مُسنَّنة أو مُتطاوِلة في أكثر الأحيان، كاملة، مُخفَّفة القاعدة. الكأس التَّمريَّة منتصبة، أهُلبيّة، باهِتة اللُّون الأصفر، غير مُعَرَّقَة. نصل منحن أو شبه منحن، فصوصه غير متساوية. الأسدية أطول من العُنق.

الخصائص والاستعمال - يَتمتّع هذا النَّوع الذي يشيع طوعيًّا في لُبنان بخصائص البَنْج الأسود ذاتها. ولكنه لا يُستعمل أبدًا. أعيد تَسجيله في الفرماكوبيا الحديثة عام ١٩٧٥ (البزور).

Benzoate de مُنْزُوات الصوديوم sodium (F)

المواصفات - الملح المَخْزَنيّ هو الآن الملح اللّامانيّ؛ يَحتوي على ١٥,٩٦ بالمئة من الصّوديوم وعلى ٨٧,٧٤ بالمئة من حامض البنزويك. إنه يذوب في ١,٨ من حامض البنزويك. إنه يذوب في ١,٨ عند جزء ماء عند +٢٠٠ سغ وفي ٤٩ جزء كحول ٩٠ درجة، وفي ٣,٥ جزء من الغليسرين. محاليلُه المائيّة العِشْريّة تكون مُتعادلة أو قلويّة خفيفة. وهي تُعطي تَفاعُلات ملسوديوم وتَفاعُلات البنزوات. النَّتاج المَخْزَنيّ يَجب أن يَحتوي كحد أدنى التضادّات - أملاح الكلسيوم، أملاح

ب ن ك

المواصفات - يقع البنكرياتين على شكل مسحوق باهت اللَّون الأصفر؛

والموادّ النّشويّة والأجسام الدَّسمة.

وهو سهل التلف والفساد ويفقد من نشاطه بالتَّسخين عند حرارة أعلى من ٢٠° سغ في محيط مائي.

البنكرياتين لا يذوب في الماء ولا في الكحول الخفيف (٢٠ إلى ٣٠ درجة) ولكنه يَتخلّى لهذين السّائلين عن قسم من مُركِّباته؛ إنّه لا يذوب في كحول ٩٥ درجة.

يتم عمله على المواد الهيوليناتية في محيط مُتعادَل، خفيف القِلْويّة جدًّا أو خفيف القِلْويّة جدًّا أو خفيف الحموضة جدًّا: وهو يحلّها ويُحوِّلها إلى يَيْتُونات وحوامض أمينيّة؛ وهو يُسَكِّر المواد النَّشويَّة، ويَسْتَحْلِب ويُصَبِّن الأجسام الدَّسمة.

الحفظ - في قارورات مُقفلة، مُبَرُفَنة، بمعزل عن الحرارة والضوء.

الاستعمال - يُعطى البنكرياتين في معظم أمراض الأنبوب الهضميّ وفي بعض إصابات البنكرياس، وحده أو مشتركًا مع خمائر أخرى كما إلى الكينازات منذ بعض الوقت.

طريقة الاستعمال - يجب أن يعطى بمقدار ٠,٥٠ إلى ٢ غرام في اليوم على شكل بيلولات مُقَرْتَنَة أو مُجَلَّتَنَة.

هناك عِدّة مُستحضرات صَيدليّة معروفة مُصنَّعة أساسها البنكرياتين، حيث يشترك

الخصائص والاستعمال - بَنزوات الصّوديوم هو الأكثر استعمالًا من البنزواتات: كدواء مُسيِّل مُميِّع وكدواء مُزيل للإفرازات في التهاب القَصَبة والشُّعَب وفي حال التهاب الحنجرة، وهذا هو استعماله الأساسيّ. يَدخل في عدد كبير من الأدوية المتخصّصة؛ كدواء مُضاد للنُّقْرِس؛ كدواء مُطهِّر للجهاز التَّناسليّ البَوليّ، في التهابات المثانة وفي التهابات المثانة وفي التهابات المُويْضة والكلية؛ وأخيرًا كدواء مُدِرِّ ومُفْرِغ للصّفراء في حال الرَّمال الصّفراويّ.

مقاديره الاعتيادية من ٠,٥٠ غرام إلى غرام واحد للجرعة ومن غرام إلى غرامات لكل ٢٤ ساعة. للأولاد: من صفر إلى شهر: الامتناع عن إعطائه، ومن شهر واحد حتى ١٥ سنة: ٠,٠٥ على ٢٤ ساعة.

Pancréatine (F) بَنْكِرِيَاتِيْن -٥٨

البنكرياتين مادة تحصل من جرّاء تجفيف لُبّ بنكرياس (غدة حلوة) الخنزير بحرارة أدنى بكثير من صفر سغ. تُنظَّف المادة المُجفَّفة من موادِّها الدَّسِمة بواسطة الأثير ومن ثم تُسحَق.

يحتوي البنكرياتين على عِدّة أنْزيمات مُحَلِّلَة مائيّة، أهَمُّها: تريبسِيْن، أمِيْلاز، لِيْبِاز أي شِحْمَاز، وهي خمائر تُؤثِّر بالوقت ذاته على المواد الهيوليناتية

فيها غالبًا إلى أنزيمات هضميّة أخرى.

ب و د

Wild May (۱) المُونُونُونُ دَرَقي – ه م apple, Mandrake (E) Podophylle, Podophylle en bouclier, Podophylle petté, Pied de Canard (F) Podophyllum peltatum (S)

نَبات بَرِّي مُعمَّر من فصيلة البَرْبَرِيسِيَّات ينبت بكثرة على ضفاف السواقي في الولايات المتَّحدة الأمريكيّة. أوراقه واسعة، طويلة الأعناق، مزدوجة الأسنان، خماسيّة سباعيّة الفصوص. أزهاره فرديّة، كبيرة، بيضاء، بين ورقتين درقيتين، بتلاتها تسعة، الثلاث الخارجيّة منها أعرض من سواها؛ ٣ كأسيّات بَتَلائيّة، زائلة؛ الأسدية ضعف عدد البتلات. ثمارها بيضانيّة، لحميّة، عنبيّة، صفراء اللَّون، خفيفة الحموضة، يؤكل في أمريكا باسم «تفاحة أيار».

الرِّيزوم بحجم الإصبع الصغير، مفلطح بعض الشَّيء، بُنِّيّ اللَّون المُرمَدّ. يقع هذا الريزوم في قطع تحمل، على مسافات متساوية، مفاصل عِقديّة غليظة مزوَّدة بحزوز دائريّة، وتبدي على وجهها العُلويّ ندبة بيضاء هي أكثر الفروع الهوائيّة، ونحو القاعدة السُّفلي، أثر التصاقات الجذور.

رائحته غير مستحبّة، طعمه مُرّ، حامز، ومُغثِ.

المُركِّبات - يحتوي على أوقصالات الكلسيوم، نشاء، بَرْبَارِيْن، صابونينات، راتنج من ٣ إلى ٨٪ هو البُودُوفِيلِين.

الخصائص - مسهّل قويّ شُعَبيّ ممتاز، لا يُحدِث إمساكًا ثانويًّا، مدرّ الصفراء.

الاستعمال - الإمساك العادي خاصة عند المشلولين، الرمال الصفراوي.

طريقة الاستعمال - على شكل مسحوق، وصبغة، أو مستخلص في إنكلترة، وبنوع خاص في الولايات المتحدة حيث كان الپودوفيلن واحد من المسهلات القوية الأكثر استعمالًا. من الداخل: مسحوق في أقراص من وردوفيلين في أقراص أو بيلولات من الي مستغ (البراز بعد ذلك بحوالي ١٠- المستغلص ست الحسن لكل بيلولة مستخلص ست الحسن لكل بيلولة لتلافى المغص.

من الخارج: مَسْح البُودوفيل المحلول في زيت الڤازلين (٠,٥ إلى ١ بالمئة) لمعالجة، أو على الأوْرَام الحُلَيْمِيّة

مسحوق الريزوم فاتح اللّون البُنّي، غني بحبوب من النّشاء تكون تارة بسيطة يبلغ قطرها ٥ إلى ١٢ ميكرون، وطورًا تكون مركّبة من ٢ إلى ٦ عناصر؛ بعض الأوعية المجذّعة، الشّبكيّة، أو الحَلزونيّة الشكل، وبعضها الآخر، وهو الأَنْدَر، يكون مع تنقيطات دقيقة.

التَّنَاسُلِيَة البَوْلِيَة: -Papillones génito . ينسب بعض الأطباء الأميركيون إلى البودوفيلين خصائص مضادة لداء السرطان.

Mothmulleine (E) بُوْصِيْر مُسْكِر – ۲۰ Molène sinueuse (F) Wollkraut (D) Verbascum gileadense, Verbascum sinuatum, Syn: Vervascum undulatum (S)

نَبات مُحول من فصيلة الخَنَازِيريَّات يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. مُغطّى بكساء قصير وكثيف، مُرْمَد أو مُصْفرّ اللُّون، يُصبح غالبًا أمْرَط. سوقه أسطوانية تكون عادة فَرْعاء من القاعدة. أوراقه القاعديّة لاطئة أو قصيرة العُنُق، نَصلها مِلْوَقِيّ متطاول، قياساته ٤-٣٥×٢+١٥ سم. أوراقه السَّاقيَّة لاطئة. إزهراره مُرتخ، عديد الفُروع. أزهاره بضُمّات من ٢ إلى ٧ على إبط القنابات العريضة القلبية الشَّكل المُثَلَّث المُستدقة الرّأس. الكأس من ٢٫٥ إلى ٥ ملم. التّاج أصفر اللُّون، قطره من ١٥ إلى ٣٠ ملم، ذات تنقيط شفّاف، لِبُدى الخارج. الأسدية خمسة. خيوطها ذات أوبار بَنفسجيّة اللُّون الأرجواني، الخَيْطان العُلويّان أمْرَطا الرأس. النَّمرة إهليلجية إلى شبه كُروية، قياساتها ٣-٥ و ٢,٥-٤ ملم، لبدية المظهر.

ملاحظة - نوع من البُوصير اللَّبناني بوط الذي نَفْتقِد تحاليله الكيميائية. ولعلّه يُسمّى هو أيضًا في بعض المناطق «حشيشة عَلْيًا» وتُستعمل بزوره لاتَدْويخ» الأسماك. وإنّه من المعروف أن بزور هذا النَّوع تُستخدم في اليُونان طُعْمًا يجتذب الأسماك. ومما جاء عنه في «الموسوعة في علوم الطبيعة» أنّه: «عُشبة مُحوِلة، أزهارها بَنفسجيّة. ثمارها طبيّة يُقال إنّها مُشكِرة».

(۱) أَوْط أَسْتَرَالَي، بُوْط رَفِيْع، حَفَاً (۲۰ Reed-mace, Small bulrush (E)
Typha d'Australie, Typhace, Massette des étangs, Quenouille, Tontaque (F)
Schmaler, Rohrkolben (D)
Typha australis, Typha angustifolia,
var. angustata, Typha angustifolia,
ssp. australis, Typha augustata (S)

نبات معمَّر من فصيلة البُوْطِيّات يعلو من 1,0 إلى مترين. أوراقها بحريّة اللون، عرض ٤ إلى ١٠ ملم. سنابله الذَّكريّة والأُنثويّة تتباعد من ٢ إلى ٥ سم، باهتة اللَّون البُنِّي؛ السُّنبلة الذَّكريّة تكون في بعض الأحيان أطول بكثير من الأخرى، وتنقسم إلى قسمين بحَصْرٍ أو تضييق بارز جدًّا؛ السُّنبلة الأُنثويّة أسطوانيّة الشَّكل، متطاولة قليلًا. إزهراره وإثماره في الربيع والصيف، في المناقع والبرك والحفر

⁽۱) التَّسمية العربيَّة الأولى والفرنسيَّة الأولى للمؤلِّف.

بى ر الرطبة.

لخصائصه واستعمالاته المحتملة، راجع بوط عريض الورق.

17- بيرة مُضَادّة للحَفَر، جِعَة مُضَادّة Bière antiscorbutique, Sapinette (F)

الخصائص - مُضادّة لداء الحَفَر، مُشهّية، مُبوِّلة (دستور ١٨٨٤).

ملاحظة - يُمكن تقريب بيرة أخرى من هذه البيرة، وهي البيرة التي تُدعى Epinette أو Bière de Spruce، والتي تُحضَّر من الشَّعير، ودِبْس الشَّونُدَر، ومن بَراعِم أبيسَة كندا أو الأبيسة البضاء «Abies».

كان جايمس كُوك قد حَمَى طاقَمه دائمًا من داء الحَفَر بواسطة هذا المشروب خلال أسفاره حول العالم.

(۱) عُنْقُودِيِّ (۱۳ مَنْقُودِيِّ (۱۳ Racemose elder (E)
Sureau à grappes (F)
Sambucus racemosa (S)

شُجيرة أو شجرة فَرْعاء من فصيلة الخَمَانِيَّات، تعلو من ٣ إلى ٤ أمتار. لحاؤها بُنِّيَ اللَّون المرمَّد ولبابها مُصفر اللَّون. أوراقها متقابلة، ثُلاثيَّة التَّقسيم الرِّيشيِّ إلى وُريقات صغيرة الأعناق، بيضويّة، مُستدِقَّة الرِّأس، مسنَّنة الحوافي. أزهارها مخضرة اللَّون، عُثكوليّة التَّجميع البيضويّ الشَّكل الهرميّ. كأس أنبوبيّ، خماسيّ المهرميّ. كأس أنبوبيّ، خماسيّ الفصوص. الشَّمرة عُنيْبَة حمراء، مُحمضَّة الطَّعم، الشَّمرة عُنيْبَة حمراء، مُحمضَّة الطَّعم، تحتوي بزورًا عديدة.

المُركِّبات - في الثَّمار: حامض تُفّاحي، حامض خَلِي، حامض دُرْديّ الخمر، سُكَّر، عفص، مادّة ملوئنة، في تامين «ث». في الأوراق: سَمْبُونيغرين، دهن، حامض ناردينيّ، حامض تُفّاحيّ. في البزور: زيت شحميّ.

الخصائص - له تقريبًا خصائص البَيْلسان الأسود عينها؛ ويَدَّعي القُرويُّون في بعض مناطق أوروبا أنَّ البيلسان الأحمر أفْعَل من الأسود. الثَّمار مأكولة لذيذة الطعم، معرّقة،

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

مُسهِّلة، مُنقِّية؛ الأوراق من الخارج لحَلَّ الأوديمات وتخفيف ألم داء المفاصل، وهي مُعرَّقة، مُبوِّلة، مُصرُّفة حالَّة؛ اللَّحاء الثَّاني مسهِّل قوي يفيد في الروماتيزم والحصى والأوديمات.

الاستعمال - روماتيزم، عصير، حصى الكلى، أوديمات، إمساك، داء المفاصل، إلتهاب المفصل، الكريب والبَرْد، نقاعة، معجون عَسَلي، مسحوق.

طرق الاستعمال - نقيع ٢٥غ لحاء مجفّف في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق أو أكثر ويغطّى ويصفّى ويؤخذ منه فنجانان في اليوم مع العسل. نقيع ٢٠غ أوراق مجفَّفة في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق ويغطَّى ربع ساعة. فنجانان في اليوم. الأوراق الغضّة الممعوسة تُسخّن في المقلاة وتوضع على الأوديمات والمفاصل لإزالة التجمّعات المَصْليّة والانتفاخات. شراب بوضع الثمار في وعاء مع الماء الساخن، ومن ثم تُصفّي وتُعصر بالقماش ويُعاد العصير إلى النار ويضاف إليه وزنه من السكر ويُطبخ حتى الحصول على تماسك الشراب. ملعقة كبيرة في فنجان ماء ساخن جدًّا، ٣ مرات في اليوم، في حال الكريب والبَرْد، وهو شراب معرّق جيّد.

٦٤- بِيْلُوكَرْبِيْن وأملاحه

الخصائص الطبية للبيلوكربين وأملاحه

يبرز عمل الپيلوكربين بشكل أساسيّ پي ل على: أ) الإفرازات، ب) القلب، ج) العَيْن. وهو بشكل عام مهيِّج للجهاز العصبيّ الپاراسَمْپَتَاويّ، كما يُهيِّج كذلك جُزئيًّا الجهاز العَصبيّ الوُدِّيّ ويعمل كموسِّع عُروقي في الأعضاء الغدِّية.

أ-إن ابتلاع ١٠,١ إلى ٢٠,١غ من ملح ما من أملاح البيلوكربين، أو ابتلاع نقاعة من سلا إلى ٤ غرامات من الجابورندي من ٣ إلى ٤ غرامات من الجابورندي تحدث حقنًا دمويًّا Нурегнетів في الوجه ومن ثم في كامل البشرة، يتبعه تعرُق غزير خلال ١٠ إلى ٢٠ دقيقة (إلى وتلَعُّب كثيف (١٠٠ إلى ١٢٠٠ ملل؛ وتلَعُّب كثيف (١٠٠ إلى ١٢٠٠ ملل؛ المعدل، حسب ج. پوشِيه، ١٢٠٠ ملل لعاب) التي تدوم حوالى الساعتين. إن الإفراز المفرط يطال أيضًا الكبد، والنخرياس، والمعدة، والأمعاء، والغدد الدَّمعيّة، والقصَبيّة الشُّعبيّة والشَّعبيّة الشُّعبيّة والثَّدييّة؛ ويبدو أن البُوال والإفراز الصَّفْراويّ لا يزيدان.

بعد خَفْقة قصيرة الأمد، تتباطأ الحركات القلبية من البيلوكربين.

ج - إذا ابتُلِع الهيلوكربين يُحدث تَوسُّع البؤبؤ، ولكنه إذا قُطِر في العين مباشرة فإنّه يحتّم، وعلى عكس ما تقدّم، انقباض الحدقة مع انخفاض التوتّر داخل العين.

يبدو الپيلوكربين بوجه العموم مضادًا فيزيولوجيًا للأتروبين اولكن هذا

ب ی ل

التَّضادّ، كما ذَكَرَ ج. يُوشيه، لا يمكن عسل جيد ٦٠ غ الإفادة منه عمليًا إذ إنّ تحييد تأثيرات الأتروبين يَتطلُّب مقادير هائلة من البيلوكربين، كما أنّه يترك كذلك تأثيرات سامة خطرة».

> إن البيلوكربين لا يبدو فعّالًا في مختلف الحالات التي يُعْتَقَد فيها أنّه بالإمكان الإفادة من عمله المعرِّق: إصابات نَزْلِيَّة، استسقاءات كليوية أو قلبية، حالات الجُناب، تَسمُّمات (بهدف إزالة الرصاص السَّكْبيّ مثلًا في الأمراض الرصاصيَّة)، تَبَوْلُن الدم، إلخ. وهو لم يعطِ نتائج مرضية فعلًا سوى في طب العين؛ ورغم كونه يقلّص الحدقة بأقلّ قوة من الأزارِين، إلَّا أنه يهيِّج الملتحمة أقلّ منه ولا يحدث سوى آلام هدبية خفىفة .

عينية تحتوى من ٠,٥٠ إلى ٥٪ من كلورهيدرات أو نيترات الييلوكربين. لمعالجة زَرَق العين تحضر قطرات تُحَل فورًا حيث يشترك البيلوكربين مع حامض الأسقوربيك ومواد أخرى.

٦٥- بيلولات

، الحديدي المنفنازي	بيلولات بالكربونات
ه٧ غ	سولفات حديد نقيّ .
٠٠٠٠ غ	كربونات صوديوم
٢٥ غ	سولفات منغانيز نقي

ماء كمّيّة كافية نُحضّر كما في بيلولات ڤاليّه Vallet ونَصْنع بيلولات من ٢٠,٠ غرام فضّيّة.

كان يُعطى منها في الماضي من ٢ إلى ٤ في اليوم. لذكرى التاريخ.

بيلولات بالكربونات الحديدية والمنغانية (حَنُّون)

سولفات الحديد ٢٦ غ سولفات المنغانيز٧غ ٣٥ غ كربونات الصوديوم شراب وعسل بالتساوي كميَّة كافية نُحضِّر بيلولات من ٢٠٠٠ غرام. من ٢ إلى ١٠ في اليوم. لذكرى التاريخ.

بيولات برومور الرصاص

الاستعمال الخارجي – قطرات ومراهم برومور الرصاص ۲٫۰۲ إلى ۰٫۰۵ غ مستخلص ست الحُسن ٢٠٠١ إلى ٠,٠٥ غ لوبولان (من الجنجل) ٥٠٠٥ إلى ٠,١٠ غ نُحضِّر بيلولات يؤخذ منها ٢ إلى ٣ في اليوم لتهدئة الانتصابات المؤلمة في حال التهابات الإحليل. لذكرى التاريخ.

Pilules (F) بيلولات بُونتيوس

:	١	٠	أَلْوَة البَرْبَاد
: •	١	٠	صمغ طَبَرْخا (نقطة)
:	١	•	صمغ أمّونياك
: 	٦	•	خل أبيض
و زز	•		نُعالج الموادّ في الخل السّاخن،

مع العَصْر ونُبخِّر في حمام مريم حتى القوام البيلوليّ. نُقسِّم إلى بيلولات من ,۲ غرام (دستور ۱۸۲٦).

ضد الاستسقاء. لذكرى التاريخ.

بيلولات حديدية (أندرال)

۶٫۲ غ	ديجيتال
٢٢ غ	خس
يد۲ غ	
كمَّيَّة كافية	عسل

لصنع ٣٦ بيلولة يؤخذ منها ٢ إلى ٣ في اليوم، بمقادير متصاعدة، في اليرقان. لذكرى التاريخ.

بيلولات حديدية (بلود)

يد ۳۰غ	سلفور بروتوكسيد الحد
۳۰غ	كربونات البوتاس
ه غ	صمغ عربي
١٥ غ	شراب بسيط
	اصنع ۲۰۰ بیلملة

نَحل الصمغ في الماء في وعاء تبخير في حمّام مريم، نُضيف الشَّراب والشُّولفور. نُحرِّك؛ نضيف الكربونات مع تحريك مستمرّ، ومن ثمّ مسحوق السُّوس ونتابع التَّسخين حتى القوام البيلوليّ. نرفع عن النار ونُقسِّم إلى البيلوليّ. نرفع عن النار ونُقسِّم إلى ونُفضِّضها. كل بيلولة تزن حوالى ٣٠،٠ غرام. نحفظها في قارورات مقفلة جيدًا (دستور أدوية ١٩٠٨). مقاديرها ١ إلى

١٠ لذكرى التاريخ. مستحضر فعال بي ل
 جدًّا ومستعمل جدًّا في الماضي.

بيلولات دوپُويتْرَن، بيلولات مضادة للسفلس، بيلولات كلورور زئبقي مؤفْيَن

٠ ٤,٠ غ	مستخلص الثيل
٠,٤٠ غ	مستخلص الأفيون
٠,٢٠ غ	سليماني أكّالّ
كمّيّة كافية	مسحوق السوس .
لة تحتوي الواحدة على	نُحضّر ٢٠ بيلو

نحضر ٢٠ بيلوله تحتوي الواحدة على ٠,٠١ ٢,٠١ غرام من السُلَيمائيّ وعلى ٢,٠٢ غرام من مستخلص الأفيون (كودكس).

إِن مستخلص عود الأنبياء الذي لم يعد مسجَّلًا في الفرماكوبيا منذ العام ١٩٠٨ استُبدِل بمستخلص الثيل. (دستور ١٩٣٧).

إن هذه البيلولات تنعم بشهرة استحقَّتها عن جدارة في معالجة السِّفْلس الدَّائم. لذكرى التاريخ. مقاديرها من ١ إلى ٣ في اليوم.

الجدول Tableau C

بيلولات زبدة الكاكاو اليودية الحديدية

٣ ع :	بُرادة حديد
٤غ	يود
كمّيَّة كافية	زبدة كاكاو

تذوِّب اليود في زُبدة الكاكاو المذوَّب، ونُقسِّم إلى بيلولات، غير قابلة للفساد بعد تغليفها بالصمغ والسُّكّر.

ب ي ل بيلولات زرنيخية آسيوية

رنيخي	حامض ز
د ٥ غ	بهار أسو
ييّ١ غ	صمغ عر
كمّيّة كافية	ماء نقتي .

نَهرس الحامض الزَّرنيخيِّ مع البهار ونَدُقُه طويلًا، نُضيف الصمغ والماء، ونصنع كتلة نقسمها إلى ١٠٠ بيلولة تحتوي الواحدة على ٥ ملغ حامض زرنيخيِّ (دستور ١٨٨٤). بيلولة في البرَص السِلِّيِّ. نزيد المقدار تدريجيًّا. بيلولات مُستعملة جدًّا في الهند وللحالة نفسها. لذكرى التاريخ.

إن ما كان يسمّى "بيلولات تَنْجُور" التي كانت تُعتمد ضِدّ لَدْغ الحيوانات السامّة كانت مماثلة.

بيلولات زرنيخية (بُودان)

أرسينيات الصوديومأ٠٠١٠ غ

نَحل الأرسينيات (أي الزرنيخات) في عدة نقاط من الماء المُقطّر ومن ثم نُحضًر ٢٠ بيلولة بواسطة كمية كافية من مسحوق الخُبيَّزة.

كان الدكتور بُودان يستعمل عبارة «مَعدِني» بدلًا من عبارة «زَرنيخي» لكل المستحضرات التي يكون أساسها الزَّرنيخ، وذلك لكي لا يُخيف المرضى.

بيلولات زئبقية (لانْيو)، بيلولات المَرُوخ الزئبقي

١٥ غ	مَروخ زئبقتي
كمّيّة كافية	خبيزة مسحوقة

نحضّر ۱٤٤ بيلولة تحتوي الواحدة على ٥٠,٠٥ من الزئبق. يؤخذ منها ٣ إلى ١٢ في اليوم. لذكرى التاريخ.

بيلولات زئبقية (مُوسكاتي)

۲,٥ غ	زئبق مُوسكاتي المحلول
٢,٠ غ	مستخلص أفيون
٨ غ	مستخلص كينا
ى التاريخ .	نحضّر ٢٠ بيلولة. لذكر:

بيلولات زئبقية (هانمان)

إن النسب ليست هي ذاتها في كل الفرماكوبيات. الدكتور كازناف يعطي ما يلي: زئبق محلول ١ غرام، خُسل ٣ غرام؛ لمقدار ٤٠ بيلولة.

بيلولات زيت الزعتر الدهني

٤٠,١٠	دهن الزعتر
٤٠,١٠	صابون لوزي
كمّيَّة كافية	مسحوق خبيزة
، ببلسم تولو .	لبيلولة واحدة تُغلّف

مقدارها: بيلولة في اليوم، في اليرقان، فقر الدم، الأنيمية الكلورورية. لذكرى التاريخ.

بيلولات ضد الإمساك (مكاريو)

الوة٥٠,٠ غ
مستخلص البلّادونالله و ٠,٠١ غ
سولفات الحديد
لمقدار بيلولة واحدة مُفضَّضة.

الى ٣ مساءً عند النوم؛ بيلولة واحدة تكفي في العادة. علاج فعال جدًا ضد الإمساك العَصِيّ. لذكرى التاريخ.

بيلولات ضد النزلة المثانية

۱۵ غ	گُوبايو (کُوباهو)
كمَّيَّة كافية	مغنازيا
١٥غ	تربنتين

نحضر بيلولات من ٢٠,٠ غرام.

یؤخذ ۳ إلى ٤ صباحًا، ومثله ظهرًا ومساءً. لذکری التاریخ.

بيلولات ضد النقرس (بيكرال)

۱٫۵۰ ع	سولفات الكينا
۲۰٫۰ غ	مستخلص الديجيتال
٥,٠ غ	بزور سورنجان
	لصنع ١٠ بيلولات. يؤخذ من
لتاريخ .	بيلولات ولعدّة أيام متوالية. لا

بيلولات ضد النقرس (سكودامور)

مستخلص اسيتات السورنجان ١٠ غ تربنتين البندقية Venise

مقدارها: بيلولة في اليوم، في اليرقان، خبيزة

نحضر ١٠٠ بيلولة. ١ إلى ٥ في اليوم، حتى الإسهال القوي. نقرس. لذكرى التاريخ.

بيلولات ضد النقرس (هَلْفُورد)

مستخلص اسيتات السورنجان ۰,۱۰ غ مستخلص الحنظل المركب ۰,۱۰ غ مسحوق دوڤر ،۱۰٠ غ

لتحضير بيلولة واحدة، كان هلفورد يعطيها بعد أن يكون قد أعطى للمريض لمدّة بضعة أيام من ٣٠ إلى نقطة من نبيذ السورنجان صباحًا ومساءً.

بيلولات ضد النقرس (هَنْرُوتاي)

 كبريت الإثمد المذهّب
 \$ غ

 مستخلص الأفيون
 \$,10

 سوس
 \$ غ

 لعاب عربي
 كمّيّة كافية

نحضر ٣٠ بيلولة. يؤخذ منها بيلولة صباحًا ومساءً لمدة ١٥ يومًا بعد أخذ جَرُوع المؤلّف ذاته.

بيلولات ضد اليرقان

 أرعدِيّات حديدية بوتاسية

 ألوة مسحوقة

 إفراز القُندُس المسحوق

 زعفران مسحوق

 تربنتين البندقية

 Venise

ب ي ل نُحضِّر ١٠٠ بيلولة من ٢٠٠ غرام يؤخذ ٢٠١٠ غرام من الكريوزوت. لذكرى منها ٣ في اليوم في البداية. للتاريخ. التاريخ. بيلولات ضد اليَرقَان (شُومَل) بيلولات الكُوباهو (ريْغِيْني) مسحوق العنصل ٢ غ كوباهو مسحوق الديجيتال ٢ غ مستخلص راتانيا حديد مُسَمَّق كاغ دهن سَاصَفْراء نُحضُّر ٤٠ بيلولة. من ٢ إلى ٦ في مغنازيا محروقة اليوم. الزلال البَوليّ المشترك مع نَمزج ونصنع ٤٠ بَلْعَة. لذكرى اليرقان. لذكرى التاريخ. التاريخ . بيلولات عرق الذهب المركَّبة، بيلولات الكودايين العنصل وعرق الذهب كودايين كودايين المستنطقة مسحوق دوڤر ۱۲ غ خُس ٠,٦ غ عنصل ٤ غ نُحضِّر ٤ بيلولات مع كمِّية كافية من أمُّونياك (نبتة) ٤ غ مسحوق الخبيزة، تؤخذ واحدة كل يوم. لعاب عربيكميَّة كافية نحضر كتلة بيلولية. لذكرى التاريخ. بيلولات لَبَنات الحديد لَبَنات الحديد (لَكُتات)١ غ بيلولات عرق الذهب والأفيون خبيزة مسحوق دوڤر٣ غ عسل كمّيّة كافية معلّب الورد١ غ لمقدار ٢٠ بيلولة. لذكرى التاريخ.

نحضر بيلولات من ٢٠ر٠ غرام.

بيلولات الكريوزوت (دستور ١٩٣٧)

مسحوق صابون لوزي مجفف

كريوزوت مخزني

بالمحم كمّيّة كافية

نُحضِّر ١٠٠ بيلولة تحتوي الواحدة على

لذكري التاريخ.

بيلولات مبولة (كروڤاييه)

٠	كالومَل
٤٠,٥	عنصل
٠,٢٥	ديجيتال
كمَّيَّة كافية	شراب النبق

٨غ

۰٫٥ غ

كمَّة كافية

غ *ا*

لصنع ١٢ بيلولة. لذكري التاريخ.

نحاسية، بيلولات مضادة للصرع

سولفات النحاس النشادري ۴, غ لُبّ الخبز ٣ غ كربونات الأمونياك السائل كمّيّة كافية نُحضًر ١٨ بيلولة. للتاريخ. هي بيلولات الألمان الزَّرقاء التي يجب عدم إشراكها مع بيلولات الإنكليز الزرقاء.

بيلولات لهولوواي

} غ	ألوة
۱٫۷۰ غ	راوند
٥٤,٠ غ	بهار (فلفل)
۲۰ غ	زعفران
	سولفات الصوديوم
	لصنع ١١٤ بيلولة.
ِخّص كما كشفه	الدواء الإنكليزي المر
خ ·	التحليل. لذكرى التاري

بيلولات يودور الحديد والكينا (أوجييرا)

٥ع	يود
۲غ	حديد منقَّص بالهيدروجين
۴,٤٠غ	سولفات الكينا

نُحضِّر ٢٠٠ بيلولة يمكن إضافتها ببلسم التولو.

نضيف إلى البيلولات المسمّاة بيلولات كرونيا:

١٠غ	مستخلص الجِنطيانا
۱۰ غ	مسحوق ديجيتال

بيلولات مدرة للسوائل

۲غ	حلتيت
۱ غ	مستخلص الحنظل
۲غ	عنصل
١غ	ديجيتال
يؤخذ منها بيلولتان	تحضير ٢٠ بيلولة.
ى التاريخ.	كل ٣ ساعات. لذكرة

بيلولات مدرة للسوائل (بُونيتوس)

١٠غ	الوة البَرْبَاد
۱۰غ	صمغ نقطة
١٠غ	صمغ أمّونياك
٦٠ غ	خل أبيضخل

مقاديرها: بيلولة واحدة. لذكرى التاريخ.

بيلولات المقيئ المسهل

۳,۲۰ غ	مقتيئ مسهل
١٦,٠ غ	مستخلص أفيون
ي ٤ غ	مستخلص الخسر
۰۱٫۵۰ غ	صمغ عربي
۱٫۵۰ غ	خبيزة

نُحضِّر ٣٢ بيلولة تحتوي الواحدة على ١,١٠ غرام من المقيِّئ. نُصح بها الدكتور بُوديه لكي تحلّ محلّ مذابات المقيَّئ المستعملة وفقًا لطريقة معيِّنة في التهابات الرئة الحادة. للتاريخ.

بيلولات النحاس النشادرية، بيلولات

77- بيلولات وبَلْعات بيطرية Pilules et

Bols, usage vétérinaire (F)

إِنَّ وزن البيلولات البيطَرِيَّة لا يَتَخطَّى ٥ غرامات للبيلولة الواحدة. ولكن وزن البَلْعات، وهي بيلولات كبيرة بَيضائيَّة الشَّكل وأكثر رخاوة من البيلولات، فقد يَصل أو حتى يَتخطَّى ٢٠ غرامًا. وتكون بَلْعات الحِصان بشكل عام من ٣٠ إلى ٥٠ غرامًا

بلعة طاردة للدود

لمقدار ۲۰ بيلولة (الكلب). ضدّ الدودة الوحيدة والأقصور، يعطى منها ۱ إلى ٥ حسب القامة. لذكرى التاريخ.

بيلولات (بلعات) دافعة السُّعال

لمقدار ٣ بلعات.

برونشيت الحصان المزمن. لذكرى التاريخ.

ب ى ل بيلولات يودور الحديد والكينا

يؤخذ منها ٢ إلى ٦ في اليوم في البرقان، والحميات المقلعة. لذكرى التاريخ.

بيلولات يودور الكبريت

يودور الكبريت العربية المحتلقة كافية وليت لوز حلو كميَّة كافية الممغ عربي العضر ٢٠ بيلولة فضية الكزيما مزمنة المواد لأن اليود يفتك بالفضة .

تركيبة أخرى:

بيلولات يودور المنغانيز (حَنّون)

يودور البوتاس، سولفات منغاني بكميات متساوية، مع كمية كافية من العسل. نُحضر بيلولات من ٢٠٠غ. نحفظها في قارورات. للتاريخ.

بيلولة أو بَلْعَة الْوِيَّة للحصان بيلولات أو بلعات قلبية ومبولة ب ي ل ١٠غ ألوة مسحوق ديجيتال حنظل ۲۰ غ مسحوق عنصل صابون جوز الهند المائع كمّيّة كافية مسحوق سورنجان ٢٠ غ لمقدار بلعة واحدة. صابون رخوكمّيّة كافية لمقدار ٥ بلعات (للحصان، بلعة بيلولات مسهلة قوية (للكلاب) واحدة في اليوم). للكلب، يعطى ألوة الديجيتال على شكل شراب سكري، حنظل ملعقة أو ملعقتان صغيرتان. لذكرى صابون طبىكمّيّة كافية التاريخ . لمقدار ٢٠ بيلولة. يعطى منها ٢ إلى ٤ بيلولات. بيلولات (أو بلعات) مسهّلة قوية ألْوَة ٤٥غ بيلولات مقوية دُرديات حامض البوتاسيوم ٣٠غ ۲۰غ كربونات حديدي ١٥ غ يانسون مسحوق ٠٣ غ مسحوق الجنطيانا عسلكمّيّة كافية مسحوق الكينا ۱۰ غ

لمقدار ٤ بلعات، للحيوانات الكبيرة. لمقدار بلعتين (الحصان).

ري

Taro plant, Big Tayove (E) كَبِيْر، تَارُو القُدَامَى، إِلْقِس كَبِيْر (۱) كَبِيْر Grande Tayove, Taro des Anciens, Alocasie macrorhize (F) Tropenworz, Grosser Tayove (D) Alocasia macrorrhiza, Caladium odorum, Colocasia odora (S)

نَبات كبير مُتَشجَّر من فصيلة القُلْقَاسِيَّات يعلو نحو ٥ أمتار وأكثر. ساقه تعلو حتى المترين وتغلظ نحو ٤٠ سم، تكلِّلها أوراق واسعة تُذكِّر بشكلها بأوراق القلقاس، وهي سَهْمِيّة الشَّكل البَيضيّ، طولها ٦٠ سم، قاتمة اللَّون الأخضر، فصوصها السُّفلي مستديرة، طول عنقها فصوصها السُّفلي مستديرة، طول السُّويقة مهم، مسود اللَّون؛ طول السُّويقة أو مصفرٌ؛ أنبوب الجُباب باهت اللَّون الأحضر الأصفر، طوله من ٧ إلى ٩ سم. مهده الأصفر، طوله من ٧ إلى ٩ سم. مهده سيلان والهند حيث يزرع لسوقه المأكولة التي لا تُرغب جدًّا بسبب حموزتها الشَّديدة.

المُركِّبات - غَنيِّ جدًّا بالحامض الأقْصاليك، مواد نَشويّة.

الخصائص والاستعمال - نبات حامز وسام بعض الشيء، وهو على عكس القلقاس لا تؤكل درناته بل سوقه الغليظة النَّشويّة المادّة، ولكنها لا تؤكل إلّا بعد غسلها وطبخها لمدّة طويلة أو طبخه وتغيير مائه عدّة مَرّات. عُصارة ساقه أو أوراقه تُستعمل لتهدئة الحكّات المتسبّبة عن نَباتات مُقَرِّحة (بفضل عمل أوكسالات الكلسيوم المعادِل والمُبْطِل التأثير). بعد تسخين العصارة يمكن التأثير). بعد تسخين العصارة يمكن سكبها في الأذن لمعالجة التهاباتها. ويتحلّى هذا النّبات أيضًا بخصائص مفيدة للصدر ومضادة للروماتيزم.

(۲) تُمْبَا يَنْغ ، برَازِيَّة التَّمْبَا يَنْغ – ٦٨ Tambayang stinking tree (E) Tambayang, Sterculier tambayang, Sterculier Scaphigère (F) Tambayang-stinkbaum (D) Sterculia Staphigera, Scaphium Scaphigerum (S)

التَّمْبايَنْغ ثَمرة شجرة من فصيلة البِرَازِيَّات مهدها الهند الشَّرقيّة؛ وهي ثمرة مُخضرَّة اللَّون، جَعِدة البشرة؛ حجمها وشكلها كالخوخة المجفَّفة، أو حتى أفضل من ذلك كثمرة الغُبَيْراء المجفَّفة. غلافها يحضن لُبًّا رقيقًا مسود اللَّون؛ يليه نحو الداخل غلاف داخلي شبه عظميّ، رقيق، فيه بزرة وحيدة. مُبيضَّة اللَّون ومكوَّنة من فلقتين.

⁽٢) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيّة للمؤلّف.

إن تنظيم النَّمرة كما ورد أعلاه، والذي يُذكِّر تمامًا بتنظيم النَّمار المُفردة النَّواة في فصيلة الوَرْدِيَّات، قد يوحي بأن النَّبات الذي يعطي تلك الثمرة هو فعلًا من الذَرْدِيَّات.

المُركِّبات - تحتوي التمباينغ على ٧٪ لُعابًا يكسبها خاصتها التي تجعلها، إذا وضعت في الماء، تكتسب حجمًا يزيد حجمها الأوَّلي من ١٥ إلى ٢٠ مَرَّة؛ أما الباقي فمن مادّة استخراجيّة، نشاء، إلخ. طعم الثَّمرة تَفِه ولُعابيّ. تعطي إلخ. أرمدة غنيّة بالمنغانيز.

طريقة الاستعمال - تعطى على شكل مسحوق، وتحضر منه كذلك نقاعة بمقدار ٥ بالألف وتُحلّى بشراب السفرجل. في التهابات الامعاء (إسهالات، إلخ). وصفت نقاعتها أيضًا في غرغرات لمعالجة الذبحات.

Timbo (F) (المِيْنَا رِيشيَّة -٦٩ Paullinia pinnata, Sergjania curassavica (S)

الپُولِّينيا جنس شُجيرات عارشة في فصيلة السابَنْدِيّات. أوراقها متبادلة، مزدوجة أو ثُلاثية التَّركيب المُثْلَث أو ريشيّة التَركيب، معنَّقة، مجنَّحة في أكثر الأحيان. أزهارها صغيرة، باهتة اللَّون، إبطية الارتكاز، خماسيّة الكأسيات، رباعيّة الأسدية.

رائحة جذر التمبُو مِسْكيّة ذَكيّة، وهو توت يحتوي على قلويد دعاه ستانلي مارتن يحتوي، ويُستعمل مسحوقًا كأدوية في أمراض الكبد. كما يُطلق إسم يّمبو على نَباتات تُستعمل كمبيدة للحشرات وهي مسحوقة. وهناك نوع آخر من الپولّينيا يعطى ما يُسمّى يُوكّو Yocco.

Red تُوْت أَحْمَر، فِرْصَاد أَحْمَر mulberry tree (E) Mûrier rouge (F) Rote maulbeerbaum (D) Morus rubra (S)

شَجرة مُثمِرة من فصيلة التُّوتِيَّات تعلو من ١٥ إلى ٢٠ مترًا. لحاء جذعها يَتشقَّق في صُفَيحات. أغصانها تشكِّل هامة كثيفة. فروعها مُصفرَّة اللُّون الأخضر، مَرْطَاء. أوراقها مُتبادلة، عابلة، أكبر من أوراق التوت الأبيض، مَقطومة أو قلبتة القاعدة، مُسنَّنة، قطنيّة ويحريّة اللَّون الأخضر على صفحاتها السُّفلي. أذَّنَاتها مُحمرة اللُّون. السُّنبلة الذُّكريّة في الأسفل، طولها من ٣ إلى ٦ سم. الثَّمرة مُفرَدة النَّواة، أسطوانيَّة، مُحاطة بغلاف لَحمى يشكِّل التُّونَة، طولها ٣ سم، مُسودة اللَّون الأرجُواني عن النضج. مهدها جنوب الولايات المتّحدة الأمريكيّة، وهي النّوع الأكثر جَلْدًا من جنسها. الضَّرْب اللَّبْديّ (٢)

⁽١) التَّسميتان للمؤلِّف.

ت و ي

Tomentosa Bur أوراقه مبيضّة اللَّون على صفحتها السُّفلي.

من التوت ٤ أو ٥ أنواع فقط تنبت في المناطق المعتدلة من أوروبا وأمريكا وآسيا.

- راجع تُوت أبيض وتُوت أسود في المعجم الأول صفحة ٦٨ رقم ٦٣-٦٤، وتُوتَة سوداء أو شَمُّول أسود في المعجم الشاني، للوقوف على المُركِّبات والخصائص والتَّداوي.

(١) اَوْيَاغَوْبِيَّة، شَجَرَةُ الْحَيَاةَ الْغَوْبِيَّة (٢٠ Vhite cedar, Canoe cedar (E)
Thuya du canada (F)
Thuja occidentalis (S)
Lebensbaum (D)

شَجَرة من فصيلة السَّرُويَّات تعلو من ١٥ اللَّى ٢٠ مترًا. جذعها غالبًا مقسَّمة. هامتها هرميّة الشَّكل. أغصانها مورقة مصفرّة اللَّون الأخضر الباهت من تحت، مصفرّة أو محمرّة اللَّون في فصل الشتاء. أوراقها دائمة، صغيرة، قشريّة الشَّكل، متقابلة، متصالبة، مُطَبَّقة على الأغصان، عديدة الغدد المصفرّة أو المُرزقة اللَّون. أزهارها وحيدة المسكن. طول كرزها من ٨ إلى ١٢ المسكن. طول كرزها من ٨ إلى ١٢ ملم، عرضه نحو ٢ ملم. بزوره صغيرة، ضَيِّقة الجناح، ضروبها التزيينيَّة عديدة.

المُركِّبات - غلوكوسيد، دهن يحتوي على بينان، فينون، وسيتون يُحْدِث تخلُّجًا ويسمّى تويون، موادِّ عَفْصيّة، . . .

الخصائص - من الداخل: مقشّعة، مبوِّلة خفيفة، مسكِّنة بَوليّة، معرِّقة، مُضادّة للرّوماتيزم، طاردة للدود، مضادّة للسَّرطان؛ من الخارج: مقوِّية.

الاستعمال - الداخلي: التهابات المثانة، تضخُّم الپروستات، إحتقانات حَوْضيّة، سَلَس بول النساء اللَّواتي يشكون من كظَّة الدم، روماتيزم، طفيليّات الأمعاء حالات سرطانية؛ الخارجي: ثؤلول، أورام حُلَيْمِيّة، سَليلات مُخاطيّة أي أورام في غشاء مخاطي، سَعْدَانَة أي وَرَم قَنْبيطيّ قرب الشَّرْج وأعضاء التَّناسل، نابِتات (تغرغر)، وقاية من الأمراض الزُهْرية. الأجزاء الطبيّة هي الأوراق واللّحاء.

طرق الاستعمال - من الداخل، الأوراق أو اللّحاء: ١٠ غرامات في نصف ليتر ماء يغلي دقيقتان ويغطَّى عشر دقائق ويُـشـرب خلال ٢٤ ساعة. مستخلص مائي - كحولي في بيلولات من ١٠،٠ غرام، يؤخذ من ٥ إلى ١٠ بيلولات في اليوم. صبغة بنسبة واحد إلى خمسة، من ٢٠ إلى ٤٠ نقطة في اليوم.

من الخارج: دهن أو صبغة، تستعمل مرّتان في اليوم، بواسطة قطنة أو بحقنٍ موضعية.

Fruits du séné (F) ٧٢- ثِمار السَّنَى

إن القرون التي توجد في الأسواق هي نتاج الأنواع الثَّلاثة التي ورد ذكرها في دراسة وريقات السّنا، ويُشار إليها بأسماء الوريقات التّابعة لها ذاتها.

°۱ - سَنَى مُسْتَدِقَ الطَّرَف^(۱)، سَنَى الاشكَنْدَريّة

يتألُّف هذ العقّار من الثِّمار المُجَفَّفة من السَّنا C. acutifolia. يحتوي على ٣,٤٪ كحد أدنى من المُشتقّات الهيدروكسي أنتراسانية التى تُحْسَب بالسّنُوسيد Sennoside B (الإصدار العاشر للفر ماكوبيا).

المواصفات - رائحة خفيفة، طعم خفيف. الثَّمرة هي قرون مفلطحة متطاولة الشَّكل، بَيضانيَّة قليلًا؛ وهي أقصر وأعرض بقليل من قرون السنا الضيِّق الورق، طولها ٤ إلى ٥ سم وعرضها ٢ سم. جهتها الأمامية (البَطنِيّة) مستقيمة الخطوط بشكل

(١) التَّسمة للمؤلِّف.

محسوس، الجهة الخلفيّة (الظهريّة) قويّة التَّحدُّب. نشاهد فيها الرأس القَلميّ والشويقة الصغيرة على طرفق القرن وإلى الجهة الأماميّة. الصَّفحتان باهتتا اللُّون البُّنِّي في الأقسام الخارجيّة، وقاتمة اللَّونَ البنِّي في المنطقة الوسطيّة المقابلة للبزور؛ تحتوى على ٦ أو ٧ بزرات، يُظهر غلاف الثمرة قبالتها نتوءات تكون عمومًا أضيق مما تكون عليه في النوع اللَّاحق (angustifolia) طحرة القرون مكسوة بشبكة من التَّجاعيد البارزة.

تُحفظ بمعزل عن الضُّوء والرَّطوبة (الإصدار العاشر للفرماكوبيا).

 ٢° - سَنَى ضَيِّق الوَرَق (٢)، سَنَى هِنْدِي يتألُّف هذا العقار من ثمار السَّنا (angustifolia) المجفَّفة. يحتوي على ٢,٢٪ من المشتقّات الهيدروكي أنتراسانية Hydroxyanthraceniques التي تُحْسَب بالسَّنُّوسيد B (الإصدار العاشر للفرماكوبيا).

المواصفات - الرّائحة والطّعم خفيفان. الثَّمرة مؤلَّفة من قرون مفلطحة الشَّكل المتطاول مع جهة أماميَّة مَلْويَّة إلى الدَّاخل قليلًا وجهة خلفية مقوَّسة قليلًا. وهي باهتة اللُّون الأصفر البُنِّي على الحوافي، أقتم لونًا نحو الوسط الذي يقابل البزور، طولها ١٥ إلى ٦٠ مم

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

ث م ا

وعرضها ١٤ إلى ١٨ مم. ينتهي أحد شوداني الطرفين برأس قلمي، والطرف الآخر سُوداني بسويقة صغيرة. يحتوي القرن الله إلى ٨ قرونه بزور مفلطحة لونها من الأخضر إلى الكلوي. البُنِّي الفاتح. الطحرة تُبرز شبكة مُتقطَّعة إلى ١٠ من التَّجاعيد العَرَضيّة المُتعرِّجة؛ على حوافٍ م مستواها يكون على غلاف الشَّمرة مُحَدَّبًا خطُّ ما وتَتَّجه كلَّ حَدَبَةٍ عاموديًّا نحو أطراف مسحوق التَّمرة.

٣ سَنَى بَيْضِيّ الشَّكل المُنْقَلِب^(١)، سَنَى سُوْدانيّ

قرونه مقوَّسة بقوَّة، بارزة الشَّكل الكلويّ، مُحمرَّة اللَّون البُنِّيّ، تحتوي ٨ إلى ١٠ بزور؛ يغطّي البزور غلاف عليه حوافٍ مع زوائد بارزة مميَّزة تَجتمع في خطً مائل وشبه مواز لحوافي الشَّمرة. مسحوق الأوراق أخضر اللَّون ومسحوق المقرون بُنِّيّ اللَّون الأصفر.

الخصائص - مُضادّة لحصاة الكلية والرَّمْلِ البَوْلِيِّ.

الاستعمال – الحَصاة والرُّمال البَوْليّ.

طريقة الاستعمال - نُحِفِّف الجداجد ونَسحقُها جيِّدًا، ونأخذ من مسحوقها نصف غرام إلى غرام واحد مع سائل ما. ملاحظة - أورَد هذه الطُّريقة الدكتور جان ڤاكنى، في الإصدار الخامس لكتابه: «التَّداوى بالنَّباتات» Phytothérapie ، عن دار مالوان عام

۷٤- جَروعات Looch, Lok (F)

جروع الأكونيت

. 1914

كحولتور الأكونيت١ غ نقاعة المليسة ٠٣٠ شراب دیاکو د

حُذِف الأكونيت من الفرماكوبيا منذ القرار الرسمي في ١٧/٥/٨٤.

أعطى كتاب الوصفات الصادر عام ١٩٧٤ تركيبة جديدة تحلّ محلّ تركيبة دستور أدوية ١٩٣٧ (أطلب مستحلب زيت الڤازلين).

في المنازل والمطابخ والمطاحن زيت فازلين مائع ٥٠غ

٧٣- جُدْجُدٌ حَقْلِيّ، صَرّارُ اللَّيْلِ الحَقْلِيّ Sylvan-cricket, European field cricket (E)

Grillon des champs, Grillon champêtre, Cricri (F)

Feldgrille (D)

Gryllus campestris (S)

حَشَرة طِيَّة نَطَّاطَة من رُتبة مُستَقيمات الأجنحة Orthoptères وفصيلة الجُدْجُدِيّات Gryllidés، غليظة الجنَّة طولها من ۲۰ إلى ۳۰ ملَّمترًا، أرجلها الخلفية مُعدّة للقَفْز، ثوبها إلى السواد اللامع، رأسها غليظ، قرونها الاستشعارية طويلة ومُستدِقّة. ذكرها مُجَهَّز بعدّة صرصاريّة نشيطة يستعملها في اللِّيل والنّهار. تعيش في جميع الأماكن أخصها البساتين والأراضى المزروعة حيث تحفر أنفاقًا مستطيلة جروع استحلابي بزيت الڤازلين أو قليلة التّعاريج والعُمق في الأتربة البرافين الخَوّارة والأماكن الرَّفيعة التي لا تَخشى غَمر المياه. وهي من الحشرات النّافعة لأنها تلتهم النمل وأكثر الحشرات الضّارّة الصّغيرة القَدّ. منها نوع يعيش

صمغ كثيراء مسحوق ٥٠,٢٥ غ ميكانيكيّ. جيلوز ١٠٥٠ · طريقة الاستعمال – من ١ إلى ٢ ملعقة غليسّرين٥غ كبيرة للبالغين بعد وجبة المساء. نجدّد دهن ليمون الحامض ٢٠,١٠ غ حامض بنزویكع قانيلين ٥٠,٠ غ كحول ٣ ملل صباحًا عند النهوض. ماء منقَّى، كمَّيَّة كافية بالليتر ١٠٠ ملل ننثر الجيلوز كالشتاء في ٤٠ ملل من الماء، نضعه في حمام مريم ونمزج حتى الذوبان التام. نضع، من جهة ثانية، الصمغ العربي وصمغ الكثيراء، في هاون جاف تمامًا، نبلِّل المزيج بملل واحد من الكحول، نضيف الغليسرين ونهرس الكل جيّدًا.

> ومن ثم نضيف زيت الڤازلين بمقادير صغيرة ونمزج في كل مرة حتى رفض اللعاب للزيت؛ عندها نضيف محلول الجيلوز بمقادير صغيرة. بالتبادل مع ما بقى من زيت الڤازلين.

> نذوب دهن الحامض، والڤانيلين، والحامض البنزويك في ٢ ملل من الكحول. نضيف المحلول الكحولي الحاصل إلى المستحلب. نكمل إلى ١٠٠ ملل بواسطة ما بقى من الماء. نحرِّك جيدًا.

المواصفات - سائل سميك جدًّا، جروع بنزوات الأمونيوم أبيض، رائحته ليمونية، طعمه حلو، بنزوات الأمونيوم ٠,٣٠ غ ثقله النوعى ١,٩٤٠؛ حفظه محدود. روح الأثير النيتريك (أو ٥٠ نقطة) ١ غ

صمغ عربي مسحوق ٢,٥٠٠ غ نخضّه قبل الاستعمال. مُشهل عملهُ

صباحًا إذا لزم الأمر. من ١ إلى ٣ ملاعق صغيرة للأولاد مع حليب بارد أو مربّى بعد وجبة المساء، وإذا لزم الأمر،

جروع برُومِيّ أو برموريّ

برومور البوتاس ۴٫٠٠ غ ۹۰ غ ماء الخَس شراب الخبيزة يؤخذ خلال يوم في الإصابات الخنازيرية.

جروع بلسمي قلوي أثيري، جروع الكوباهو القلوي الأثيري

كوباهو ٣٠ غ ماء النعنعماء النعنع شراب الصمغ ٣٠ غ كربونات الصوديوم أثير سولفوريك٢غ

نذَوِّب الكربونات في ماء النعنع، نضيف الكوباهو، نحرِّك ونضيف المواد الباقية. بذلك يكون الكوباهو قد أصبح مستحلبًا.

نحضر نقاعة في ١٨٠ غرام ماء غال.	شراب بلسم تولو ١٦ غ
نمرًر ونضيف:	خليط مكوفر ٣٢ غ
روم ۳۰غ	يؤخذ على ٣ دفعات في اليوم. ضدّ
شراب سِیْسَنْبَرِیُون ۳۰ غ	زلال البول الحمّي القِرمزي.
شراب تولو ١٥ غ	-
صبغة القرفة ١,٣٠ غ	جَرُوع حامض، جُلَاب مُزَجَّج، جُلَاب
	مضاد للنزيف
في فقدان الصوت المتسبب عن الوَهْن	ماء النعنع ١٨٠ غ
وضعف الحيوية.	شراب الفرمبواز۳۰
جروع ضدّ التشنّج مُؤَفْيَن	حامض سولفوريك مخفّف ٤ غ
شراب الأفيون ١٥ غ	ملعقة أو ملعقتان كل ساعة.
شراب السكر ١٠ غ	5 - 3
ماء زهر البرتقال ١٥ غ	جروع حامض فوسفوريك
ماء عادي	حامض فوسفوريك طبي ٤ غ
	ماء النعنع المفلفلماء النعنع المفلفل
أثير اغ	شراب قشر البرتقال ١٥ غ
جروع ضدّ التشنّج نَتِن	
صبغة إفراز القندس	يؤخذ بالملاعق في الإسهال،
روح قرن الأيّل ١,٢٠ غ	والديسنتيريا، والكُساح.
ماء زهر البرتقال 80 غ	جروع زُلالي
شراب قشر البرتقال ٤٥ غ	ماء الخس المقطر ٢٠ غ
	شراب أفيوني۳۰
لذكرى التاريخ.	زلال بيض ١ أو ٢ عدد
جروع ضدّ التهاب الصِمَاخ (طبلة الأذن)	_
دهن التربنتين۲ غ	نمزج. يؤخذ خلال النهار، ضدّ
زيت خروع٣ غ	الإسهال أو الديسنتيريا الحادّة.
ماء ٢٤ غ	جروع ضدّ اختفاء الصوت
_	بروع عبد العالم المالي
يُعاد كل ٦ ساعات لإعادة تنظيم	
المحتوى الامعائي وتهدئة الجهاز	
	سوسن ٢,٦ غ
٠٠٠٠٠	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ج ر و

نشادر سائل تقط جروع ضد الدودة الوحيدة ج ر و ٣٠غ يؤخذ ملعقة كل ساعة في الشُّهاق زيت خروع أثيرسولفوريك٨غ العَصِيّ. ملعقة كل ساعتين. جروع ضدّ الكزاز نقاعة أرنيكا مشبعة ١٢٥ غ جروع ضدّ زلال البول ماء لُوس Luce ماء لُوس حامض غَلِّيكعامض غَلِّيك كافور ٤ غ شراب بسيطشراب بسيط مسك ماء مقطّر ۽ ٦٠ لذكرى التاريخ. يؤخذ بالملعقة خلال النهار. جروع مضاد خُناقِي (بريمن) جروع ضدّ السُّعال شراب دیاکود ۳۰ غ دُرْدِي مُثَمَّد ٠,١٠ غ إكسير مهدّئ ع غ نبيذ عرق الذهب ٣ غ ماء مقطّر ١٢٠غ لعاب الصمغ ماء الكرز الغاري٨غ شراب الخبيزة٨غ لعاب صمغ عربيّلله ٣٠ غ ماء مقطّر ٠٦٠ غ ملعقة كل ساعتين. ملعقة صغيرة كل ١٠ أو ٣٠ دقيقة، مع إعطاء ماء فاتر مسكّر للشرب بين جروع ضد السفلس المراحل، أو مزيج من الماء واللّبن محلول يوديّ زرنيخيّ زئبقيّ ع غ (الحليب). ۰۸ غ ماء مقطّر جروع مضادّ للإسهال شراب الزنجبيل ١٥ غ ه٠,٠٥ مستخلص أفيوني إصابات سفلسية. لذكرى التاريخ. ۲ غ تحت نيترات البيزموت ماء مقطّر ٧٥ غ جروع ضدّ الشهاق (لوڤرات) ١٢٥ غ شراب السفرجل١٥٠ غ هيدرولة الخَس (ماء) هيدرولة زهر البرتقال (ماء) ٨ غ 🛮 شراب النعنع ١٥ غ ٣٠غ يؤخذ بالملعقة من ساعة إلى ساعة، شراب الفاوانيا

شراب ست الحسن ٨ غ ويخض كل مرّة.

العزيز من سوريا. أمّا انتشار النَّوع ففي جع د مُحيط البحر المتوسِّط وفي آسيا القُبُليّة، ويُزهر من أيار إلى أيلول.

مقدّمة - قَلّما عانيت مِع نَبات طبّيّ مثلما عانيت مع هذا الطُّوقَريُون الذي يكاد اللَّبنانيُّون يُجمعون على تسميته بالجَعْدَة. إلَّا أن بعضهم يُسمِّيه عُشبة الرِّيح وبعضهم الآخر عشبة مار الياس، وهذا ما يُشير إلى انتشاره في الطبّ الشُّعبيُّ. ولكنُّهم يَختلفون في وصفات استعماله من منطقة إلى أخرى. وبانتظار الحصول على مُعطَيات عِلميّة دقيقة ترتكز على التحليل المخبري والتَّجربة، أوردَ أدناه مُختلف الاستعمالات التي تَوفَّرت لديّ إن عن طريق التّداوي الشُّعبيّ أو عن طريق بعض المراجع المُتوفِّرة. هذا وقد ورد وصف الجنس عامة والنَّوع المقصود أعلاه خاصة في مقال شامل عنوانه «طُو قَرْ يُون».

الخصائص والاستعمال - أُعيد تسجياً, الطُّوقَريُون اللَّبد في الفرماكوبيا الفرنسيّة عام ١٩٧٥. وذَكر إدوار غالب في الموسوعة في علوم الطّبيعة أن حشيشة الرّيح كانت ولا تزال تُستعمَل في بعض المُستحضرات الطبّية. وأوردَ في مكان آخر، تحت عنوان جَعْدَة Polium ما نَصّه:

الجَعْدَة عُشبة بَرِّيّة طبّيّة قيل في وصفها ما يلى: «حشيشة تنبت على شاطئ الأنهار وتجعد»./ «شَجرة خضراء تَنبِت في شعاب الجبال بنَجْد وفي القيعان»./

٧٥- جَعْدَة، جُعْدَة، مِسْك الجنّ، حَشِيْشَة الرِّيْح، عُشْبَة مار الباس، طُوْقَرْيُون كبد، عُشبة الطِّحال، طُوْقَرْيُون أضفر Cat thyme, Hulwort, Yellow germander (E)

Germandrée tomenteuse, Polium, Pouliot jaune, Germandrée jaune, Germandrée flavescente (F) Poleigamander, Gelber gamander (D) Teucrium polium, Teucrium aureum, Teucrium flavum (S)

وَرِدِ الطُّوقَرِيُونِ أَوِ الطُّيُوقَرِيُونِ اللَّبِدِ في فلورا لُبنان تحت ضَرْبَين: الضَّرب الأوّل، وهو لُبنانيّ، نَقترح له إسم طُوقَريُون لبِد مُستطيل الورق، أو جَعْدَة مُستطيلة الورق L Teucrium polium var. angustifolium Benth. اللَّبديّ أي الصّوفيّ يكون أكثر التصافًّا، وسوقه أكثر هُزالًا ونُحولًا، رؤيساتُه الزُّهريّة أصغر حجمًا، وخاصة أوراقه أصغر قدًّا وأقوى التفافًا على ذاتها؟ وهو ضرب ذُكر في عَمشيت ودير القَمر وسواهما.

أمّا الضَّرب الثّاني، وهو سُوريّ المَنبت، فنقترح له إسم طُوقَريُون رَخُو، أو جَعْدَة رَخْوَة L. أَوْ جَعْدَة رَخْوَة Hand-Mazz var. mollissimum ويكون كساؤه الصُّوفي كثيفًا حَول السّوق والفُروع بنوع خاص. وهو نَبات قَوِيّ النُّموّ «de forte venue» في كُلِّ أقسامه. ذُكِر هذا الضَّرب في جبل عبد

ج ع د

«عُشبة خضراء وغَبْراء تَنبت في الجبال، يُغلي قليلًا ويُؤخذ خلال النهار. لها رَعْثَة مثل رعثة الدّيك طيّبة الرِّيح تَنبت في الرَّبيع وتَيبس في الشِّتاء وهي من تنبت على شطوط الأنهار وليس لها رَعْثَة الأزهري. / الشجرة طيِّبَة الرِّيح خضراء لها قضب في أطرافها ثمر أبيض تُحشى بها الوسائد لطيب ريحها. وهي جهيدة يصلح عليها المال» النضر بن شميل. / رَعْثَة، رَعَثَة، رُعْثَة: نتوء لحمي في رؤوس بعض الطيور: . Caroncule

> أما العالم النّباتي الاب يول موتيرد فيقول إنّها تزهر من أيار إلى أيلول، وتَنبت على كامل الأرض اللّبنانيّة، من الساحل حتى ضفاف نهر دِجلة، ومن شواطئ البحر حتى قِمم لُبنان. ويُضيف أنّه نَبات مرغوب جدًّا لخصائصه المُسكّنة Sédatives

في جَنوب لُبنان، يَستعملها أحدَ (أطلبه) ومن النخل الملكي. مسؤولي ما سُمِّي بمخيّم المُبْعَدين عن فلسطين، كنبات مُنقِص للشُّكِّري في الجسم. أمّا في كسروان فتُستعمل لطرد المَغْص والرّيح.

صَيدليّ لُبنانيّ يَنصح بها للسُّكَّريِّين، لوحدها أو مُضافّة إلى مجموعة من الأنواع المُنقِصة للسُّكَّر مِثال إبرة الرّاهب، قَنطُريُون، كُنْباث، أرضى شوكى، قرون فاصولياء عريضة مُجفَّفة مع حبوبها، كأن يُؤخذ قبضة (٢-٣غ) حوامض دسمة متعدّدة التركيب من كل نوع في مقدار نصف ليتر ماء

أمّا الاستعمال الشُّعبيّ الذي وَصل إلينا مؤخَّرًا فهو أخذ العُشبة المَغْليَّة لحلَّ البَقول» عن أبي حنيفة. / بَقلة برِّيّة لا حصى الكلى المُستعصى. ولكن هذا الأمر لم يزل بحاجة إلى تكرار التجربة الواعية. وفي أيّ حال، إن الجَعْدَة أصبحت تجد مكانها بين الأعشاب الطبيّة التي تباع في صَيدليّة لُبنان.

٧٦- جُمّار، جُمّارة، جامورة marrow (E) Palmite (F)

الكرنب النخلى أى الجمّار هو طعام عُصاري جدًا وفي منتهى النكهة اللذيذة؛ يؤكل بطرق مختلفة؛ نيئًا، مقطِّعًا ومتبِّلًا كالسلطة؛ أو مطبوخًا، يتقارب طعمه من طعم الأرضى شوكه ولكنه يفوقه تماسكًا ونكهة. إن أجود أنواع الجمّار هي من النخل الكرنبي

إن زيت النخل الملكيّ يستعمل في الفرماكوبيا الأفريقية كترياق ضد السموم؛ وهو زيت أحمر اللون، طبّق وغذائتي وتجميلتي شائع الاستعمال. أمّا معدّل نسب الحوامض الدسمة فيه هي التالية:

حوامض دسمة مشبعة ٥٤٪ حوامض دسمة وحيدة التركيب 7.20 غير المشبع 7.1. غير المشبع

٧٧- جَوْزَة العَفْصَة، عَفْصَة، عَفْصَة Noix de galle, Galle, Galle de السَّنْدِيَان chêne (F)

Galla quercina, Galla turcica, Galla tinctoria, Quercus lusitanica var. infectoria (S)

هي جوزة العَفْصَة الَّتي تُدعى جَوزة حَلَب. يُطلق إسم عَفْصات السُّنديان أو جوزة العُفْصة على بَرْزات تَتَشكَّل من جرّاء وخَز حشرة من فصيلة غِشَائيّات الأجْنِحة تُدعى Cynips gallæ tinctoriæ أى ما يمكن تسميتها بآبرة العَفْصَة الصباغيّة (١١)، مرادفها Diplolepsis gallæ tinctoriæ، على براعم سنديان العَفْص Quercus infectoria، وهي شُجرة تَنبت بكثرة في آسيا الصغرى وبنوع أخص على طول سواحل البحر المتوسط، وتُعرف باسم مَلُّول في بعض المناطق اللُّبنانيَّة، وباسم عَفْص في بعضها الآخر. إنّ براعم هذه الشَّجرة وأوراقها وفروعها الطُّريّة هي الأجزاء الّتي تَتعرَّض بنوع خاص للإصابة بالحشرة الآبرة التي تضع بيُوضها عليها. عند ذلك تكثر عُصارات الشَّجرة في ذلك المكان، تَتَجمَّد فيه وتُشكِّل البَرْزَة التي تُدعى عَفْصَة Galle. عندما تُكمِل الحشرة الفتيّة كافّة مَراحل تَطَوُّرها، تَثقُب عندها حَبْسَها حوالى آخر شهر تموز (يوليو) وتهرب منه. ولأن العَفْصات غير المثقوبة هي الأكثر

جودة وتقديرًا من سواها فإنّها تُجمع عادة حوالي أواسط تموز.

ج و ز

تقع العَفْصات في الأسواق على شكل أجسام كُروية أو كُمَّثريّة مُزركشة بحَدَبَات ونُتوءات عديدة. وإذا كانت العَفْصات غير مثقوبة يكون لونها إلى الأخضر الزَّيتونيّ وثقيلة الوزن (عفصات خضراء أو نرقاء أو سوداء)، وتكون خفيفة بعد خروج الحشرة منها ويكون لونها بُنيًّا مصفرًا، ومبيضًا تقريبًا (عفصات بيضاء).

الشَّرق، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا تُنتج جَوْز العَفْصة.

إن أجود أنواع العفصات هي تلك التي تأتي من حَلَب والتي يُشار إليها باسم عَفْصات حَلَب Galles d'Alep في الأسواق؛ وهي مُزيَّنة بخشونات أو تَضَرُّسات مُرَوَّسة أكسبَتْها إسم العَفْصات الشائكة؛ يكون حجمها قدر البُندقة تقريبًا، ثقيلة الوزن، قاتمة اللَّون ولا يوجد بينها بالمرة تقريبًا عَفْصات بيضاء ومثقوبة. إن عَفْصات بيضاء بقليل، أخف منها وزنًا وأفتح لونًا ومخلوطة مع عَفْصات بيضاء؛ وهي بالتالي أقل تقديرًا وأدنى جودة منها.

عِدّة أنواع من السنديان التي تنبت في أوروبًا وغرب آسيا تنتج بَرْزَات مماثلة لعفصات الأسواق، من حيث المصدر والطبيعة. ويُطلق إسم عفصة هنغاريا أو عفصة پيامُونت على شذوذ أو تَشَوُّه يطرأ على قمع بلُّوطة السنديان العادي من جراء

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ج و ز

وخز أبرة، وإسم عفصة تركيا أو عفصة الشُّرق، وإسم Vélanède، على نتاج مشابه ينمو على السِّنديان الرُّوحِيّ: . Quercus Aegilops

إن طعم جوزة العَفْصة الحامز مردُّه إلى الكوَرْسِيتانّيك التي تحتوي منه بنسبة ٦٠ إلى ٧٠٪. ونجد فيها كذلك سُكِّر، راتنج، القليل من الحامض الغَلِّيك وموادّ هَيوليناتِيّة. إن الحامض التانّيك هو نموذج لطائفة كبيرة من الأجسام القِلَويدات، الجيلاتين. التي تدين لها النّباتات بخصائصها القابضة. إن الموادّ العَفْصيّة كانت تُعتبر منذ فترة طويلة على أنّها مشابهة للموادّ الموجودة في جوزة العفص، ولكن الأبحاث التى تَمَّت خلال السَّنوات الأخيرة بيَّنَت أن عفص مختلف النَّباتات ينعم بخصائص مُتميِّزة. ولقد وَجَد غيبُورت في العفص مقدار ٢٪ من جوهر ملون أصفر، هو الحامض اللُّو تَايُو غَلِّيك .

> إن الماء والكحول والأثير المائي تُشْحَن بسهولة بجواهر العفصات الفعّالة. إن نقاعة العفصات المائيّة أو صبغتها الكحوليّة هي كاشف يدلّ على الحديد، الجيلاتين والقلى النَّباتيَّة التي يُرسِّبها من محاليلها. يُستخرج العَفْص بشكل حَصْري تقريبًا من جوزة العفصة، على لحاء السنديان بالأفضليّة، ويَتميَّز بالعفص الفيزيولوجي أو بالعفص المَرَضى تبعًا لمصدره.

الخصائص - العفصة هي قابض قوي. إستعمالها في الطبّ يرتكز برمّته على هذه الخاصِّيّة. تُستعمل في تَنقيعات ونُقاعات، وكمادات، وحقن شَرجيّة ضِدّ الإسهال، وخاصة في رزقات ضد النّزيفات العَفْص Tanin أو الحامِض الغَلُوتانيك أو المُطاوِعَة، التَّعقيبات وحُرقات البَول. نادرًا ما تستعمل من الدّاخل؛ وبالرُّغم من ذلك فقد استُعملت كترياق ضِدّ الدُّواء المقيِّئ القويُّ وضدُّ القِلمِي النَّباتيَّةِ.

تَضَادَّاتها - الأملاح المعدِنيّة،

طريقة الاستعمال - مسحوق ٠,٥ إلى ٢غ؛ نقاعة أو نقيع ٢٠ ٪؛ مستخلص ٢,٠ إلى ١غ؛ صبغة ٤ إلى ١٢ غ.

-۷۸ جُوفْريَّة، أَنْدِير (۱۱) Cabbage tree Geoffrée, Arbre à chou, Andire (F) Unechter Kohlbaum (D) Geoffræa, Andira (S)

جُوفْريَّة سَرْحَة، أنديرا ملساء^(٢) Geoffrée inerme, Andire inerme (F) Geoffrœa inermis, Andira inermis (S)

جُوفْريَّة سُورِينام، أنديرا سُورِينام^(٣) Geoffrée de Surinam, Andire de surinam (F) Geoffrœa surinamensis, Andira surinamensis (S)

⁽١) التَّسمية العربيَّة الأولى للمؤلِّف والثانية لإدوار

⁽٢) التَّسمِية العربيَّة الأولى والتَّسميتان الفرنسيَّتان

⁽٣) كل التَّسميات ما عدا اللاتينية للمؤلِّف.

جوفرية طاردة الدود، أنديرا طاردة الدود(١) Géoffrée vermifuge, Andire vermifuge (F) Geoffræa vermifuga, Andira vermifuga (S)

أنْجَالِيْن، أَنْجَالِيْم (٢) Angéline, Angélim, Angélin (F)

قشورهما مُرَّة الطُّعم، تَنبتان، الأولى في مذكورتان في بعض الفرماكوبيات على ثمارها باسم أنجالين أو انجاليم. أنَّهما طاردتان للدّيدان بمقدار من ١٠٠٠

إلى ١,١٠ غرام؛ وتُصبحان مُقيِّنتان جوف بمقدار أعلى من ذلك. قشورهما تحتوى على جوهر أميني خاص، هو التيروزين المُمَتْيَلِ (٣ Méthylée بالأزوت، يُدعى أنْدِيرِيْنِ مُماثل إلى الرَّاتَانِيْنِ في أنواع الرَّاتَانيا.

> الجُوفْريَّة الطّاردة للدّود شَجرة من الجُوفْريَّة السَّرحة وجُوفْرية سُورينام فصيلة القَرْنِيّات الفَراشيّة تَنبت في شجرتان من فصيلة القَرْنِيَّات الفَراشيّة، البرازيل، حيث تَتَمتَّع بزرتها بشهرة عالية جدًّا على أنها طاردة للدود، تُعطى الجماييك، والثانية في سورينام؛ وهما في مسحوق أو في نقاعة. وتشتهر لوزة

⁽١) التَّسميتان العربيّتان والفرنسيّتان للمؤلّف.

 ⁽٢) التسميتان العربيتان للمؤلف.

9

۷۹ حامِض دُهْنيّ، حامِض ستيارِيك، Acide Stéarique, دُهْنِين، ستِيارِيْن Stéarine (F)

 $C_{18}H_{36}O_2 = 284,5$

يُشار إلى هذا الحامِض في الأسواق خطأً بإسم ستيارين، فالحامِض الدُّهني المَخْزَنيّ هو مَزيج يَحتوي على مُختلَف الحوامِض الدَّسِمة بنسب مُتفاوتة، خاصّة على الحامِض الدُّهنيّ أو الستياريك: $CH_3(CH_2)_{16}.CO_2H = 284,5$ والحامِض النَّخْلِيِّ أو بالمِتيك: وعلى، $CH_3(CH_2)_{14}CO_2H = 256,4$ كمِّيّة صغيرة من الحامِض الزَّيْتيّ أو أولايــــك: CH₃(CH₂)₇CH = : نستعمَل .CH(CH₂) $_7$ CO $_2$ H = 282,5 الحامض الدُّهنيّ في تَحضير كريمات أساسها ستياراتات الصوديوم أو الأمّونيوم. بَعد أن ظهر في الكُودكس باسم حامِض ستياريك، أعيد تسجيله عام ١٩٦٥ باسم «مَزيج يُقال له حامِض ستياريك» ومن ثمّ أدرج بإسمه القديم عام ١٩٧٢.

المواصفات - يَقع في شَذْرات أو في كُتَل بَيضاء اللَّون، لامِعة، زَيتيّة الملْمَس.

رائحتها ضعيفة وطعمها طعم الوَدَك. نِتاجه المَخْزَنيّ يَجب ألّا يَنصهر دون درجة ٥٦° سغ وألّا يَتَجَمَّد في درجة أدنى من ٥٤,٧° سغ. لا يَذوب في الماء، يَذوب في ٢١ جزء من الكحول، وفي ٣ أجزاء من الأثير أو في جزئين من الكلوروفورم (كودكس). وهو مَزوج تمامًا مع الكحول عند ٧٠° سغ.

الاستعمال - كريم بستيارات الصوديوم (كودكس ١٩٤٩). يُستخدَم في تحضير الستياراتات المَعدنيّة التي يَستخدمُها عدد كبير من الإختصاصييّن كسَوّاغات للمراهم.

۱۹۰ حامِض سِیانْهیدْرِیك، حامِض پروسِّیك، حامِض شِیازِیك Acide cyanhydrique, Acide pressique, Acide chyazique, Acide hydrocyanique (F)

HCN = 27

إكتشفه Scheele الذي استخرجه من أزرق پروسيا؛ ولكن غاي لُوسّاك كان أول من حصل عليه، عام ١٨١١، بحالته اللّامائية. إنّ حامِض السّيائهيدريك اللّامائية الّذي يَتم تَحضيره في المُختبرات هو سائل عديم اللّون، كثافته المُختبرات هو سائل عديم اللّون، كثافته درجة صفر سغ، يَتجمَّد عند درجة صفر سغ، يَتجمَّد عند حرجة المُفر. ولأنّه سام جدًّا؛ ولأنّ درجة غليانه (٢٦° سغ) تَتقارب جدًّا من مُتوسِّط درجة حرارة المُحيط العام، فإنّه من الخُطورة بمكان تَناقلَه

بالأيدي كما هو؛ لذلك لا يُستعمَل في الطُّت إلَّا مَحلولًا.

إنّ محلول حامِض السّيانْهيدريك كان عُشْريًّا (١٠) في كُودكس ١٨٦٦، وخُفُف في كُودكس ١٨٨٤ فأصبح مِثويًّا (١٠٠٠)، ومن ثمّ جَعَله كُودكس ١٩٠٨ محلولًا مَخْزَنيًا بنسبة ٢ بالمئة بالوزن، وذلك تَمشِّيًا مع اتفاقيَّة بروكسل الدُّوَليَّة.

لم يَعد هناك في الكُودكس ما يُسمّى محلول حامِض سیانهیدریك سوى «ماء الغار الكَرزي» المُعَيَّر بنسبة ٠,١٠٠ غرام من الحامِض بالمئة.

إنّ مُذابَة حامِض السّيانْهيدريك المَخْزَنيّة تُستعمَل كمُسكّن للجهاز العَصبي، وللوجع، وللشَّعال. وتُستعمَل من الدَّاخل ضِدَّ العُصَابات الخَلَجانيَّة، والأوجاع السَّرطانيّة، والسُّعالات الحُمِّيَّة، والشُّهاق، وأوجاع المَعِدة. ونادرًا ما تُستعمَل من الخارج ضِدّ الحَكَّة الشَّديدة.

سامّ جدًّا - جدول «أ» - Très toxique. Tableau A

٨١- حامض سيانهيدريك (سُمِّيَّة الـ)، Acide سِمامَة الحامِض السِّيانْهيدريّ cyanhydrique (Toxicologie) (F)

HCN = 27

إن الحامض السيانهيدريك هو في منتهى السمِّية (سام جدًّا جدًّا، جدول أ). بمقدار مميت من ٠,٠٥ غرام على

الأكثر، يُحدِث الحامض اللهمائي خلال ح ا م ثواني عند البالغ ألمًا حادًا يُترجَم بصرخة قلق وجَزَع (مستمرة تقريبًا) يليها شلل مفاجئ في الجهاز التنفّسيّ وفي القلب. وقد يمتلئ الفم بالرِّغُوة ويندمج الفكَّان.

> ويمقادير أقلّ، يُحدِث عُسر التنفّس، وازرقاق البشرة المصحوب بفتور حرارة الجسم، وحوادث اختناقيّة، وجَزَع أما قَلْبِي، ودوارات، وتخلّجات جزئية سرعان ما تُعمَّم. التسمَّم الخفيف يؤدّي إلى تقلّص بلعومي، وإلى انذهالات ودوارات مصحوبة برؤاس وتوصيم، أي وجع وتكشّر في الجسد.

المعالجة - لمحاربة التسمّم السيانهيدري نلجأ إلى غسل المعدة المتكرّر بمحلول بنسبة ٢ بالألف من برمنغانات البوتاسيوم الذي يعمل كمؤكسد Oxydant. ومن الترياقات الأخرى الفعّالة إذا أعطيت فورًا بعد ابتلاع السمّ: الماء المتأكسج المُشَعْشَع جدًّا (جزء واحد في ٤٠٠ جزء) الذي يحوّل السمّ إلى أُوكُسامِيد غير سامً؛ الغلوكوز يعطى ضمن الوريد؛ المواد المحوّلة لخضاب الدمّ: Méthémoglobinisantes: هِيبُوسُولْفيت الصوديوم في محلول بنسبة ٣٪ ضمن الوريد (يشكل سولفوسيانور غير سام)؛ نيتريت الصوديوم ١٪، في حقنة من ١,٥ غرام؛ غلوتاثيون مُخْتَزَل Glutathion في محلول بنسبة ١٠٪ في حقنة من ١٠ ملغ

717

لكل كيلو (يسهِّل استعادة التَّنفِّس النَّسيجيّ)؛ أزرق المثيلان بنسبة ٠,٠١ غرام لكل كيلو، ضمن الوريد.

بالإضافة إلى ما تقدُّم، نواجه الحوادث التسمّمية برشّات باردة؛ بالفَصْد أي فتح عرق، باستنشاقات أوكسيجين، بسَحْب أو جَذْب مَوزون ومُوقَّع للِّسان، بحقن من الزيت المكوفر، والكافيين، والوبائين.

٨٣- حامِض لَبَنيك مَخْزَنِيّ، حامِض لَبَنِيك مُرَازَم Acide lactique officinal, لَبَنِيك مُرَازَم Acide lactique racémique (F)

 CH_3 -CHOH- $CO_2H = 90.1$

إكتشفه Scheele عام ۱۷۸۰. يُوجد في العُصارة المِعَويّة وفي عدد كبير من خِلْطاتنا Humeurs، وفي صَفَار البَيض وفي الكثير من السَّوائل المُتخمِّرة. إنَّه مَزيج من حامِض لَبَنيك صِرْف ومن لامائيَّه الدَّاخليّ لَكْتيل لَبَنيك الحامِض، يَحصل الحامِض اللَّبَنيك من تَفَكُّك لَبَنات الكلسيوم المُكرَّرة (١٠٠٠ غرام) بالحامِض الكَبْريتيك المَخْزَني (٣٥٠ غرام) (كُودكس ١٨٨٤). يُحضَّر أيضًا بتخمير العُصارات السُّكَّريَّة بواسطة حامِض لَكْتيل لَبَنيك. العُصَيَّة اللَّبنِيكيَّة المَوجودة في الجُبْنة الحامضة. ويتم تَحضيره صناعيًا من النَّشاء واللُّتِ والدَّقيقِ المُحوَّلَةِ إلى مَلْتُوز بفضل عمل الأنْبَخَانَة التَّخميريّ المَوجودة في المَلْت.

المُواصفات - يَقع الحامِض اللَّبَنيك الصِرْف في بلُّورات صُلْبَة، تَنصهر عند +10° سغ، ولكنّ الحامض المَخْزَنيّ الَّذي يَحتوي على بعض الأجزاء المئويَّة من الماء، هو سائل شَرَابِيِّ القِوام، عديم اللُّون أو بالكاد يَصطبغ بالأصفر. وهو مزيج من حامض لَبَنيك صِرْف ومن حامِض لَكْتِيل لَبَنِيك، ومن حوامِض پُولي لَبَنِيك وماء. إنّ التَّوازن بين الحامض اللبنيك والخوامض اليولى لَننك يَتعلُّق بالتَّركيز وبالحرارة.

عديم اللُّون وطعمه قَويّ حامِض. كثافته تتقارب من ١,٢٠.

إذا تُرك لذاته لمدَّة طويلة وفي الحرارة العاديّة فإنّه يَخسر من مُيوعته وذلك بسبب تَشَبُّعه بالحامِض اللَّكْتيل لَبَنيك، وهو مُرَكِّب يَحصل من أَسْتَرَة جُزَيْئَة من الحامِض اللَّبَنيك تَعمل ككحول. بجُزَيْئة أخرى تعمل كحامض.

الحامِض اللَّبَنيك قابل للمَزْج بكلّ النِّسب مع الماء، والكحول، وقابل للذُّوبان في الأثير. النِّتاج المَخْزَنيّ يجب أن يَحتوى كحد أدنى ٣٠ بالمئة حامِض لَبَنيك، وكحدّ أقصى ٦٥ بالمئة

الخصائص والاستعمال - يُستخدَم في الصَّيدليّة لتحضير شَرابِ اللَّكُتُوفوسفات الكُلْسِيِّ السُّكُّريِّ، والحامِضِ اللَّبَنيك المَخْزَني المُخفَّف، والغُريّاء الحامِضة المُركَّبة.

ح ب ق

كان يُستعمَل من الدّاخل، في محلول مُشَعْشَع ومُحلّى بالسُّكَّر، ضِدّ الإسهال الأخضر الّذي يُصيب الرُّضَّع، وضِدّ الكوليرا، وضِدّ التهابات المِعَى الهَيْضِيّة الشَّكْل Cholériformes أو السَّليّة، وحُمّى التيفوئيد أو الحُمّى التيفيّة، وفي السَّكَري، وفي تَبَوْلُن الدّم Urémie المِعَوى الشَّكْل.

من الخارج، في مُعالجات مَوضعيّة، ضِد التَّقرُّحات الفَمِّيّة البَلْعوميّة، إلتهاب الحنجرة السِّلِي، والتَّقرُّن الفَمِّيّ الأَبيض Leucoplasie، والخُناق، وداء النَّعْلَب، والقُرّاض Lupus، إلخ.

يُحضَّر حاليًّا مَحلُول من الحامِض اللَّبنيك غير المُخَصَّص للحَقْن، لَغْسل المَثانَة، تَركيبته هي التالية:

حامِض لَبَنِيك مَخْزَنيّ مُخَفَّف حامِض لَبَنِيك مَخْزَنيّ مُخَفَّف ماء مُقطَّر ماء مُقطِّر ماء ماء مُقطِّر ماء مُعْرِي مُقطِّم مُعْرِي م

نَمزُج. نَستعمِل في لَيْموناضة لَبَنيَّة (حَليبيَّة) (كُودكس ١٩٣٧).

(۱) حَبَق أَخْضَر، حَبَق البَرْغَش Basilic vert, Basilic à moustiques, Plante à moustiques (F) Ocimum Viride (S)

نَوع من الحبق يُطلق عليه الإسم الفَرنسيّ «نبات البرغش»، يُستخرج من أوراقه زيتٌ دُهنيّ بُرتقاليّ اللَّون برائحة الزَّعتر، يَحتوي على ٣٢ إلى ٥٠ بالمئة من التيمول، وعلى سيترال، وتَرْبانات.

Basilic à feuilles (۲) حَبَقَ بَنَفْسَجِيّ الوَرَقَ violettes (F)

Basilic à feuilles (۲) حَبَقَ جِعْدِيّ الوَرَقْ frisées (F)

Basilic à feuilles (۲) حَبَق خَسِّيّ الوَرَقَ de laitue (F)

ضُروبٌ ثَلاث من الحَبق المَعروف أي المليعقة، وهي تزيينية. إلّا أن الحبق الخَسِّي يُرغَب في تحضير صَلْصة تُضاف إلى بعض الأطباق الإيطاليّة، أخصُها المَعكرونة، كما أن أوراقه الكبيرة الجميلة اللّون الأخضر تُضاف إلى

⁽١) التَّسميتان العربيّتان والتَّسميتان الفرنسيّتان الأولى والثانية للمؤلَّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

ح ب ق

السلطات والأطباق النَّيئة، وهو من الأنواع الشائعة في لبنان.

مُلاحظة - الحبق هو نبات مقدَّر جدًّا في اليونان لخصائصه المطهرة. إن بَلّ الحبق vassilicos بالماء لفترة طويلة يمنعه من الفساد والتَّعَفُّن. ويُنسَب إلى هذه الخاصِّية المُنفِّية المُطَهِّرة استعمال الحبق من قبل الكنيسة اليُونانيّة الأورثُوذُكْسِيَّة لتَبريك الماء خلال القدّاس الإلهيّ.

Kleines basilien kraut (D)
Ocimum minimum (S)

والأمراض الجِلْدِية المختلِفة.

الاستعمال - الوَهْن العَصبِيّ، الإرهاق والإجهاد الفِكريّ، الحَصْر، الكُرْب، الفَمّ، القَلَق، التَقلُّصات المِعَويَّة في حالات عسر الهضم، إصابات الأمعاء، شُهاق، دوارات، دَوْخات، آلامِ الشقيقة، داء النقطة (Pline)، شلل، نقْرِس، شَحِّ الطَّمث، تَقَيُّوْات، قُلاع، زُواس، تَطَبُّل البطن، وخز الحشرات، زُكام، فقدان حاسة الشَّمّ، البرود زُكام، فقدان حاسة الشَّمّ، البرود الجنسيّ والعُقْم النّسائيّ، الأمراض الجلدية.

الشّرفات والحدائق والنَّوافذ اللُّبنانيّة عامّة.

المُركِّبات - زيت دُهني من ١,٥٠ إلى ١,٥ بالمئة، مؤلَّف عُمومًا من أُوسِيْمان، لينالُول، غني بالأستراغُول الموجود في دهن الطَّرخُون، أو جينُول أساس دهن القرنفل، وأحيانًا التِّيمُول الموجود في الزَّعتر والصَّعتر والنَّدْغ وسواها.

الخصائص - مُقوِّ (عَصبيّ بنوع خاص Bodart) ومقوي القُشور الكُظْرِيَّة Cortico-surrénales مُنشَّط، مضادّ للتَّشَتُّج (يُخَفِّض النشاط المُخِّيّ الشَّوكيّ بعد أن يكون قد نَشَّطه)، مُسكِّن: كان يُنصح به في مُعالجة الهستيريا، نافع للمعدة، مطهّر المعدة والأمعاء، مُطمِّث، مِدِرّ الحليب، صَدْريّ، مُعطِّس، طارد للرّيح. وقيل إنه مُنعِش مُعطِّس، طارد للرّيح. وقيل إنه مُنعِش ومُضادّ للتَّعقيبة. التَّداوي التُّونسيّ يَعتبرُه ناعظًا ومفيدًا في العُقْم النسائيّ والأمراض الجِلْدِيّة المختلِفة.

نَبات عُشبيّ حَوْليّ صَغير القدّ من فَصِيلة الشَّفَويَّات يُشبه الحَبَق المَعروف (المليعقة) ولٰكِنّه مُتراصٌّ أكثر منه، يَعلو من ١٥ إلى ٢٥ سم وأكثر. سُوقُه مُربَّعة، دقيقة الزّغب الخَمْليّ، فُروعُه وفُريعاتُه دقيقة. أوراقُه لَسِنَة جميلة الخضار العاديّ، ذَكيّة العَرْف المُستَحبّ. إزهرارُه سَنابل مُستطيلة. أزهارُه بَيضاء اللَّون أو وَردِيّة. مَهدُه الشِّيلي وسيلان. منه ضُروبٌ تَزينيّة أوراقها بنفسجيّة ومنها القرم المُتراص الأخضر، والقرم المَتراص المَتراص الوَرق. وهو نَبات المتراص البَنفسجيّ الوَرق. وهو نَبات

طريقة الاستعمال الداخلي - نُقاعة الأوراق والرووس المُزْهِرة في الماء الغالى، فنجان بعد كل وجبة كمهضّم. الزيت الدُّهني، ٢ إلى ٥ نقاط في محلول مائتي أو كحولتي أو مع العسل، ثلاث مرات في اليوم. مَلْتُوت سُكّريّ مُضادّ للتَّشنُّج يُحَضَّر من دُهن الحَبَق ومن دُهن المردكوَش بمقدار غرام واحد من كل منهما، شُكَّر مسحوق ٥٠ غرام، يُؤخذ من هذا المُستحضر نصف مِلعَقَة إلى مِلعَقَة صغيرة في فنجان زيزفون أو رغى الحمام بعد كل وجبة. الأطبّاء العَرَب يُعالجون القُلاع بنقاعة الحبق بمقدار ١٠ غرامات حبق في نقيع مغلى مُركّز يُستعمل غرغرة. كما يَنْصَحُ الطبُّ الشَّعبيُّ التُّونسيّ بنقاعة الحبق في حال البرود أو العجز الجنسي. طريقة الاستعمال الخارجي - أوراق الحبق المجفَّفة المسحوقة تُستعمل عَطوسًا في حال فقدان حاسة الشَّمّ المُتسبِّب عن زُكام مُزمِن Coryza. الزَّيت الدُّهنيِّ أو الأوراق الغضَّة المفرفكة توضع على عَقْص الزنابير والزَّلاقط، وعلى لَدْغ الأفاعي كعلاج تَكميلي مساعد. نقيع الحبق الغَضّ المغلى يُنصح به في التّداوي التُّونسيّ في حال العُقْم النّسائيّ على أن يُستعمل

ملاحظة - الحبق هو العُشبة الملكية . Herbe royale وهـو إسـم مـصـدره

في حُقُنات وحَمّامات فَرْجِيّة. كما

يُستعمل النَّقيع ذاته من الخارج في

مُعالجة مختلف أمراض البشرة.

كلمتين يُونانيَّتين معناهما «أشْعُر، أحس» حبي و «ملكي». إن رؤوس الحبق المُزهرة الغَضّة تُستعمل في تحضير الكحولة الشّافية للجرح (دراسة أحادِيّة)، وقد أعيد تسجيلُها في الفرماكوبيا الفرنسيّة عام ١٩٧٥. أمّا حساء الحَبق Soupe au مقاطعة پروڤائس الفرنسيّة، فيحضر من مقاطعة پروڤائس الفرنسيّة، فيحضر من الحبق الصغير خاصّة، كما يحضّر من الحبق المعروف أيضًا. ولقد أوردتُ تفاصيل تحضير هذا الحساء القديم الشهير في دراسة الحبق المعروف أي

ه۸- خُبَيْبَات، خُبَيْبَة

الحُبيبات هي بيلولات صغيرة مُخصَّصة لكي تُؤخذ بالفَمّ تزن الواحدة منها عادة من ٥ إلى ٦ سنتغرامات.

يُوصي دستور الأدوية لتحضيرها باستعمال مسحوق الصّمغ العربي، وسُكّر الحليب المسحوق، والشَّراب السُّكَريّ البسيط كسَوَّاغ لها (ملحق الفرماكوبيا الصادر عام ١٩٧٦).

تكون الحُبيبات بشكل عام من صنفين: الواحدة تحتوي على ملغرام واحد من المادّة العِلاجيّة في الحُبيبة الواحدة وتكون بَيضاء اللَّون (أنْهيدريد زَرنيخيّ، سولفات الأتروپيس، سولفات المستركنين)؛ وتحتوي الأخرى على واحد من عشرة (المناهمن الملغرام من الملغرام من

ح ر **ف**

الخصائص - نبات مُضاد لداء الحَفَر.

۸۷- حزاز Lichen (F)

حَزَاز بَيَاضِ الثَّلْجِ(١) Lichen blanc de neige (F) Physica nivalis (S)

حَزَازِ الحيطان (۲) Lichen des murs Imbricaria parietina, Parmelia parietina (S)

قُدِّم هذا النُّوع كبديل للكينا، وهو يحتوى على جوهر مُرّ يُدعى کريزو سکّرين.

إِنَّ الأَنواع التي وردت أعلاه هي من بين أنواع الحزاز التي كانت تُستعمل في الماضي للتَّداوي، والَّتِي تَذَكُّرها الفرماكوبيات المختلفة، ومن دون أي تفصيل عن خصائصها في بعض الأحيان.

حَزَاز الرَّنَات (T) Lichen des rennes Cladonia rangiferina (S)

(F)

Peltigera canina (S)

Lichen entrelacé (F) Usnea plicata (S)

كان هذا الحزاز يُعرف في الماضي

المادّة العِلاجيّة وفي الحُبيبة الواحدة؛ مقربة من الماء. وهى تُحضَّر بواسطة المساحيق المَخزَنيّة بنسبة واحد من مئة (١٠٠٠)، وتُلَوَّن بالتّالي أُعيد تَسجيلُه في كودكس ١٩٧٤. باللُّون الوردي. ويمكن كذلك تحضير حُبيبات تحتوى إمّا على نصف ملغرام $(\frac{1}{2})$ ، أو على ربع ملغرام $(\frac{1}{4})$ من المادّة العِلاجيّة: تُلوَّن الأولى باللُّون الأخضر والثّانية بالأصفر.

> ٨٦- حُرْف الحَقْل، صناب الماء Cuckoo flower, Ladies' Smock, Meadow bitter-cresse (E) Cardamine des prés, Cresson élégant, Cresson des prés, Cressonnette (F) Kukucksblume, Weisenschaumkraut (D) Cardamine pratensis (S)

الصِّنَابِ جنس نَباتات حَوليَّة مُحولة أو مُعمَّرة من فصيلة الصَّلِيبيّات. أوراقها بسيطة أو مُركَّبة. أزهارُها بيضاء، ليلكيّة أو أرجوانيّة، عُنقوديّة التَّجميع الهاميّ. أربع كأسِيّات حُرّة وأربع بَتَلات على شكل صليب. ست أسدية اثنان منها أصغر من الأخرى. الثَّمرة قَرْن مُنْفَلِق حَزّاز الكَلّب (٣) Lichen contre la rage يَنفتِح عن مِصراعين.

حُرْف الحَقْل نبات مُحوِل أو مُعمَّر. حَزَاز مُتَحابِك، أَشْنَة الجمجمة (٣) ساقُه جالسة، هزيلة. أوراقُه مُتعاقِبة، مُركَّبة. أزهارُه من الأبيض المُتورِّد إلى الورديّ اللَّيلكيّ. طعم أوراقه يَتقارب من طعم قُرَّة العَيْن. أوراقه ويزوره حِرِّيفة نافِطة. يَنبت على حوافي الجداول وفى المروج الرَّطبة وعلى

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسميات للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمات للمؤلِّف.

باسم «أشنة جمجمة الإنسان»؛ وكان يُدفع ثمن هذا النوع الّذي يَنبت ويعيش على جمجمة المَشنوقين، مقدار وزنه ذهبًا، ويُستعمل ضِدّ داء النّقطة.

Lichens tinctoriaux حَزَارَ صِبَاغِيّ -۸۸

إِنَّ أنواع الحزاز تُعطي الصِّباغ أربعة ألوان هي البُنِّيِّ والأصفر والأرجوانيّ والأزرق. اللُّون البُنِّيِّ يحصل من الحزاز المُتَبَثَّر والرئويِّ؛ والأصفر من حزاز الحيطان والحزاز التَّعْلَبيّ. الأنواع التي تُعطى اللُّون الأحمر أو الأرجواني هي من البَرّ أو من البحر. تَنتمي أنواع البحر إلى جنس رُوكْسَلّة (١) Roccella، والنوع الأكثر استعمالًا منها هو رُوكْسَلّة صِباغِیّة (۱ R. tinctoria وهو نوع یعیش على الصخور البحرية في الرأس الأخضر، ومادير، والموغادور، وسردينيا، وكورسيكا، والكناري، والأسور. ونجد في المحيط الهندي النَّوع روْكُسَلَّة مونْتاني^(١) R. Montagnei . أُشْنَة الصبّاغين المَدَغشقريّة تنتج من روكْسَلَّة زُنْبُورِيَّة الشَّكِلْ(١) R. fuciformis. وهناك أنواع أخرى منها

تَنتمي أنواع البَرّ إلى جنس جُدَرِيّة (۱) Variolaria منها بنوع خاص الجُدَرِيّة المبيّضة (۷. dealbata) وجُدَرِيّة

أورْسِينا (١٠ V. Orcina أي Parelle وهما نوعان اكتشف فيهما رُوبيكيه مادَّتَين مُتبلِّرتين هما: ڤاريُولِين، وأورْسِيْن، وهما يعيشان في جبال الپيرينيه والأوڤَرْنيه والألب، إلخ. اللَّون الأزرق يحصل من أنواع شَحْمَة الأرض الدُّرض التَّرية (١٠ L. tartarea).

حزا

إذا مُرِثَت أنواع حزاز اللَّون الأحمر مع البَول، تُشكِّل تلك المواد الصِّباغيّة البَنفسجيّة اللَّون التي تعرف باسم «أشنة الصِباغين»، وهي تَصبغ باللَّون القِرمزيّ الزّاهي من دون مُرْسِخ (مادَّة كيميائيّة تُثبّت اللَّون أو الصِّبغة)؛ وحسبما تكون من البحر أو من البرّ، فإن الأشنة الصِّباغيّة تُدعى أُشْنَة البحر (أشنة الجزر أو الكناري أو العُشب) أو أُشْنَة البرّ (أشنة أوڤرنيه، أو المُشب) .

يُحضَّر لَكَ أزرق اللَّون بواسطة شحمة الأرض والنُّشادر أو البول، مماثل لدوّار المحلول الذي يُستخرج من الكروتُن الصِّبَاغين الصِّبَاغين الصِّبَاغين الصِّبَاغين Croton tinctorium أي Maurelle وهو أكثر حساسية، كمادّة كاشفة، من هنا الأخير.

إن المادّة المُلوِّنة لا توجد في هذه الأنواع من الحزاز بشكل مُشبَق ولكنّها تتشكَّل نتيجة ظواهر خَمائريّة وَصَفها كلّ من غُورِيْس ورُونْسْرَاي عام ١٩٠٦. هكذا

في أمريكا وسواها.

⁽١) التَّـمية للمؤلِّف.

إذًا، إن اللِّيكانُوريْن (أي حامض ٨٩- حَسَاء عجل، مَرَق عجل Bouillon de veau (F)

ليكانوريك أو أورسَليك) الذي يوجد مسبقًا في الجُدَريّة المبيّضة وفي جُدرية ٠١٢ غ شريحة عجل مقطعة أورسينا وفي شحمة الأرض التَّتَريّة، والَّذي اكتشفه شُونْك، إذا غُلِيَ بالماء أو أخضِع للتَّقطير الجافّ، فإنّه يَتحوَّل إلى أورْسِيْن (أو أورْسِينُول، وهو ل -(دستور ۱۸۳۷، و۲۸۲۱). متيل - رِيزُورْسِينُول)؛ إن هذا الأخير، وبالفعل المتزامن للأوكسجين والهواء والنُّشادر، يُعطى أورْسَاييْن، أي مادّة والضَّفادع (دستور ١٨٣٧). الأشنة المُلوِّنة (وكذلك مادة دوار

> إن الأريترين الّذي اكتَشفه «كان» Kane يُوجِد مُسبقًا في الروكُسَلَّة الصِّباغيَّة، ويَتغيّر، بملامسة الهواء والنشادر، إلى أماريترين أي مُرّ الأريترين الذي يُصبح، نتيجة ملامسة أطول، التَّلَريترين، ومن ثم الأورْسَاييْن. إنّ الرُّوكْسَلّين أي الحامض الرُّوكْسَلِّيك، الَّذي يوجد أيضًا في الروكْسَلَّة الصِّباغيَّة، يمتصّ الأوكسيجين ويُشكِّل، حسب روبرت كان، الحامض الأريترولاييْك. إن هذه الموادّ إذا احتفظ بها محلولة مع زيادة من النُّشادر، تُشكِّل

المحلول).

. Orseille	اشنة الصباغين
Pustuleux	مُتبثر
Vulpin	نَعْلَبِيّ
En forme de frelon	زُنْبورِيّة
Fermentaire	خَمائرية
Pulmonaire	

نَغلى بحرارة هادئة، في وعاء مُغطّى، لمدّة ساعتين. نُمرّر السّائل عندما يبرد

نُحضِّر بالطُّريقة ذاتها حَسَاء رئة العجل، والدِّجاج، والقريدس، والسلحفاة،

حساء العجل المُتَقى Émétisé يُحضَّر بإضافة ٥ سنتغ من المقيِّئ إلى حساء العجل، والحساء المسهِّل، وإضافة ٦٠ غرام من سولفات المغنازيوم إليه.

حساء الأفاعي كان مذكورًا في دستور ١٨١٨، وكان يُحضُّر على غرار حساء العجل من أفاعي منزوعة الرأس والذُّنب، بمعدَّل ١٢٨ جزء لكل ٣٨٤ جزء من الماء.

٩٠ حَشِيْشَةُ اللَّيْمُون، عُشْبَةُ الشَّاي (١) Lemon grass (E) Verveine indienne (F)

Citrongrass (D)

Andropogon citratus, Cymbopogon citratus (S)

نَبات عُشبيّ مُعمّر من فصيلة النَّجيليَّات. أوراقه عصفيّة النَّصل، ليمونيّة الرّائحة الكيّة العَرْف، تُستعمل

⁽١) التَّسمة الثَّانة للمؤلِّف.

Para cress, حشيشة النّتَاق – ٩١ Spilanthes (E) Cresson de Para, Cresson du Brésil, Spilanthe (F) Parakresse, Husarenknopf (D)

Spilanthes oleracea (S)

نَبات حَوْلِي مِن فَصِيلَة المُركَّبات، مهده أمريكا الجَنوبيَّة. سوقُه نائمة على الأرض. أوراقُه بَيضَويَة الشَّكل، كامِلة. رُؤيساتُه الزَّهرِيَّة هامِيَّة الارتكاز، مَخروطيّة الشَّكل، صَفراء اللَّون (بُنيَّة اللَّون في الضَّرب Spilanthes fusca)، كُل أقسام النَّبات لها طَعْم لاذع وعِطريّ. المُركِّبات - زيت دُهنيّ مُركَّب خاصَّة الشَّكل، تُسمّى إسْبِيلَتُول أو إسْبِيلَتُون، من إسْبِيلَتُون، ومن مادَّة مُنتْرَجَة عديمة الرَّائحة، ومن مادَّة بِلُوريّة، لها صفات وهي مادَّة سائلة صَفراء اللَّون، تِبْنِية الرَّائحة، ومن مادّة بِلُوريّة، لها صفات الفيتوستارول. ومن المُركِّبات مادّة الفيتوستارول. ومن المُركِّبات مادّة حاصِف سِيروتيك.

الخصائص - عناصر حشيشة النَّتاق مُضادَّة لداء الحَفَر، مُلَعِّبَة، مُرْضِبَة Sialagogue، ضُراسِيَّة (نافع لوجع الأسنان).

الاستعمال - دَاء الحَفَر، وَجَعِ الأسنان، ضَعف اللِّئَة، فَقْد الرِّيق.

طريقة الاستعمال - تُؤكّل الأوراق الفَتِيّة الطَّرِيّة في السَّلَطة. يَدخل هذا النَّبات، كمضاد قويّ لداء الحَفَر، في تحضير بعض الأطباق المَدَغَشْقَريَّة.

إستعمال الشاي. وهو نبات يُزرع للزِّينة في لبنان، حيث يبدو أنّه لا يزهر أبدًا.

المُركِّبات - زيت دهني يحتوي خاصة حتى ٨٥٪ من السيترال.

الخصائص - منبّهة للمعدة، مطهّرة، منظّمة للعصّب المُبْهَم السَّمْپتاوي، مُدرّة للحليب؛ من الخارج مبيدة للطفيليّات.

الاستعمال الداخلي - كسل المعدة، عسر الهضم، إلتهاب المعى، إلتهاب القولون، كسل العَصَب النَّبوتي، شَحَ الحليب، الخارجي: تَقَمُّل.

طريقة الاستعمال – يؤخذ من الزَّيت الطيار ٣ إلى ٤ نقاط مع العسل أو في محلول كحولي، ٢ أو ٣ مرات في اليوم. لم تُذكر أية استعمالات للأوراق.

ملاحظة - يَشِحّ الكلام عن هذا النّبات في الكتب الطبّية، وتقلّ التفاصيل أو تغيب، ربما للدلالة على «حذر ما» يخالج المؤلّفين ذوي الخبرة والاختصاص من التّشجيع في استعماله بكثرة؛ وبينما نلاحظ الغموض الذي يلفّ هذا النّبات الذكيّ الرّائحة في لبنان من حيث الهوية النّباتيّة والخصائص الطبّية، نَرى من جهة ثانية، شيوع استعماله الشّعبيّ عندنا، أقلّه في بعض المناطق، وبشكل لا يبرره، في ظنّنا، المناطق، وبشكل لا يبرره، في ظنّنا، سوى التلذّذ بالعرف الذكي الفوّاح الذي المنزل. وبالتالي، نُذكّر بعدم الخلط بين حشيشة اللّيمون وبين نَبات يشبهه هو عود الوَجّ.

Lavements, Clystères,	٩٢- حُقَن
Enègmes (F)	

	٤٥ - حقنة طاردة للحتى
۰٫۷٥ غ	سولفات الكينا
٤ نقاط	لودائم روسو
١٢٥غ	ماء الخس المقطر
	الكمية لربع حقنة.
	٤٦ - حقنة جيلاتينية
١٥	جيلاتين شائع
٥٠٠ غ	ماء
	نحلّ على الساخن.

	٤٧ - حقنة مُغَلْسَرَة
٤٠ إلى ٦٠ غ	غليشرين متعادل
	ماء

	٤٨ - حقَّنة زيتية
۱ عدد	حقنة مليّنة
٠٦٠ غ	زيت أبيض
۶	٤٩ - حقنة زيت الخرو

							•	-	_							
غ	٥	٠		 	٠.	 		٠.		 	 		 ع	خرو	-	زيت
غ	٣		٠	 		 				 	 		 زة	خبي	از	نقيع

عادية سلفًا.

١٠ إلى ٢٠ نقطة	صبغة اليود
وم ١ إلى ٢ غ	يودور البوتاسيم
۲۰۰ إلى ۲۵۰غ	ماءماء
نيريا المزمنة. تعطى حقنة	ضدّ الديست

ح ش ي صبغة كُحوليّة لمعالجة وَجَع الأسنان، نُحضِّرها كما يلي:

أوراق حشيشة النَّتاق ٤٠ غ	غ
أُوراق الرَّاسَن inula bifrons ١٠ غ	غ
حشيشة الحُمّى ١٦ غ	غ
كحول ٨٦ درجة٨٠ غ	غ
نُقَطِّع كَافَّة الموادّ المذكورة، وِنَنقعِها	
في الكحول لمدَّة ١٥ يومًا. نُصفِّي	ي
ونعصر. إن هذا المُستحضر كان يُباع	_
في الماضي لمعالجة آلام الأسنان بإسم	•
. Paraguay-Roux	

نُبَلِّل قطنة صغيرة أو صُوفان بالمُستحضر، وندخلها في السن المُتَسَوِّسَة، أو نضيف عدَّة نِقاط منه إلى كوب من الماء، نَتَغَرْغَر به عِدّة مَرّات.

تَركيبة أخرى:

۲۰۰غ	أوراق حشيشة النّتاق
١٠٠غ	حَشيشة الحُمّى
٤٠٠ع	كحول ۹۰ درجة
	نَنقع الأعشاب المُقطَّعة بالكحو
تاريخ .	ثلاثة أيّام، ونُصفّي. مُستحضَر للن

مُلاحظة - إن طَعْم حَشيشة النَّتاق القَويّ جدًّا، الحارق، الخاصّ بها، يَجعل منها خضارًا أُقَلّ جودة من قرّة العَيْن. ولكنّها تُعتَبَر مُضادًّا قَويًّا لداء الحَفَر. تُرغبُ جدًّا ﴿ يُو فى المناطق الاستوائيّة، ومن هذه الزّاوية م على الأخصّ. راجع أيضًا بحث: أَنْحَدَّتَة .

٩٣ - حَلْحَلِ أَشْعَرِ، يُلْيُوسِ أَشْعَرِ، حَلْحَل أَزَب، بُلْبُوس الكَلْب، بَصل صمغ، موادّ سُكَّريّة، أملاح معدِنيّة. الزِّيْز، بَصَل المِسْك، سِلَّيْتَة، بَصَلَ الدِّيْدِ (۱) الدِّئْد (۱)

> Fair-haired hyacinth, Tassel hyacinth **(E)**

Muscari chevelu, Muscari à toupet, Jacinth à toupet, Ail à toupet, Lilas de terre, Vaciet (F)

Schopfmusk (D)

Muscari comosum, Hyacinthus Comosus, Muscari longissimum (S)

نَمات صغير مُعمّر من فصيلة الزَّنْبَقيّات، بصلته من ٢ إلى ٤ سم، بنيّة الغلافات. أوراقه ضُمِّية، لحميّة، عريضة الشَّكل السِّنانيّ، مُروَّسة، يبلغ عرضها ٢٢ ملم أحبانًا، هوامشها مُهدَّية صغيرة الأسنان. ساقها هزيلة، أسطوانيّة تعلو ٣٠ إلى ٧٠ حمّام زيزفون سم. إزهرارها في عُنقود مُرتخ طوله ١٠ إلى ٣٠ سم. الأزهار المُخفِقة عديدة، مُتراصة، سُويقاتها أطول من سُويقات الأزهار المُخصة، باهتة اللَّون الأزرق. الأزهار المُخصبة ذات سُويقات متفاوتة الطُّول، قصيرة جدًّا، أو تبلغ وتَتَخطَّى السنتمتر الواحد، بُنَّة اللَّون أو مُخضرة أحيانًا، طولها ٤-٦ ملم، مستديرة أو شبه مقطومة القاعدة. عُلسة شبه كُرويّة ثُلاثيّة الصَّفحات، طولها وعرضها متساويان، مستديرة وغير منفرجة الرّأس. يزهر من آذار إلى حزيران في الحقول والمراعى

(١) التَّسمية الأولى والثانية للمؤلِّف.

المركّبات - في البصلة لُعاب، عَفْص، حم ا

الخصائص - مُبوِّل، مُليِّن.

الاستعمال - نقيع، لصوق. بصل الحلحل يُؤكل مطبوخًا بسبب طعمه المُرّ. وإذا هُرِست توضع لصوقًا على البشرة المُحمرَّة. وبشكل عام نحصل من هذا البصل على تأثيرات البصل الزِّراعي ذاتها، خاصة في ما يتعلَّق بالخصائص المبوّلة. البصلة قد تُحفظ في الخَل فتفقد بذلك الكثير من جوهرها المُرّ .

٩٤ - حَمّامات Bains (F)

Bain de tilleul (F)

نقاعة ٥٠٠ غرامًا من أزهار الزيزفون في الماء الغالي، نصفيها بالقماش ومن ثم نضيفها إلى ماء الحمّام.

حَمَّام ضد الجَرَب (بيطري) Bain antigaleux (vétérinaire) (F)

۲۰ کلغ	كرازِيل
۱ کلغ	أنَّهيدريد زَرْنيخيِّ
۱۰ کلغ	پُوليسُولفور البوتاس
۱۰ کلغ	كربونات الصوديوم
J 1 · · ·	ماء

حَمَّام فعَّال ضِدَّ الجَرَبِ وفَعَّال أيضًا ضد القُراد.

المفاصل.

	حمّام مُنشّط
٠٦٠غ	أَنارِف أي أُنْجَبار
۸۱ غ	ناردین
۸۱ غ	بيلسان
۸۱ غ	بابونج
٠٠٥٠ غ	ماء غال

ننقع لمدّة ١٠ دقائق، نسكب الكل في ماء الحمام ونضيف:

حامض أستيك ماء حياة/ قنديد

الانتباه إلى سَكْب المزيج الأخير على ثلاث دُفعات يفصلها ربع ساعة كل مرة، وحتى يشعر المريض بحرارة مستحبّة. في معالجة التيفُوس أي الحُمّى الصفراء.

۹۰ - حُمَّيض منفرج الوَرَق (۱) sauvage, Parolle, Rhubarbe sauvage **(F)**

Rumex obtusifolius (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة البَطْبَاطِيَّات يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه الزَّهريّة خشنة، قوية، مضلّعة، مُحمرَّة اللّون؛ أوراقه السُّفلي مُتبادلة، مُعنَّقة، عروقه الوَسطيّة مُحْمرَّة اللُّون، يَبضويَّة، قَليتة: أزهارها مخضرة اللُّون، زناداتها خَيضية الشَّكل، دُوّاريّة التَّرتيب، سُنبليّة التَّجميع، ٣ كأسيات ضيِّقة، مُنبسِطة، ٣

للخُواريف فقط.

حَمَّام مُنَشْدَر حَدِيدِيّ Bain ammoniaté ferrugineux (F)

١٥ غ	كلورهيدرات الأمونياك
٠٥٠ خ	كلورور الحديد
كمّيَّة كافية	ماء

يؤخذ ضدَّ الكُساح والخَرَع وتَعقُّد ﴿١) النَّسمية للمؤلِّف.

حمّام مُصرِّف، حمّال حالّ Bain résolutif (F)

۸۰ غ		كبريت
۲۰ غ		ملح بحريملح
۱۵ غ	(11)	كربونات الصوديوم
كمشة	۱ إلى ۲	مريمية (كمشة)
J٦		ماء

في حمامات، لوسيونات، رَشّاشات (دوش)، في العِقْدَة الخنازيرية أي السَّلَعَة وفي الشَّوْك المنفوخ -Spina . ventosa

حَمّام مضاد للطُّفَيْليّات بالنيكوتين Bain antiparasitaire à la nicotine (F)

عصير تَبْغ بنسبة ١٥غ ۱۰۰غ نيكوتين في اللّيتر 11...

إن عصير التَّبغ يُعيِّر بين ٨ و٢٠غ من النِّيكوتين في اللِّيتر، ومن المناسب تَعديل كمِّيَّة العَصير التَّبغي في المحلول بحيث يُصبح عِيار النِّيكوتين ١٫٥ في الألف. عدم مُعالجة الحيوانات التي يُوجد على جلدها بَرزات أو زوائد فُطريّة. يُحْتَفظ به

كأسيّات مُنلَّنة، مُطرَّزة بمصاريع منها مِصراع أو مصراعين مُزوَّدان بحُبَيْبَة، ٦ أسدية، ٣ أقلام ذات سِمات؛ الشَّمرة مُثلَّنة الزَّوايا، ذات بزرة واحدة محميّة المصاريع؛ الجذر غليظ، خشن، بُنيِّ اللَّون، مقطّعة أصفر. الرّائحة حامزة؛ الطَّعم مُرَّ وحامز.

الأقسام المُستعملة الأوراق العصير الطّازج الجذور المجفَّفة التي تُنظَّف من دون غسيل.

المُركِّبات - مُركَّب من الحديد والفوسفور، مواد عَفْصَانيّة، غلوكوسيدات.

الخصائص - مُضاد لفَقْر الدم، قابض، منتًى، مُبوّل، مُسهّل، مقوّد.

الاستعمال - فقر الدم، يَرقان، إمساك، علاج ربيعي، أمراض جلديّة (قوباء)، كُباد، قرحات الساق.

طريقة الاستعمال - قريب الحميض الزِّراعي أي الحُمَّيْضَة؛ طعمه خالٍ من الحموضة ولكنّه مُرَّ جدًّا. مُركِّباته فعّالة عمومًا، ولكنّها لا تؤثِّر إلّا بعد فترة طويلة.

لمعالجة فقر الدم يؤخذ نقيع الحميض يُوميًا، أو غرامان من مسحوق الجذر ممزوجان مع العسل أو برشام بسبب الطَّعم الشَّديد المرارة؛ في الإمساك يُؤكل الحميض الغَضّ؛ في القُوباء والأمراض الجلديّة يؤخذ لمدّة أسبوع،

٣ فناجين يوميًّا من نقيع ٢٥ غرام من الجذر المجفَّف المُقطَّع في ليتر ماء يغلى دقيقتين ويغطّى ١٥، وذلك بهدف دعم العلاج الخارجيّ للقوباء؛ للكبد، ٣ فناجين يوميًّا، واحد منها على الريق، من نقيع ٢٠ غرام جذور في ليتر ماء يغلى ٥ دقائق ويغطّى عشرة؛ أما على قرحات الساق فنضع لصوقات من الجذر الغض المهروس. في معالجة البشرة يؤخذ طوال المهروس. في معالجة البشرة يؤخذ طوال غرام جذور في ليتر ماء يغلى ■ دقائق غرام جذور في ليتر ماء يغلى ■ دقائق ويغطّى بعض الوقت.

كان ما يُجْمَع في الماضي من الحميض الشَّلَبي يُنْسَب دائمًا إلى الحميض المنفرج الورق.

رغْلِيل رَغْلِيل – عَوْذَان شِرِّير ، حَوْذَان شَقِيّ ، زِغْلِيل Celery leaved crowfoot, Water الفِسْق Celery, Marsh crowfoot (E)
Renoncule scélérate (F)
Gifthahnenfuss (D)
Ranunculus Sceleratus (S)

نبات حَوْلِيّ من فصيلة الحَوْذانِيَّات. جذوره مبيضًة اللَّون، هزيلة. وهو نبات أمْرَط أو قليل الزغب، فاتح اللَّون الأخضر، وحيد الساق في غالب الأحيان. ساقه مُنتصِبة تعلو من ١٥ إلى ١٠ سم، غليظة، ناسوريّة، فَرْعاء جدًّا، فروعها مُنتصِبة. أوراقه الجذريّة ضُميّة، طويلة العنق كما الأوراق السَّاقيّة

ح و ذ

ح ي ا

الشّفلي، وهي مَرْطاء، كلويّة النَّصل، راحيّة التَّفصيص أو التَّقسيم إلى ٣ أو ٥ سَكَمات خفيفة التَّفصيص. الأوراق العُليا قصيرة العنق أو لاطئة، سَكَماتها أقل تقطيعًا أو حتى كاملة. أزهار عديدة جدًّا، صغيرة، قطرها ٥ إلى ٦ ملم. كأسيّات منبسطة ومن ثم مَلْوِيَّة إلى الوراء، بَيضويّة الشَّكل. البتلات كبريتيّة اللّون الأصفر. أكنات صغيرة جدًّا وعديدة جدًّا، بَيضانيّة، مضغوطة، ذات منقار جانبيّ، تُشكِّل سُنبلة بَيضانيّة منقار جانبيّ، تُشكِّل سُنبلة بَيضانيّة الشَّكل.

أطلب المركبات والخصائص والاستعمال في دراسة أحادية خاصة.

۹۷ - حَيّ العالَم المِكْرَار، حَيُّون مِكْرَار، وِدْنَة مِكْرَارَة - Orpine, Livelong, Mid Summer men (E)

Sédum reprise, Orpin reprise, Grand orpin, Herbe à la coupure, Joubarbe des vignes, Sédum télèphe (F)

Grosse Fetthenne, Rote bergfetthenne
(D)

Sedum telephium, Sedum purpureum, Sedum Vulgare (S)

نَبات مُعمَّر من فصِيلة المُخَلَّدات يَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقُه مُنتصِبة، قاسية، مَرْطاء، قليلة الفُروع. أوراقُه مُتقابلة، مُتعاقبة أو دَوَّارِيّة، وهي لاطئة، مُسَطَّحة، لُبابِيَّة، شَحيمة، بَيضويّة الشَّكل، رَخْوة التَّسَنُّن. أَزهاره

إلى اللّون الأرجوانيّ، أو الأبيض، أو الأصفر الفُسْتُقيّ، أو الوَرديّ (حسب الضُّروب)، وهي عِذقيّة التَّجميع، خُماسيّة الكأسِيّات القصيرة، خُماسِيّات البَتَلات، عُشاريَّة الأسْدِية. خمس كرابل. بزور صغيرة. ريزوم قويّ، قصير. الجذور سميكة. رائحة معدومة. الطَّعم حُلو في الأوراق وحامز في الجذور.

المُركِّبات - أملاح مَعدِنيَّة، تَلافيوسيد، عَفْص، لُعاب، سكاكر.

الخصائص - قابضة، مُنظِّفة، مُليِّنة، شافية للجرح، مُنعِشة، مُبوِّلة، هاضمة.

الاستعمال - العصير الطّازج، كل أقسام النّبات المُجفّف، الأوراق الغَضَّة أو المحفوظة في الزّيت (تجفيفُها صعب). حرق، جُسْأَة، تَكَلْكُل، رَضَّة، كدمة، ثَفَن، عُسُوّ، قُوباء، فِلْع، صَدْع، شَقّ، بَواسير، ثُؤلول، قُرحة.

طريقة الاستعمال - نَضِع على الحروق لَصوقًا من الأوراق الغَضَّة المَمْروثة في الزَّيت، عِدّة مَرّات في اليوم، نُكرِّر اللَّصوق حتى اختفاء الثَّفَن؛ وعلى القُوبَة عصير النَّبات الطّازج يُضاف إلى مِقدار مرّتين وزنه من الماء؛ ونَدهَن الفِلْع والصَّدْع والشَّق، عند النَّوم، بأوراق النَّبات المَمروثة في زيت الزَّيتون؛ وعلى البَواسير لَصُوق الأوراق المَمروثة في زيت الرَّيتون، وعلى قرحات المَمروثة في قرحات

البَشرة المحيطة بالثَّولول.

٩٨- حَيّ العَالَم الوَرْدِيّ، حَيّون وَرْدِي Joubarbe rose, Orpin rose, Rhodiole **(F)**

Sedum roseum, Sedum rhodiola, Rhodiola rosea (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة المُخَلَّدَات يَعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم، أرومته عَطِرة، من دون فسائل عقيمة؛ سوقه مُنتصِبة،

البَشَرة، لصوقًا من الأوراق عينها. أمّا مَرْطاء، بحريّة اللَّون، مورقة جدًّا. حي ا على الثَّؤلول فتُمْعَس الأوراق الغَضَّة أوراقه متقاربة، بَيضويَّة الشَّكل السِّنانيّ، حتى اختفائه، مع وجوب الحفاظ على مُستدِقّة الطَّرف، لاطئة، مُسنَّنة في قسمُها العُلويّ. أزهاره ثُنائيّة المَسْكِن، مُحمرّة اللُّون الأخضر، عِذْقية التَّجميع المُتَراصِّ؛ أربع كأسيات؛ ثمان أسدية بارزة؛ أربع كرابل. جبلي. عَدو الكلس.

> ملاحظة - أربع نَباتات تَنتمي إلى فصيلة المُخَلَّدات وتُسمّى خَلُّود أو عَمِيْر، تذكرها الفرماكوبيات الأجنبية المُختلفة كأنواع طبِّيَّة، منها الخَلُّود الورديِّ.

خ

Mauve alcée, Alcée خُبَّازَة خُطْمِيَّة -٩٩ (F)

Malva alcea (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة الخُبَّازِيَّات يَعلو حتى المتر. حَمْلُه مُستَرْخ، أوراقُه كَفِّية مُشَرَّمة الأقسام، خضراء اللَّون الفاتح، خَمْلِيَّة الكساء. أزهاره وَرديّة اللَّون الأرجوانيّ الباهت، قطرها ٥ سم، الأرجوانيّ الباهت، قطرها ٥ سم، السُّفلي منها إبطيّة مُنفرِدة، العُليا مجموعة بباقات إبطيّة وهامِيّة. إزهراره صَيفيّ.

المُركِّبات - مَوادَّ لُعابِيّة.

الخصائص - مُسكِّنة لَلجهاز التَّنَفُسيّ، مُلَيِّنة، مُسهِّلَة؛ من الخارج مُلطَّفة للبَشَرة وفَعَالة في علاج الإلتهابات التي تُصيب كافّة التَّجاويف الجَسديّة الخارجيّة.

الاستعمال - إصابات الجهاز التَّنَفُّسيّ، إصابات الشُّعَب، إمساك، إلتهاب المِعَى، مغص الأمعاء، البَشرة، الفَمّ، اللَّنَّة، اللِّسان.

طريقة الاستعمال - نُقاعة الأزهار في الماء المَغليّ، تُحلِّى بالعَسَل ويُؤخَذ منها كا فناجين في اليوم وفي إصابات الجهاز التَّنَفُّسيّ. نَقيع الأزهار المجفَّفة يُغلى ٥

دقائق ويُؤخذ منه فنجان في اليوم للإصابات الشَّعَبيّة، أو صباحًا على الرّيق في مُعالجة الإمساك. تَصلح النُّقاعة من الخارج لغَسْل البَشرة المُحمَّرة والمُلتَهِبة ، ولغسل تجويف الفَمّ في علاج الالتهابات التي تصيب الفَمّ واللَّقة واللَّمة واللَّمة واللَّمة .

١٠٠- خَرْبَق أَخْضَر(١)

Green hellebore (E)

Ellébore vert, Ellébore à fleurs vertes (F)

Grüner nieswurz (D)

Helleborus viridis (S)

نَبات طبِّي تَزييني مُعمَّر من فَصيلة الشَّقِيقيَّات يَعلو حوالى ٤٥ سم. أوراقُه قُرصيَّة التَّجميع تَنْشرِم عن ٩ إلى ١١ وُريقة مُستطيلة، نَصلُها مالس البشرة، قاتم اللَّون البَحري. ساقُه شِمراخيّة تَحمل من ٣ إلى ٥ زهرات كبيرة القَدّ، زاهية اللَّون الأخضر، خالية من العُرْف. يَنبت في الأحراج القريبة من الغُرف. يَنبت في الأحراج القريبة من الغُرواحي الباريسيّة حيث يُعثر عليه مع الخَرْبَو النَّجِس. إزهراره من آذار إلى أيار.

المُركِّبات - يحتوي على خَرْبَقين أي أخضر أي ألابُورِين وعلى خَرْبُوقين أي قيراترين.

الخصائص - مُجِّد في الماضي في

(١) التَّسمة الإنكليزية والألمانية للمؤلِّف.

يُستعمل طبيًّا استعمال الخَرْبَق الأسود إِلَّا أَنَّهِ أَخْصَب مادَّة وأشَدّ مفعولًا.

١٠١ - خَرْبَق الشَّرْق، خَرْبَق مَخْزَنِيّ Oriental hellebore (E) Ellébore d'Orient, Ellébore officinal **(F)** Orientalische nieswurz (D) Helleborus orientalis, Helleborus officinalis (S)

نَبات طبِّي تَزييني من فَصيلة الشَّقِيقِيَّات يَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه قرصيَّة التَّجميع، دائمة، مَرْطاء أو مُوبرة، الجَذريّة منها كبيرة جدًّا تَطول حتى ٤٠ سم، دَوَّاسِيَّة الشَّكل، تَنقسم من ٥ إلى ١١ وُريقة. الشِّمراخ الزَّهريّ مُورق، قصير القُنيبات، يَحمل من ١ إلى ٤ زهرات تبدأ زبديّة اللُّون ومن ثم تميل إلى الأخضر المُصفَر البُنِّي المواج. الكأس من ٦ كأسيّات بَتلانيّة بَيضويّة الشَّكل. البَّتلات مُختَصَرة إلى بُوَيْقات صغيرة أقصر بكثير من الأسدية العديدة الملوَّنة. الثَّمرة جرابيّة. البزرة سوداء اللُّون اللَّامع. أشكاله الجُغرافيَّة عديدة. مهده اليونان وآسيا الصُّغرى. يُزهر من شباط إلى نبسان.

الخصائص - يَعتقِد الخُبراء أن خَرْبَق الشَّرق هو النَّوع الذي كان القُدامي يستعملون منه قشرة الريزوم لمعالجة

معالجة الأمراض الجلديّة. وذُكر أنه الأمراض العَقْليّة، وهو نوع كان ينبت خ ر ب بشكل أساسيّ في ضواحي Anticyre في اليونان، كما أنه النَّوع الوحيد الذي صادفه تُورنفُور في رحلاته إلى الشَّرق.

> ١٠٢ - خَرْبَق مُنَفِّط ، خَرْبَق أَمْرَط (٢) Blister hellebore, Vesicatory hellebore (E) Ellébore vésicant, Hellébore vésicant **(F)**

Blasenzichend nieswurz (D) Helleborus vesicarius (S)

نَياتِ مُعمَّر مِن قَسلة الخَرْبَقتاتِ وفَصلة الشَّقِيقيّات، يَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم، أَمْرَط جِدًّا، غالبًا ما يكون مُتعدِّد السّوق. أوراقه القاعديّة واسعة، ثُلاثيّة التَّشريح، شُدفاتها صغيرة العُنَيقات ومُقسَّمة إلى سُيور سِنانيّة. أوراقه الزّهْريّة لاطئة، مُشرَّمة، ثُلاثية - خُماسيّة الأقسام. أزهاره صغيرة القدّ، جَرسيّة الشَّكل، خضراء اللُّون، غالبًا ما تَتَموَّج بالأرجواني. كأسيّاتها مُنفرجة جدًّا، طولها حوالي ١,٥سم. مثابرها خالية من النُّتوء، سَرْحَة. كرابلها شبه دائريّة، مُستديرة الرّأس. يُزهر في المناطق الحُرجيّة من شباط إلى أواخر نيسان.

الخصائص - نَبات سامٌ يكثر في بعض الجبال السُّوريّة المتوسِّطة الارتفاع عامّة وفوق سلنفة وكسّاب بنوع خاص. مُركّباته قد تكون مُخدِّرة ومُسهِّلة، كما قد تكون

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

خ ش ب مُميتة بجرعة قويّة. من المفيد جدًّا تحليل يُعتبر دواء مقوٍّ وعَقُول، وكان يُحضُّر منه هذا النُّوع للوقوف على ما يحويه من الخُرْبَقين وسواه.

> ١٠٣ - خَشَب Wood (E) Bois (F) Holz (D)

إن الأخشاب التي كانت في الماضي خَشَب الحَفِث أو الحِفْث(١) تُستعمل في التَّداوي عديدة جدًّا، ولكن عددها تراجع اليوم كثيرًا. نذكر منها الأخشاب التالية:

بَقَم أَسْوَد Bois de Campêche (F)

نبات من فصيلة القرنيّات إسمه العلمي ، Hæmatoxylum campechianum في كمپاش وهي مدينة تقع في جنوب المكسيك، وتنبت في الجماييك. خشبه أحمر أَدْكَن من خشب الألوة وأكْمَد منه؛ حَطَبَاتِهِ المقشَّرةِ وغيرِ المنتظمة تُعطى في الغالب بَعضًا من الشَّكِيْرِ الأبيض. يَجِب أن تكون مُحمرَّة اللَّون الخارجيّ وبُرتقاليّة اللُّون الدّاخلي .

المُركِّبات - إكتشف شَقْرُويْل في هذا الخشب جوهرًا عِطريًا هو الهيماتين أو الهيماتوكسيلين Hématine, Hématoxyline. يُستخدَم في الأعمال الفَنِّية للصِّباغ بالأسود والرَّمادي والبَنَفسجيّ والأزرق والقِرمِزيّ، وهي ألوان قليلة الصّلابة؛ ويَدخل كذلك في عدد كبير من الألوان المُركَّبة.

الخصائص والاسعمال - في الطبّ

مياه مُقطَّرة (٥٠٠ بالألف)، ومُستخلَّص (من ١ إلى ٢٠)، ونبيذ؛ وكان أساسًا لدواء عَسَلت. أنه يُلوِّن البَوْل بالأحمر. الاستعمال العِلاجيّ لتلك المادّة مُحدود جدًا. استعملت أحيانًا كدواء عَقول ومُضادّ للإسهال.

Bois de couleuvre (F)

يُوجِد منه عِدَّة أصناف؛ ولكن يبدو أن الصِّنف الطبِّيِّ منها هو جذر الستريكنوس الحِفْثِيّ (۱) Strychnos colubrina من فصيلة اللّوغانيات. وهو جذر يأتي من المولوك، ثقيل الوزن، عديم اللُّون؛ أليافُه حريريّة؛ مُجِّد في الماضي ضِدّ نَهْش الأفاعي والحيوانات السّامّة وفي معالجة الحُمَّيات. وهو غير مُستعمل اليوم.

خَشَب رُودِس (١) Bois de Rhodes (F)

هو خشب أعْقَد، متلوًّ، ثقيل الوزن، طبقاته مُتراكِزَة بشكل مُتراص، لونه إلى الأصفر المُشقر القاتم المحيط؛ قِشرتُه رَماديَّة اللُّون، خَشِنة جدًّا؛ رائحته رائحة الورد المُستحبَّة جدًّا. ومن المعلوم اليوم أن هذا الخشب يحصل من نوعين من اللَّبُلاب المتَشجَّر في جُزر الكناري. Convolvulus florida : ______________ Convolvulus scoparius ، وكلاهما من

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

فصيلة المَحْموديّات. وهو الخشب الذي كان في الحقيقة خشب رودس عند الصّيادِلة والعَطّارين، ولكنه ليس هو ذاته خشب صانعي الأثاث الذي يحمل الاسم ذاته.

Bois (۱) خَشَب الأَلْوَة (۲) طُشُب الأَلْوة (۲) d'aloès (F)

ينتج خشب الألوة الحقيقي من نبات من فصيلة القَرْنيَّات إسمه العلمي Aloexylon فصيلة القرْنيَّات إسمه العلمي agallochum أغَلُوشا»، أو ألوة أغَلُوشا الخَشبيّة)، وهو خشب يأتي من الكُوشَنْشِين.

يكون خشب الألوة التجاري مائلًا إلى اللَّون البُنِّي على وجهه، وعَقِدًا جدًّا في بعض الأحيان. إذا نُشِر يكون مَقطعه مالسًا، راتنجيًّا، ومنقَّشًا بنقط صغيرة بيضاء. رائحته عِطريّة وراتِنجيّة.

خَشَب الوَرْد Bois de rose (F)

في مناطق الغِيّان، وفي شمال البرازيل عِدَّة أشجار تَنتمي إلى جنس "أوكُوتِيا" تُعطي ما يُسمّى به "أخشاب الوَرْد". وهو جنس من فصيلة الغاريّات يَضم عددًا كبيرًا من الأشجار والشُّجيرات ذات الأوراق الرِّيشيّة، المتبادلة، وذات الأزهار الصّغيرة القَدّ، العُثكوليّة التَّجميع الإبطيّة الارتكاز.

إن خشب الورد الذَّكريّ يَتحلَّى برائحة

اللَّيمون أو البَرْغَموت؛ ويُستخدم على خ ش خ الأكثر في صُنع الأثاث. أما خشب البورد الأنشَوي، وهو الأكثر جودة واعتبارًا، فينسب إلى النوع Ocotea واعتبارًا، فينسب إلى النوع caudata أوكُوتِيا مُذَنَّبة (٢٠)؛ يُعطي دهنا يُقال له «دهن اللّينالول»، وهو اسم تَشترك فيه أدهان تحصل من فصائل نباتية مُختلِفة؛ يُجمع الخشبُ في قِطع قُطرها من ٥ إلى ١٠ سم، قُشورها مُحمرة اللّون من ٥ إلى ١٠ سم، قُشورها مُحمرة اللّون البُنِّي؛ المركِّب الأساسيّ الطّاغي في دُهن البُنِّي؛ المركِّب الأساسيّ الطّاغي في مرغوب في صناعة العُطور. أما بالنسبة مرغوب في صناعة العُطور. أما بالنسبة في مواقعها.

Lebanon (۳) خَشْخَاش لُبْنَان – ۱۰٤ poppy (E) Coquelicot du Liban (F) Libanon mohn (D) Papaver libanoticum (S)

نبات محول أو معمّر من فصيلة الخشخاشيات. جذره متليّف. سوقه عديدة، نائمة أو صاعدة، أحيانًا له ساق واحدة منتصبة وفرعاء تعلو من ٥ إلى ٣٠ سم. أوراق النماذج العديدة السوق تكون قوية التجميع نحو العنق Collet، وأوراق النماذج الوحيدة الساق تكون عديدة على الساق. الأعناق متمدّدة القاعدة، كثيرة الأهداب والحرائر البيضاء المنتصبة

⁽١) التَّسميتان العربيّتان للمؤلّف.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) كلّ التَّسميات ما عدا اللّاتينيّة للمؤلّف.

خ ل و

سكمات مفصصة بدورها. مجموع منعشة للبشرة. الأوراق باهت اللون الأخضر الذي يميل إلى اللون البحري. السوق متلوية دقيقة، لاصقة الحرائر المتفرّقة. البتلات معبلة، باهتة اللون الأحمر الشمس والطَّفْح الوَرْدِي. البرتقالي المواج، غير ملطّخة بالأسود. العُليبة مسودة اللون الأزرق، مُتطاولة، مخفَّفة الطرفين، تكلَّلها أسطوانة ضيَّقة، مخروطية. العليبة الناضجة تنفتح بأربعة مصاريع. نبات محصور في لبنان، ازهراره صيفي في الجبال العالية.

> ١٠٥- خَلُوْد عَنْكَبُوْتِي، عَمِيْر عَنْكَبُوْتِي Jupiter's beard (E) Joubarbe Toile d'Araignée (F) Hauswurz (D) Sempervivum arachnoideum (S)

> نَبات صغير مُنتصِب مُعمَّر من فصيلة المُخَلَّدَات يَعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه بَيضية مُنعكِسة، مُستطيلة، ضُمِّتة التَّجميع، شبه حادّة الرّأس، غِدِّيّة، مكسوة بأؤبار بيضاء متصالبة فيما بينها كنَسْج العنكبوت. أزهاره عِذقيّة التَّجميع، بَتَلاتها ١٢، مَرْطاء، سِنانيّة، وَرديَّة اللُّون القِرمزيّ البَنَفسجِيّ المُواجِ. يرغب الحجارة والصخور.

> المُرَكِّبات - لعاب، عَفْص، حامض نَمْلي، مَالَات malates.

الخصائص - مُلبِّنة، مزيلة للثَّفَن

الطويلة. نصل الورقة ريشي التقسيم إلى والثؤلول، مُسكِّنة، رقوءة، عينيَّة،

الاستعمال - دمامل، رُعاف، نزيف، جروح، ألم الأسنان، التهابات الأذن، ثَفَن، ثؤلول، حمرة البشرة، إحمرارات

طرق الاستعمال - الأوراق المدقوقة توضع على الدَّمامل فتعجُّل في إنضاجها. العصير الطازج المُستنشَق يوقف الرُّعاف، ونزف الجرح. لَوْك الأوراق له مفعول مزيل للألم للأسنان. العصير الفاتر، يُقطر في الأذن، فعّال في معالجة إلتهاباتها. الأوراق المنقوعة في الخَلّ توضع على الثفن والثؤلول حتى تشفيها. لُّبِّ النبات يصلح قِناعات منعشة للبشرات المحمرة والطُّفْح الوردي المتسبّب عن الشمس.

١٠٦- خِيَارِ الأَنْتِيلِ، خِيَارِ الكُورْنِيشُونِ، كُورْنِيشُون، قَاوُون هِنْدِي(١)

Beergherkin, West indian gherkin **(E)**

Concombre des Antilles, Concmbrecornichon, Concombre marron, Cornichon, Angurie, Anguria (F)

Birngurke, Anguriengurke (D)

Cucumis anguria (S)

نَبات حَولي من فَصيلة القَرْعِيّات. فُروعه مَدّادة أو عارشة بعض الشَّيء.

⁽١) التَّسميات العربة للمؤلِّف.

خ ي ا

ثماره تُحضَّر بطرق مُختلِفة، فإمَّا أن ثماره عديدة، مُضلَّعة القُشور، حجمها تُقطَف قبل اكتمالها، تُقَشَّر وتُحضَّر على غرار الفاصوليا الخضراء حيث تُشكّل طبقًا لذيذًا مُستحبًّا، وإمَّا تُكْبَس في الخل على غرار كل ما يُسمّى «كُورنيشُون»؛ والكورنيشون، أي خيار الكبيس، هو كل خيار من أي ضرب كان قُطِف باكرًا، قبل اكتمال بزره،

أوراقه راحية، ثُلاثيَّة الفُصوص والأغبر. المُستديرة، الثُّلاثية الفصوص بدورها. وشكلها كالبيضة، مُزركَشَة برؤوس ونُتوء خَشِنة صُلْبَة كما في ثمار القَسْطَل هِنديّ. يَنبت طوعيًّا في جميع مناطق الأنْتيل كما يُوجد في كافَّة مناطق أمريكا الجنوبيّة خاصّة في قِسمها الشّرقيّ حيث يُزرع غالبًا كالخضار. ضروبه عديدة منها الأخضر والأصفر والمجذّع والموشّم للأكل أو للكبيس.

۱۰۷ – دِرْیاس، دَرُوس، دَرْسَت، إِدْرِيَاس، ثَابْسِيا غَرْغَانُو (١٠) Drias plant, Smooth thapsia (E) Thapsie, Faux fenouil, Faux turbith, Panacée d'Esculape (F) Falsche turbith (D) Thapsia garganica (S)

نَبات بَرِّى خَشِن معمَّر من فصيلة الخَيْمِيَّات يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. كحول ٩٠ درجة أوراقه لامعة، ثلاثيّة التَّشريح الرّيشيّ وقويّة، مصفرّة اللُّون، قُلافتها معدومة أو عابلة. أكناته تساعيّة الأضلاع. وهو نبات يشيع بنوع خاص في الجزائر وصقلية والبلدان الحارة، عرفه تيوفراستُس، ديوسقوريدس، يلاينُس، وغالينوس. وهو يوجد بكثرة في شِناخ ٍ إسمه غَرْغَانُو Gargano يقع في جزيرة تَبْسُوس. جذره حامز جدًّا ومُرّ جدًّا، ويُستعمل أحيانًا كمسهِّل قويّ يحلّ محلّ نيات التُّويُد.

المركّبات - قشرة الجذر تحتوي على الحلول محل ثابْسِيا غَرْغَانُو.

(١) التَّسمات العربيّة للمؤلّف.

٢٠٪ من النشاء، ٥٪ راتنج رخو أصفر اللُّون، محمِّر جدًّا للبشرة (راتنج الدرياس، كودكس ١٩٣٧) اكتُشف عام ١٨٥٧. كذلك وُجد فيه حامض كَيْرِيليك، حامض كَيْرُويك، حامض أنْجليك، حامض إيزوناردينيك وثائسيك، كذلك فيه مادة متعادلة، غير أزوتية، منفّطة.

الاستعمال - يُستخدم هذا الراتنج لتحضير الغُرِيّاء، لَصْقة مُشمّعة، تَفْتات مُحمّرة للبشرة؛ وإذا سُيِّل بواسطة الكحول أو الزيت، توضع منه طبقات محمّرة بواسطة فرشاة صغيرة.

قشور مشرَّحة من جذر الدرياس

كميَّة مطلوبة

كمَّة كافية

نغسل قشر جذر الدرياس بالماء الفاتر الدَّقيق. أزهاره في خيمات مُركَّبة ونجفَّفه ونسحقه خشنًا. ننقعه على مرحلتين في الكحول الساخن في حمام مريم مغطّى. نُصَفِّق، نُصفّى ونُقطّر للحصول على الكحول: إن الفضالة هي راتنج الدرياس، ممزوجًا إلى كمية ما من الموادّ الغريبة، نغسل الفضالة عدّة مرات بالماء الساخن، وعندما لا يعود الماء يحلّ شيئًا، نبخر في حمام مريم حتى قوام المستخلص الرخو (دستور ١٨٨٤).

ملاحظة - يقول هَكُل أن الثَّابْسِيا المُوبِرَة (٢) Thapsia villosa L. يمكنها

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

Derris (E) دِرِّیْس – ۱۰۸ Derris, Deguélie (F) Derris, Deguelia (S)

يُشار باسم درّيس إلى جنس من فَصيلة القَرْنِيّات الفَراشِيَّة، قريب من أجناس الغُبَيْدة Lonchocarpus، والبِسِّيدِيا(۱) Pongamia (۱) والبُسْغَامِيَا(۱) Piscidia (دَلْبُرْجِيَة في غير مرجع)؛ ويَتمثَّل بعددٍ ما من أنواع المناطق الاستوائية.

في بلادها الأصليّة، يَستخدِم البَلديّون الدرّيس لإخبال الأسماك وتخديرها؛ ولقد تَمّ التَّحقُّق لاحقًا بأن تلك النَّباتات هي سامّة للحشرات، ولكنها شبه عديمة الضّرر للإنسان والحيوانات الدّاجنة. ومن هنا انتشر استعمالها المعروف، يومًا بعد يوم، كمبيدات للحشرات.

إن الأنواع الأكثر استعمالًا هي الدِّريْس الإهْلْيلجيّ D. elliptica، والدرّيس المَنْقَعِيّ D. Malaccensis، والدرّيس المَنْقَعِيّ D. uliginosa؛ وهي تنمو في الهند والشَّرق الأقصى، وفي بُورينو وسومَطرة بنوع خاص، حيث يُشار إلى جدورها بأسماء؛ Akar toeba بالماليزيّة، Tuba wortel بالهولَّنديّة، بالماليزيّة؛ المؤلِّفون بالأميركيّون يُطلقون غالبًا على جنس الأميركيّون يُطلقون غالبًا على جنس درّيس الاسم اللّاتيني Deguelia الذي المؤلِّفة المؤلِّفة عليها قديمًا Aublet. وقام بدراسة الدرّيس التَّشريحيَّة المؤلِّفة المؤلِّفة المؤلِّفة المؤلِّفة المؤلِّفة عليها قديمًا J. Maheu

خاص، ووجد في سوقها وجذورها دري خلايا مُنْتِجة للرّاتنج.

المُركِّبات - من الوجهة الكيميائيّة، إن المركِّب الأساسيّ من المُركِّبات الفَعّالة هو الرُّوتينون C₂₃H₂₂O₆ ، Roténone (٤ إلى ٨ بالمئة)، قابل للتبلّر، مُيّاسِر، يَتمتَّع بشكلين، واحد يَنصهر عند ١٦٣° سنغ، الثّاني عند ١٨٠° سنغ؛ وله مجموعتان مِيتوكْسِي وعمل لَكْتُون.

ويُوجد الرّوتينون كذلك في غُبَيْدة نيكُو (٢) Lonchocarpus Nicou من الغِبّان، وفي غُبَيْدَة ذَهَبِيّة الوَرَق (٢) لا غِبّان، وفي غُبَيْدَة ذَهَبِيّة الوَرَق (٢) لا الغِبّان، وفي بعض أنواع الديق (من القَرْنِيَات الفَراشِيَّة، مثال تَفْروزيا فُوجل (٢) T. vogelii ، تَفْروزيا كبيرة الوَرَق (٢) المتحدة الوَرَق (٢) المتحدة المتحدة

مُواصفات عامة – يُعرف جذر غُبَيْدة نِيكُو في أميركا باسم Cubé، كذلك بأسماء Barbasco، Timbos، إلخ؛ ويُطلق في سورينام على الغُبَيدة الذَّهبيَّة الوَرَق إسم Nekoe.

نظرًا للفائدة التي تُمثِّلها هذه المُبيدات

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

د ر ی

الحَشَريّة الجديدة، ومناجمها التي قد تصبح غير كافية، عمدت البلاد الاستوائية المناخ إلى زراعة تلك الأنواع وتكثيرها عن طريق العُقَل بالأفضلية. عام ١٩٣٤، صَدَّرت مناطق الهند النرلندية ١٤٣ طنًّا من الجذور. سِعْرها يُقدَّر حسب مضمونها من المُستخلَص الأثيري أو من الرُّوتينون. إن جذرًا من الصِّنف الجيِّد لدرّيس أو لـ Cubé يُعطى من ١٥ إلى ٢٠ بالمئة من المُركِّبات القابلة للَّوبان في الأثير، ومن وعلى حشرات فصيلة البراغيث. ٥ إلى ٨ بالمئة من الرّوتينون؛ إن جذر ال Nekoe هو أقلّ غِنّى، ولكنّه مع ذلك يُستعمل. واستنادًا إلى الأبحاث الحديثة، فإن الدريس المَنقِعيّ هو أدني بشكل واضِع من الدريس الإهليلجي والدرّيس المَلَقي وسواهما .

> بالنِّسبة لتقدير الكمِّية، يمكن الاستناد إلى مقدرة الرُّوتينون المُيَاسِرَة، أو اللَّجوء إلى استعمال الطُّرُق التَّحليليّة المِلْوَانِيّة Colorimétrie، أو كــذلــك إلــي وزن الروتينون المستخرج على التوالى بواسطة حالّات عُضويّة مُتعدِّدة (أثير، بنزان، كلوروفورم، تريكلور الأتيلان، تتراكلورور الكربون).

وبالإضافة إلى الرّوتينون، إن الأشكال الأخرى المُستعملَة هي مسحوق الجذر المُعَيَّر والمحلول مع مسحوق هَامِد كالطُّلُق وسواه، رَازِيْنَات(١) جذر

الدرّيس (Résinates: صابون غير قابل للذُّوبان، من الكلسيوم أو من الزنك؛ لَكّ)، مُستخلصات سائلة، إلخ. ويمكن كذلك تحضير مزيج مُعَلَّق من مسحوق الدريس في محلول مائي من الصابون عند الحاجة. إن مساحيق الدريس والغُبَيْدة يجب أن تُحفظ بمعزل عن الضُّوء والرَّطوبة في أوعية مُقفلَة تمامًا.

في كودكس ١٩٤٩ ذُكر مُستحلَب من مسحوق الدريس للقضاء على الأساريع

١٠٩- دَزَرْبِيدِيْن Déserpidine (F)

 $C_{32}H_{38}N_2O_8 = 578,64$

قِلَويد عُزل من جذور الرولْفِيا المُبيَضَّة Rauwolfia canescens کیلورهیدراته يَنصهِر عند ٢٤٧، ٣٥٣° سبغ مع تَحَلُّل.

الزرپيدين، كيميائيًا، هو الرزريين الذي استُبدِلَت فيه مجموعة ميتوكي في وضعية ۱۱ بدُرّة هيدروجين.

فَرماكولوجيًّا، هو مُهدّئ مُسَكِّن يَتحلَّى بعمل مُنْقِص للتوتّر جَرَت عليه التّجارب في طِب الإنسان عن طريق الفَمّ بمقادير ٠,١ إلى ملَّغرام واحد. لم يَعد يُصَنَّع.

١١٠ دُسُوم مُهَدْرَجَة، دُهُون مُهَدْرَجَة Graisses hydrogénées (F)

للحصول على زُيوت أجمد أي أكثر كثافة اعتبارًا من زُيوت أو دسوم رَخُوة،

نُعرِّض هذه الأخيرة للهَدْرَجَة، في درجات حراريّة تَختلف حسب الطُّرق المُتَّبعة وتحت الضَّغط بشكل عام، بوجود حافِز Catalyseur (نيكل مُفَعَّل أو سوى ذلك).

إن ترابُطات الذَّرّات الأتيلانيكيّة المُزدوِجة في الحوامض الدَّسمة تَتَشبَّع هكذا بالهيدروجين، فننقل، مثلًا من الحامض الرَّايْتيك (مع C₁₈ غير مُشْبَع) إلى حامض دُهنِيّ (مع C₁₈ مُشْبَع)؛ يَتغيَّر بذلك قِوام الدَّسَم ونقطة انصهاره.

طُبِّقت هذه الطَّريقة على زيت فستق العبيد، وزيت السُّمسم، وزبدة جوز الهند، إلخ. وعلى دسوم حَيوانيَّة كزيت البَال.

إن المواد الحاصلة تكون جامدة، جميلة اللَّون الأبيض، وتجد استعمالاتها في التَّغذية كما في الصَّيدليّة (تحضير مراهم، سَوّاغ للتّحاميل، إلخ).

Dragon's-blood (E)
Sang-dragon, Sang-de-dragon (F)
Drachenblut (D)
Calamus draco, Dracæna draco, Pte-rocarpus draco (S)

مادّة راتِنجيّة دَمويّة اللَّون الأحمر، عديمة الرَّائحة، تَفِهة الطَّعم، صلبة، فَتَاتة، لَهُوبة، تَحترق مع نثر رائحة اللهُ حدًّا في المَّة محله له حدًّا في المُّة مع المُّة

الكحول، والأثير، والزُّيوت الدَّسِمة، والزُّيوت الدَّسِمة، والزُّيوت الطَّيّارة. يحتوي بعض أنواعها على حامض البَنْزَوِيْك؛ ولقد تمَّ الاتّفاق على إدراج دَمِّ الأخوين بين البَلاسِم. يقع دمِّ الأُخوين في الأشكال التّالية:

١ - في شكل عِنْدان أو قضبان كبيرة التشابه مع شَمْع الأختام أي الشَّمْع الأحمر أو اللَّك، تكون واحدتها مُغلَّفة بورقة شجرة من فصيلة النَّخْلِيَّات وجنس كِرْفِئَة Corypha؛ وتُحفَظ مُتماسكة بواسطة سَيْر من أَسَل الهِند؛

٢ - في شكل كتل مُستديرة أو كُريّات زِنتها من ١٥ إلى ٥٠ غرامًا، ومُغلّفة كذلك بورقة شجرة، وتكون أحيانًا مُعلَّقة الواحدة بالأخرى في شكل مَسْبَحة: إن هذين النّوعَين من دمّ الأخوين هُما ما يُسمّى دم الأخوين القَصَبِيّ الشَّكْل؛

٣ - في شكل قوالب أو كتل كبيرة الحجم، تكون جَيِّدة الصنف أحيانًا، ولكنها تكون في أكثر الأحيان مُسودة اللَّون وغير نَقِيّة؛

٤ - في شكل طلامي بحجم أسطوانات الشَّمع الأبيض، لونها إلى البنِّي المُسْمَر. إن هذا الصنف الأخير يكون مُتدنِّي الجودة. وفضلًا عن ذلك إن دماء الأخوين القَصَبيَّة التي كانت تُعتبر من الأصناف العالية الجودة في الماضي، تُستبدَل اليوم في غالب الأحيان بمنتوجات مغشوشة الصنع تتداولها

دما

Dentaria pinnata, Syn. Cardamine pinnata (S)

يتم الحصول على هذه الأنواع المختلفة من دم الأخوين في الهند، عن طريق عليان ثمار أَسَل الهند أي قَصَب دراكو غليان ثمار أَسَل الهند أي قَصَب دراكو أمّا دم الأخوين في جزر الكناري فينتج من القاطر الجبّار .Dracæna draco L من القاطر الجبّار .Dracæna draco L من القاطر الجبّار ، وهو صنف لا يوجد في فصيلة الزَّنْبقيّات، وهو صنف لا يوجد في الأسواق؛ كذلك هو الحال مع الصنف الحاصل من شجرة قَرْنِيّة تدعى الحاصل من شجرة قَرْنِيّة تدعى الحاصل من شجرة قَرْنِيّة تدعى أعيد إدراج هذه المواد الرّاتِنجيّة في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام الإحدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام 19٧٤.

المُركِّبات - يتم إستيراد دم الأخوين من الهند الشَّرقيّة على شكل مسحوق؛ ويُعتَقد إن هذا المسحوق ليس إلّا ثمار أسَل الهند المسحوقة. يتركَّب هذا المسحوق على الأكثر من أستيرات بَنْزَوِيّة ومن بَنْزُوِيْل أستيك الدراكُورازِيْنُوتَنّول المصحوبة بالدراكُورازِيْنُ وبالدراكُوالْبان وبالقليل من حامض البَنْزَوِيك الحُرّ والقليل من النَّيت الدُّهنيّ.

الخصائص والاستعمال - قابض، رَقَوْ، مُنظُف أسنان. جرعته غرام واحد إلى ٥ غرامات. أما في الصناعة فيصلح لتحضير أنواع الوَرْنيش.

۱۱۲ - دَنْتَارِيَا رِيْشِيَّة (۱۱۲ - دَنْتَارِيَا رِيْشِيَّة

(١) التَّسمة للمؤلِّف.

الدَنْتَارِيَا^(۱) جنس نَباتات مُعمَّرة من فصيلة الصَّليبِيَّات، تَتميَّز عن أنواع الحُرْف Cardamines بأرومتها ذات الريزوم الأفقيّ الامتداد، الحرشفيّ المظهر، وبقدِّها الأَكْبَر.

الدَّنْتَاريا الرِّيشيّة نوع يَعلو من ٣٠ إلى ٢٠ سم. أوراقه ريشيّة مُقَلَّقة، مُركَّبة من ٥ إلى ٩ وُريقات مُتقابلة. أزهاره بيضاء أو وَرديّة اللَّون، تبرز من نيسان إلى حزيران. يتكاثر هذا النَّوع بواسطة البزور وفَسْخ الأرومة، ويَرغب ظلال الأحراج الرَّطبة في تُربة دُبَاليّة مُبحِصة.

الاستعمال - كانت الدنتاريا الرّيشيّة مسجَّلة في دستور الأدوية الأوروبي عام ١٨١٨.

(لا نملك أيّة تفاصيل أخرى عن هذا النبات، سوى ما أوردناه أعلاه) إسم النوع من اقتراحنا.

Essence (۲) دُهْن تِيْكُوتِيْس أَجْوَان (۲) طو Ptychotis ajowan (F)

ته غرام واحد إنّ دُهن أو ستِيَارُوپُتَان التيكوتيس صناعة فيصلح يُستخرج من الأُجُوان وهو نَبات من فصيلة الخَيْمِيَّات مهده الهند الشَّرقيّة، حيث يُرغب جدًّا في تلك المناطق حيث لرغب جدًّا في تلك المناطق Dentaire (F)

ومُدن أخرى في دَكَان، يُباع الدُّهن باسم «أَجْوَان رافُول»، أيّ زَهر الأَجْوَان، وهو يُحضَّر في فصل الشِّتاء في مناطق الهند الوسطى.

المواصفات - يَقع هذا الستيارويتان في بلُّورات شفَّافة مُتطاوِلة، تَشتَقّ من مَوْشور مُعَيَّنيّ مُنْحَنِ يَتمتَّع بانفساخ سَهْل، أخفّ من الماء، يَنحَلّ بسهولة في الكحول والأثير؛ رائحته تُذَكِّر بالزَّعتر والمردكوش. يبدأ الانصهار عند ٤٢° سغ ويمكن تَقطيره في مَجْري من حامض الكربونيك. يَتألُّف هذا الدُّهن من مزيج من التيمول والسّيمان، مع القليل من الكَرْقُكْرول وكربورات مختلِفة. وهو يُشكِّل مصدرًا صِناعيًّا للتِّيمول. إن زراعة الأجوان أدخلها الإنكليز قبل العام ١٩٢٠ إلى جزر سِیْشُل والی مونت سِیَیرًا. وهو یحتوی، وحسب المناطق، على ٣٨ إلى ٥٠ بالمئة من التّيمول في دُهنِه .

المُجَيِّنَة (١١٤ دُهُن الخُزَامَى الهَجِيْنَة (١١٥ Essence de lavandin, Essence de lavande bâtarde (F)

دُهن يُستخرَج بالتَّقطير البُخاريِّ من رؤوس الخُزامي الهجينة المُزهِرة: Lavandula hybrida (وهي نَوْع يَحصل من تهجين الخُزامي الحقيقيَّة والخُزامي

(١) التَّسمة العربة للمؤلِّف.

الذَّكريّة)، وهي أنواع تُزرع في جنوب ده شرق فرنسا بين ارتفاعَيّ ٥٠٠ و١٠٠٠ مترًا عن سطح البحر. إنتاجُها يكون من واحد إلى اثنين بالمئة من الدُّهن الذي يَحتوي على ٢٠ إلى ٣٥ بالمئة من الأُسْتيرات المُعبَّر عنها بأستات اللّيناليل.

المواصفات - دُهن الخُزامى الهجينة هو سائل مُخضر اللَّون الأصفر، مُتحرِّك، رائحته قويّة تُذَكِّر برائحة دُهن الخُزامى، ولكن مع لَمْسَة خفيفة التَّكَوْفُر، طعمه عطري. وهو قابل للنَّوبان بكل النِّسب في الكحول، والأثير، والزيوت، والدّهون. يحتوي على: لينالول، جيرانيول، أستات الليناليل. نتاجه المَخْزَنيّ يجب أن يحتوي على ٢٠ بالمئة كحد أدنى من اللَينالول.

الاستعمال - لَزْقة زئبقيّة (كودكس 1989). يُستخدم في صناعة العطور.

۱۱۵ - دُهْن يَنُون، دُهْن يَلانِج، دُهْن كَانْنْغَا (۲۲) Essence d'ylang-ylang

يُطلَق هذا الاسم على دُهون ناتجة عن أشجار من الشَّرق الأقصى (سُومطرة، جاڤا، فيليپين، إلخ) تَنتمي إلى فَصيلة القِشْطِيّات: Unona odorantissima ou Uvaria

⁽٢) التَّسميات العربيّة للمؤلّف.

. odorata ou Cananga odorata

المواصفات - نَحصل بالتَّقطير على كيلو واحد من الدُّهن مقابل ٥٠ إلى ٦٠ كيلو من الأزهار الغَضّة. إن رائحة هذا الدُّهن عَذْبة جدًّا، ويَغلي عند حوالى ١٠٥٠ سغ؛ وله استعمالات عديدة في صناعة العطور.

إن الثّوابت الفيزيائيّة تَختلف قليلًا تبعًا للمصدر الجغرافي. كثافته ٩٣٠، إلى المصدر الجغرافي. كثافته ٩٣٠، إلى ٩٦٥، مُركِّباته الأساسيّة: لينالول حُرّ ٣٢ بالمئة، ولينالول مُؤَسْتَر (أستات وبنزوات اللِّيناليل، من كل واحد يُوجد من ٧ إلى ١٠ بالمئة)، بينان، سَسْكي من ٧ إلى ١٠ بالمئة)، بينان، سَسْكي تَرْپانات (كادينان)، القليل من الجيرانيول، إلخ.

إن الدُّهن المُسمَّى كانَنْغا هو أقل جودة من الدُّهن المُسمَّى يَلانج يَلانج، ويُباع باسم دُهن كانَنْغا في أكثر الأحيان الكمِّيات الأخيرة الحاصلة من تقطير دُهن اليلانج، المُركِّبات الأساسيّة هي إذًا ذاتها؛ ويُوجد فيه أحيانًا، بالإضافة إلى ما تَقدَّم، حتى ١٢ بالمئة من الأوجانول.

إن زَيْف المُزَوِّرات الأساسيّة التي يجب قشور إشقيل الكشف عنها في هذا الدُّهن أو ذاك هي بولوغالن ڤيرجينيا زيت الجوز الهندي ودُهن التَّرپنتين.

الخصائص - مُضاد للتَّشنُّج (عامّ وقلبيّ)، مُقوِّ عَصَبي (عُجز جنسيّ)، مطهّر.

ملاحظة - منذ حوالى ٥٠ سنة أدخلت زراعة اليلانج إلى الاتحاد، حيث أنتج ٣ أطنان من الدّهن في السّنة، ومن ثم إلى مدغشقر حيث وصل الإنتاج حتى ١٢ طنًا في السّنة، وإلى نُوسِّي - بَيْه وإلى السِّيشَل.

إن الدُّهن الأعلى سِعرًا هو دُهن مانيلا، ومن ثم دهن الاتحاد، يليه دهن جاڤا ومدغشقر. إن العُطور المنافِسة لدُهن اليلانج هي اليلانج - يلانج الاصطناعيّ ودُهن الياسمين النَّاتج في الكوت دازور.

Médicament (F) دواء -۱۱٦

دواء الأشْقِيْل العسلي، عَسَل إشْقِيلي

نحضر كما في العسل المورَّد (دستور ١٨٦٦).

نحضر بالطريقة ذاتها دواء بَصَل السورنجان العسلق.

١٦ - دواء الأشقيل العسلى المركّب

قشور إشقيل ١٢٥غ بولوغالن ڤيرجينيا ١٢٥غ

نغلي في مقدار ٤٠٠٠ ملل ماء حتى إنقاص الربع، نمرّر ونضيف إلى السائل الحاصل:

غَسَل despumé

د ي ج

نغلي كذلك حتى إنقاص ربع آخر، نمرر ونضيف لكل ٥٠٠ غرام من النتاج:

درديات البوتاس والانتيموان ٢,٠ غ

دواء البنفسج العَسَلي، عسل بنفسجي عصير بنفسج، عسل بالتساوي نطبخ حتى التماسك المطلوب.

يحضر البعض هذا الدواء على طريقة تحضير شراب البنفسج السكري، كذلك دواء النيلوفر العسلي.

دواء الزعفران العسلى

زعفران ۱٫۲۰ إلى ۳٫۲۰ غ عسل أبيض

Finger flower, ديجيتال أرْجُوانِيّة -۱۱۷ Bloody finger, Digitale pourprée, Grande digitale (F) Fingerhut (D) Digitalis purpurea (S)

الخصائص الطبّية - جواهر الديجيتال الفَعّالة لا يمتصُّها الجسم، عن طريق المَعِدة، إلّا ببطء كبير، وبطريقة لم تزل مجهولة حتى اليوم؛ كما أن التَّخلُص من تلك الجواهر ليس كذلك أقل بُطئًا، وأن تراكم الجرعات المتتالية منها وتكويمها يمكنه أن يُؤدي فجأة إلى تأثيرات تسمُّعِية، مما يُوجب الحذر الدّائم منها. إن إعطاء الديجيتال في أقراص أو بيلولات غير مرغوب فيه؛ أما محاليل الدّيجيتالين، ومُستحضرات مَرْث

الدِّيجيتال أو نُقاعتها تبدو أفضل تحمَّلًا من الجسم بكثير.

بجرعات علاجية، إن الديجيتال، وكذلك الدّيجيتالين، هي المُقوِّي القَلبيّ المُمتاز المثالي: فهي تُبطئ، تُقوي، تُنظم وتُسوِّى التَّقلُّصات والانقباضات القَلبيّة؛ وهي، بالإضافة إلى ذلك، تُمارِس على الجهاز الوعائتي الطّرفي عملًا شديدًا مَقبِّضًا للعُروق، مصدره مُباشر ومركزي في الوقت ذاته (تَهَيُّج الجهاز الوُدِّيُّ). إن ذلك الانقباض العُروقي يُؤدّي إلى ارتفاع بارز في التَّوتُّر الشِّريانيّ (إرتفاع الضَّغْط) يمكنه أن يُسهِّل البُوَال (غزارة البَوْل). ولكن البُوَال الديجيتالي، الذي لا يَحدُث إلّا بصورة مُتأخِّرة، لا يَتَّصل سوى بشكل إضافي جدًّا في ذلك التَّوتُّر الشِّريانيِّ المُرتفِع؛ وتُحدِث على الأكثر زيادة في سرعة الدم وتُسبّب امتصاص الاستسقاءات أو الأوديمات، والتي تكون ضرورية لحدوثه.

إن الإشارات الأساسية للديجيتال أو للديجيتالين، خاصة عندما يكون النبض سريعًا، غير منتظم وغير متساوٍ هي: نَقْص النقباضيَّة القَلْب (١) Asystoli (لأي سبب القلْب Asystoli (لأي سبب كان): إسترخاء القلب بسبب الأمراض القاجِيّة الفَلبيّة، خاصة الأمراض التاجِيّة (Mitrales وَهن ونَهَك الحُمَّيات العَدُوائيَّة المُرتفِعة Pyrexies (إلتهابات

الرِّئة، حُمِّى التِّيفوئيد، إلخ). إن طريقة اس استعمالها يَتطلَّب الكمال النِّسبيّ لنَسيج ومستحضراتها القَلْب العَضَلِيّ. أ – مسحوة

> أما استعمال الدّيجيتال أو الدّيجيتالين فغير صالح وغير مرغوب فيه في: فَرُط إِنْقِبَاضِيَّة الْقَلْبِ(') Hypersystolie، وفَرْط التَوتُّر الشَّريانيّ (إلّا إذا كان هناك نزارة في البَوْل، وتمدُّد قَلبِيّ)، وتَوازن إنقباضِيّة القَلْب ('') Eusystolie وخَفْق قَلْبي بَطيء Bradychardie، وتَصَلُّب قَلْمَبيِّ (١٠) Cardiosclérose أو نَشاف قَلْبِيِّ^(٠)، وضَعْف كلوى (ليس دائمًا)، وحساسيّة المَعِدة والأمعاء المُفرطة. وإذا أُعطِيت باتّجاه معاكس ولا منطقى، أو بجرعات قَويّة وطويلة الأمد، فإن الدّيجيتال يمكنها أن تؤدّي إلى نتائج مَشؤومة: إفراط الهَزَع أي الاختلاج القلبي Ataxie، نبض بائس، زُرَام أي انحباس البَول Anurie، تقيُّوءات، إسهال، إلخ.

> بجرعات سامّة يُحدِث الدّيجيتالين اضطرابًا قلبيًّا Arythmie خاصًا يتميّز بمجموعات من ٢، ٣ أو ٤ انقباضات مُتقارِبة تَفصلُها وَقُفَات مُتفاوِتة الوقت، مُرفَقة بغثيانات وتقيّوءات، واضطرابات في النّظر، وفتور الحرارة في الجسم، دُوار وهَذيان.

بجرعة مُميتة يبطل نشاط الانقباضات البُطَيْنِيّة فجأة بعد فترة أخيرة من خَفْقَة قَلبيّة مُنتظمة؛ ويتوقّف القلب أثناء الإنقاض.

طريقة استعمال الديجيتال

أ - مسحوق الأوراق المُعَيَّر بيولوجيًّا والمحفوظ في الفراغ أو في غاز خامِل في أمْبُولات مختومة من ١، ٢، • و١٠ غرامات (إهمال القسم غير المستعمل): في نقاعة من ٢،٠ إلى ٢٥٠٠غ؛ في مَرْث من ٣٠٠٠ إلى ٢٥٠٠غ، هذا الشكل من ٣٠٠٠ إلى ١٨٠٠غ، هذا الشكل الأخير هو الأفضل.

طريقة الفرماكوبيا: بالغون: عن طريق الفم: مقادير اعتيادية: ٢٠,١٠غ إلى ٧,٧٥ لجرعة واحدة ولكل ٢٤ ساعة؛ مقادير قصوى: غرام واحد لجرعة واحدة ولكل ٢٤ ساعة.

التداوي الولادي (حسب دستور أدوية 1970). عن طريق الفم: من صفر إلى 1970 سنة: ٢٠ ملغ لكل سنة من العمر. ب – صبغة (مُراقَبَة بيولوجيًّا): ٥٢ نقطة منها تساوي غرامًا واحدًا. مقادير اعتيادية (بالغون): غرام واحد وحتى ٤ غرامات لكل ٢٤ ساعة. مقادير قصوى في دستور الأدوية: ١٥٠٠غ للجرعة و٦ غرامات لكل ٢٤ ساعة؛ للأولاد من صفر إلى لكل ٢٤ ساعة؛ للأولاد من صفر إلى عشر نقاط مقابل كل سنة من العمر.

ج - شراب شُكّري (۲۰ غرام تحتوي على غرام واحد من الصبغة): ۲۰ إلى ۸۰غ؛ أولاد: ۱٫۵۰ غرام لكل سنة.

د - مستخلص كحولي: ۰,۰۳ إلى ٥,٠٥غ؛ حدّ أقصى: ٠,٠٥غ للجرعة و٠,٢٠غ لكل ٢٤ ساعة.

ه - نبيذ الديجيتال المركّب (نبيذ من مسحوق الديجيتال وتحتوي على جرعات اعتيادية: · ٢غ لجرعة واحدة التراكميّة التكويميّة السامّة. و٥٠٥غ لكل ٢٤ ساعة للبالغ.

ملاحظة مهمّة - أيًّا تكن المستحضرات د ي ج تروسّو): ٢٠غ توازي حوالي ٠,١٠غ المنتخبة للاستعمال، من المناسب عدم إطالة استعمالها لها أكثر من ٣ إلى • غرام واحد من أستات البوتاسيوم؛ أيام، لكي نتلافي تأثيرات الديجيتالين

Resin (E) راتِنْج، راتِنْج، راتِنْج، راتِنْج، الله Résines (F) Harz (D)
Resina (S)

الرّاتِنْجات هي موادّ نَباتية عديمة الشّكل عادة، نادرًا ما تكون مُتبلّرة، صُلبة، منصهرة بالحرارة، وهذا ما يميِّزها عن الصّموغ، ولكنّها لا تصبح أبدًا مائعة تمامًا، وهذا ما يفرِّقها عن الأجسام الدُّهنيّة؛ لَهوبة (قابلة للاحتراق)، لا تذوب في الماء، تذوب في الكحول، والكلوروفورم، والأثير، والأجسام الدُّهنيَّة، والموادّ الزِّفتيّة (الزفوت الدُّفتيّة (الزفوت في صفراء اللَّون بشكل عامّ، كسورة، فهي صفراء اللَّون بشكل عامّ، كسورة، أثقل من الماء (١,١٢٥). ويبدو أنّها نتيجة أكْسَدة الزّيوت الطيّارة.

هناك أيضًا راتِنْجات أُحْفورِيّة من المرجَّح أن يكون مصدرها من النَّباتات. يبدو الهِيْغات (۱) Hygate ، وهو راتنج مَعدِنيّ، أنّه كهرمان أصفر. ليست هناك من راتنجات بالمعنى

الصَّحيح في مملكة الحيوان، ومع ذلك، فإن اللَّكِيّة: Coccus lacca تنج، أو أقلَّه تُحدِث تكوين راتنج اللَّك. تدين الرّاتنجات بلونها إلى مواد غريبة، وبرائحتها إلى زيت طيّار؛ أمّا الرّاتنجات النَّقيّة فتكون بَيضاء اللَّون وعديمة الرّائحة. أطلق بُوناسُتْر اسم وعديمة الرّائحة. أطلق بُوناسُتْر اسم مواد تتركَّد بشكل بِلُوريّ من المُذابات مواد تتركَّد بشكل بِلُوريّ من المُذابات الرَّاتنجيّة الكحوليّة.

درس تشيرش وطلّابه من بَرْن، عددًا كبيرًا جدًّا من الرّاتنجات وخصّصوا لها مجلًدات عديدة: Die Harze und) المعتلف المعالخات بالقِلَى، والكربونات، وسوى معالجات بالقِلَى، والكربونات، وسوى ذلك، حوامض راتنجيّة (تختلف تقريبًا باختلاف كل نوع نباتي)، وراتنجات، ورازيتَنُّولات أي: (راتنجات عَفْصيّة)، مثال: تَرْبَنْينات الصَّنوبريّات، بَنجوان، مصوغ راتنجيّة، إلخ.

يمتلك الكثير من الرّاتنجات خصائص حامضة خفيفة تكفي، بالرغم من ذلك، وفي بعض الأحيان، لتحليل الكربوناتات القِلويّة وتكوين ما يُسمّى بشكل غير صحيح رازِينات Résinates أو أصبان الرّاتنج. هذه الأجسام ترغي بالماء، ولكنّها تتميّز عن الأصبان الحقيقيّة كونها غير قابلة التَّرسيب من محاليلها بواسطة الملح البحريّ.

(١) التَّسمية للمؤلَّف.

البلدان الحارة. الفصائل التي تنتشر فيها هذه المواد أكثر من سواها هي فصائل الصَّنَوبَريَّات، البُطْميَّات، وتأتي في الخط الثّاني فصائل الفَرْنيَّات، والسَّذابيَّات، والفُرّاصِيَّات، والسَّذابيَّات، والفُرّاصِيَّات، والسَّبُوتِيَّات، إلخ.

بعضها يَنْتج طوعيًّا، ولكن الحصول عليها يتمّ في أكثر الأحيان بحَزِّ قشور الأشجار الرّاتنجيّة. تسيل منها بشكل ترْبينات صافية فاتحة اللَّون محلولة في زيت دُهنيّ، وهي صفة تُميِّزها عن الصموغ الرّاتنجيّة، التي يتمّ الإشراك بينها في أكثر الأحيان، والتي تكون لبنيّة المشكل لحظة نَتْجها. تجمد العصارة الرّاتنجيّة بملامسة الهواء. إن العُصارات التي تبقى منها بحالة نصف مائعة تشكّل التي تتجمّد، أمّا تلك التي تتَجمّد، ولكنها تحتوي على حامض من المجموعة ولكنها تحتوي على حامض من المجموعة العِطريّة (حامض بتزويك، حامض عَبْهري) فتسمّى بلاسِم طبيعيّة.

بعض الرّاتنجات يحصل في مختبر الصَّيدليّ. تُنْهِك الموادّ أوّلًا بالكحول ٩٠ درجة، ومن ثمّ نُقطِّر حتى ﴿ المناء مع الفضالة ٤ إلى ٥ أحجام من الماء المقطّر، نجمع الرّاكد الرّاتنجيّ الذي يتكوَّن، نغسله بالماء السّاخن، نسكبه في صحون نضعها في المِحَمَّ حتى يصبح الرّاتنج كَسُورًا. قبل معالجة الموادّ بالكحول تُنظّفها من عناصرها الاستخراجيَّة بواسطة الماء وفقًا لطريقة

نُحضِّر هكذا راتِنجات الجَلَبَة، الغَيَّاكِ أي عود الأنبياء، الكَنْكينا، عشبة الحمّى، السَّقَمونيا، والتوربيت. بالنسبة للجلبة، هناك طريقة للحصول على راتنج أبيض اللَّون من هذه المادّة.

يلائش.

نحظى في دراسة البِدُفِيل^(۱) Podophyllum على تحضير ومواصفات وتجربة البُودوفِيلَين، وفي دراسة سقمونيا المكسيك على تحضير ومواصفات وتجربة راتنج سقمونيا المكسك.

الرّاتنجات بشكل عام هي منشّطة، بعضها مُسهّل قويّ، بعضها الآخر كاوٍ. وهي تُشكّل أساس المَروخات. عدد كبير منها يُستخدم في الصناعة لتحضير الورنيشات، والأصبان، وغاز الإنارة، إلخ.

Rhubabr (E) راوَنْد، رَوَنْد Rhubabres (F) Rhabarber (D) Rheum (S)

التركيب الكيميائي - عام ١٨٤٤ عاوَد كلّ من شلُوسّبَرْغَر ودُولِنْغ دراسة الراوند الكيميائيّة، وهي دراسة كانت إلى ذلك الحين هدف أبحاث عديدة، تَعَرَّفا إلى وجود جسم محدَّد بشكل جيّد أطلقا

⁽١) التَّسمية لإدوار غالب.

راو

عليه اسم حامض كُرِيزُوفانِيْك؛ إنه دِيُوكُسي-١-٨-مَتيل-٣-أنْتراكِيْنُون. وعَزَل من الراوند فيما بعد، كلّ من وارّن، دولارُو، مُولَّر، عزلوا مادّة جديدة دُعيت إيمودين؛ إنّها ترِيُوكُسي-١-٨-مَتيل-٣-أنْتراكِيْنُون.

يحتوي الرّاوند، حسب تشيرش وهُوبَرْغَر، على صَفّين من المركّبات:

" - غلوكوسيد عَفْصيك (رايسوتَنُوغلوغلوكوسيد الغلوكوسيد (رايُوأنْتراغلوكوسيدات. الغلوكوسيد العفصيك المحلَّل بالماء بواسطة الحَوامض المخفَّفة، يعطي شكّرًا، وأحمر الراوند، والحامض العَفْصيك، والحامض العَفْصيك، الأنْتراغلوكوسيدات تعطي الحامض الكرِيْزُوفانيك (كريزُوفانُول)، الأيمُودِيْن (أيمُودُول)، والرَّايِيْن الذي يمتلك بناء الألويمُودين متقاربًا من بناء الألويمُودين ومع الرّايُوكريزيديْن الذي هو الأيمُودُول الذي تَأْسُتَر فيه عَمل فينول بواسطة الكحول المثيليكي.

وعندما درس جِيلْسُن مواد الرّاوند العَفْصيَّة Tannoïdes، عزل منها ما يلي:

۱° - هيتروسيد يدعى غلوكُوغَلِّين ينشطر بالتحليل المائي إلى غلوكوز وإلى حامض عَفْصِيك؛ ٢° - تَرْارِيْن يعطي بالتأثيرات عينها الغلوكوز، الحامض العَفْصيك، الحامض العَفْصيك، الحامض العَفْصيك، الحامض العَنْهريك، رايُوزْمِين؛ ٣° نوع

من الكاتَشِيْن؛ ٤° رايُوكرِيزِيْن يعطي، إذا انشطر، الرّايُوكريزِيديْن والغلوكوز.

إقترح جيلْسُن للمجموع الغلوكُوسِيدي اسم: Rhéopurgarine .

عام ١٩٢٤-١٩٢٥ بَيَّن عدد من العلماء أن الراوند يحتوي، بعد شتاء قاس، على أنْترانُولات Anthranols تحصل من جرّاء اختزال الأنْترانُولات الكيميائي. إن هذه الأنْترانُولات تتَحلّى هي أيضًا بعمل مسهل.

إن الحواد المستقة من الأنتراغلوكوسيدات، إذا اتّحدت مع الأوكْسِي مَتيل - أنتراكينونات الحُرة، تشكّل جواهر راوند الصّين المسهّلة القويّة، أمّا خصائصه القابضة والمقويّة فمردُّها إلى الغلوكوسيدات العَفْصية الكريزُوفانيْك والأيمودِيْن يوجدا معًا في الخلايا ذاتها، محصوران في الشُعاعات النَّخاعيَّة التي تخطّط القسم اللَّيفيّ، كما في تلك التي توجد في النجوم.

يحتوي راوند الصين، بمعزل عن هذه الأجسام، على كمَّيَّة وافرة من أوكسالات الكلسيوم، والنَّشاء، والپَكتِيْن، ومادَّة صمغيّة، وپروتيدات (حَيُوليّات)، وجواهر عِطريّة طيّارة، وراتنج.

الرّاوند الإنكليزي يحتوي على معظم الأجسام الموجودة في الرّاوند الصينيّ، ولكن عمله الفيزيولوجي وتأثيراته العِلاجيّة هي أدنى منه بكثير.

البيطري.

الرّاوند المسجَّل في الإصدار العاشر للفرماكوبيا يتألَّف من الأعضاء التَّحْتُرابيّة المُجفَّفة من الرّاوند الكَفِّيّ أو من هجن هذين من الرّاوند المَخْزَنيّ أو من هجن هذين النَّوعَين أو من خليطهما. الرّاوند يجب أن يحتوي على ٢,٥٠٪ كحدٍّ أدنى من مشتقّات هيدروكسي أنْتروسِيانيكية، تُحْسَب بالرّايِيْن، بتركيب كيميائيّ ديهله٥٥.

طريقة الاستعمال - للرّاوند أهمّية طبّية فعليّة. إنّه واحد من أفضل المُسهّلات للأولاد. مقوّ بمقدار ٠,٣٠ إلى ٠,٦٠ غرام، ومسهّل قوي بمقدار ٣ غرامات وأكثر.

طريقة استعمال مسحوق الرّاوند للبالغين عن طريق الفمّ، وحسب الفرماكوبيا الحديثة؛ المقادير الاعتياديّة من ٠,٢٠ إلى ٠,٥٠ غرام لجرعة واحدة، والمقادير القصوى غرام واحد

للجرعة و٣ غرامات لكلّ ٢٤ ساعة (بالغون).

راو

طريقة الاستعمال للأولاد، من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٠,٢٠ إلى ٣٠,٣٠غ. إن هذه الطريقة لم تعد متبعة في فرماكوبيا

يُعطي الأطبّاء عادة الصُرّات أو البرشامات أثناء الوجبة، كمُثيرة ونافعة للمعدة؛ ومن ثمّ المستخلص (دستور ٢٥)؛ ١٠،٠ إلى ١٥،٠غ، الصبغة (دستور ١٩٣٧)، و إلى ٢٠ غرام؛ الشراب البسيط وخاصّة الشراب المركّب (دستور ٣٧)، ١٠ إلى ٣٠ غرام. يدخل الرّاوند في تركيب الجروع المسهّل القوي في دستور ١٨٦٦. يشارك الكالومل، والمغنازيا، والألوة، إلخ. يمتص اليود ويحتفظ به؛ الحصول سهل على مستخلص، شراب، أو نبيذ الرّاوند المُيَوَّد.

كان الأطبّاء يعطون في غالب الأحيان قطعًا من الرّاوند في صرَّة ممروثة في الماء (بنسبة ألى ١٠٠٠). الرّاوند يجب أن يُعالَج بالمرث لمدّة ألى ساعات، إذ إن النقيع المغلي يُدخِل إلى سوائله كميَّة كبيرة من النشاء تجعلها عكرة ومضطَّربة.

الرّاوند يَفقُد خصائصه الماسِطة بالتَّحميض ويكتسب خصائص مقويّة أكبر.

عدم ملاءمة - حوامض مركَّزة، ماء الكلس، دواء مُقيِّئ، نقاعات قابضة،

ر او

عفص .

١٢٠ - رَاوَنْد رِيْبَاسِيّ، رِيْبَاس، رِباص، Currant fruited rhubarb, Gooseberry Currant (E) Rhubarbe-groseille (F) Persischer rhabarber (D) Rheum ribes (S)

ريزوم معمَّر غليظ من فصيلة البَطْبَاطِيَّات. ساقه قويّة غليظة، مرتفعة، قد تَتَخطّي المتر، مورقة القاعدة فقط، تحمل عثكولًا واسعًا، منتصبًا. أوراقه بحريّة اللُّون، أوراق الضُمَّة القاعديّة جلديّة النّصال، مستديرة، طولها أقلّ من عرضها، شبه قلبيَّة الشَّكل، قد تبلغ ٦٠ سم، عروقها راحِيّة ومتشابكة فيما بينها، غالبًا ما تتغطّى صفحتها العُليا بحُلَيْمات خشنة، مسنَّنة الحوافي. ساق طويلة، خالية من الأوراق، تكسوها نتوءات مصفرة اللُّون. سُويقات حُزميّة خيطيّة الشَّكل، أطول من الأزهار ومساوية للثَّمرة. أكسنة كبيرة القَدّ، تصبح عُصاريّة في النّهاية، قلبيّة، بَيضويّة، أجنحتها ثُلاثة أضيق من الغمد. مَنبتُه الجبال اللّبنانيّة العالية.

المركّبات والاستعمال - جاء عنه في «مَخْنَزَن» دُوْرُقُو، الإصدار الشاني والعشرين، ما يلي: الرّاوند الرّيباسي يَنبت في جبال لبنان العالية وفي سوريا، عرفه اليونان والرّومان.

سُليماني، سولفات الحديد، والزنك، للحو ٢٠٠٠ مترًا عن سطح البحر؛ وهو الذي عرفه العرب منذ القرون الوسطى، وقام بدراسته اللّبناني إيلي فَرَح عام . 194.

يُستعمل هذا النُّوع محلِّيًّا (أي في لبنان) كمسهّل قويّ. وهو يقع، من حيث بنائه التَّشريحيّ ومحتواه من الجواهر الأنْتراكينونِيّة، بين أنواع راوند الصّين والأنواع الأوروبيّة.

- أطلب الدراسات المفصّلة عن أنواع الرَّاوند الآسبويَّة والأوروبِّيَّة، ومواصفاتها التَّشريحيّة، ومركّباتها الكيميائيّة.

١٢١- رَاوَنْد مَخْزَنِيّ، رَاوَنْد صِيْنِيّ Rhubarb (E) Rhubarbe, Officinale (F) Echter rhabarber (D) Rheum Officinale (S)

نَبات معمَّر قويّ من فصيلة البَطْبَاطِيَّات. ساقه غليظة، قصيرة، تعلو من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أوراقه متعاقبة، مُعنَّقة، طولها من ٥٠ إلى ٦٠ سم. نصلها مِرُوحيّ الشَّكل الكبير، من ٦٠ إلى ١٠٠ سم وأكثر. الشَّمراخ الزَّهريّ منتصب ومُتفرّع، يعلو من ٢ إلى ٣ أمتار. أزهاره باهتة اللون الأخضر. مهده الصّين والتّيبت. أثره التَّزيينيّ جميل جدًا. عرفه الصّينبُّون منذ آلاف السنين لخصائصه المُسهِّلة؛ ومن ثمّ

المركّبات - حامض أقصاليك، حامض عفصيك، حامض عَبْهري، غلوكوسيد، عفص، نشاء، حديد، مغنازيوم، ڤيتامين ب، ث.

عدم ملاءمة - عفص، دواء مقيّئ، ماء الكلس.

الخصائص - مقوي مُرّ مُمَعدِن ومُضادّ لفقر الدّم، قابض بمقادیر خفیفة، مشة، یزید حجم الصَّفراء، مضادّ للعفونة، منعش، مسهّل قويّ بمقادیر کافیة، ولکن هذا التأثیر یتبعه إمساك، فلا یُعطی منه سوی بشکل عابر، طارد للدود (خصائصه الاحتقانیّة تجعله ممنوعًا عن المصابین بالبواسیر).

الاستعمال - فقر دم، ضعف عامّ، فقد الشَّهيّة، كسل المَعِدة، كُباد، إمساك، طفيليّات الأمعاء، إسهالات مزمنة، ديسنتيريات.

تضاد الاستطباب - إرتفاع حموضة المعدة، بواسير، نقرس، رمال أقصالي.

طريقة الاستعمال - مسحوق في أقراص من ٢٥، ٤٠ قرص في بداية الوجبتين الرئيسيّتين، طوال ١٥ يومًا (مقوَّ، مضادّ لفقر الدم، حالات الهضم البطيء). مسحوق، غرامان مع العسل كمسهّل قوي وطارد للدود. شراب سُكّري من 1 إلى ٥٠ غرام، كمسهّل. خليط مشهً ونافع للمعدة: صبغة جوز القيء ٥غ، صبغة الراوند وصبغة الباديان بالتساوى

وما يكفي ٣٠ ملل. يؤخذ ٢٠ نقطة مع قليل من الماء قبل الوجبتين الرئيسيّتين.

ر م ر

الكَلْب، رَمْرَام، رَمْرَم، فِسَاء الكَلْب، Wall goose- مَزْرِيْطَة، أَثِيْنَة الحِيْطان (۱۹۰ مَرْرِيْطَة، أَثِيْنَة الحِيْطان (E) Ansérine des murs, Patte d'oie vraie (F)

Gänsefussmelde, Mauergänsefuss (D) Chenopodium murale (S)

نَبات حَوْلِيّ من فَصِيلَة السَّرْمَقِيَّات سَاقُه مُنتصِبَة تَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم، كثيرة الورق، مُحمرَّة اللَّون أحيانًا، غير طَحينيَّة أو خفيفة الكساء الطَّحينيّ، فَرعاء منذ القاعدة. أوراقُه مُعنَّقة، بَيضويّة مَعَيَّنِيّة إلى مُتطاوِلة حادّة، قويّة التَّسْنين غير المُتساوي على هوامشها، نَصلُها لامع الصَّفحتين الخَضراوين. إزهراره في الصَّفحتين الخَضراوين. إزهراره في الكأسيّات خفيفة التَّزورُق. البُزور الكأسيّات خفيفة التَّزورُق. البُزور الهامش، يُزهر على مدار السَّنة تقريبًا الهامش. يُزهر على مدار السَّنة تقريبًا في الحقول والحدائق والرّدوم.

الخصائص - ذكر إدوار غالب أنّ: «أنفعه وأجوده خواصًا ما نَبت في الأتربة الكلسيّة. وهو مُضاد للتَّشنَّج. يَدُر الطَّمْث ويَنفع التُّخمة ويَذهب بالدِّيدان المِعَويّة». يَشتهر هذا النّبات في شمال تُونس في شِفاء المَريض

⁽١) التَّسميات العربيّة للمؤلّف.

رم ر المريض أن يَفرك جسده بالأوراق قَبْل وتَمسيدًا خارجيًّا. و أن يَستحمّ، وأن يَحتفظ ببعض الأوراق

الواهِن الذي يكون بُوَاله مُحمر اللَّون قُرْب الوِسادة أثناء نومه. إنَّ نَقيع الأوراق وتَعرُّفه غَزيرًا؛ وفي ذلك يَتوجَّب على يَشتهر كذلك في طرد الحُمَّى فَرْكًا

وطعمه قوي المذاق المُرّ المُكَوْفَر. ولقد زدو استَخْرَج منه ترومُسدُرْف مادّة مرَّة الطَّعم هي الدزدواريْن Zédoarine؛ ويحتوي الزَدوار، إضافة إلى ذلك، دهنًا بنسبة واحد بالمئة، يحتوي بدوره على السِّنابول.

مسحوق الزَّدْوار مُصفرٌ اللَّون الرماديّ .

مواصفات المسحوق المجهرية - خلايا بشرية (بَشَرة) مُسدَّسة الزَّوايا والأَضْلاع، مع قاعدة الشُّعَيسرات. خلايا زَيْتُوراتنجية (۱): Oléorésine. شُعيرات طويلة وحيدة الخلية، سميكة الأَجْوال أي الحواجز الحُجْرويَّة. خلايا ليفية عديدة مصدرها النَّسيج الحَشُويَ. نشاء بوفرة، حبوبه مستطيلة الشَّكل، مستدقة الرَّأس الصّغير، مع لُوْمَن Lumen نُقُطي الشَّكل يقع على طرفها الصغير، خطوطها مُتراكِزة.

إِنَّ الزُّرُنْبَاد أو الزُّرُنْبَة Zérumbet، أو ما سُمِّي زنجبيل بَرِّي:

Curcuma zerumbet, Zingiber zerumbet, Amomum zerumbet

والنَّوع المُسمِّى Cassumuniar إن هذه الأنواع تتشابك مع أنواع الزَّدْوار بحيث لم يَتوصَّل المؤلِّفون الأخصَّائيّون إلّا بجهد وصعوبة كبيرين إلى الكشف عن اختلافها عنها، ونَسَبوها تارة إلى أنّها زَنجبيل وطورًا إلى أنّها قاقُلَّة أي هال.

ارَدُوَار ، جَدُوَار ، سَطُوَال Zedoary, Setwall (E)
Zédoaire, Curcuma zédoaire, Gingembre bâtard (F)
Zedoarwurzel, Zittwer Kurkume (D)
Curcuma zedoaria Rosc. (S)

إن الزّدُوار المَخْزَني هو ريزوم كُرْكُم زَدُوَار، وهو نَبات من فصيلة الزَّنْجَبيليَّات يُزرع في الهند والكوشَنشِين وماليزية. يُعْرَض دواؤه على شكل شَرائح صغيرة مستديرة مُسطَّحة، تبلغ سماكتها حوالى • ملم (زَدُوار مستدير) أو على شكل قِطع وكِسْرات غير منتظمة، مُزوَّات، يبلغ طولها من ٣ إلى ٤ سم زَدُوَار طويل) وتحصل من جرّاء قِطع وأجزاء عَرْضِيّة أو طُوليّة. ويكون وأجزاء عَرْضِيّة أو طُوليّة. ويكون الرّمادي، مُمَركًا بآثار الجُذَيرات والشُعيرات الجَذْرِيّة. ويكون مِحْسَرها والشُعيرات الجَذْرِيّة. ويكون مِحْسَرها والشُعيرات الجَذْرِيّة. ويكون مِحْسَرها وَرُنْيَ المظهر، مُرمَدّ اللَّون الأبيض.

المُركِّبات - تحتوي كلّ الأجزاء على خلايا مملوءة بالدهن.

رائحة الزَدْوار مماثلة لرائحة الزَّنْجبيل،

زرا

إنَّ كلِّ هذه الموادِّ هي موادٍّ مُنَبِّهة مهيِّجة قليلة الاستعمال في يومنا.

- راجع دراسات الكُرْكُم الأُحادِيَّة.

١٢٤ - زَرَاوَنْد ثُغْبَانِي، أرستولوجية ثُعْبَانِيَّة، لُوْف عِطْرِيّ

Virginia snake-root (E) Serpentaire de Virginie, Vipérine de Virginie, Couleuvrée de Virginie, Aristoloche serpentaire (F) Virginischer Hohlwurz, Virginischer osterluzei (D) (1) Aristolochia serpentaria (S)

نَبات طبِّي ليفي معمَّر من فصيلة الزَّرَاوَنْدَيَّاتِ. ساقه منتصبة تعلو حوالي ١٠٠ سـم. أوراقه قىلىبيّة القاعدة، أرسْتُولُوخِيَة ثُلاثِيّة الفُصوص^(٣) إهليلجيّة الرّبع الثّاني والثّالث، سِنانيّة الأخير، ثُنائية التَّقوُّس، صغيرة القَدّ. ريزومه دقيق، أليافه هزيلة، متشابكة؟ لونه الخارجي إلى البُنِّي، والدَّاخليّ مُصْفَرّ. رائحته قويّة، نَفّاذة وكافوريّة؛ طعمه مرّ، عطري. ينبت في أمريكا، لويزيانا، كارولينا، ڤرجينيا. أعيد تسجيله في الفرماكوبيا عام ١٩٧٤.

> المُركّبات - زيت طيّار ١ إلى ٢٪ غنى بالبورنيول، موادّ صمغيّة راتنجيّة، أملاح كلسيوم، مادة مُرَّة عديمة الشَّكل تُدعى سَرْبَنْتَارِيْنِ.

الخصائص - يبدو أنّها تدين إلى الزّيت الطبّار . مقوًّ ، منشِّط ، معرِّق غزير ، مُقَيِّع : مسهِّل قوى بمقادير مرتفعة.

الاستعمال - كان الدكتور شُدْمَان يعتبه ه مفيدًا جدًّا لوقف الاستفراغات.

طريقة الاستعمال - نقاعة ٢٠غ في ليتر ماء غال. مسحوق ٠,٥٠ إلى غرامين. مستخلص مائع ٣٠,٥ إلى غرامين. استُعمل أحيانًا كبديل لريزوم هِدْراسْتُس كندا. يُغش جذر الزراوند الثعباني بريزوم القَنْفَاسَة الزغبيّة (٢) Cypripedium pubescens wild من فصيلة السَّحْلبيّات.

١٢٥ زَرَاوَنْد ثُلاثِي الفُصوص،

Trilobate Worm-killer, Trilobate birthwort (E) Aristoloche trilobée (F) Dreilappigosterluzei, Dreilappighohlwurz (D)

Aristolochia trilobata (S)

نَبات طبِّي من فَصِيلَة الزَّرَاوَنْدِيَّات مَهده سُورينام والجماييك، يُقال إنّ خصائصه الطبِّيَّة أعلى من خصائص الزَّرَاوَنْد الثُّعْبانيِّ. جُذوره كانت ولم تَزل مُسجَّلة في الفَرْماكوبيا .

⁽١) التَّسمتان للمؤلِّف.

⁽٣) كلّ التَّسميات للمؤلّف ما عدا الفرنسيّة

١٢٦ - زَرَاوَنْد كبير الزَّهْر، أَرسْتُولُوخيَة ١٢٧ - زَعْتَر مُنْتَفِخ الرَّأْس، زَعْتَر زع ت Headed thyme, Spanish red (۲) إِسْبَانِيَ thyme (E) Thym capité, Thym rouge d'Espagne, Origan d'Espagne, Thym rouge de Tunisie (F) Spanisch Thymian, Spanisch Dost (D) Thymus capitatus, Corido thymus capitatus, saturcia capitata, Thymbra

capitata, Thymus Creticus (S)

جُنَيْبَة ليفيّة بَرِّيّة مُجَبْجِبَة، صغيرة القَدّ جدًّا، من فَصيلة الشَّفَويَّات. فُروعها غليظة، مُنتصبة، مُتفرِّعة بدورها، صُلْبَة، طَحْلاء اللَّون. فروع عقيمة، مُسْتَشُوكَة، مُتجمّعة مُتضامّة وقصيرة جدًّا. الشُّفة السُّفلي أطول، مَقسومة إلى سِنَّيْن مِخْرَزيَّى الشَّكل. التَّاج وَرديّ اللُّون، له أنُّوب قصير البروز. مآير بارزة. إزهرارها من أيّار وحتّى تشرين الأوَّل، على الشُّواطئ البَحريَّة في حوض المُتوسِّط والبرتُغال.

وردت لهذا النَّبات في المراجع العَربيَّة الأسماء التالية: حاشا، سَعْتَر العَبْس، سَعْتَر أو زَعْتَر فارسيّ، صَعْتر بَرِّيّ.. أمّا التَّفاصيل الطبّية له فلقد أورَدها الدكتور جان قالني، نَقلًا عن ميشال يواروت M. Poirotte، وهو صاحب أطروحة دكتوراه في الصَّيْدَلة (مون پولىيە، ١٩٨٣)، ويَتعلَّق مَوضوعها بنوع

Big flowering worm-killer, Geant birthwort (E) Aristoloche à grandes fleurs, Aristoloche géante (F) Groberblüte Osterluzei, Riesenhohlwurz (D) Aristolochia grandiflora, Aristolochia

gigas (S)

نَبات طبِّي من فَصيلَة الزَّرَاونْدِيَّات ساقُه عارشة مُلتَفَّة. أوراقُه قَلبَّة الشَّكُل مُستدقّة الطَّرف طويلة السّويقات مُتعاقِبة. أزهاره فَرديّة الارتكاز، تَبرز في الجهة المُقابلة للورقة، كبيرة جدًّا، أنبوبها مُنحنِ ومُنتفِخ القاعدة، طوله من ٢٠ إلى ٢٥ سم، ومن ثمّ يَعرض إلى نَصْل قُطْره ٢٠ إلى ٢٥ سم، يَنتهى رأسه بزائدة خَطِّيَّة هزيلة طولها ٣٠ إلى ٤٠ سم. داخل النَّصل مُصفر اللُّون ومُبَقَّع باللُّون البُنِّي البَنَفسجيّ المُواجِ. تَنثُر الزَّهرة رائحة بَشِعة. مَهده البرازيل، وهو من الأنواع الَّتِي تُزرع في البيوت المَحْمِيَّة .

الاستعمال - كثيرًا ما يُستعمَل هذا النَّوع في البرازيل في مُعالجة الاستسقاءات وعُسر الهضم والشُّلُل.

⁽٢) التَّسميتان العربيّتان للمؤلّف.

ز ع **ت**

۱۲۸ - زُغْرُور شَائك، شَوْكَة حَادَّة Hawthorn, white thorn, May bush, Quick (E)

Aubépine, Épine blanche, Noble épine, Senelle, Aubépinie épineuse, Bois de mai, Senellier (F)

Gemeiner dorn, Hagedorn, Weissdorn (D)

Cratægus Oxyacantha, Mespilus Oxyacantha (S)

جَنْبَة بَرِّيَة شائكة مُعَمَّرة من فَصيلة الوَرْدِيّات، تَعلو من ٢ إلى ٦ أمتار. لحاؤها الفَتى يَكون فاتِح اللُّون الرَّماديّ، مالِس الرُّقعة، يُصبح فيما بعد بُنِّي اللَّون ومُتَفَلِّع. أوراقُها مُعْبِلَة، بَيضَويَّة الشُّكل الإسفيني، ثُلاثِيَّة إلى خُماسِية الفُصوص المؤذَّنة، القليلة العُمق، الدَّقيقة التَّسْنين، عُروقُها مُتَّجِدة الاتِّجاه. أزهارُها بَيضاء أُو مُتورِّدة اللُّون، عِذْقيَّة التَّجميع، خفيفة الرَّائحة غير المُستَحبّة، خُماسِيّة الكأسِيّات، خُماسِيّة البَتلات الحُرّة، أقلامُها من ٢ إلى ٣، أَسْدِيتُها حَمراء. الثَّمرة نَوَويَّة. بَيضانِيّة الشَّكل، طَحِينيّة اللَّب، حمراء اللُّون، تحتوى على عَجَمَتَين أو ثلاث. طَعمُها سُكّري تَفِه. الأقسام المُستَعمَلة هي الأزهار والأوراق والثِّمار والقشور. نَبات يَشيع في أوروبّا، ولا يُوجد في

من الزَّعتر الَّذي يُقطَّر في إسبانيا ويُصَدَّر دُهنه منها للتِّجارة باسم «الزَّيت الدُّهنيّ لصَعْتر إسبانيا»، جاء عنه ما يلي:

المُركِّبات - غَنيّ جدًّا بزيت دُهنيّ يُستخدم لصناعة التيمول ويحتوي على ٩٢ مُركِّبًا، أهمَّها كَرْفَكرول من ٦١ إلى ٨٣ بالمئة، حامض هِيدروكسي تريتَرْپينيك بَنْتا-سيكليك، حامض أوليانُوليك، فلاڤونُويدات: لُوتايُولين، فلاڤونُولات،

الخصائص - أكَّدت التَّجارب الحديثة على أهمِّيَّة خصائص دُهن الزَّعتر الإسبانيّ المعروفة جيِّدًا في إبادة البَكتيريا، وهي خصائص مُماثلة لخصائص زيوت دُهنيّة أخرى اتُّخِذت كعناصر للمقارنة، وهي: دُهن القرفة وكبش القرنفول والزَّعتر والنَّدْغ، والَّتي تشتهر بالتَّالي فَعاليَّتُها القَويّة في هذا المجال ومنذ زمن بعيد.

ويشير واضع الأطروحة إلى نشاط الزَّعتر الإسبانيّ المُضادِ للتَّشَنَّج والَّذي يفيد في علاج الرَّبو الشُّعَبيّ منذ القرون الوُسطى. ويضيف قالني: «تجدر الإشارة إلى أنّ الخاصَّتين المذكورتين أعلاه، أي إبادة البكتيريا ووقف التَّشَنَّج الشُّعَبيّ لتتقيان معًا كذلك عند أنواع الصَّعْتر وعند الزَّعتر، وهذا ما يُعطي مجالًا للاعتقاد بأنّ خصائص واستعمالات تلك الشَّفَوتات الثَّلاثة قد تَتشابه».

المُركِّبات - إنّ التَّركيب الكيميائيّ للزعرور غير معروف بشكل كامل.

وكان لورُوا Leroy قد كَشَف في الماضي عن قِلُويدَيْن في اللّحاء هما: الكُراتاجِين عن قِلُويدَيْن في اللّحاء هما: الكُراتاجِين Cratægine، والأوكْسِياكَنْتِيبن Oxyacanthine. إنّ هذا القِلَويد الأخير هو قاعِدة ثُلاثيَّة وُجِدت أيضًا في عدد كبير من البَرْبَرِيسِيَّات والقَمَرِيَّات. وفي الأَزْهار تمَّ تَمييز التُرِيْمَتِيل أَمِيْن وأَجْسام أَمينية مُختلِفة أُخرى. البزور تحتوي على بقايا حامض سيانهيدريك. الثمار تحتوي على على على Caroténoïdes خِضابات وعلى حامِض أَسْقُورِبيك أي ڤيتامِين "ث». حامِض أَسْقُورِبيك أي ڤيتامِين "ث». وذُكرت المُركِّبات التَّالية: كَرْسَاتِين، عَلْوَكُوسيد...

الخصائص - عَمليًا يمكن اعتبار الزُّعرور نباتًا قليل السُّمَّيَة جدًّا. أَزهارُه مُقَوِّية للقَلْب، مُنْقِصة للقَلْب، مُنْقِصة للتَّوتُّر الشَّريانيّ (بتوسيع العروق)، مُضادَّة للتَّصَلُّب مُضادَّة للتَصلُّب الشَّرايين، طاردة للحُمّى، مُهدَّئة الشَّرايين، طاردة للحُمّى، مُهدَّئة للأَعْصاب. الثَّمار قابِضة وعَقُولَة (إسهالات)، حالَّة للحَصَى.

الاستعمال - الأزهار قبل تَفتُحها. الثّمار في أواخر أيلول. لحاء الفُروع الفَيّة خلال شباط. من المُحَبَّذ التَّقيَّد بالمقادير. كما أنّ زهر الزُّعرور يُستعمَل لفترة طويلة من دون أن يتراكم في الجسم. ذُبحة الصَّدْر، تَقلُّصات وعائيَّة الجسم. ذُبحة الصَّدْر، تَقلُّصات وعائيَّة عرْقِيَّة، خَفقان، إختلاج، آلام قَلْبِيَّة، نَفحات إحْتِقانِيَّة، نَزَق، سُرعَة الغَضَب، تأثُّريَّة، حالات الأرق في سِنّ القُعود تأثُّريَّة، حالات الأرق في سِنّ القُعود

خاصَّة، عُسر الهضم، تَصَلُّب الشَّرايين، الرَّفاع التَّوتُر، اضطرابات الضعف العَصبيّ النَّباتيّ (قَلَق، دوار، دوخة، طنين أذنين)، الأرق، إسهال؛ ديسنتيريا: (الثَّمار)، رُمال بَوْليّ ورُمال صَفراويّ (الثَّمار). كان رينون Rénon يجمع التَّيُوسِينامين والزُّعرور مَعًا كعناصر مُنقِصة للتَّوتُر الشَّريانيّ.

طريقة الاستعمال - نُقاعة، نَقيع، صبغة كحوليّة، مُستخلَص سائل، مُستخلَص جافّ، مُستخلَص مائع مائيّ، شَراب، ماء مُقطَّر. مسحوق أو أزهار في نُقاعة بنسبة ٢ إلى ٤ غرامات في اليوم. نُقاعة ٢ إلى ٤ غرامات أزهار مُجفَّفة في مقدار فنجان ماء غال يُغطّى ١٠ دقائق. فنجانان أو ثلاث في اليوم. صبغة فبل كُلِّ من الوجبات الثَّلاث، وطوال تُعلِّ من الوجبات الثَّلاث، وطوال ثلاثة أسابيع من الشَّهر (في حال ارتفاع النَّوم كمضادّة للتَّشَنُّج ومُنوِّمة خفيفة اليوم من النَّوم كمضادّة للتَّشَنُّج ومُنوِّمة خفيفة ماء غال، يُؤخذ منه ٣ فَناجين في اليوم. ماء غال، يُؤخذ منه ٣ فَناجين في اليوم.

خَليط مُضاد للتَّشَنُّج:

۲۰غ		صبغة زعرور
١٠غ		صبغة آلاميَّة
۱۰غ	سِيون	كحولتور فَرا
مَرّات	٤٠ إلى ٦٠ نقطة، ٣٪	يُؤخَذ منه
		في اليوم.

زع ر

ز ف ت

خَليط مُضاد للتَّشَنُّج:

يُؤخَذ منه ٢٠ نقطة مع قليل من الماء، مرّتان في اليوم، في حاّل القَلَق، الاكتئاب العُصابيّ.

الزعرور هو موضوع دراسة أحادِيَّة في الإصدار العاشر للفرماكوبيا الفرنسيَّة الحديثة ١٩٧٥. عددٌ كبير من الأدوية الصَّيدليَّة يحتوي على الزُّعرور.

۱۲۹ - زِفْت راتِنْج، راتِنْج، راتِنْج أَصْفَر Poix résine, Résine jaune (F)

يتم الحصول على هذا الرّاتنج الأصفر بمزج الرّاتنج اللّذي يبقى في قعر الخلقين بعد تقطير دُهن التّربنتين، بالماء الغالي وتحريكه طوال حوالى ٢٠ دقيقة. إنّه إذا قُولُوفان معجون مع الماء. وهو مصفر اللّون، صلب وفتُوت.

زفت أسود (F) وفت أسود

إنّه حصيلة احتراق غير كامل لمصافي القَشّ استُخدِمت في تنقية التَّربنتين والغاليبوت، ومن قطع التَّنُوب أيضًا. نجمع الكلّ في كومة نُضرِم فيها النار. يسيل الرّاتنج المنصهر نحو وعاء مملوء بالماء، حيث ينفصل إلى مادّة نصف صُلبة يجب تجميعها للحصول على الزفت الأسود، ومادّة ثانية تطفو، يُطلق عليها

اسم زيت الزفت: Huile de poix ou . Pisselæon

مادة سوداء، مالسة، فَتُوتة، رائحتها شِياطيَّة، يَسهل تليينها عند حوالى ٣٧ سغ وتصبح سائلة تمامًا في الماء الغال. تُستعمل كمرهم بيطريّ مُنفِّط.

زیت زیتونکمّیّة مطلوبة کربونات صودیوم متبلًر نقی کمّیّة کافیة ماء مقطّر کمّیّة کافیة

نُقدِّر كمِّيّة الحوامض الدَّسمة الموجودة في الزَّيت. لذلك، نُعادِل بشكل دقيق بواسطة محلول بوتاس عِياري نَموذجي عشرى N/10، مزيجًا من ٢٥ مليليترًا من الكلوروفورم ومن ٥٠ مليليترًا من كحول ٩٥ درجة، بوجود مليليتر واحد من محلول فتالايين الفينول، التَّلوُّن الوَرديّ الذي يبرز يجب أن يدوم مدّة ١٠ ثوان. نُضيف ١٠ غرامات من زيت الزَّيتون، ونكسب محلول KOHN العياري النَّموذجي العِشري N/10 حتى التَّلوُّن الوردى الذي يدوم ١٠ ثوان. نَعتبر n عدد المليليترات المُستعملة، فإنّ كمّية الحوامض الحُرّة، المُعبّر عنها بالحامض الزيتيك والموجودة في ١٠٠٠ غرام زيت تُعطى وفقًا للمُعادَلة ٢,٨٢× n.

نأخذ وزنًا من Na₂CO₃ المُتبلَّر يساوي مرتبن ونصف المرّة وزن الحامض الرَّيتيك الذي حُسِب أعلاه (بطريقة نستعمل معها زيادة ملحوظة من هذا الملح). نُسخِّن الزَّيت عند ٤٥° مع تحريكه. نسحق الملح ونُذوّبه في مقدار عُشر وزنه من الماء المُقطَّر بحرارة ٤٠° سغ. نسكب هذا المحلول رويدًا رويدًا، أو أفضل نقطة نقطة، في الزَّيت السّاخن مع خليط المزيج بقوّة. نَترك الكُلّ للرّاحة لمدّة ٢٤ ساعة. نُصفِّق ونُصفِّي الزَّيت الرَّيت المُصَفِّق على ورق.

إن زيت الزَّيتون المُعالَج هكذا هو زيت مُعادَل بشكل محسوس، وفي كلّ حال، إنّ حموضته المُعبَّر عنها بالحامض الزَّيتيك، يجب أن تكون أقلّ من ١٥٠٪.

الاستعمال - قَطْرة زَيتيّة بالأزارِيْن بنسبة واحد من مئة، مُذابات زيتيّة تُزْرَق (مذابة الكافور الزيتيّة المزروقة، والكلْسيفارُول، والپروجَسْتَارُون، المحلول الزَّيتيّ المُعلَّق المزروق المُحضَّر من يُودُوبيسْمُوثيت الكينا، إلخ)، إن هذا الزَّيت يجب أن يُسخَّن سَلفًا عند حوالى ١٣٥ إلى يُحفَظ في قارورات مُعقَّمة.

۱۳۱ - زَيْت الكَتَان ۱۳۱ - الكَتَان ۱۳۱

نحصل عليه من بزور الكَتّان التي تُعطي منه حوالى ٢٢ إلى ٣٤٪ من وزنها. فإذا حصل على البارد، وهذا هو الأفضل، يكون الزَّيت فاتح اللَّون الأصفر، بينما

إذا حصل على السّاخن يكون لونه إلى البُنِّيّ. رائحته خاصة. كثافته عند ١٥٥ سغ هي ٩٣١، إلى ٩٣٦، يذوب في أجزاء كحول غال، وفي ٤٠ جزءًا من الكحول البارد، وفي ١٦، جزء أثير. يحتوي على الأكثر غليسّريدات زَيتيّة، لينولاييكيّة ولينولانيكيّة، مواد فعّالة تُرْنَخ بسرعة. ويحتفظ في شكل محلول على مُخاط وعلى ألبُومين يمكن التخلُّص منهما بمزج الزَّيت مع سولفاتٍ رصاصية بكميّة كافية لكي يَتَشكّل نوعٌ من الكريما السّميكة، نُحرِّكه عند ذلك طوال ٣ أو ٤ البّام، نتركه يرتاح ومن ثمّ نُصفّق.

استُعمل زيت الكتّان الحديث الصَّنع في بعض الأحيان في الطبّ بمقدار ٢٥ إلى ١٠٠ غرامًا في حقن شَرجيّة كعقّار مُليِّن.

إنّ لزيت الكتّان في عالم الفُنون أهميّة كبيرة جدًّا. إنّ ميزته التي يختصّ بها بدرجة عالية تجعله صالحًا جدًّا للاستعمال في الرَّسم. فإذا غليناه في وعاء مُغطَّى وانتبهنا إلى حركه باستمرار، فإنّه يَنقلِب رويدًا رويدًا إلى كتلة دَبقة جدًّا، تُستعمَل باسم دِبْق Glu لالتقاط العصافير. وإذا أشْعَلْنا أبخرته، بعد رفعه عن النّار، وتركناها تشتعِل لفترة من الزَّمن، ومزجنا مع المادّة النّاتجة عن ذلك السُّخَام، فإنّنا نحصل على حِبر المَطْبَعة. إذا غليناه طويلًا مع الماء الماء الذي نُضيف إليه قليلًا من الحامض

ز ي ت

ز ی ت

النيتريك، بدلًا من إضافة السُّخَام، واستبدلنا من وقت إلى آخر الماء الذي يَتبخُّر بسواه، نُحوِّله بذلك إلى مادّة لها الكثير من خصائص المطّاط، وهي مادّة دعاها جُوناس مطّاط زيت الكتّان الذي يُستخدَم في صنع المَحاجيج (مِحْجاج، هومِيْل يُقدر به عُمْق الجُرْح)، والفِرْزَجات (فِرْزجة، هي «كعكة» تُفَحَّم في المَهْبِل لمنع الحمل أو لتصحيح وَضْع الرَّحم)، والقُنَيّات (حِفَن)، والتَّفْتَة المصمَّغة، ولُوازم الصَّيدليَّة. وفي مَعمل الصَّابون تَسمح بصناعة أصبان رخوة إنَّ هذا البَرنيق يَجفُّ تمامًا. عالية الجودة. وهي مثاليّة لصنع اللِّينولايوم أي مُشَمَّع الأرْضِيَّة. إذا بتسخينه من ٦ إلى ٨ ساعات مع جزء احتفظنا بزيت الكَتّان بحرارة متقاربة من درجة الغَليان، وبملامسة الهواء طوال ٨ إلى ١٢ ساعة، وكنّا قد أضفنا إلى كلِّ ١٠٠٠ جزء منه، ١٥ جزءًا من المَوْتَك المسحوق جيَّدًا، و٤ أجزاء من سولفات الزنك، نحصل على زيت يَجفّ إذا مَدَدْناه بطبقات رقيقة، خلال ٢٤ ساعة، وهو زيت يُشار إليه بأسماء الزَّيت المطبوخ، زيت الكتّان المغشوش بالرّصاص أو المُمَرْتَك، ورنيش أو بَرْنيق. وإذا خضّينا زَيت الكَتّان ببساطة مع مُذابة أستات الرّصاص، فإنّنا نُزيل لونه ونزيد من خصائصه المحفِّفة.

ولأن للألوان المُحضَّرة من زيت الكَتَّان الرَّصاصيّ سيِّنة كونها تَسْوَد مع الوقت تحت تأثير التَّصاعدات السولفهيدريكيّة،

فلقد اتبعت في إنكلترة طريقة تسمح بزيادة خصائص زيت الكَتّان المُجفُّفة، من دون مشاركة مركب من الرصاص. إنّ هذه الطَّريقة هي من جُوناس، وتقضى بتسخين ١٠٠ جزء من زيت الكتّان في وعاء نُحاسى حتى حرارة مُعيَّنة (لم تُذكر بالتَّحديد)؛ نرفع بعد ذلك الزَّيت عن النّار ونُضيف إليه نقطة نقطة، مع التَّحريك المُستمرّ، ١٢ إلى ١٥ غرامًا من الحامض النيتريك المُركَّز الذي يُحدِث عملًا عنيفًا. نترك الكُلّ للتَّركيد عِدّة أيّام ومن ثمّ نُصفِّق.

ونجعل الزَّيت كذلك مُجفِّفًا أكثر من عشرين (١٠٠٠) من بيروكسيد المنغانيز، أو مع ٢ إلى ٦ أجزاء من ألف من سولفات المنغانيز ومن ييروكسيد (فَوْق أوكسيد) الرّصاص: وهو بذلك الزّيت المُمَغْنَ L'Huile Manganésée المُمَغْنَ

١٣٢ - زَيْتُون بَرِّيّ، عُتْم، عُتُم Wild olive tree (E) Oléastre, Olivier sauvage (F) Wilder ölbaum (D) Olea sylvestris, Olea oleaster (S)

شجرة بَرِّيَّة من فصيلة الزَّيْتُونِيَّات تَعلو من ٥ إلى ١٠ أمتار. فروعها وأفنانها شائكة. أوراقها مُعنَّقة، سِنانيَّة، نصلها حادّ الرَّأس. جلديّ الرّقعة، طوله من ١ إلى ٨ سم، صفحته العُليا بحرِّيَّة اللَّون والسُّفلي خَمليَّة فضِّيَّة المُواج. إزهرارها عُنقوديّ التَّجميع،

إبطيّ الارتكاز. أزهارها صغيرة القدّ، بيضاء اللَّون، خضراء الموادّ. ثمارها بَيضيَّة الشَّكل، صغيرة القدّ، قليلة اللَّب تُدعى زغْبَج أو زَغَنبَج. وهي «مثل النَّبق الصِّغار تكون خضراء ثمّ تسود فتَحُلُو في مرارة وعجمتها مثل عجمة النَّبق. تُؤكل وتُطبخ ويُصفَى ماؤها حتى تكون رُبًا كرُت العِنَس».

المُركّبات والخصائص - يُنتِج جذع الشَّجرة المعمَّرة العتيقة مادّة خاصة مُحمرَّة اللَّون البنِّي تُدعى صمغ الزَّيتُون أو راتنج الزَّيتُون: Gomme d'olivier ou Résine d'olivier ou Gomme lecca ينصهر عند ١٣٠° سغ ويَتألَّف بكامله تقريبًا من مادّة بيضاء، بلُّوريَّة شَفَّافة تُدعى أُولِيڤيل Olivile. تَتميَّز هذه المادّة برائحة الوانيليا القويَّة الَّتي تنثرها إذا أحرقناها بحرارة ١٢٠ إلى ١٥٠° سغ. وهي مادّة تُستعمل في صناعة العُطورات كما تُستعمل لتحضير بعض شُموع الأختام الحمراء المُعَطِّرة. كما يُستخدم هذا الرّاتنج الصّمغ في تَدخينات وتَبخيرات لمعالجة الالتهابات الشُّعَبيّة والنَّزلات الرُّ ثويَّة .

ولقد حَضَّر هُوسْت Hoste من الزَّيتون البرِّيّ مُستخلَصًا مائِيًّا حامِضًا البرِّيّ مُستخلَصًا مائِيًّا حامِضًا Hydroacide أَطلَت عليه اسم أُولِياسْتِيرِيُوم Oleasterium يُوصى باستعماله بديلًا لسولفات الكينا كدواء طارد للحُمَّى ويُعطى على شكل نبيذ أو بيلُولات.

۱۳۳ – زَیْتُون عِطْرِيّ، عَوْف عَطِر (۱) Odoriferous osmanthus, Odoriferous olive tree (E)

ز ي ت

Olivier odorant, Osmanthe odorant (F) Riechölbaum (D)

Olea fragrans, Osmanthus fragrans (S)

جَنْبَة من فَصِيلة الزَّيتُونِيَّات تَعلو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم، فروعها وأفنانها مُنسجمة الارتكاز، مُعتدِلة الكثافة. أوراقها مُتقابلة، دائمة، بَيضويَّة الشَّكل المتطاول، طولها من ٦ إلى ١٢ سم وعرضها من ٣ إلى ٥ سم، نصلها جِلديّ الصَّفحة، لامِع البَشَرة، مُسنَّن الحافّة. أزهارها إبطيَّة وهامِيَّة الارتكاز، صغيرة أفراحة العرف العَنْب الأخاذ. الكأس جُدًّا، قصيرة الأنبوب، كبيرة الفلقة، وُباعيَّة الأقسام المُسنَّنة. التّاج رُباعي البَتَلات المُتراكِبَة. الثَّمرة مُفردة النّواة، بَيضانِيَّة الشَّكل. أوراقها وأزهارها بيضانِيَّة الشَّكل. أوراقها وأزهارها تستعمل في اليابان لتعطير الشَّاي.

۱۳۱ - زَيْرَفُون عَرِيْض الوَرَق، زَيْرَفُون كَبِيْر صيفي، زَيْرَفُون كَبِيْر Tilleul à (۲) الزَّهْر، زَيْرَفُون شَجِيْح الزَّهْر، زَيْرَفُون شَجِيْح الزَّهْر (۲) grandes feuilles, Tilleul d'été, Tilleul femelle (F)

Tilia platyphyllos, Tilia grandiflora, Tilia pauciflora, Tilia europaeavar, platyphyllos (S)

⁽١) التَّسمية العربيّة الأولى والتَّسميات الإنكليزيّة والألمانيّة للمؤلَّف.

⁽٢) كلِّ التَّسميات العربية للمؤلِّف ما عدا الأولى.

شجرة من فصيلة الزَّيْزَفُونِيَّات تعلو ٣٠ مترًا وتعمر طويلًا. لحاء الجذع والأغصان مالس. فروعها زغبية. أوراقها متبادلة، معنَّقة، مستدقَّة الرّأس، شبه مستديرة، لا متناسقة القاعدة، خفيفة التَّسنُّن، كامدة اللَّون الأخضر، صفحتها العُليا مَرْطاء، السُّفلي لِبديّة طويلة الأوبار، خاصة على تقاطع العرق الرَّيسيّ مع العروق النَّانويّة. أزهارها خُنثويّة، مصفرة اللَّون الأبيض، عَطِرة، في باقات صغيرة متدلِّية، قُناباتها مستطيلة، زنادها طويل. النَّاج خماسيّ مستطيلة، زنادها طويل. النَّاج خماسيّ مقطعها خماسيّ الزَّوايا، أضلاعها بارزة.

المركبات - دهن يحتوي على فَرْنيزول، منغانيز، خميرة تأكُسُد، مواد عفصية، غلوسيدات، فيتامين «ث»، ستيرولات، لعاب، كاروتين... في الأزهار: ٣٠,٠٪ زيت طيّار، عفص، سُكَّر، الكثير من الصمغ، كلوروفيل. البذور تحتوي على ٥٨٪ زيت دسم غير مُجفَّف، خالٍ من الرّائحة والطّعم المُرّ، يتقارب من زيت الزّيتون الجيّد. الشّكير والقشرة الأولى: لعاب سميك مليّن وملطّف.

الاستعمال - تَقلَّصات، تَشنُّجات، حالات عسر الهضم، حالات أرق، عُصابات، هستيريا، وسواس المرض، سُوَيْداء، تصلُّب الشَّرايين، كظَّة الدَّم،

آلام الشَّقيقة (الأوراق)، حالات حُمِّيَة. الخصائص - مُضادِّ للتَّشنُّج، مُدِرِّ العرق الغزير، مسكِّن، منوِّم خفيف، يؤثّر على زيادة لزوجة الدَّم وتخثّره،

مُبوِّل، مُهدّئ، ملطِّف، مليِّن.

طريقة الاستعمال - تُستعمل الأزهار بشكل عام في نقاعة بنسبة ١٠ بالألف، كمضادة للتَّشنَّج ومعرِّقة غزيرة، وبنسبة ٥٠٠ غرامًا في حمّامات مهدَّئة. كما تستعمل هيدرولة الزَّيزفون، أي ماؤه المقطَّر، كسَوَّاغ لعدد من الجروعات الطَّبَيَة.

وأكثر ما تستعمل الأزهار مرفقة بقناباتها ممّا يعطي مشروبًا أقلّ نكهة وفعاليّة. أمّا لعاب الشَّكير والقشور فينصح به كمليِّن وملطِّف على الحروق وآلام النقرس، وفي معالجة التهابات المَعِدَة والأمعاء المزمنة (الدكتور كازان). ويُعتبر الشَّكير ولعابه دواء شافٍ للرِّمال الصَّفراوي في نقيع من ٣٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى، كما يعتبر مضادًا للتَّشنُّج والتَّقلُّص الكَبديّ الصَّفراويّ.

هناك مضغوطات مُلبَّسة ومعيَّرة بنسبة ٢٥٠ ملغ من مستحضر الشكير، تُنظُم صبيب الصَّفراء، وتوقف تَشنُّج المجاري الصَّفراويّة كالتَّقلُص والرُّمال والاضطرابات الكَبديّة.

نقاعة الأزهار، من ١٥ إلى ٣٠ غرام في ليتر ماء غال يغطّى عشر دقائق ويؤخذ منه ٢ إلى ٤ فناجين يوميًّا. نقاعة الأزهار مع أوراق البرتقال، للإصابات العصبية، زَيْت صديق الشَّغر(١١) Huile philocome **(F)**

> مُخ ثور زيت لوز زيت بندق

بمقادير متساوية .

تجميلي للشعر. من كلمتين يونانيتين: صديق، شعر.

Huile de garou (F) قشرة كَرُدمانة جافّة١ جزء ندقّها في هاون مع الكحول، ونتركها تنهضم في: زىت زېتون ۲ جزء

نُمرِّر مع العطر القويّ.

زَیْت مسهّل قَویّ (Huile purgative (F سَقَمُونيا أي محمودِيّة ۱,۲۷ غ ٠٣٠ غ نحل؛ ١٥ إلى ٥٠ غرامًا في مستحلب.

زَيْت مُفَنَّك أو مُفَنَّل Huile phéniquée ou phénolée (F)

زيت الخشخاش المنوم ٩٨ غ فينول مخزني ۲ غ

دستور أدوية ١٩٠٨.

زيوت طبِّيَّة زَيْت مُكَوْفَر، مَرُوخ مُكَوْفَر Huile camphrée, Liniment camphré **(F)**

كافور طبيعتي غير مُصْطَنَع مبثور ١٠٠٠غ

(١) التَّسمة للمؤلِّف.

والرَّبو، والسُّعال النوبيّ، والتَّخلُّجات، وآلام الشقيقة، والقيئ العَصبيّ.

ملاحظة - عندما قرَّر النَّازيُّون، عام ١٩٤٠، تجويع الشُّعب الفَرنسي، عَمَد البروفسور ليون بينيه إلى تحضير ما سُمّى بـ «الطَّحين الأخضر» من أوراق الزَّيزفون بعد تجفيفها وسحقها ونخلها. وكان يتمّ خلط الطَّحين الأخضر مع ﴿ زَيْتِ الْكَرْدَمَانَةُ طحين الشَّعير أو مع طحين السَّرّازان، واستهلاكه في التَّغذية العامّة. وكان هذا الطُّحين يؤمِّن حوالي ٢٨ بالألف من الأزوت و ٢,٥ بالألف من الكلوروفيل.

۱۳۵ - زيوت طبيّة Huiles médicinales

زَيْت الذّراح (Huile de cantharides (F) ذُرّاح (حشرة) مسحوق خشن 💮 ۱۰۰ غ زیت لوز زيت زيتوننين ١٠٠٠ غ إستعمال بيطري.

> دستور ۱۸۸٤. موضعیّ یستعمل کَنَار سائلة.

> زَیْت رَمَادِیّ Huile grise (F) أطلب مَحلول زئبقيّ مُعَلَّق يُزْرق.

> زَيْت السَّرْخَس الذَّكر Huile de fougère mâle (F)

> مستخلص الرخس الذكر المؤثيرَ ٢٠ غ زيت فستق العبيد ٨٠ غ إستعمال بيطري.

ضد داء المَشْقُويات عند المُجْتَرّات.

111

ز ي و

 Huile iodée (F)
 مُيَوَّد

 ه غ
 يود

 يود
 ديت لوز

نَحلّ اليُود في الزَّيت بواسطة الهاون، ونُسخِّن في حمّام مريم حتى إزالة اللَّون. إنَّ هذا الزَّيت يحتوي على ٠٥٠٠ غرام من اليود في ١٠٠ غرام.

مقداره: مِلعقة إلى ملعقتين صغيرتين. نُصِح بالزَّيت المُيَوَّد كدواء بديل أو بالحري كدواء مُجانس لزيت كَبِد المُورَة. إنّ زيت پَرْسُنَ المُيَوَّد مَرَدُّه إليه؛ ولكن پَرْسُنَ كان يُحضِّره بجعل مجرّى من نجار الماء يصل إلى السّائل المزيج. إنّ زيت ڤيزو Vézu بيودور الكبريت يعود إلى مزيج من الزَّيت المُكبرت الخفيفين. المُعبرت الخفيفين. أذخِل إلى السّداوي منذ عدّة سنوات أدخِل إلى التّداوي منذ عدّة سنوات زيوت مُيوَّدَة أكثر تركيزًا بكثير (١٠ يتفاعل على زيت السمسم. ويحضر ويحضر يتفاعل على زيت السمسم. ويحضر أيضًا زيوت بروميّة بالطُّرق ذاتها.

زَيْت الورد الباهت، زَيْت الورد الجوري، لَيْت مُوَرَّد Huile de roses pâles, Huile rosat (F)

زيت زيتون أو فستق عبيد ٩٠٠ غ زَيْت مُيَوَّد

نَحلّ الكافور في الزَّيت إمّا على البارد أو في حَمّام مريم عند ٦٠° سغ، ونُصفّي. (دستور ١٩٦٥). إنّ زيت راسْپَايْـل المُكوفَر لا يختلف عن هذا الزَّيت.

تجربته - ينصح عددٌ من المؤلّفين، لتقدير الزّيت المُكَوفَر، باستعمال المِقطاب؛ كلّ درجة انحراف في الأنبوب ٢ دسمتر تقابل حوالى ١٪ من الكافور. الزّيت المخزنيّ بنسبة ١٠٪ يجب أن يعطي إذًا انحرافًا قدره + ١٠٠ إذا استعملنا الكافور الطّبيعيّ المُيامِن.

إستعماله - مَرُوخ نُشادريّ مُكَوفَر (دستور ۱۹۶۹).

التَّركيبة ذاتها اعتُمِدت في كتاب الوصفات الفرنسيّ الوطنيّ الصادر عام ١٩٧٦؛ استعمالها كمروخ مُصَرِّف.

Huile camphrée زَیْت مُکَوْفَر مُرکَّز concentrée (F)

كافور طبيعي ١٠ غ زيت نباتي مُعَادَل ٣٠ غ إستعمال بيطري .

ضِد قُلابات الحصان (التهاب العَضَلة القلبية).

Huile camphrée زَیْت مُکَوفر یُزْرَق injectable (F)

أطلب مُذابة الكافور الزَّيتية المزروقة.

پروس يستبدل القرميد بالكلس.

زَيْت صمغ الدَّوْرَم المخزنيّ المُحتَرّ Huile de gomme ammoniaque pyrogénée (F)

صمغ دَوْرَم مخزني ٢ جزء رمل

نقطّر، نفصل الزَّيت وننقّيه.

نحضر بالطَّريقة ذاتها زيوت المُرّ، والبنجوان، والصّابون، المُحترَّة.

زَيْت النَّضِيْد (Huile de schistes (F)

نصح بهذا الزَّيت المسحوب من الأحجار النَّضيديّة بالتَّقطير، في تمسيدات لمعالجة الجرب، بمقدار وبضعة غرامات.

يتم الحصول على الزَّيت الكبريتيّ Ichtyol بتقطير جافّ لبعض أحجار نضيديَّة زفتيَّة وأحافيريَّة.

الورد مساوية للكمِّيَّة الأولى، مع تكرار العمل كما ذكرنا أعلاه؛ نُصفِّي الزَّيت أخيرًا (دستور ١٨٦٦).

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها زيت القرنفل، والسَّوسَن، والياسمين، والبنفسج.

١٣٦ - زيُوت مُحْتَرَة

نصهر الشمع بطريقة يمكن معها صنع كُرات مع مسحوق القِرميد ونقطّر في حمام الرمل. يعطي التَّقطير الأوّل زيتًا زِبْديًّا، هو زبدة الشَّمع، نمزجها مع القرميد المدقوق، ونعاود تقطيرها ثانية حتى يصبح النَّتاج الحاصل مائعًا.

نحضّر بالطَّريقة ذاتها زيوت الموادِّ الدَّسمة.

ز ي و

س

۱۳۷ - ساغُو Sago (E)

Sagou (F)

Sago (D)

نشاء على شكل حبوب صغيرة قطرها من ١ إلى ٨ ملم، مستديرة، مبيضة أو مُحمرَّة اللَّون، صلبة جدًّا، مطّاطة، قرْنيّة، عديمة الرّائحة، تَفِهة الطعم الخفيف الحلاوة. تَتلَيَّن وتنتفخ في الماء الغالي. دخلت إلى أوروبًا عام المولوك، من لُبّ عدّة أنواع من فصيلة المولوك، من لُبّ عدّة أنواع من فصيلة النَّخُلتَات:

Metroxylon (Sagus) Rumphii Mart. Metroxylon Sagu Roth.

Sagus (phœnix) Farinifera Gaert.

Raphia pedonculata Beauv. Etc...

ذكر بَرْجِيُوس أنّ المولوكيِّين يُقَطِّعون جذع النخلة إلى قِطع يشقونها طوليًّا ويسحبون اللّب الذي يَحلّونه بالماء لكي يصنعوا منه عجينة يمررونها في الغربال ويجفّفونها. جذع واحد يعطي ٣٠ كلغ من السّاغُو أحيانًا.

الخصائص - مقوٍّ مُنَشِّط Analeptique منهضم جدًّا.

الاستعمال - يستعمل الشرائد أي الأحسية المُركَّزة في إنكلترة والهند. أعيد تسجيل السّاغو في الفرماكوبيا عام 19٧٤. يجب عدم الإشراك بينه وبين ساغو الهند الغربية، وساغو البرازيل أي Tapioca الذي يختلف مصدره تمامًا والذي يُحضّر من طحين المَنْيوك أو مَنْهُوت.

الدود، عُشْبَة الهند (۱۳۸ مسيجالِيَة طاردة (۱۳۸ مسيجالِيَة طاردة للدود، عُشْبَة الهند (۱۳۸ Worm grass (E)
Spigélie anthelminthique, Brinvillière (F)

Indianisches wurmkraut (D) Spigelia anthelmia (S)

نَبات عُشبيّ حَوليّ من فصيلة السبيجاليّات يعلو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. أوراقه متقابلة سِنانيّة النَّصل. أزهاره في سنابل وحيدة الاتِّجاه لونها إلى الوَرديّ، باطنها أصفر. ثماره عُليبات كُرويّة صغيرة القدّ. الكأس والزهرة خماسيّة الأقسام. أوراقه وجذوره وسوقة وأزهاره تُستعمل في الطبّ منذ العام ١٧٤٠.

المركبات - الجذور والعُشبة تحتوي، حسب Fenculle (۱۸۲۰) على «مادة مُرّة» دعاها سبيجالين، وهي بالواقع قلويد. بُوورسما عزل من النّبات قِلَويدًا سامًا للغاية يُذكّر بالستريكنين.

⁽١) التَّسمية العربيَّة الأولى والثَّانية للمؤلِّف.

الخصائص - المادّة المُرَّة مسهِّلة قويّة، القِلَويد مُكَزِّز.

الاستعمال - نُصح بأنواع السبيجالية كمهيِّجة، ومسهِّلة، وبنوع خاص طاردة للدود. وهي نَباتات سامّة إذا كانت غضَّة.

طريقة الاستعمال - لطرد الديدان عند البالغ ٠,٥٠ إلى غرامين في اليوم.

ملاحظة - السبيجالية المرطاء (۱) Spigelia glabrata Mart من البرازيل، وأنواع أخرى سواها، تشترك بالخصائص الطبيَّة ذاتها.

المُرَط، مُرَّيْرَة الغابُون، مَرَّيْرَة لَطِيْفَة، الْمُرَط، مُرَّيْرَة الغابُون، مُرَّيْرَة لَطِيْفَة، Glabrous strophanthus,

Agreeable strophanthus (E)

Strophanthe glabre, Strophanthe agréable (F)

Strophanthus gratus (S)

نَبات عارش ليفيّ من فصيلة الدَّفْلِيَّات. أوراقه متقابلة، ريشيّة التَّعريق. أزهاره سَنميّة التَّعريق. أزهارو سَنميّة التَّجميع الهاميّ. مهده الغابون والكامرون والكونغو ومناطق نيجيريا الجنوبيّة. ثماره تحتوي على عدد كبير من البزور التي تعلوها ضمّة من الأوبار الحريريّة التي يحملها شِمراخ يطول

حسب الأنواع. بزوره إلى البُنِيّ س ت ر الشاموا، وهي أفتح لونًا من بزور النَّوع الهُلْبيّ، طولها من ١٢ إلى ١٣ مم كحدً أقصى، عرضها ٣ إلى ٥ مم، مستديرة الشَّكل، مَرْطاء المظهر، منفرجة القاعدة، مُخفَّفة الرأس إلى منقار، مُتَلَوِّيَة في غالب الأحيان.

القُنزعة مشابهة لما في الأنواع الأخرى، ولكن القسم السُّفليّ من شمراخها عار وأقصر حيث يمثِّل حوالى الثلث ($\frac{1}{7}$)؛ القسم العُلويّ الذي يحمل الأوبار الحريريّة المنبسطة يبلغ حوالى 70 مم طولًا، ويمثّل حوالى ثلثي ($\frac{1}{7}$) الشمراخ.

أحد وجهي البزرة المسطّح القاعدة، يحمل عند ثلثها السفليّ عرفًا بارزًا صغيرًا هو الرّآفة Raphé؛ أما الوجه الآخر المُحدَّب فيحمل في وسطه خطًّا بارزًا يمتدّ بانتظام حتى رأس المنقار.

إن هذه المواصفات هي مواصفات واضحة المعالم أكثر بكثير، ممّا هي عليه في الستروفنتوس الهلبيّ والكُمْب، ذلك أنّ طحرة البزرة تكون خالية من الأوبار الحريريّة اللَّاصقة التي تكسب بزور النَّوعين المذكورين، الكُمْب بنوع خاص، مظهرها المتموِّج Moiré. إن طعم بزور هذا النوع هو أقلّ مرارة من طعم النَّوعين إيّاهما بشكل ملموس.

المركّبات - إن الهيتروسيد المتبلّر الذي يُستخرج من ستروفنتوس الغابون هو

⁽١) التَّسمية للمؤلُّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة الأولى والنَّانية للمؤلِّف والتَّسميَّان الإنكليزيِّتان للمؤلِّف.

الوَبائِين. إن بزور هذا النوع لا تَتَلُوَّن مع الحامض السولفوريك المركز باللون الأخضر الذي نلاحظه مع النَّوعين الآخرين؛ ولكننا نشاهد ألوانًا ورديّة أو بنفسجيّة. ونظرًا لهذا الفارق البارز يضع بعض العلماء هذا النوع في جنس متقارب يطلق عليه اسم Roupellia grata. في أنواع سحلب أوروبًا والشَّرق من فصيلة كودكس ١٩٧٢ ذكرت بزور نوع الغابون كودكس ۱۹۷۲ دىرك بررد ي والكُمْب فقط، سام، - الجدول يتبع: سَخْلب مُوريو^(۱)

١٤٠ - سجائر زُرْنيخيّة Cigarettes arsenicales (F)

ماء مقطِّ

تُدعى "ورقة بَرْزَليوس" تمتص المُذابة؛ وتُجفّف. نُجفُفها ونُقطِّعها إلى ٢٠ قطعة تحتوي يقع السَّحلب في درنات لَوزيَّة الشَّكل كلّ منها على • سنتغرام من الزَّرنيخ. المستدير البّيضائيّ أو الرّاحيّ، صلبة نَلفٌ كل مُرَبّع على ذاته وندخله في جدًّا، لونها إلى الرَّماديّ المصفر، أنبوب ورق السجائر.

> ١٤١ - سجائر بودان الزَّرْنيخية، سجائر ديوسقوريدس Cigarettes arsenicales de Boudin (F)

أسِتات زَرْنيختيا سنتغ نحل الأستات في عِدّة نقاط من الملح، نَمتص المُذابة بواسطة قطعة من الورق نُجفِّفها ومن ثمَّ نَلفّها كالسيجارة.

الاستعمال - في الرَّبو.

١٤٢- سَخُلُب، سَطوريُون Salep (E) Salep, Satyrion, Salap, Scrotum de chien, Patte de loup (F) Salepwurzel (D) Orchis (S)

يَتَكوَّن السَّحْلب من درنات مختلف السَّحْلَبِيَّاتِ أو الشُّحْرِيَّاتِ. أهمَّها ما

Orchis Morio L. سَحْلب مزدوج الورق(١) Orchis bifolia L.

Orchis militaris L. (۱) عَسْكُر يُ صَالِحُلْ عَسْكُر يُ أرْسينيات الصوديوم المتبلّر١ غ سَحْلب عريض الورق.Orchis latifolia L أرْسينيات ۲۰ غ سَحْلب ذکر Orchis mascula L.

نَحل الملح بالماء؛ نَجعل ورقة تصفية تُغْسَل الدرنات، تُغلى بعض الوقت

مكسرها قرني ونصف شفّاف. ينثر السَّحلب رائحة خاصة خفيفة؛ الماء يُلَيِّنه ويسهِّل سحقه. يتألُّف السَّحلب من نشاء، ومن مَنّانات Mannanes ومن غُلُكُتانات

الخصائص والاستعمال - يُستعمل السَّحلب دائمًا مسحوقًا. تُحضَّر منه ثرائد أو عصائد، مُجمَّدات، شوكولاته مغذِّ ومقوِّ ومنشِّط. كانت درناته تستعمل

⁽١) التَّسمات العربة الثلاث للمؤلِّف.

في الماضي كناعظة، وهي خاصة نُسِبت إليها من دون شك بسبب ما كان يُسمّى «نظرية التَّشابه»، أي بسبب ترتيبها على غرار كيس الخِصْيَتين.

ملاحظة - إن درنات نَبات «سَحْلَبيّة السَرِّجُلِ السَمْسَنوق»(١) Aceras السَرِّجُلِ السَمِسْنوق»(١) من فصيلة السَّحْلَبيّات، تعطي سحلبًا جيّدًا؛ وهو السَّحْلَبيّات، تعطي سحلبًا جيّدًا؛ وهو نبات شائع في فرنسا والجزائر، يشبه جدًّا النبات اللَّبنانيّ Ssp.galilaea. أوراقه تحتوي على كومارين، وتتحلّى، إذا تخمَّرت بعض الشيء، بخصائص مشابهة لخصائص الفيء، بخصائص مشابهة لخصائص مفيدة في إصابات الأعضاء التنفسية. نقاعتها ٥ بالألف. يحضر منها مستخلص ومسحوق وماء مقطر.

الله مَلِيْنَة صَغِيرة، مَلِيْنَة صَغِيْرة، صَغِيْرة، صَغِيْرة، Small honey-wort, (۲) كثيبيْشَة البَرَص (۲) Wax flower (E)
Cérinthe petite, Petit mélinet, Mélinet minor (F)

Gelbe wachsblume (D)
Cerinthe minor (S)

نَبات مُحوِل أو مُعمَّر من فصيلة الحِمْحِميّات، أمرط، مُتعدِّد السّوق، يَعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم؛ سُوقُه مُنتصِبة، فَرعاء. أوراقُه مالِسة أو مُتدرِّنة

الصَّفحة العُليا، القاعديّة منها مُتطاوِلة وَلُوقيَّة تَضيق إلى عُنق، الساقِيَّة قَلبيَّة القاعدة، مُتطاوِلة مِلْوَقيَّة مُستديرة الأُذَيْنات. سَنماتُه الشَّمرية تَستطيل جدًّا في النّهاية. قُناباته قَلبيَّة تَتخطّى الكؤوس وتَخفي قسمًا كبيرًا من الأزهار أثناء تفتُحها. فصوص الكأس سِنانيّة، مُستديرة القاعدة. التاج مَرَّة ونِصف مُستديرة القاعدة. التاج مَرَّة ونِصف المُسَرَّة طول الكأس، باهِت اللَّون الأصفر، ينقسم حتى ثلثه إلى فصوص اللُبنانيّة مُستدِقَّة الرّأس. يرغب المناطق اللَّبنانيّة العالية عن سطح البحر.

الخصائص والاستعمال - قيل عن السَّرنْتَة إنها جنس نباتات مِغثريّة طبيّة تفرز رحيقًا عَسليّ المادّة يجرسه النَّحل. أوراقُه طبيّة تُستعمل في علاجات العَين. بزوره تُسكّن المغص وأوجاع الجنب والظهر. فُرْزُعة منه مع الزَّعفران والعسل بعد الطهر تعين على الحمل. وهو يُهيِّج الباه.

۱۱٤ – سَرَنْتَة كَبِيْرَة، مَلِيْنَة كَبِيْرَة (٣) Major honey-wort, Major wax flower (E)

Cérinthe majeure, Grande cérinthe, Grand mélinet (F)

Grosser wachsblume (D)

Cerinthe major, Cerinthe aspera (S)

نَبات حَوليّ من فَصيلة الحِمْحِميَّات غالبًا ما يكون مُستمرطًا وبحريَّ اللَّون،

177

س ر ن

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة الأولى والثّانية لإدوار غالب.

⁽٣) كلِّ التَّسميات ما عدا اللَّاتينيَّة للمؤلِّف.

Runde zyperwurzel (D) Cyperus rotundus (S)

نبات مُعمَّر من فصيلة السُّعْدِيَّات، ريزومه نحيل، رئدي، يَنتفخ بدرنات بيضيّة الشَّكل، مسودّة اللُّون، كافوريّة الرّائحة. سوقه خشنة تعلو من ١٥ إلى ٦٠ سم، مَرْطاء، مالسة، مُثَلَّثة الزَّوايا، مورقة القاعدة فقط. الأوراق أقصر من السَّاق عادة، مُزَوْرَقَة خارجيًّا، مَرْطاء، رقيقة الحوافي الشفّافة. الأوراق القلافيّة ٢ إلى ٨ تتخطّى الأنشيل(١١) Anthèle المرتخى المؤلّف من ٣ إلى ٨ شعاعات غير متساوية قد تبلغ ٨ سم، مُغَمَّدة القاعدة بورقة أنبوبيّة باهتة اللُّون. الأَنْيُثلات (٢) Anthélules عِذْقِيَّة الشَّكل، شعاعاتها قصيرة وقليلة العدد مؤلَّفة من ٣ إلى ١٠ سُنَيبلات شبه مزدوجة الصفوف، من ١٠ إلى ٢٠ زهرة طولها ٢ إلى ٣ سم. عَصْفات كثيفة التّراكب لونها إلى الأحمر البُنِّيِّ وحتى الأصفر الوسخ.

الخصائص - الريزوم والدرنات مُنشَّطة، مستدرَّة للعرق الغزير، مبوِّلة، مطمئة، مُضادَّة للإسهال، طاردة للحمّى، طاردة للدود. أعيد تسجيله في الفرماكوبيا.

الاستعمال - رُمال كليوي، كريب، إسهال، طمث، اضطرابات كَبِديّة. وقويّ البُنية. ساقُه مُنتصِبة، بسيطة أو متفرِّعة، تَعلو من ٢٠ إلى ٢٠ سم. أوراقُه بَيضيَّة الشَّكل المُنعكِس، مَزمومة القاعدة، العُليا بَيضيَّة مُنفرِجة، مُزَرْكَشة السَّاعدة، العُليا بَيضيَّة مُنفرِجة، مُزَرْكَشة التصل، تُعلِّف السّاق، مَكسوَّة بتدرُّنات بيضاء اللَّون، مَرْطاء الصَّفحة العُليا، شقراء السُّفلي. أزهاره كبيرة القَدّ هاميّة التَّجميع الكثيف العَقْربيّ الشَّكل القصير، التَّجميع الكثيف العَقْربيّ الشَّكل القصير، واحد، قَنِينيّة الشَّكل، مُوبِرة، تاجها واحد، قَنِينيّة الشَّكل، مُوبِرة، تاجها الأسنان المُقوَّسة، وهو أصفر اللّون أو مُبقًع القاعدة ببقع أرجوانيَّة، جالس، مُبقًع القاعدة ببقع أرجوانيَّة، جالس، عريض، فصوصه قصيرة جدًا.

الخصائص والاستعمال - قيل عن السَّرَنْتَة إنّها جنس نباتات مغثرية طبّية تفرز رحيقًا عسلي المادّة يجرسه النحل. أوراقه طبيّة تُستعمل في علاجات العين. بزوره تسكّن المغص وأوجاع الجنب والظهر. فُرزُعة منه مع الزَّعفران والعسل بعد الطهر تعين على الحمل. وهو يُهيِّج الباه.

السَّرَنْتَة الكبيرة نبات لبناني نادر جدًّا، على عكس السَّرَنْتَة الصَّغيرة، أمَّا تَسميته سَرَنْتَة ومَلِيْنَة فلإدوار غالب.

١٤٥ - شُغْد شَرْقيّ، شُغْد مُسْتَدِيْر، شُغْد الحَيْر الخَيْر الحَمِيْر، رَزُّيْن، صَباح الخَيْر

Nut-grass (E)

Souchet rond, Herbe à oignons (F)

⁽١) التَّسمية العربيّة للمؤلّف.

⁽٢) التَّسمية العربيّة للمؤلّف.

طريقة الاستعمال - نقيع ٢٥ إلى ٥٠ غرام من الريزوم والدرنات في ليتر ماء يُغلى ويغطّى ١٠ دقائق ويؤخذ منه ٣ فناجين يوميًّا. درنات الرَّزِّين بطعم الكستناة، تستعمل مهروسة، في بعض الرُّيف اللُّبناني، لمعالجة حَبِّ الشّباب.

(۱) مَغْزَني، مَبَدِيْل مَغْزَني، مَبَدِيْل مَغْزَني، مَبَدِيْل مَغْزَني، (Cevadilla (E))
Cévadille, Sébadille, Sabadille (F)
Schœnocaulon officinalis, Sabadilla
officinarum (S)

نَبات بَصلى من فَصيلة الزَّنْبَقِيَّات السورنجانِيَّة. ساقه عُشبيَّة تَعلو حتى المترين، وتنتهي بازهرار سُنْبُليّ التَّجميع. أزهارُه صغيرة القَدّ، بَيضاء اللُّون. ثمرتُه عُلَيبة صغيرة بَيضويَّة الشَّكل تُشبه إلى حدٍّ بعيد حَبَّة الشَّعير أو حَبَّة الشَّيْلَم المُغَلِّفة، مُصفرَّة اللُّون، عديمة الرّائحة؛ طعمها حافر ولاهب. البزرة عديمة الرائحة، طعمها حامز ومُرّ، سِنانيَّة الشَّكل، خفيفة التَّحدُّب، دقيقة الرأس، مُسطَّحة الطُّرف وغير منتظمة الزُّوايا. طولها الوَسَطِّيُّ نحو ٨ ملم، وعرضها ١,٥ ملم. سطحها لامع اللُّون البُنِّيِّ المُسوَدِّ، ومُزَيِّن بخطوط طُوليَّة دقيقة القشرة الملوَّنة تُغلِّف سُويداء قَرْنِيَّة، مَبيضَّة اللَّون، تُحيط بجنين صغير يقع على قاعدة الحَبَّة.

المُرَكِّبات - لقد أمْكَن عَزْل الموادِّ س ف د التَّالية من الحَبَّة:

فيراترِيْن (٢) أي خُرْبُوقِيْن، وهو مزيج قَلُويدي، يجعل البزرة سامّة جدًّا، سَبَدِيْلِيْن (٢) أو سَوَادِلِين أو سِفْدِيْلِيْن (٣)، عزله Couerbe، سَبَتْرِيْن (٤) عزله Weigelin، وهذا ما يُشكِّل مجموع (٣,٥٠ إلى ٤,٢٥ بالمئة من القَلْويدات. ان هذه القلويدات تكون مشتركة مع عدّة حوامض من بينها حامض عَفْصِيك، وحامض فيراتريك أو خُرْبوقيك.

مواصفات المَسْحوق التشريحية - مسحوق قاتم اللَّون البُنِّي يتألَّف من خلايا كبيرة مُتطاوِلة، بُنيَّة اللَّون، مُتعدِّدة الزَّوايا، تَختص بالبَشرة، ومن خلايا تحصل من السُّويداء القَرْنيَّة وتترافق بتنقيطات أو جدارات معدومة التنظيم البنيوي. أكثر ما تُستعمل لاستخراج القيراترين.

المسحوق يُحدث العَطْس.

الخصائص والاستعمال - مُنبَّهة مثيرة ومُهيِّجة. يُستعمل السَّبَديل من الخارج في مسحوق مشترك مع مسحوق العائق الجَبَلي أو عُشبة القَمل، باسم «مسحوق الكبوشيين» Poudre des Capucins، أو باسم «مسحوق النَّظافة» Poudre de فذلك للقضاء على القمْل.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمية لإدوار غالب.

⁽٤) التَّسمية للمؤلِّف.

س ك ا

ويستعمله المكسيكيّون ضِدّ رُهاب الماء (خُوف مَرضي من الماء، داء الكّلب). ولقد جرت محاولة استعماله في فرنسا ضِدّ الحالات عينها، ومن ثم استُعمِل ضدّ السَّكْتة الدِّماغيَّة أي النُّقْطة، والشَّلَل، والدِّيدان، وفي المجالات المُخصَّصة للسُّورَنْجان.

العَرَب يُدخِلون الثِّمار المدقوقة في الهاون في مسحوق مُخصَّص للعينين.

طريقة الاستعمال - مقادير السَّبَديل من ، ٠,٥٠ إلى ٠,٥٠ غرامًا.

ملاحظة - في الطبّ تُستعمل البزرة الأذنات. (كودكس ١٩٧٤). يُنسب هذا النبات ملاحظة الدواء الآتي من المكسيك وأمريكا في الجنالوسطى، في بعض الأحيان وعن خطأ، النّباتات إلى جِنس «خُرْبُوق» Veratrum. وكان جدًّا. لم مونارْدِس قد عَرَّف به عام ١٥٧٢.

رَّفَ فِضَّيَّة، فَاقُوعِ فِضِّيِّة، Silver Scabious, (۱۹۵۰) المكابئوزة أُوكْرانِيَة Ukranian Scabious (E) Scabieuse argentée, Scabieuse d'Ukranie (F) Scabiosa argentea, Silberskabiose (D) Scabiosa ucranica (S)

نبات مُحوِل أو معمَّر من فصيلة الدِّبْساسِيَّات، سوقه منتصبة، خشنة، دقيقة، فرعاء جدًّا، تعلو من ٥٠ إلى

٨٠ سم. أوراقه زغبية إلى مبيضة اللّون الفضي، أو خضراء وشبه مَرْطاء، مختلفة الأشكال، السّفلى ريشية الأقسام إلى فصوص متطاولة خطية، العُليا خَطية ضيقة، مفصّصة أم لا. قُنابات القُلافة خطية سِنانية، أقصر من الرؤيس أو مساوية له. الرؤيس الزَّهري مسطّح، مساوية له. الرؤيس النَّهري مسطّح، قطره ١,٥ سم. التّاج فاتح اللَّون، أبيض، أبيض مصفر أو ورديّ الصّبغة. الوئيس الثَّمري كُرويّ، غالبًا ما تتَخطّاه الوئيس المُبنَقة. القُليْفَة ذات أنبوب القُنابات المُبنَقة. القُليْفَة ذات أنبوب أبيض، حريريّ. نصل الكأس قصير الأذنات.

ملاحظة - نَبات لبناني شائع جدًّا يُعرف في الجنوب باسم فاقوع، وهو من النَباتات المِغثريّة التي يرغبها النَّحل جدًّا. لم يرد ذكره في المراجع الأجنبيّة الطبّيّة، وهو يشبه إلى حدٍّ كبير النَّوع الطبّيّة، وهو يشبه إلى حدٍّ كبير النَّوع الطببّيّ Scabiosa Succisa. مُركِّباته وخصائصه مجهولة، ومن المفيد تحليله المخبري أو أقلّه تجربته في نطاق الخصائص الواردة لأنواع السكابيوزة الأخرى. أسماؤه المقترحة أعلاه هي ترجمة للاسم العلمي.

Poisonus بُحَالِي اللهِ اللهِ

Rhus toxicodendron (S)

نبات من أمريكا الجنوبية من فصيلة

⁽١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة والتَّسمية الإنكليزيَّة الأولى.

البُطْمِيَّات. سوقه سَرْعِية ومتجذَّرة. أوراقه ثُلاثية الوريقة البَيضيّة، الكاملة الحوافي (ذكر بعض المراجع العلميّة أنّها منشارية الأسنان)، لامعة الصَّفحة العُليا، زغبيّة الصَّفحة السُّفلى. هي أوراق ذات حموزة تكفي معها ملامستها فقط حتى تُهيِّج البشرة بشكل عنيف وتُحدِث عليها النَّفخات والنُّفظات، ومن الخطورة سكب عصارتها على الجلد وحتى فركها قرب الأغشية المخاطيّة. أزهاره مُخضرة اللَّون، عذْقيَّة المَّخميم.

المركّبات - تفقّد الأوراق الكثير من فعاليتها إذا جُفِّفت؛ وهي تدين بسمِّيَّتها إلى وجود الكَرْدُول ذو التَّركيب الكيميائيّ (C₁₅H₂₇.C₆H₃(OH)₂ والذي يُستخرج كذلك من بلاذُر الشَّرق: Anacardium .

الخصائص - مهيِّج سام، مُنفِّط.

الاستعمال - نُصح به ضِدّ القُوبات والشَّلل والسَّلَعَة أي العِقدة الخنازيريّة.

طريقة الاستعمال - مستخلص، كحولتور، مسحوق. نصح بالمستخلص ضدّ السَّلَعة والشَّلَل وسَلَس البول اللَّيليّ. ويُعطى مسحوق الأوراق بمقدار ٥٠,٠ إلى ٢٥,٠٥غ، تُكرّر حتى الإحساس بحكّة أو وَخْز أو نخْز أو تَنَمُّلِ ما. قليل الاستعمال، أدخله أَلْدَرْسُن إلى المادّة

الطبيّة عام ١٩٧٤، وأعيد إدراجه في سن د الفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٥.

سنْدِیان أَبْیَض، سِنْدِیان أَمْرِیكیّ – ۱٤٩ White oak, American oak (E) (2) Chêne blanc, Chêne d'Amérique (F) Weisser eiche, Amerikanischer eiche (D)

Quercus alba (S)

شَجرة كبيرة تَعلو من ٢٥ إلى ٣٠ مترًا وأكثر، أمَّا في المناطق الجبليَّة فإنَّها تتَّخذ شكلًا دَغْليًا مُنخفضًا. مَهدها وسط وشرق أمريكا الشمالية حيث يستخدم خشبها الثَّقيل في صنع المراكب والأثاث والعوارض والبراميل وفي التَّدفئة. أوراقها مُعبلة، طولها ١٢,٥ إلى ٢٢,٥ سم، قصيرة العُنق، مُزوّاة القاعدة، مُقَطِّعة من ٩ إلى ٧ فصوص مستديرة من كل جانب، قاتمة اللُّون الأخضر اللَّامع على صفحتها العُلبا، زغبية الصَّفحة الشُّفلي في البداية، تَصطبغ باللُّون البَنفسجي عند تمام الإيراق، تَنقلِب إلى اللُّون الأحمر الشَّديد في الخريف، غالبًا ما تبقى على الشَّجرة طوال الشتاء. بَلُّوطها مأكول، طوله ١,٨ سم، لاطئ غالبًا، يتساقط في الخريف؛ قمعها قليل العمق، حراشفه منتفخة ومُرْمدَّة اللُّون. وهو من الأنواع المذكورة في مراجع النباتات الطبية.

⁽٢) التَّسميات الإنكليزيّة والألمانيّة للمؤلّف.

س ن د

اللاخ، بَلْخ، جِيْدار – اسِنْدِيان بُلاخ، بَلْخ، جِيْدار – اسْنُدِيان بُلاخ، بَلْخ، جِيْدار Kermes oak, Scarlet oak (E)
Chêne kermès, Chêne cocciné, Chêne garouille (F)
Kermes eiche, kermesbaum (D)
Ouercus coccifera (S)

شُجيرة صغيرة دغلة في أكثر الأحيان تكثر في الأراضي الكلسية وتَعلو من المراقع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع القد، جلدية النصال البيضية المنتماوجة، شائكة الأسنان، لامعة اللون الأخضر الفاتح، مرطاء الصفحتين، مستدقة الرأس، طولها من ٢ إلى ٢ سم وعرضها من ١٠ إلى ٢٥ ملم. بَلُوطتها كبيرة القد، لامِعة القشرة، ممتراكِبة، خشِنة، منبسِطة أو مُحدَّبة. أعيد تسجيل هذه الشُجيرة في الإصدار أعيد تسجيل هذه الشُجيرة في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٥.

Dyer's oak, البُرْتُغال، عَفْص، مَلُّوْل العَفْص، سِنْدِيان العَفْص، البُرْتُغال، عَفْص، مَلُّوْل Gall oak, Nut gall oak (E)
Chêne à galles, Chêne du Portugal,
Chêne des teinturiers (F)
Echte galleiche, Galläpfel eiche (D)
Quercus infectoria, Quercus lusitanica (S)

شَجرة لُبنانيَّة تَعلو ١٠ أمتار وأكثر، قليلة التاسع للفرما التَّقرُّع بشكل عام. لحاؤها مُرْمَدِّ اللَّون، تُصاب أوراقه حَرشَفيِّ، غير قُرْقِيِّ. فروعها مُرمدَّة منها العفص.

اللُّون، كثيفة وهي فَتيَّة، كذلك الأوراق كثيفة ولبديَّة، ولكنَّها شرعان ما تُصبح مَرْطاء الصَّفحتين، شبه جلديّة النّصال، نصف دائمة، هوامشها مُتماوجة، مُسنَّنة، مُستدِقَّة الرَّأس، مُختلِفة التَّفريض أو شبه كاملة ولكنُّها مُتَلوِّيَة، وأحيانًا أخرى تكون كاملة تمامًا. عُنقها مُتفاوت الطّول من ٥ ملم إلى ٢ سم. القِدّات الذِّكريّة لِبديّة القُلافات، الأنثويّة قصيرة. السُّويقة النَّمريَّة مُتفاوتة الطُّول، قد تكون قصيرة جدًّا أو تطول حتى ٢ سم. قمع البَلوطة رمادي اللُّون، حراشفه لاطئة، تتَخطّاه البلوطة بشكل بارز. نوع يُصاب بتدرُّنات مَرَضيَّة يُطلق عليها اسم «جوز العَفْص» Noix de galle عليها أعيد تسجيله في الفرماكوبيا الحديثة عام . 1970

الاستعمال - راجع دراسة أحادية عن مركبات السنديان وخصائصه وطرق استعماله في المعجم السادس ص ١٢٢ رقم ١٤٦.

Chêne à سِنْدِیان عُنْقُودِیِّ – ۱۰۲ grappes, Chêne à galles (F) Quercus racemosa (S)

شَجرة أُعيد تَسجيلُها في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية عام ٩٧٥. تُصاب أوراقها بعَفْصات مَرضيَّة يُستخرَج منها العفص.

Chestnut سِنْدِیان کَسْتَنِیّ الوَرَق – ۱۵۳ foliate oak (E) Chêne à feuilles de Châtaignes (F) Blattkastanie eiche (D) Quercus castaneifolia, Quercus æs-

culus (S)

شَجرة مُعيِلَة الأوراق تَعلو ٣٠ مترًا، مهدها غابات جنوب وغرب بحر البلطيق وهي من الأنواع النادرة. أزهارها تبرز في نيسان وأيار مع الأوراق. الأنثويّة منها على إبط الفُروع الفَتيّة الهامي. بَلُوطها مأكول، طوله ٢٫٥ سم، يَنضع في سنته الثّانية ويَتَساقط في تشرين الأول. الأوراق قاتمة اللَّون الأخضر اللَّامع على صفحتها العُليا، رَماديّة اللَّون الكامد على السُفلى، طولها من ٧٫٥ إلى ٩ سم.

من الأنواع المذكورة في مراجع النَّباتات الطبَّيّة العلميّة.

White acacia (E) مَرُاس Acacia blanc, Mimosa blanc (F)
Weisse akazie (D)
Acacia albida (S)

شَجَرة لُبنانيّة تَعلو من ٢ إلى ٥ أمتار وأكثر من فصيلة القَرْنِيَّات. أغصائها بيضاء، مَرْطاء، قليلة الشَّوك. أوراقُها مُزدوِجة التَّركيب الرِّيشيّ، قد تَبلغ ١٥ سم، وُريقاتها تَطول نحو ١ سم وتَعرض ٢ ملم. أزهارُها سُنبليّة التَّجميع، بَيضاء

اللَّون، مُنفرِدة أو مُجتمِعة، أقصر من سور الأوراق، ٥ إلى ٦ سم. الثَّمرة سميكة، غير مُنتظِمة الشَّكل، مَضغوطة جانبيًّا نوعًا ما. إزهرارها ربيعيّ. مَنبتها ضواحي المُدُن السّاحليّة.

Blue مَنْطَ أَزْرَقَ، أَقَاسِيا زَرْقَاء – ١٥٥ acacia (E) Acacia bleu, Mimosa bleu (F) Blaue akazie (D) Acacia cyanophylla (S)

شَجَرة صغيرة من فَصيلَة القَرْنِيَّات مَهدها أستراليا الغَربيّة؛ فُروعها مُتَلَوِّية ومُزَوَّاة. أوراقُها قِلْدات طولها ١٠ إلى ٣٠ سم، بَحريّة اللَّون الأزرق، عَريضة وضَيِّقة الشَّكُل السّنانيّ، وتكون أحيانًا خفيفة الشَّكل المِنْجَليّ. عِرْق وسطيّ واحد. أزهارُها كثيفة النَّجميع في رُؤوس كُرَوِيّة الشَّكُل جميلة اللَّون الأصفر، من ٣ إلى ٨ على فُروع إبطيّة قصيرة، إزهرارها في الرَّبيع. فرُوعت منذ سنوات طويلة في مختلف مناطق السّاحل اللَّبنانيّ.

Autumn مُوْرَنْجان الخَرِيْف – ۱۵٦ colchicum, Meadow saffron (E) Colchique d'automne (F) Herbstzeitlose (D) Colchicum autumnale (S)

طريقة الاستعمال - تتَحلّى مُستحضرات السّورَنْجان بخصائص بارزة مُضادّة

س و ر

للنَّقْرِس وتتفاعل على المَعِدة والأَمعاء بشكل شديد؛ وعندما تبرز رَدَّة الفِعْل هذه على المَعِدة والأَمعاء تكون نَوبة النَّقْرِس في العادة قد شُفِيت؛ وتُعطى مُستحضَرات السُّورَنْجان في هذا النَّطاق بمقادير تتصاعد تدريجيًّا في أكثر الأحيان حتى بروز اضطرابات خفيفة في المَعِدة والأَمعاء. إنها مُستحضَرات فَعّالة أثناء حدوث النَّوبة النَّقْرِسيّة الحادة ولكنّها غير فَعّالة في الفَترات التي تَفصلها.

إن أفضل مُستحضر هو صِبغة البزور (كودكس ١٩٤٩)، تُحضّر عُشارية (١٠٠٠)، وهي نصف مرة أقلّ فعالية من صبغة دستور ١٨٨٤، وتحتوي حوالى صبغة دستور ١٨٨٤، وتحتوي حوالى منها يقابل ٥٦ نقطة. يعطى منها ٣٠ إلى ١٥ نقطة في البداية؛ نضيف ١٠ إلى ١٥ نقطة في الأيام التالية ومن ثم نُوقف نقطة في الأيام التالية ومن ثم نُوقف تَغيُّطات في اليوم. إن المقادير العِلاج بعد حصول أكثر من ٣ أو ٤ تغيُّطات في اليوم. إن المقادير الصّبغة هي غرام واحد للجرعة، ١٩٥٠ إلى ٣ غرامات لكل ٢٤ ساعة؛ المقادير القصوى: ٣ غرامات لجرعة واحدة و١٢ غرامًا لكل ٢٤ ساعة (بالغون).

إن مسحوق البزور نادرًا ما يُعطى في بيلولات بمقدار ٠٠,٠٥ إلى ٣٠,٠٠ في اليوم. مقاديره الاعتيادية ٢٠,١٠ لجرعة واحدة، ٢٠,٠٠ لكل ٢٤ ساعة. مقاديره القصوى هي ٣٠,٠٠ لجرعة واحدة، ١٦,٠٠ لكل ٢٤ ساعة (بالغون).

إن المُستحضَرات التي تُحضَّر من بَصَلَة السّورنجان أو أزهاره لم تعد تُذكَر في دستور الأدوية، وهي أقل فَعاليَّة بكثير من مُستحضَرات البنزور. أما كحولتورات البصل والأزهار (دستور ١٨٨٤) فكانت تحتوي على ٣٠,٠ إلى ٢٠,٠٪ من الكولْشِيسين؛ مقاديرها ١ إلى ٣ غرامات في اليوم. أما صبغة البصل الخماسية (أ) في دستور ١٨٨٤ فكانت تحتوي على ٢٠,٠ إلى ٣٠,٠ فرامات بالمئة من الكولْشِيسين؛ مقاديرها ٢ غرامات بالمئة من الكولْشِيسين؛

إن الأدوية الفعّالة النّاجعة Héroïques يجب ألّا تُعطى على شكل خمر (اتفاق دولي)، إن خمر بصل السورنجان، بنسبة ١٦٠ غرام في الليتر، الذي ذكر في دستور ١٨٨٤، ولم يعد مذكورًا في الفرماكوبيا، كانت مقاديره ٥ إلى ٢٠ غرامًا لكل ٢٤ ساعة. أمّا خَلّ السورنجان، بمقدار ٢٠٠ غرامًا من البصل في ليتر خَل، المذكور في دستور ١٨٨٤، فكان يعطى بمقادير من ٢ إلى ١٠ غرامات.

كان السورنجان أساسًا لعدد كبير من المُستحضَرات الصَّيدليّة المُضادّة للنُقْرِس مثال بيلولات لارتِيغ Lartigue، مسحوق بِسْتُويا Pistoïa، ليكور لاڤِلّ Laville، ليكور لاڤِلّ Cocheux، ماء هُدْسُن صبغة كُوشو Cocheux، نقاط رَايْنُولْد الطبيّ Hudson، نقاط رَايْنُولْد (Reynold، مُضادّ وَانْت النَّقْرِسيّ Want، وواء بيجيان المُتخصّص Béjéan، إلخ.

المحال مُوْرَنُجان دُوكاين، لَحُلَاح Decaisne colchicum, دُوْكاين (۱)

Decaisne meadow saffron (E)

Colchique de Decaisne (F)

Decaisne Zeitlose, Decaisne Lichtblume (D)

Colchicum decaisnei (S)

دَرَنة مُعمَّرة بَصَلتة الشَّكل من فصيلة السُّؤرَنجانِيَّات مُتَوسُّطة الأحجام يُغلِّفها إهابان أو ثلاثة إهابات دائمة إجمالًا لا تُعرِّي الدَّرَنة وقاعدة السّاق إلَّا نادرًا؛ وهي إهابات تستطيل حول قاعدة الأغَمِدة Cataphylles الّتي تَحصُرُ الأوراق والأزهار. أزهارها نادرًا ما تكون أكثر من ٢ إلى ٦، أنبوبها في العادة أطول من التَّبَلات التي تكون باهتة اللُّون الوَرديُّ أو نادرًا شبه بَيضاء، إهليلجيَّة الشَّكل أو سِنانيَّة، ضَيِّقة أحيانًا، طولها من ٥ إلى ٦ سم وحتى ٨ سم أحيانًا وعرضها من ٤ إلى ١٢ ملم. الأسدية أقصر من غلاف الزَّهرة بنصف مَرّة، بالكاد تَتخطّاها الأقلام أو لا تَتَخطّاها. الأوراق من ٣ إلى ٥، منفرجة، عرضها على الأرجع. من ٢,٥ إلى ٥ سم. إزهراره خلال تشرين الأول والثاني. أوراقه تبرز من شباط إلى أيار؛ وهو من الأنواع الشائعة جدًّا في

لبنان، في الحقول والأراضي المحجرة

والصخور والأماكن الكلسية بنوع

خاص. ورد باسم سورنجان دكني في س و س و س بعض المراجع.

تحليله المخبري مَرغوب للوقوف على مدى نسبته بالكولشيسين.

۱۵۸ - سُوْس (مُركِّبات كيميائيّة)، تَركيب السُّوس الكيميائيّ Réglisse (Composition Chimique) (F)

يحتوي جذر السوس على مادة مُلوّنة، وحامض مالِيْك، وأَسْهاراجِيْن بنسبة ٢ إلى ٤٪، وعلى جوهر خاص يُدعى غليسِرِّيزِيْن Glycyrrhizine أي حامض غليسِرِّيزِيْن غليسِرِّيزِيْن الله ٢١٪، وهو غليسِرِّيزيك بنسبة ٦ إلى ١٢٪، وهو الذي أطلق عليه پفاف اسم غليسِيُون والذي أطلق عليه پفاف اسم غليسِيُون ونجد فيه كذلك ٢٠ إلى ٣٠٪ من النشاء، ٢ إلى ٤٪ من السَّكاكر المُحَلِّلة كيميائيّة. وقد بَيَّن رُوسّان، عام ١٨٧٥، أن الغليسِرِّيزِيْن النَّقيّ هو غير قابل الذَّوبان وهو وتَفِه الطَّعم، وأن عمله حامض؛ وهو وتَفِه الطَّعم، وأن عمله حامض؛ وهو خصائصه ويُعظِّمها ويرافقه في النبات على الأرجع.

يمكن الحصول على الغليسرِّيزيْن بترسيب مُستخلِص السُّوس المحلول في حامض سُولفوريك خفيف، نَغسل الرَّاسب بالماء المُحْمَض أوَّلاً، ومن ثم بالماء النَّقيّ؛ نَحلّه في الكحول، نُعادله بواسطة كربونات البوتاسيوم، نُصفي ونُبخُر حتى الجفاف التّام. يكون

⁽١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية الفرنسيّة واللّاتينيّة.

ين و س

الغليسِرِّيزين الذي يحصل بهذه الطريقة في كتلة فاتحة اللَّون البُنِّيّ، لامعة، كَسُورة وشديدة الطَّعم السُّكَريّ. وهي تنتفخ بالحري في الماء أكثر ممّا تذوب فيه؛ تذوب في الكحول وليس في الأثير.

إن الغلِيسِرِّيزين ليس غلوكوسيدًا كما اعتقده البعض عام ١٨٦١، ولكنه في الحقيقة أشتير الحامض الغليسريزيكي الدِّيغْليكورونيّ diglycuronique؛ يُعطى بالتحليل المائي الحامض الغليسِرِّيزيكي وذَرّتَين من حامض الأورونيك Uronique؛ ولقد تَمّ التَّعَرّف لاحقًا على وجود الغليسِريزين في جذور وأوراق عُصْبَة السُّوسُ أي الشَّشَم Abrus .pecatorius L وفي جيذور وأوراق اللُّتَّيْنِ الشَّائِكِ^(١) Ononis spinosa (وهو مَا يُسمَّى في جنوب لبنان: شُبَيْرِقَة)، وفي جذور وأوراق نَفَل الجبال(١) Trifolium .alpinum L وعند الكُشْني السَّوداء Orobus niger L. وعند اليَرْيانُدرا الحُلْوَ (۱) Periandra dulcis Mart. وفي أوراق الأسطراغالس السُّكَّري السؤرّق (۱) Astragalus glycyphyllos L. وأسطراغالس آخر يُدعى Astragalus .Ammodytes Oall، وهي تنتمي جميعها إلى فصيلة القرنيّات؛ كما وُجِد، بالإضافة إلى ما تقدّم، في ريزوم بعض السَّراخس، مثال البَسْبَايج أي عَرَقْسُوس Polypodium vulgare L. وعند خَيْمِيَّة تدعى مِرِّيْس

Myrrhis odorata L. وهي نبتة تشبه جدًّا نباتًا لبنانيًّا عطريًّا من فصيلة المُركَّبات يُدعى .Tagetes minuta L. مُخْمَلِيَّة صَغيرة (۱۱)، وفي نبات من السَّبَنْديّات يُدعى .Chrysophyllum glycyphlæum يُدعى :Cas. كريزُوفِيْلُم سُكَّريّ (۱۱) (كلمة كريزوفيلُم من إدوار غالب).

كان تركيب الغليسِريزين الكيميائي مدار جدل، خاصة بين كل من هابرمان، وتشيرش، وسَدَرْبَرْغ (١٩٠٧)، غُوشُمان ١٩٣٧-١٩٣٦ المحتام ١٩٣٧-١٩٣٦ القترح قُوس ومن ثم رُوزِيكًا التركيبة التالية: С42H62O16 للغليسِريزين، والتركيبة والتركيبة د30H46O4 للحامض الغليسرّاتيك. يمكن الحصول على ٣٠ من الغليسرّيزين من ١٠٠ من مستخلص السُّوس. ولان الغليسرّيزين لا يذوب في الماء. فإن الغليسرّيزين النّشادريّ هو الذي يستخدم للحاجات الصيدليّة.

مُركِّبات جذر السُّوس الكيميائية - ماء ٨٤٪، رماد ٢٪، مواد دهنيَّة ٥،٠ إلى ١٪، نشاء ٣٠٪، سَكّارُوز وسكاكر مُحلِّلة كيميائيّة ٢ إلى ٤٪، مُنبِّت، جوهر مرّ، هيتروسيد فلاڤونيّ: ليكيريتُوسيد، جوهر مُسَكَّر، غليسِرِّيزين ٥ إلى ١٥٪ بشكل مُشتقّات كلسيّة ونشادريّة. إن جذر السّوس المؤلّف من الجذر والركوب غير المنظّقة والمجقّقة، يجب أن يحتوي، وحسب الفرماكوبيا الفرنسيّة، على ٤٠٪ من الحامض

الغليسر يزيكي كحد أدني.

لوحِظ غش عصير السُّوس بواسطة ما يُدعى Masticogna وهو عصير نبات من فصيلة المركّبات مهده أفريقيا الشّمالية يُسمَّى إشْخِيص أو شَوْك العِلْك . Atractylis gummifera L.

يستخدم خشب السُّوس يوميًّا في تَحلية الزهورات. وما يجب التنبّه له هو ألّا نستعمله سوى نُقاعة أو مَرْثًا، ذلك أن جوهره الحامز ينحلّ بالغلّيان وينتقل إلى السَّوائل. ولهذا لا يُضاف السُّوس إلى الزهورات المَغليّة إلّا بعد رفعها عن النار. ويجب كذلك قشره بالسكين لكي ننزع عنه القشرة البنيَّة، ومن ثم نُقطَّعه إلى قطع صغيرة نَنخلها لكي ننزع عنها الغبار. إن مسحوق خشب السوس يكون فاتح اللون الأصفر.

إن السُّوس الممروث بالماء مع كمية صغيرة من الكزبرة يشكّل المشروب الشُّعبيّ المعروف باسم كوكو Coco.

مستخلص السوس ومسحوقه (دستور ١٩٦٥) يستعملان جدًّا بهدف إعطاء بعض القوام للبيلولات. مستخلصه الخام (دستور ١٩٦٥) أي عُصارته يُستعمل كما هو، ويدخل في تحضير عجائن صدريّة ويستخدم في تحضير عصارة الشوس المُيَنْسَنَة. وهي دواء شعبيّ ضدّ الزكام (مقشّع ومضادّ للشعال). بالإضافة إلى ذلك، لمسحوق السوس خصائص مسهلة.

وهو يستعمل أيضًا في معالجة حالات س و س تقطّع الطمث وعسره، في مرث ١٠ غرامات لكل ليتر ماء ولمدة • ساعات، كمضاد للتشنُّج.

> إن استعمال السُّوس في معالجة التهابات المعدة أو في معالجة قرحات المعدة والعفج، إما على شكل مستخلص أو بإعطاء مشتقات الحامض الغليسراتيك، هو حصيلة أبحاث قام بها عالِمان (١٩٤٨) وعالِم آخر عام ١٩٥٠، ومن ثم أجراها في فرنسا كل من غُوتُمان وغِي أَلْبُوت عام ١٩٥٣؛ ومن ثم أجرى بعد ذلك كل من مارتان وهالْبَرن دراساتهما على الحيوان عام ١٩٥٣.

هناك مُستحضران مُتخصِّصان يستعملان هذا المبدأ في معالجة القرحات والآلام المعوية، منهماك مستخلص عصارة السُّوس الذي يحوي على ٦٪ من الحامض الغليكورونيك الحُرّ أو المُركّب، بالاشتراك مع مسحوق السوس، ويكون في مضغوطات من ٥٠٠ ملغ تحتوي الواحدة على ٣٠٠ ملغ من السوس. إن هذا المستحضر يجب ألا يستعمل في معالجة القرحات ولكن في علاج أعراض الآلام الشُّرْسُوفيَّة. التَّنبُّه إلى أن الغليسرِّيزين يُحْدِث انحباس الصوديوم، وفقدان البوتاسيوم (مجازفة ارتفاع التَّوتُّر الشّريانيّ).

Réglisse (۱) سُوس شائِك (۱) مُوس فائِك (۱) hérissée (F) Glycyrrhiza echinata (S)

نَبات معمَّر أَمْرَط أو شبه أَمْرَط من فصيلة القَرْنِيَّات (أوبار نادرة قصيرة جدًّا). سوقه مُنتصبة أو نائمة طولها حتى المتر أو أكثر. أذَّناته صغيرة جدًّا. أوراقه مُركَّبة من ٣ إلى ٦ أزواج من الوريقات المتطاولة أو الإهليلجية، المُستدقَّة الرَّأس. سويقاته قصيرة جدًّا، تحمل أزهارًا صغيرة، تجتمع في رؤيس كثيف. الكأس من ٢ إلى ٣ ملم، أسنانه أطول من الأنبوب، غِدِّيّ وزَغِب. التّاج أزرق اللُّون البِّنفسجيّ، بتلاته ضيِّقة وحادّة. رؤيسات مثمرة كُرويّة قطرها ٣-٤ سم. القرون بيضيّة الشَّكل المُنقلِب إلى متطاولة، مضغوطة قليلًا، ذات بزرتين، كثيفة الكساء بحرائر صلبة ومزركشة. يزهر من أيار إلى تموز في الأراضي المهملة.

Mountain (۲) الجِبال (۲) العِبال (۲) laburnum (E)
Aubour de montagne, Cytise de montagne (F)
Berggoldregen (D)
Laburnum alpinum (S)

شَجرة تَزيينيّة جميلة جدًّا من فَصيلة

القرنيّات الفراشيّة تَعلو ١٠ أمتار. أغصانُها مَرْطاء، أحيانًا خشِنة الأوبار. أوراقُها مُعْبِلَة، إهْليلجيّة، طويلة العُنق، أوراقُها مُعْبِلَة، إهْليلجيّة، طويلة العُنق، لا إلى ٧ سم، ثلاثيّة الوريقات الشّبه لاطئة، مُهدَّبة الحوافي. أزهارُها صَفراء في عُنقود ضَيِّق، هاميّ الارتكاز، مُنتصِب، يُزيِّنه بَعضُ الأوبار أحيانًا، قد يَبلغ ٤٠ سم. الشَّمرة قرن ضيِّق، مَضغوط، أمْرَط، يَنْفَلِق متأخِّرًا جدًّا عن بُرورٍ عديدة، كلويّة الشَّكل، بُنيَّة اللَّون، خالية من الزَّوائد.

المُركِّبات - قِلُويد سام في الأزْهار والبُزور: السِّتِيزين Cytisine؛ مرادفاته: باتِيْتُوكْسِيْن، لابُرْنِيْن، صُوفُورِين، أُولَكْسِيْن، يُستخرج أيضًا من اللَّزّان، تركيبُه الكيميائي C₁₁H₁₄ON₂.

الخصائص - مُدِرّ للصَّفْراء، مُسهِّل قَوى، مُوتِّه الأَمويّة.

الاستعمال - الإمساك، التَّتَبُّغ، الكَبِد، الخفاض التَّوتُّر.

طريقة الاستعمال - الدكتور لوكلير ينصح بنقاعة ١٠-١٠ غرامًا من الأوراق في فنجان ماء غال يُؤخذ كمدر قَويّ للصَّفراء. السِّتيزين يُستعمل طبيًّا على شكل كلورهيدرات لمحاربة التَّسمُّم بالتَّبغ. إن استعمال السَّوْقَم يَجب أن يُستَعْد من التَّداوي المنزليّ.

⁽١) التَّسمية العربيّة والفرنسيَّة للمؤلّف.

⁽٢) كلّ التَّسمياتُ للمؤلِّفُ مَا عداً اللّاتسنة.

Cactus à (۱۱ مُبِير الزَّهُر ۱۲۱ – سِيْروس كَبير الزَّهُر ۱۲۱ – ۱۲۱ grandes fleurs (F)
Cereus grandiflorus, Cactus grandiflorus (S)

يتميَّز جنس سيريوس عمومًا بنباتاته الشَّجَرانيَّة أو الصَّغيرة القَدّ، وبأزهاره الكبيرة، الحالية من الحراشِف، والتي تَسقط بعد الازهرار من دون أن تَترك نُدْباتٍ على الثَّمرة. وسيروس كبير الزَّهر نوع من فصيلة الصَّبّاريّات دَرَسه بُونييَّه وبواتَسَييه عام القلبيّة.

المُرَكِّبات - قَلْويد غير واضح التَّحديد: كاكْتِيْن، صَبَّارِيْن.

الخصائص - مُقوِّيَة للقلب.

الاستعمال - الزَّهرة الكبيرة الصَّفراء اللَّون المَقْدُودَة: إصابات قَلبيّة.

طريقة الاستعمال - صبغة بنسبة جزء من خمسة أجزاء، يؤخذ منها ١٠ إلى ٤٠ نقطة، ٣ مرّات في اليوم؛ كَاكْتِين، الجرعة القُصوى ٥ ملغ.

ملاحظة – كانت خصائص هذا النبّات المُقوِّية للقلب مَثار جَدَل، ذلك لأنّه كان، وبوجه الاحتمال، قد استبدل غالبًا بالأزهار السهلة التّمييز لصَبّاريّات عديدة مختلفة.

(أطلب دراسة صَبْرَة أو كَاكْتُوس في س ي س الله المعجم الرّابع ص ١٣٥ رقم ١٦٩).

Skirret (E) بيثسَارُون – ۱۹۲ Chervis, Cherouis (F) Zuckermerk (D) Sium Sisarum, Pimpinella Sisarum (S)

يَتألَّف جنس Sium من نَباتات عُشبيَّة مائيّة عمومًا، من فصيلة الخَيْمِيَّات، تكون أوراقها ريشيّة التَّفليق. من أنواعها السيسارون الصينيّ المهد. وهو نَبات طَوعيّ مُعمَّر في آسيا الوسطى، يَعلو نحو ١٥٠ سم. جذوره عُسقوليّة غليظة مِغزليّة الشَّكل، مأكولة، لُبابها أبيض اللَّون كمِكْسرها، نشويّ التَّركيب، سُكَّريّ الطَّعم.

الخصائص - الجذر دواء مُطْمِث، مُبوَّل، طارد للحمِّى. البزور تابلة.

الاستعمال - تُؤكل الجذور مَطبوخة كجذور السَّلْسَفيل، وهي طحينية المادّة السُّكَريّة جدًّا. أما أسطوانتها الوسيطة فتَتليَّف جدًّا، ومن الملائم نزعها ورميها. الثَّمار، وهي بزور تُشبِه بزور الشّومر، ولكنّها أدَق منها، يَستعملُها الإنكليز والألمان كتابِل.

ملاحظة - يُزرع السيسارون منذ أمد طويل في فرنسا، حتى إنه كان كبير الانتشار في حدائق عصر النَّهضة. ولكن نتاجه الخفيف جعله يُهمَل لحساب الدَّبَحْ

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

 س ى س الزِّراعق أي القَعْبَارُون وأنواع السَّلسفيل. ويَتمّ تكثير السيسارون بالبزور في تُربة خفيفة، عميقة، جيِّدة التَّسميد العُضويّ. ويَتمّ ذلك في الخريف أو في أوائل الربيع، وفي خطوط تبعد عن بعضها نحو ۲۰ سم.

١٦٣ - سَيْسَبان كَبِيْر الزَّهْر Great flowered Sesban, Danchi plant (E)⁽¹⁾ Agati, Sesbanie à grandes fleurs (F) Grossblüte Sesbanie, Schnurfrechme **(D)** Sesbania grandiflora (S)

شُجَيرة أو شَجَرة صغيرة مَجهولة المنشأ من فَصيلَة القَرْنِيَّاتِ القَراشِيَّة تَنتشر زراعتها في حَدائق الزِّينة. أوراقُها ثُنائيّة التَّقسيم الرِّيشيّ إلى وُرَيقات عديدة.

إزهرارها إبطى الارتكاز، عُنقودي التَّجميع المُرتخي. يُقال إنَّها من النَّباتات الطُّبِّيَّة يُتداوى بها لتفتيت حَصَى المَثَانة. من جنسها حَوالي ٥٠ نوعًا.

الخصائص والاستعمال - قشرتها غنية بصمغ قابض، وتشتهر على أنّها طاردة للحُمّى؛ مُستخلصها مُشةً ومُضادّ للإسهال، مُقيِّئ وماسِط بمقادير مُرتفِعة. أوراقها مُبَوِّلة؛ وهي دواء مَوضعيّ لمعالجة الكدمات والرَّضّ والفَكْش. أزهارها تُشكِّل عِلاجًا شَعبيًّا في كاليدونيا الجديدة ضد الزُّكام المُزمِن والشَّقيقة بحيث يُستَنشَق عَصرها بالمنخرَيْن. أزهارها الفَتية غَنية بالموادّ السُّكُّريّة، نَبْتُها الفَتِيّ وأوراقها الفَتيّة تُؤكّل مَطبوخة أو مَقْلِيّة.

⁽١) التَّسمية الإنكليزيّة الأولى والتَّسمية الألمانيّة الأولى للمؤلِّف.

ذكر كذلك أن جذوره وساقه وأوراقه ش ب ي وبزوره تفيد المَعِدة وتُقوِّي القَلب وتَصرِف الغازات وتوقف الفُواق. ويُستخرَج من جميع أجزائه زَيت طيّار فافع له استعماله الطبِّق.

ش

Spiny burdock, (۱) فُبَيْط شائك – ۱۶۰ Spiny burrweed (E) Xanthium épineux, Lampourde épineuse (F) Stachelspitzklette (D) Xanthium spinosum (S)

نَبات حَوليّ منتصب متفرّع من فصيلة المُركّبات يعلو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مَرْطاء، أسطوانيّة، مزوَّدة كالفروع بأشواك قويّة مثلَّنة طولها ٢ إلى ٤ سم. الأوراق سِنانيّة، حادّة، غير منقسمة أو مزدوجة ثلاثيّة التّقصيص، مَرْطاء، قاتمة اللَّون الأخضر على وجهها العُلويّ، صُوفيّة اللَّون الأبيض على الوجه الشّفلي. رؤيساته الذّكريَّة هاميّة وقصيرة. القُلافات الأنثى إبطيّة، فرديّة، تتدلّى في النّهاية، متطاولة، مصفرة اللَّون، عميقة الأثلام، أشواكها دقيقة ومعكوفة الرأس.

المركّبات - إستخرج زَانْدَر من بزوره عام ۱۸۸۱ مادّة Xanthrostrumarine، وهي غلوكوسيد يشبه الدّاتِسين. Meu, مُوْم، مُو – ۱۹۶ Spignel (E) Meum, Aneth sauvage, Fenouil d'ours (F) Wilder dillen, Feine Bärwurz (D) Meum athamanticum, Ligusticum

mem (S)

المُوم جنس نَباتات مُعمَّرة عِطريَّة من فصيلة الخَيْمِيَّات تَنبت في ضمَّات في ضمَّات في جبال أوروبا الغربيّة. والشَّبْث البَرِّيّ نوع أمْرَط، رائحته نَفّاذة. سامّة مُخطَّطة، تعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم، مُخطَّطة، بسيطة. أوراقه مُتطاولة، عديدة السَّكَمات التي تبدو كأنَّها دَوّاريّة التَّجميع، سيورها دقيقة، شَعريّة. التَّجميع، سيورها دقيقة، شَعريّة. الخيمة عديدة الشُعاعات. الثَّمرة مُتطاولة، مُزَوْرَقة الضُّلوع. البزرة ذات مُتطاولة، مُزَوْرَقة الضُّلوع. البزرة ذات مُلْتَقى مُقَعَر.

يَتمتَّع هذا النَّبات بكامل مظهر الشَّومر، إلّا أنَّه يَتميَّز عنه بعنقه المحاط بالأوبار الصَّلْبَة المُنتصِبة وهذا ما أكسَبه الاسم الفرنسي شومر الدُّبِ.

الخصائص - مُنشِّط، مُبوِّل. لم يعد مستعملًا.

⁽١) كلّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا الألمانيَّة واللاتينية.

ش ج ر

الخصائص - مُلَعّب، مبوّل خفيف، زاوية قائمة فيجعلان الورقة تبدو وكأنَّها عمله أقلّ بروزًا بكثير من عمل الجابورَنْدي.

> الاستعمال - كان يقال إنّه فعّال ضِدّ الكَلَب، بمقدار ٠,٦٠ غرام من الأوراق المجفّفة المسحوقة للبالغ، ٣ مرات في اليوم، ولمدّة ٣ أسابيع. وقد كشف كلّ من تراسْبُوت ونُوكارد أنّه نَبات خال تمامًا كبير من الحراشف المتراكبة. من الفعالية في شفاء الكَلُّب أو حتى اتقاء تطوّره، بعد التَّلقيح الطَّبيعيّ أو التَّجريبيّ . ذُكر أن الشُّبِّيطُ الشَّائِكِ والشُّبِّيطِ .macrocarpum DC هما بديل مزوّر لمختلف الأوراق المَخْزَنيّة، كأوراق تولِيبيفاريْن. الداتورة وسواها. إن كشف هذا الغش يسهّل من مظهر الثّمار المخلوطة إذا مقوّية. الجذر مُرّ وعِطريّ. وُجدت، بالإضافة إلى الفحص المجهري.

> > ١٦٦- شَجَرَة التُّولِيْب، شَجَرَة القَيَاثِير، شَجَرَة الزُّنْبَق (١) Tulip tree, Lyre tree, Saddle tree (E) Tulipier, Liriodendron, Tulipier de Virginie (F)

Echeter tulpenbaum (D) Liriodendron tulipifera (S)

شجرة جميلة الشَّكل من فصيلة المَغْنُولِيَّات تعلو من ٣٠ إلى ٤٠ مترًا، في قطر متناسق. أوراقها عريضة، مَرْطاء، كبيرة النَّصل الرُّباعيّ الفصوص، الفَصَّان الهاميّان يتقاربان في

(٢) كلّ التّسميات للمؤلّف ما عدا التّسمية الفرنسيّة

شَجَرة من فَصِيلَة الدُّفْلِيّات تَشيع في أدغال كاليدونيا الجديدة وتَرغب التُّربة

مقطومة. أزهارها عرفية الرّائحة، كبيرة

القَدّ، تُشبه التُّوليب، لونها إلى الصفار

الأخضر، مع بقعة بُرتقاليّة. خشبها ناعم

الرقعة، خفيف الوزن، تبنّي اللّون. إزهرارها في حزيران وتموز، وهي لا

تزهر قط قبل ٢٠ أو ٣٠ سنة. الثَّمرة شكل من المخروط المؤلّف من عدد

المركّبات - وجد فيها أَمَتَ جوهرًا

قابلًا للتبلّر، غير أزوتي: لِيريو دَنْدرين؛

وقال آخرون إن فيها عفص، وقلويد:

الخصائص - طاردة للحمى، منشّطة،

الاستعمال - الحُمّيات، الوهن.

طريقة الاستعمال - تعطى في أمريكا

الشمالية كطاردة للحمى بديلة عن

الكينا، ومقوّية في نبيذ أو مستخلص.

١٦٧ - شَجَرَة الشَّمْع، باجِيَنْتَا شَمْعِيَّة (٢)

Arbre à cire, Pagianthe cérifère (F)

Wax tree (E)

Wachs baum (D)

Pagiantha cerifera (S)

القشرة، خاصة قشرة الجذور.

المقادير من ٤ إلى ٦ غرامات.

الأولى والتَّسمية اللَّاتينيَّة.

(١) التَّسمة العربيَّة الثَّانية للمؤلِّف.

الشَّديدة القِلَوِيَّة .

المركّبات - قِلَوِيْدات عديدة مُختلِفة تَخضع لدراسات مُعَمَّقة.

الخصائص - إنّ مَرْت قُشورها يشكّل مُسَهّلًا عَنيفًا ماسطًا.

Mock عَرِيْضِ الوَرَق – ۱٦٨ privet (E) Phillyrée à larges feuilles, Filaria à

Phillyree à larges feuilles, Filaria à larges feuilles, Alavert, Aouret (F) Feinfilzige Lorbeerlinde (D) Phillyrea latifolia (S)

الشُّحْص جنس أشجار أو شجيرات من فصيلة الزَّيْتُونِيَّات. أوراقها دائمة، جلديّة النَّصل. كأسها رباعي الفصوص. تاجها على شكل دولاب رباعيّ الأجزاء نوعًا ما. مئابرها شبه لاطئة. الثَّمرة عُنيبة لحميّة، نواتها سهلة المكسر.

المُرَكِّبات - يحتوي الشحص على فِيلَيرِيْن (أي فيليروسيد)، وعلى هيتروسيد يتحوّل بواسطة الحامض الكلورهيدريك إلى غلوكوز وإلى فيليجانين.

الخصائص والاستعمال - الشحص العريض الورق شجرة إسبانية المهد تُستعمل أوراقها كطاردة للحمّى على شكل مسحوق أو نقيع، وهي أوراق قدَّمها الدكتور جاشَلّي، من فرّاري، كبديل للكينا.

ملاحظة - إن شكل الشحص الذي

يوجد في شرق المتوسط، ذات الأوراق شح ص المُسنَّنة، كان سِبَسْتيان قد ألحقه عام ١٩٥٦ بالشحص العريض الورق الذي قد يكون نُويعًا منه، بالرُّغم من قاعدة أوراقه غير القلبيّة الشَّكل. لذلك أورد أدناه مواصفات النَّوع اللَّبنانيّ الذي قد يمتلك المُركِّبات والخصائص ذاتها.

Phillyrée intermédiaire, شخص مُتَوسَط الورق، شُخص المرقي (۱۱) المرقي (۱۲۹ Phillyrée orientale (F) Phillyrea media, (Syn.: Ph. latifolia subsp. orientalis) (S)

شجيرة ليفيّة من فصيلة الزَّيْتُونِيَّات فرعاء جدًّا تعلو من ٢ إلى ٤ أمتار. فروعها الفتيّة وبنوع خاص أعناق أوراقها قصيرة الهُلْب اللَّبدي، وكل ما عدا ذلك أمرط. أوراقها قصيرة الأعناق جدًّا، غير قلبيّة القاعدة، بَيضاويّة نادرًا متطاولة، جلديّة، وهي دائمًا تقريبًا قويّة التَّسنين المِنشاريّ (في لبنان)، نادرًا كاملة. إزهرارها إبطيّ، حُزميّ. أزهارها فصير أخدًا، قمعيّ الشَّكل، يقسم سَطحيًّا إلى مُصفَرَّة اللَّون الأبيض. الكأس قصير جدًّا، قمعيّ الشَّكل، يقسم سَطحيًّا إلى الكأس، رباعيّ الفصوص. الثَّمرة عِنبِيَّة كُرويَّة، قطرها ٤ ملم، حمراء ومن ثم سوداء، تنتهي برأس حاد قصير. مجالها سوداء، تنتهي برأس حاد قصير. مجالها

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة الثانية للمة لُف.

من ٥٠ غ	من ٤٠	من ۴۰	شراب ليمون
۲۰غ	١٦	17	هيدروكربونات المغنازيوم
۲۳غ	70,7	19,7	حامض سيتريك
۳۰۰غ	۲.,	٣٠٠	ماء مقطر

(دستور أدوية).

الجغرافي محيط البحر المتوسط؛ والأماكن الحُرجية في لبنان.

۱۷۰- شراب ليمون سيترو-مَغْنازِي، شراب ليمون مسهّل قوي بسيترات المَغْنازيوم (F)

أدخل روجيه دُولابار هذا الشَّراب إلى المادّة الطبِّيّة منذ العام ١٨٤٧. عِدَّة تركيبات قُدُمت لتحضيره. تركيبة دستور ١٩٦٥ هي من ٥٠ غرامًا، ولكن التَّركيبة من ٤٠ غرامًا مذكورة فيه أيضًا.

نَحُلّ الحامض السيتريك في الماء، ونُضيف هيدروكربونات المغنازيوم. عندما يَتمّ التَّفاعل، وهو يحصل بسرعة، نُصفّى المحلول ونُضيف:

البطاقة يجب أن تُشير إلى مقدار سيترات المغنازيوم الموجود في الشَّراب، ويُفتَرض بالسيترات أن يكون مُتبلِّرًا. يُسَلَّم هذا الشَّراب في غالب الأحيان خالِ من الغاز.

يمكننا استبدال شراب الحامض السُّكَّري البَسيط بشرابات الكشمش، الكرز، الفرمبواز، شرط ألّا تكون قد تنقَّت أو رُوِّقَت بواسطة بياض البيض، إذ إن بقايا من الألبومين تُسهِّل نموّ العُفونات. إقلال كمِّية الماء كذلك إذا أمكن.

يمكننا أيضًا تحضير هذا السّائل المُسهِّل القَويِّ بطريقة أسهل بواسطة سيترات المغنازيوم المَخزنيِّ الذي أشرنا إلى طريقة تحضيره، إذ إنه وهذه الحال، لن يكون هناك سوى التَّذويب، والتَّحلية والتَّغيير، إذا كان ذلك مطلوبًا. إن بعض أنواع السيترات التجاريّة، الكثيرة الحموضة، تذوب بصعوبة، يجعلها البعض ذَوّابة بإضافة كربونات المغنازيوم إليها.

المواصفات - إن شراب اللَّيمون

طعمه الذي يكون طعم المتعة، لا يترك مجالًا للشك بوجود ملح مغنازيّ يوجد سيترو-مغنازي. فيه، بالرغم من ذلك، بنسبة قويّة. شراب اللَّيمون المَغنازيّ يَفسُد بسهولة؛ فيصبح غَبَشيًّا ودَبقًا؛ يحتوي عند ذلك على عفونات، من بينها فطور البنيسيليوم: des Penicillium. لذلك يجب تحضيره عند الحاجة فورًا.

> يَذكر جُوليارد طريقة لحفظ شرابات اللَّيمون من التَّلَف، نوردها كالتالى: نُحضِّر محلول سيترات المغنازيوم على السّاخن، نُصفّى، نُضيف ٥٠ غرامًا من شواب السُّكُّر، ونُعيد الكُلِّ إلى النار ونَغلى. نَسكُب السّائل الغال في قنّينة على غرام واحد من كحولتور ليمون الحامض ونقفلها فورًا.

> يقترح شميدت، لمنع ترسب سيترات غير قابل للذُّوبان، بتحضير محلول بنسبة الثلث من سيترات المغنازيوم، ومن جهة أخرى، تحضير محلول بالنسبة ذاتها من سيترات الصوديوم:

۱° حامض سيتريك١٠ ٠٨١ غ كربونات المغنازيوم ٠٥٧ غ ماء مقطر، كمية تكفي ۲۱۰ غ ۳° حامض سيتريك٢ بيكربونات الصوديوم ٢٥٠ غ ماء مقطر، كمية تكفىماء مقطر، نمزج المحلولين معًا؛ بعد مرور ٢٤ ساعة، نُصفّى ونَحفظ في القبو. فيكون لدينا بذلك مُستحضر بنسبة الثلث من

السيترو-مغنازي هو عديم اللُّون، صافٍ؛ السيترات المزدوج الذي يسمح لنا بالحصول على شراب ليمون صودي -

ش ر ع

إقترح البعض استبدال سيترات المغنازيوم بدُرْدِيّ الخمر «ترترات» الذي يحصل بواسطة حامض دُرُدِي الخمر المعدُّل بالحرارة أو حامض ميتاترتريك.

١٧١ - شَرَعْطُط مَنْقِعي، شَمَار الماء Water drop-wort, Water hemlock (E) Phellandrie, Fenouil d'eau, Ciguë

aquatique, Millefeuille aquatique (F) Wasser Filipendel, Wasser Pfersaat **(D)**

Phellandrium aquaticum L., = Oenanthe phellandrium (S)

الشُّرَعْطُط جنس نَباتات مائيَّة أو راطِية، مَرْطاء، من فصيلة الخَيمِيَّات. أوراقها مُقطُّعة. أزهارها ضُرِّيَّة بيضاء أو مُتورِّدة اللُّون بعض الشيء، مشعّة في أكثر الأحيان. أسنان الكأس حادة. البَتلات يَبضاوية الشَّكل المعكوس، مُقَوَّرَة، مَثْنيَّة الصَّفحة. حامل القَلم مخروطي الشَّكل. الثُّمرة متطاولة، دَوَّاميّة أو أسطوانيّة الشَّكل، مُكَلَّلة بالأقلام المنتصِبة. الماريكاربات خُماسية الأضلاع المُنفرجة، كلُّها أو الجانبيَّة منها على الأقل فِلْينية، سميكة. يَتمثَّل هذا الجنس في لبنان بأربعة أنواع على الأقل، يغيب عنها الشَّرَعْطَط المنقعيّ.

الشَّرَعْطَط المَنقعي إذًا هو نَبات شائع

ش ق ا

في كاقة أنحاء أوروبًا. يَنبت في الماء مُكوَّنة من ٣ وعلى حوافي السمجاري. يُشبه لاطئة، والكُلّ الشَّوكران. أوراقه نوعان: أوراق الزَّهرة. الزَّهر مَغمورة خَطِّية الشَّكل؛ وأوراق هَواثيّة كأسِيّة بَتَلانِيَّة. ثَنائيَّة أو ثُلاثيَّة التَّفليق الرِّيشيّ.

المُركِّبات - يحتوي النَّبات على كربور تَرپينيِّ يُدعى فلَّانْدران، وعلى أَلْدَهيد كَمَّونيِّ مُهَدْرَج يُدعى فلَّانْدرال.

الخصائص والاستعمال - كانت العُشبة من أربعة أنواع أعيا تُستعمل، وخاصة بزورها. وهي بزور الفَرْماكوبيا الفَرَنس تُشبه بزور الشّومر، رائحتها قويّة، عير مُستحبَّة، أعيد تسجيلها في بأزهاره الأصغر حجم الفرماكوبيا الفرنسيّة عام ١٩٧٥. يَعمل البَنفسجيّ الأرْجُوانيّ. شرعطط الماء كمخدر، ومُقشِّع، ملاحظة - بالنّس ومُبوّل، ومُضادّ للسِّل، وطارد للحمّي. والخصائص الطبيّة وال

طريقة الاستعمال - مقاديره من المسحوق غرام واحد إلى ٣غ في اليوم. أما مقاديره من المستخلص المائع فمن ١٠,٠٠ إلى ٠,٥٠ غرام في اليوم، للبالغين. لذكرى التاريخ.

Anémone des (۱) المروح – ۱۷۲ prés (F) Anemone pratensis (S)

الأنيمُون جنس نَباتات مُعَمَّرة، رِيزُوميَّة من فَصِيلَة الشُّقَارِيَّات. ساقُها فَرديَّة الزَّهرة أو تكون أحيانًا مُتفرِّعة وعديدة الأزهار. أوراقُها القاعديّة مُحَزَّزة مَشروطة بعض الشَّيء، السّاقيّة مُختَصَرة إلى قُلافة

(١) التَّسمية للمؤلِّف.

مُكوَّنة من ٣ أوراق دَوَّاريّة التَّرتيب، لاطئة، والكُلِّ مُتَباعد بعض الشَّيء عن الزَّهرة. الزَّهرة الهاميّة من ٤ إلى ٢٠ كأسِيّة بَتَلانِيَّة.

أمّا شُقّار المُروج، أي أنيمون المُروج (١) فنوع لم يَرِد ذكره في فلورا لبنان، ونادرًا جدًّا ما يرد في مَراجع النَّباتات الطبِّيَّة المُتداوَلة؛ ولكنّه واحد من أربعة أنواع أحيد تسجيلها في الفَرْماكوبيا الفَرَنسيّة عام ١٩٧٥. ويختلف هذا النّوع عن شُقّار الفِصح بأزهاره الأصغر حجمًا، والأَقْتَم اللّون البَنفسجيّ الأرْجُوانيّ.

ملاحظة - بالنسبة للمُركِّبات والخصائص الطبِّيّة والاستعمال وطرقه: (أطلب دراسة: شُقّار، أنيمون في المعجم الرابع ص ١٢٦ رقم ١٥٩).

Vegetable wax (E) مُسَمُعٌ نَبَاتِي –۱۷۳ Cires végétales (F)

أهم الشموع النباتية تعطيها شجرة «نَـقُـوس الشَّـمْع»(٢) أي Copernicia (شَـمع الكَرْنُوبا) من فصيلة النخليّات؛ وشجرة «نَخْل فصيلة النخليّات؛ وشجرة «نَخْل أنْ دِيْكولا»(٣)، أو «سِيْروكْسِيل أنْ دِيْكُولا»(٣) أو «سِيْروكْسِيل أنْ دِيْكُولا»(٣) Humb. (شمع النَّخْل، سِيْروكْسِيلَيْن (Céroxylone

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمية للمؤلِّف.

من البرازيل على الأخص.

يأتي شمع الكَرْنُوبا خاصة من البرازيل حيث يحصل من نَتْح أوراق نخلة نَقُوس الشَّمع في الشَّمع في ألواح مُخضرَّة اللَّون قد تزن عِدَّة كيلوغرامات.

ينصهر شمع الكَرْنُوبا عند ٨٤° سغ، وهو قليل الدُّوبان في الكحول وفي الأثير، يَذوب في دُهْن التَّربَنْتين والبنزان؛ غير قابل الدُّوبان في الحامض الخلِّيك وفي الصّودا الكاوِيّة؛ يَحتوي خاصّة على سيرورات الميرِسْتيل المصحوبة بحامض كَربُونيك وبكحول مَلْيْسِيّ، وبقليل من حامض سيروتيك. السّعمالاته الصّناعيَّة مُهِمَّة (صُنع السّموع، دُهون الأرضِيّات الخَشَبيَّة، الورنيش والألوان الشَّمعيّة، دِهانات الأحذية).

ويُنسب شمع كَنْدَلِينا إلى نَبات قد يُسمّى «رِجل الطّاوس»(۱)، اسمه العلميّ ورِجل الطّاوس»(۱)، اسمه العلميّ (اللّفؤبيون مُضادّ للسِّفْلِس»(۱): Pedilanthus Pavonis Boiss. Euphorbia: وهما من اليَتُوعِيَّات antisyphiliticca وهما من اليَتُوعِيَّات الصَّبَارِيَّة الشَّكل في المكسيك، والتي تتغطّى كل أجزائها الهَوائيّة بالشَّمع. إن هذا الشَّمع يَنصهر، وحسب العيِّنات، عند ١٤ إلى ٧٢ سغ.

ويُجمع الشَّمع، أي الـ Cérosie، وكنتاج ثانويّ من معامل السُّكَر، وهو

صلب وفَتوت ويمكن استعماله كشمع ش م ع كَرْنُوبا ذاته، ولكنّه يَحتوي على ٧ بالمئة

كرنوبا داته، ولكنه يحتوي على ٧ بالمة من الغليسرين المركّب.

شموع أخرى، أغنى بالغليسريدات والحوامض الدُّهنيّة، وهي شُموع من الأفضل تسميتها شحومًا نَباتيّة، وتَنتُج غالبًا من الثِّمار. هكذا هي الحال مع شحم «شجرة الشَّحم sebifera الموجودة في الصّين والأندوشين، وتُعطي الشَّحم النَّباتيّ الصِّينيّ الَّذي يَنصهر عند ٤٥° سغ؛ وشَمع الشَّمْعِيّة الذي تُنتِجه «شَمْعِيّة الشَّمْع "Myrica cerifera (۱)، أو «شجرة الشَّحم الأمريكيِّ»؛ وشُموع فصيلة البَسْباسِيّات من أمريكا الجنوبيّة: شمع Myristica Bicuhyba بيْكويْبا من نبات schott. شَمع أوكُوبا أو شمع فِيْرُولا من نبات .Myristica sebifera Sw شمع أُوتُوبا من نبات Myristica otoba . Humb.

الشَّمع النَّباتيّ أكثر صلابة من الشَّمع العاديّ. شمع اليابان يَنصهر عند ٤٠٠ و٢٤٠؛ السيروكُسِلِّين عند حوالى ٩٥٠؛ شمع بيكويبا عند ٣٥٠؛ شمع أوكوبا عند ٣٦،٥٠؛ شمع الشَّمعيّة ينصهر عند ٤٧ إلى ٩٤٠؛ إن هذا الشمع الأخير له ثقل نوعي من ٤٠٠،١ إلى ٢٠،٠٠١؛ وهو شمع كَسُورٌ أكثر من شمع العسل، وينحَلِّ في ٢٠ جزءًا من القلى الغالية (مؤور).

يُستعمل السيروزين كبديل للشَّمع في صُنع الشُّموع والدِّهانات، وهو نوع من

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ش م و

الپرافِيْن الَّذي يَحصل من معالجة الأوزوكرِيْت أو شمع Galicie المُتَحجِّر بالحامض السولفوريك؛ ينصهر عند ٦٨-٦٦° سغ.

في كثير من الحالات، تدين بعض النِّمار أو بعض الأوراق أو بعض الألياف بلمعانها إلى نسبةٍ صغيرةٍ من الشَّمع، ثمار التُّفّاح والبَنِنكُوزا(١) Benincosa، أوراق الموز والكوكا والزَّيتون والصَّنوبريّات، إلخ. وألياف الكَتّان والقُطْن والقابُوق.

شَمع اللِّينيْت، أو شَمع مُونتان montane يُستخرج بالحرارة من بعض أنواع اللَّينيت. يَحتوي على حامض مونتانيك(٢) حُرّ، وعلى أستيرات من هذا الحامض عينه ومن حامض سيروتيك، وعلى كَرْبُورات، وراتنجات، إلخ.

شَمع العَنْبَر: يرد «أبيض البال» في الفرماكوبيا الفرنسيَّة بإصدارها التاسع، وفي دراسة أحادِيّة عنوانها «شمع أو شحم العَنْبُر».

الله مُنْمُوْع طِبُيّة، شَمْعَة طَبُيَّة الله الله الله الله Medicinal Candles (E)

Bougies médicinales (F)

Heilstearinkerze (D)

إن اللَّجوء إلى الشُّموع الطبِّيّة تَوارى تمامًا من الاستعمال.

الشَّموع الطبَّة هي أسطوانات مُتفاوِتة الطَّول والثَّخانة، ولكنّها تكون في الغالب نحيلة دقيقة ولَدنة، وتكون مَخروطيّة الشَّكل في أحد طرفيها وتُخصَّص لكي تُدْخَل في قناة الإحليل (شُموع إحليليّة) أو في المعى المستقيم (شموع شرجيّة). وتُقسم الشُّموع إلى لاصقة أو مطّاطة أو أدويّة.

تُستعمل الشُّموع اللّاصقة إما كجسم مُمَدُّد مُوَسِّع أو كجسم مُذِيب مُسهِّل الإنصهار، ومُقَسَّطِر Cathérétique (مُفْرغ البَوْل بالقَسْطَر) ومُجفِّف؛ أمّا الشُّموع الأدَوِيَّة Instrumental فلا تُستخدم قط إلّا لتمديد وتوسيع القناة البَوْليّة في حال انسدادها ولتسهيل إخراج البول. نحضّر للأولى كتلًا من زبدة الكاكاو أو من الغليسَّرين المُجَمَّد، أو مزيجًا من اللَّكْتُوز والصمغ، أو من الشمع والشحم، إلخ. بالإمكان إضافة أدوية مختلفة إلى تلك الكتل. الشُّموع الطبِّيَّة يجب أن تُعقُّم، وأن يكون قطرها عادة ٤ ملم وطولها من ١٠ إلى ١١ سم. إن المواد التي تصلح لتحضير تلك الشموع هي سَبيبات أو شُرَيْطات من القماش أو من الخيوط الحريرية أو القُطنيّة، تُوضَّب على شكل فتائل، ومن ثم الشمع والمُذابات الشَّمْعيّة Cérolés واللَّزْقات، إمَّا لوحدها أو ممزوجة بالمواد العلاجية الفعّالة.

تُصنع هذه الشموع بتغطيس الفتائل في المواد المنصهرة، ومن ثم لَفّها على

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية للمؤلَّف.

مُسَطَّع سَوِيِّ لإكسابها الشكل الملائم. يجب أن تكون الفتائل مالسة جيِّدًا وأن يكون طولها من ١٠ إلى ٣٠ سم.

وتُحفَّر الشموع أو الأمْيال Sondes (المَحاجيج) المطّاطة بتغطيس ضمَّة مخروطيّة الرأس نوعًا ما من الخيطان أو القماش الحريريّ الملفوف، في برنيق (تركيبته أدناه) عدّة مرّات، تُجفَّف بعد كل مرة في المِحمّ وتُصْقَل. أمّا صنع هذه الشموع والمحاجيج فهو وقفٌ على صانعى الأدوات الجراحيّة.

بَرْنیق الشموع المطّاطَة – دهن تربنتین $\frac{1}{2}$ مقدار، زیت کَتان مُمَرْتَك Lithargirée مقدار، واحد، عَنْبَر $\frac{1}{2}$ مقدار، مَطّاط ۱٫۲۰ مقدار.

۱۷۵ - شَوْكُران (Ciguës (F)

تُشرِك اللَّغة الفَرنسيّة الشَّعبيَّة بين أربع نَبْتات يُطلَق عليها اسم شُوكران Ciguë: ثلاثة منها ورد الكلام عنها في دراسات أحاديّة؛ أما الرّابعة فهي الشَّرَعُطَط المَنقعيّ Phellandrie.

إنّه من الأهميّة بمكان أن نتمكّن من تمييز تلك الأنواع عن بعضها عند الحاجة؛ لذلك نرى من المفيد وضع جدول يُبيّن صِفاتها المميّزة، خصوصًا وأن أنواعًا خُضريَّة مأكولة أخرى هي عُرضة كذلك للخلط مع هذه الأنواع السامَّة، كالبقدونس والسَّرْفِل، وهذا ما يجعل ضمّهما إلى الجدول المذكور أمرًا

ضروريًّا. إن ما يُجمع كل هذه الأنواع هو انتماؤها إلى فصيلة الخَيْمِيَّات، وتَشابهها الكبير فيما بينها بأوراقها، وحتى بمظهرها العام. (الجدول على ورقة مرفقة).

هناك خَيْمِيَّة سامّة أخرى: رَازِيَانَة زَعْفرانيّة (١٠ Oenanthe Crocata)، وهي نبتة مَرجِيَّة، كانت تَسَبَّب أيضًا بالكثير من الأخطاء المشؤومة القاتلة، إما بواسطة جزورها الذي يُشبه لِفْتَة صغيرة، وإمّا بواسطة أوراقها التي اتّخذت على أنها أوراق البقدونس أو أوراق الكرفس. أما صفاتها المتميّزة الأكثر بروزًا فعصيرها الأصفر اللَّون (Crocata)، من Crocata أي زعفران) المُلْبن المظهر، الذي يسيل من الساق عند حزّها أو جرحها، ومن من الساق عند حزّها أو جرحها، ومن جذورها العِطريّة التي تُشبه اللَّفْت من الصغير. إن الإيْنانَثَة الزَّعفرانيّة (٢٠ هي احداث الموت.

يكمن جوهرها الفَعّال، حسب فِنْسَنْت الذي حَلَّلها، في عصيرها الصمغيّ - الرّاتِنجيّ وفي زيتها الدُّهنيّ. وقد استخرج منها J. Pohl عام ١٩٠٤، مادّة الـ Oenanthotoxine، وهي سَمّ يُحدِث التَّشنُّج والاختلاج.

تنتشر هذه النَّبتة بنوع خاص في غرب فرنسا ونواحي شواطئ بحر المانش، كما تَنتشر كذلك في بريطانيا.

ش و ك

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

سرفل	بقلونس	شوكران صغير	شرعطط منقعي	شوکران سام	شوكران كبير	الأساء
خاصة	خاصة	مُعْشِيّة	السرفل	البقدونس	نتنة، منفرة	رائحة
عصير استخراجي	عصير استخراجي	معلوم	عصير استخراجي	عصير أصفر	عصير لبني	جنر
خالية من البقع	خالية من البقع، مخططة	القسم البنفسجي السفلي، مالس	خالية من البقع	خالية من البقع	مبقعة بالأرجواني	ساق
معدومة	معدومة	معذومة	asteař	معلومة	قلافة واحدة	قلافة
aateaš	হাণ্য:	مختصرة إلى النصف*	كاملة	হাণ্য:	مختصرة إلى النصف*	فَالْفَهُ
بيضاء	صفراء	بيضاء	بيفهاء	بيضاء	بفاء	أزهار
مستطيلة	مستطيلة	کرویة ذات حزوز مالسة	متطاولة من دون حزوز	كروية ذات حزوز بيضانية ذات حزوز مالسة*	کرویة ذات حزوز مفرّضة	ثمار
حولية	محولة	خولية	معمّرة	معمّرة	areglā	زمنها
حدائق	حدائق	أماكن مزروعة	في الماء	حوافي الماء	أماكن عقيمة	منبتها

الورقة المختصرة إلى النصف Dimidiée هي الورقة التي لا تمثل سوى جهة واحدة من النصل.

١٧٦ شِيْح حَفْلِيّ، شْعَال، دْقُفْت، أَرْطَماسِيا الحُقُولِ (``) Field wormwood **(E)** Armoise champêtre, Aurone des champs (F) Feldbeifuss (D) Artemisia campestris, Ssp. Campes-

tris, glutinosa, canescens (S)

نَبات مُعَمَّر من فَصِيلَة المُرَكَّبات يَعلو حتى ١٥٠ سم. أوراقُه مُتعاقبة، القاعديَّة مُعنَّقة، العُلبا لاطئة ومُقطَّعة إلى سُيور ضَيِّقة. أزهاره كلّها أنبوبيّة، في رُؤيسات بَيضانية أو كُرَوية، عُنقودية التَّجميع. الثَّمرة أكنة خالية من القُنْزُعَة ومن الإكليل الغشائق على رأسها. من هذا النَّبات نُويعات وضُروب مُختلِفة منها العِطريّ جدًّا والدَّبق والأطْحَل... أمَّا شُعَال ودْقُفْت فإسمان تُونُسِيَّان.

الخصائص والاستعمال - يَشتهر هذا النَّبات في تُونس بسبب استعماله كمضادّ للسَّمّ. ولهذه الغاية يُستعمَل مَسحوق الأوراق المُجفَّفة مَوضعيًّا كما يُستعمَل لخصائصه اللائمة خاصة للحُروق. في منطقة سيدى مَخْلُوف يُؤكِّد البَعض على صِحّة هذه الخصائص بينما يَنصح البعض الآخر بإضافة الثُّوم إلى المسحوق.

في جَلْما (تُونس) تُؤكّل النّبتة بكاملها شي ي ح في حال لَسْع العَقْرب أو لَدْغ الأفعى. ويَنصح البعض الآخر بالتَّبخير بواسطة النَّبات أو كذلك بنقيعها الَّذي يُنصَح به، إضافة إلى ما تَقدَّم، لمعالجة السُّعال والشُكَّريِّ وقُرحة المَعِدَة في استعمال داخلي، أمّا من الخارج فهو فَعّال ضِدّ الأكزيما والإصابات الجلديّة.

> ۱۷۷ - شِيْح المَغْرِب، شِيْح أراغُون، Barbary wormwood (E) Armoise de Barbarie (F) Barbarei Beifuss (D) Artemisia cina, Artemisia aragonensis **(S)**

نَبات طبِّي من فَصِيلَة المُركَّبات يُشبه الشُّويلاء A. vulgaris إلى حدٍّ كبير. تُستعمَل رؤوسه المُزهِرة في مراكش نُقاعة تُؤخَذ ضد الزُّكامات، وتَبخيرًا ضد الجُدَري.

أرطماسيا مصدرها كلمة يُونانيّة بمعنى ديانا، شفيعة وحامية العَذاري، وذلك بسبب الاستعمال الرّئيسي للشُّويلاء.

الإنكليزيّة والألمانيّة للمؤلّف.

⁽١) التَّسمية العربيَّة الأولى والرابعة والتَّسمية (٢) كلِّ التَّسميات للمؤلِّف ما عدا الفرنسيَّة

ص

(۱) اَرُنْبَرْغ، أُورِيْغَانُم أَرَنْبَرْغ Ehrenberg organy (E) Origan d'Ehrenberg (F) Ehrenbergdost (D) Origanum Ehrenbergii (S)

نَبات برِّيّ من فَصيلة الشَّفَويَّات، مُعمَّر، زغبيّ القاعدة، أجرد في بقيّة أجزائه. سوقه بسيطة ومنتصبة تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ (٨٠ سم). أوراقه كثيرة الجيوب العِطريّة، منفرجة، من ١٠ إلى ٢٠ ملم. أوراق القاعدة مُعنَّقة، العُلما لاطئة متقابلة. الزِّناد الزَّهريّ قصير السُّنبلة شبه لاطئة، تبوز بحزمات ابتداء من تُلُثِيُّ علم النَّبتة على أعناق قصيرة، مشكِّلة بذلك شمراخًا من الازهرارات الإبطية المتباعدة، ينتهي بازهرار تاجي مشابه. الأوراق الزَّهريّة صغيرة على قاعدة الازهرار، إبطية وشبه معدومة في الأعلى. السُّنبلة من ١٠ إلى ١٥ ملم. الكأس نظاميّة، خماسيّة الأسنان وكثيرة الجيوب العِطريّة الحمراء، التّاج أبيض، يعرض تدريجيًّا نحو القمة. الأسدية غير

بارزة. يزهر من حزيران إلى تشرين الأوّل في تربة لبنان الحُثّية.

إن هذا الصَّعتر هو مُستوطن أي أنه محصور الوجود في لبنان فقط.

الخصائص والاستعمال - في غياب التحاليل المخبرية، من المفيد الاطلاع على خصائص الصَّعتر واستعماله بشكل عام، علمًا بأن عددًا من أنواع الصعتر الأجنبية، أكان ذلك في شمال أفريقيا أم في اليونان، يُجمَع ويُستعمل في التَّداوي على غرار الصعتر الشائع. ويذكر بعض الأطباء أن لبعض تلك الأنواع خصائص المَّعتر الشائع أقوى من خصائص الصَّعتر الشائع الأوروبي. ولا نستبعد أن تكون أنواعنا ممتازة.

(۲) غِدِّيَّة جَرُوْمَة غِدِّيَة (۲) (۲) صُقْرَابِ غِدِّيّ ، جَرُوْمَة غِدِّيَة (۲) Cécropie glanduleuse, Ambaiva, Imbahyba (F)
Cecropia adenopus (S)

(۲) مُقْراب أَبْيَض، جَرُومَة بَيْضاء Cécropie toute blanche, Colequim, Arbre de paresse (F) Cecropia hololeuca (S)

ذكرنا سابقًا أن الصُّقُراب هو جنس أشجار من فصيلة الأنْجريات الخُبْزيَّات، وهي أشجار بَرِّيَّة، دَمَّاعة،

⁽٢) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

تنتج المطّاط. سُوقُها أسطوانيّة فارغة تَعلو من ٣ إلى ١٠ أمتار. يُطلَق في البرازيل على الصُّقْرابِ الغِدِّيِّ وعلى الصُّقْرابِ الأبيض الأسماء المَحلِّيَّة التَّالية: إِمْبَاهِيْبَا، أَمْبَايِيقا، كُولَكِيم، شَجَرة الكَسَل.

أُوراق الصُّقْرابِ الغِدِّيِّ كبيرة، مُسَعَّفَة الفُصوص، مُتعاقبة، عرضُها ٢٠ سم وأكثر، وهي قاتمة اللَّون الأخضر الكامِد على صَفَحاتِها العُليا، أَفْتَح لَونًا ومُوبرة على الصفحات السُّفلي. أزهارها الذَّكريّة في سَنابل أُسطوانيّة الشَّكل. فُروعُها عَقداء، مُتَلَوِّية. خشبها طَريّ.

المُركِّبات - تَحتوى قشرة النَّوعَين المذكُورين على ٠,٨٨ بالألف صَقْروبين Cécropine (حَسَب بيكُولْت)، وعلى راتنج، عَفْص؛ وتَحتوي قشرة الصقراب الأبيض، بالإضافة إلى ما تَقدُّم، على ٠,٥٩ بالألف أمْبَايين ambaïne.

تُنْسب إلى أوراق الصُّقْرابَيْن خَصائص طبيّة عِلاجيّة، لم تُحدّد.

١٨١- صُمُوغ رَاتنْجِيَّة résines (F)

الصّموغ الرّاتنجيّة هي مزيجات طبيعيّة بنسب مُختلِفة من الموادّ الصّمغيّة ومن الموادّ الرّاتنجيّة، بالإضافة إلى بعض المواد العُضوية الأخرى التي تَجرُّها معها.

تُنْتِج هذه الصّموغ عمومًا نَباتات تَنمو ص م و في أدفأ مناطق الكُرة الأرضيّة. إن الفصائل التي تُعطى أكبر عدد منها هي فصائل الخَيْمِيَّات، والبُطْمِيَّات؛ ونَذكر كذلك السَّقَمُونيا وصَمْع الجَنْدَم؛ والصّموغ الرّاتنجيّة في الفَربيون وفي العَشْقَة. وتكون هذه الصموغ في النّباتات مُعلّقة في سَوّاغ مائي أو تكون على شكل مُستحلّب. وهي تَختلِف بذلك عن الرّاتِنْجات التي تكون في النّباتات في محلول شَفّاف من الزَّيت الطيّار. وهي تَنْتَج طُوعيًّا في بعض الأحيان، ولكن الحصول عليها يَتمّ في أكثر الأحيان

> المواصفات والمُركّبات - صُموغ غير قابلة للذُّوبان في الماء أو في الكحول الصِرف، ولكنها تذوب على السّاخن في الكحول المائق. كثافتها الوسطى . 1,7

> باسْتِصْماغ الشَّجرة بالحَزِّ والتَّجفيف في

الشَّمس.

تكون، بشكل عام، نسبة الرّاتنج في هذه المواد أقوى بكثير من نسبة الصمغ، ومؤلّفة من دخسترانات Dextranes، ومن غَلاكُتَانات أو عَرَبانات Arabanes، وتَنتمى الموادّ الرّاتنجيّة إلى فئة الرّاتنجات. وتحتوى بعض الصموغ الرّاتنجيّة على نسبة قويّة نوعًا ما من الزَّيت الدُّهنيُّ.

ينصح بعض الفرماكوبيات بتنقية الصموغ الرّاتنجيّة وتكريرها وذلك بحلّها

بواسطة الحرارة والماء، والخمر، والخلّ، وأفضل من ذلك الكحول المائي، وتمريرها مع العَصْر، ومن ثم تبخيرها في حمام مريم.

إن طريقة دستور الأدوية الواردة مع مقال أُشَّق Galbanum هي التَّالية:

صمغ راتنجي مسحوق كحول ٦٠ درجة

نَضع الصّمغ الرّاتنجيّ في دَسْت مَطّليّ بالميناء، نُضيف الكحول، نُسخِّن في حمّام مريم مع تحريك مُتكرّر حتى تَنقسم المادّة تمامًا في السّائل السّاخن وتُشكِّل نوعًا من المُستحلَب. نُمرِّر عندها مع العصر في قماشة دقيقة. نُبخِّر السّائل في حمّام مريم حتى يُسمَك النّتاج بما فيه الكفاية حتى إذا رمينا منه عِدّة نقاط في الماء البارد تُشكِّل كُتلةً صغيرة يمكن بها. نُصبّ الموادّ في وعاء.

نُكرِّر بالطَّريقة ذاتها الأُشَّق أي الحِلْبيْنة وصمغ الدُّوْرَم المَخْزنيّ أي صَمْغ النّشادر (دستور ١٩٤٩) وصَمع فيرولا العَجَم المسمّى Sagapenum (دستور ۱۸۸٤).

الحفظ - من المُفضَّل حفظ الصموغ الرّاتنجيّة بمعزل عن ملامسة الهواء لأنّها تكون كلها عِطريّة. ويكون سحقها في أكثر الأحيان صعبًا جدًّا، إلَّا أنَّه يمكن إنجازه بواسطة البَرُد مع الانتباه إلى سحقها ودَقِّها باستعمال مِدقّة يكون رأسها قليل العرض، وعدم متابعة العمل على الكمِّية عينها لفترة طويلة، ذلك خَوفًا من أن تَتَليَّن بالحرارة الحاصلة. ويجب اعتبار تجفيف هذه المواد المُسبَق في المِحَم على أنّه عمل مُضِرّ. إنّها موادّ مُنَشِّطة بشكل عام: (أطلب أسماءها النّوعية، جلتيت، دَلكُها بين الأصابع من دون أن تلتصق صمغ فيرولا العجم، صمغ الدُّورَم في المعجم الثالث ص ٦٥ رقم ٨٨).

١٨٢ - ضَال، عُنَّابِ بَرِّي، سِدْر بَرِّي

Wild jujub, Lotus tree, Lotus jujub **(E)** Jujubier sauvage, Jujubier des lotophages, Lotus des anciens (F)

Lotosbaum (D) Zizyphus lotus, Rhamnus lotus, Zyzyphus jujuba (S)

شُجِيرة ليفيّة من فصيلة النَّيْقِيّات تَعلو من حوالي المتر إلى المترين، فروعها مُتَلوِّيَة، مُزوَّات، بَيضاء أو مسودة اللُّون، مَرْطاء. إبرها صلْبَة قويّة. أوراقها مَرْطاء، لا تَتخطِّي ١٥ ملم، مُتطاولة أو إهليلجيّة، مُنتظمة القاعدة، خفيفة التَّقريض. الزُّنيدات والأزهار مَرْطاء. ثمرتها مأكولة لذيذة الطَّعم تبلغ ٨ ملم أو أكثر بقليل. تزهر من أيّار إلى أيلول في الأراضي الصخريّة.

الخصائص والاستعمال - من غير

المُستبعد أن يكون رماد خشب الضّال ض ال الممزوج مع الخل مفيدًا في معالجة لَدْغ الأفاعي، على غرار رماد خشب العُنّاب، وهو استعمال قديم جدًّا كان قدامي الأطبّاء العَرَب يلجأون إليه. كما أنّه من غير المُستبعد أن تكون ثمار الضّال تحتوى على بعض الأنتراكينون على غرار العُنّاب، أو أن يحتوى مُستخلّص خشب الضّال المائيّ على جوهر مُتبلّر هو الحامض الزِّيزيفيّ Ziziphique، وعلى عفص هو الحامض الزيزيفُوتانيك . . . غير أن كل ذلك يبقى رهنًا بالتَّحليل المخبري.

> وفي أي حال، ذُكر عن الضّال أن القُدامي كانوا يقدِّسون شجرته في الزَّمان الغابر وينسبون إلى ثمارها عِدّة فضائل نَفسانيّة وصحّيّة. وذُكر أن نقيعها يفيد الصَّدر ويُقوّيه. في تونس تُدعى الشَّجرة سِدْرَه ونْبَاق. ويورد اليُروفسور يوكيف M.K. Boukef أن الثمرة تتحلّي بخصائص صدرية وأن جذرها الممعوس والمعصور يُعطى سائلًا فعّالًا في معالجة حالات الغُفاءات العَنْنيّة أو الظَّليلات العَيْنيّة Leucomes

3

ويُنصَح بطحين الصّويا أو الصوجَة في تغذية المُصابين بداء السُّكَّر بسبب محتواه القويّ على المواد الأزوتيّة.

١٨٤ - طُوْقَرِيُون، طُيُوقَريُون

Germander (E)

Germandrées (F)

Gamander (D)

Teucrium (S)

الطُّوقَرْيُون جنس نَباتات مُعمَّرة أو ليفيّة الشَّاعدة، نادرًا حَوْليّة، من فَصيلة الشَّفَويَّات. كأسُها تكون إمّا مُنتظمة، وإمّا مشرومة وجَرَسيَّة الشَّكل، وإمّا شبه مُحَدَّبة ومُنْحنية القاعدة. شَفَة التّاج العُليا قصيرة جدًّا؛ السُّفلى غالبًا بارزة جدًّا، فصوصها الجانبيّة ضييّقة، مَنْنيّة، والفَصّ الهاميّ نام جدًّا، مُستدير أو مُتطاوِل الشَّكل، غالبًا مُستدير أو مُتطاوِل الشَّكل، غالبًا مُستدير أو مُتطاوِل الشَّكل، غالبًا مُستدير أو مُتطاوِل الشَّكل، غالبًا

يَصدُر عددٌ وافر من أنواع الطُّوقَرْيون في مَخْزَن الأدوية والفرماكوبيات الحديثة، وهي أنواع كانت ولم تزل تُستعمل في الطِّب. كما أنّ لُبنان يَستضيف منها في أرضه لا أقل من ١٥ نوعًا بَرُيًّا، بعضها يَشتهر في التَّداوي، وبعضها الآخر لم يزل يَتلطَّى مُسْتَترًا في ظلال أوديته وسكون يتلطَّى مُسْتَترًا في ظلال أوديته وسكون الجبال. ومن الأنواع التي تَفَرَّدَت بدراسة أحادِية (في مؤلَّفِنا): الأَسْقُورديون المائي، الطُّوقَريُون المَنْ

دِيْدِينَام (مجموعتان). البُزَيْرات مُنحَنِيَة

القاعدة، شبكتة النشرة أو خشنة.

القَرْنِيّات، طَحِيْن القَطَانِيّات، طَحِيْن Farines de القَرْنِيّات، طَحِيْن السِّنْفِيّات légumineuses (F)

يُنصَح بإضافة مُختلف أنواع طحين القطانِيّات إلى تَغذية الأولاد الصِّغار بعد شهرهم الثّامن. إن تركيب الأنواع الأساسيّة منها يرد كالتالى:

طحين القرنيّات: فاصولياء، فول، بازيلا، عَدَس، هي أغذية فقيرة نسبيًا بالمواد الدَّسِمة، ولكنّها غَنيّة جدًا بالأزوت، وغنيّة على الأكثر بتركيبات عُضويّة مُفَسْفَرَة، خاصّة بالـ لَسِيتينات عُضويّة مُفَسْفَرة، خاصّة بالـ لَسِيتينات الذي يكون في هذا الشكل يَتمثّله الني يكون في هذا الشكل يَتمثّله الجسم جيّدًا بنوع خاص. ولكن المؤسف هو أنها أنواع صَعبة الهضم بعض الشّيء، حتى ولو كان تحضيرها قد تمّ بالاشتراك مع الخضار المطبوخة.

ويبدو أن طحين العَدَس Ervum lens يُشكِّل ما يُسمِّى: أَرْقْالَنْتا وَارْتُن يُشكِّل ما يُسمِّى: أَرْقْالَنْتا وَارْتُن Ervalenta de Warton وما يُسمِّى Revalescière أو رِيقْالَنْتا بَارِّي، المُبجَّلة جدًّا كمواد مُجدِّدة للقُوَّة ومسهِّلة.

طوق Germandrée de Crète, Polium blanc (F)

Cretischer berglavendel, Ysop Gamander (D)

Teucrium Creticum, Teucrium rosmarinifolium (S)

نَبات مُعمَّر ليفيّ القاعدة فروعه قاسية، طويلة، أنْبُوباتها مُتطاولة، يَعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم، أوراقه خضراء اللَّون ومُستمرطة الصَّفحة العُليا، لِبْديّة الصَّفحة العُليا، لِبْديّة الصَّفحة السُّفلي أوراقه السُّفلي إهليلجيَّة خَطِّيّة، ضَيِّقة القاعدة، العُليا خَطِّية ضَيِّقة، كُلُها مُدوَّرة الهوامش. إزهراره (يُذكِّر بازهرار نَدى البحر) في عناقيد سُنبليّة الشَّكل المتطاول. الكأس بيضاء لِبْديَّة، قَصيرة الشَّكل الجَرسيّ، أسنانها مُثلَّنة سِنانيَّة، حادة، التّاج أسنانها مُثلَّنة سِنانيَّة، حادة، التّاج أطول من الكأس.

ذُكر أنّه يُستعمَل كالطُّوقَريون المَخْزَنيّ. واقتُرح هذا النّوع، باسم سَطاقِس الأناضول^(۱)، ضِدّ الكوليرا الهنديّة. كما ذُكر أنّه من النَّباتات النّاهضة النّاعِظة.

Germandrée à (۲) طُوْقَرِيُون بَحْرِيّ fleurs en tête, Polium maritime (F) Teucrium capitatum (S)

نَبات طبِّيّ يُستعمَل كالطَّوقَريُون المَخْزَنيّ، أعيد تسجيلُه في الفرماكوبيا الحديثة.

الأنواع الأخرى التي ذُكِرت في المراجع العِلميّة على أنّها تُستعمل في التّداوي في الحالات التي يُستعمل فيها الطُّوقَرْيون المَخْزنيّ ذاتها، فهي التالية:

Yellow طُوْقَرِيُون أَصْفَر، عُشْبَة الطِّحَال germander (E)

Germandrée jaune, Polium, Pouliot Jaune, Germandrée flavescente (F) Gelber Gamander (D)

Teucrium polium, Teucrium aureum, Teucrium flavum (S)

نَبات مُعمَّر لِبْدِي مُبْيَض المظهر أو صُوفِي، لِيفي القاعدة، قصير العَثْكَلَة الهاميّة غالبًا عِذْقيّ. أوراقه لاطئة، مُتطاوِلة، مُنفرِجة، مُفرَّضة، مُلتفَّة الحافة. أزهاره في رؤيسات مُنتصِبة، شبه كُرويَّة أو بَيضاويّة، قصيرة الزِّنادات. قُناباته خَطيّة مِلْوَقيّة، أقصر من الأزهار. الكأس أنبوبيّة الشكل الجَرَسيّ، شبه لاطئة، لِبْديَّة، مُثلَّثة المخرسيّ، شبه لاطئة، لِبْديَّة، مُثلَّثة المخرابيّة بالكساء الصُّوفيّ. التّاج أبيض المخبرة، اللّهون الأبيض، مُوبِر من الخارج، بالكاد يتخطّى الكأس. المنابر المنابر الكاد بارزة.

ذُكر أنّه يُستعمَل استعمال الطُوفَريُون المَخزنيّ ذاته. وكتَب الأب پول موتيرو أنّه نوع يُجمع لخصائصه المُسكِّنة. ويُقال إنّها عُشبَة تَشفى أكثر عِلَل الطِّحَال.

طُوْقَرِيُون إِكْرِيتِيّ، بَقْلَة العَوْف Cretan طُوْقَرِيُون إِكْرِيتِيّ، بَقْلَة العَوْف germander (E)

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمة للمؤلَّف.

طوق

طُوْقَرِيُون كَوْرَبِيّ، مَارُوم، مَرْمَاخُور Marum Germander (E) Germandrée maritime, Herbe aux chats, Germandrée ambrée, Marum

Katzengamander, Katzenkraut (D) Marum verum, Teucrium marum (S)

جُنِّيَة تَعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم، فروعها مُنتصبة، يَبضاء اللَّونِ اللَّبْدِيِّ. أوراقها نَيضِونَة الشَّكل، صغدة القدّ، قصدة العُنُق، كاملة، مَلفوفة الأطراف، بيضاء اللَّهِن، لِنْدِيَّة الصَّفحة السُّفلي. أزهارها تَسجيلُه في الفرماكوبيا الحديثة عام إلى اللُّون الأرجواني، في دَوّارات من ٢ إلى ٤ زهرات على إبط الأوراق. تَرغب بساتين اللَّيمون، والبراري

ذُكرت على أنها استُعمِلت في الحالات التي يُستعمَل فيها الطُّوقَرْيون المَخْزنيّ

عَرْصَف جَعْدِيّ Herb ivy, Musky buble **(E)**

Ivette musquée, Ive (F) Ivygünsel (D)

Ajugaiva, Teucrium iva (S)

عُشبة مُعمَّرة تَعلو نحو ٢٠ سم. أوراقها كاملة مُستطيلة، مُسنَّنة الحاقة. أزهارها أرجُوانيّة اللُّون، عُنقوديّة التَّجميع. أوراقُها وأزهارُها وجميع أجزائها مِسْكِيّة

ذُكر أنّها تُستعمَل استعمال الطُّووَريُون المَخزنيّ ذاته. وذُكِر أن أطبّاء العَرَب

طُوْقُرِيُونِ جَبَلِيّ Germandrée des montagnes, Polium à feuilles de lavande, Pouliot de montagne, Thym blanc (F)

Teucrium montanum (S)

نَبات مُعَمَّر يَعلو من ٥ إلى ٢٥ سم، سوقُه هزيلة، نائمة، مُخضوضرة. أوراقه خَطِّية، لِبْديّة مُرمدة اللَّون. أزهاره مُصفرّة اللُّون الأبيض، في رؤوس نِصف كُرويَّة. يَرغب الصخور الكلسية.

يُستعمل كالطُّوقَريُون المَخزَنيّ. أعيد 1940

طُوْقَرِيُون كَمَافِيطُوس، عَرْصَف صَنَوْبَرِي، الْكِلْسِيَّة التُّربة الْجافَّة الدَّافئة. كَمَا فَنْطُهِ سِ (۱) Ground pine, Yellow bugle (E)

> Germandrée ivette, Ivette, Chamépitys (F)

> Gelber Günsel, Ackergamander (D) Teucrium chamæpitys, Ajuga chamæpitys (S)

عُشبَة حَوْليَّة تَعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها ثُلاثيّة التّشريح الهُدبيّ. أزهارها صفراء اللُّون سُنبليَّة التَّجميع. وهي عُشبة قريبة جدًّا من عَرْصَف شِيًّا. ذُكرت على أنها تُستعمَل في الحالات التي يُستَعمَل فيها الطُّوقَوْيون المَخْزنيّ ذاتها . وذُكِر أن الأطبّاء العَرَب يَسقون نَقيعها المَغليّ بعد العَرْف المُستَحَبّ الفَوّاح. لَسْعة العَقْرب بأسرع ما يمكن.

⁽١) التَّسمة الأولى للمؤلِّف.

يُوصون باستعمالها ضِدّ الكُوليرا، وبأنّهم يَستعملونها جدًّا ضِدّ أمراضٍ أخرى عديدة.

ا العَوْفُ الْحَوْفُ الْحَوْفُ الْحَوْفُ Germandrée de Crète, Germandrée Crétoise

Pouliot de Crète, Polium blanc
(F)Cretan germander (E)

Cretischer berglavendel, Ysop-Gamander (D)

Teucrium creticum, Teucrium rosmarinifolium (S)

جُنيبة مُعمَّرة ليفيّة القاعدة من فصيلة الشَّفَوِيَّات تَعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم، فروعها خَشنة، طويلة، أنبوباتها فروعها خضراء مُتطاوِلة. أوراقها خضراء ومُستمرطة الصَّفحة العُليا، لِبديّة الصَّفحات السُّفلى، الأوراق الدُّنيا إهليلجيّة الشَّكل الخَطِّي، مَزْمومة العُليا ضَيِّقة الشَّكل الخطي، هوامشها كلُّها ملتفَّة بعض الخطي، هوامشها كلُّها ملتفَّة بعض الشَّيء. إزهراراتها تُذكّر بازهرار نَدَى

البَحْر، وهي في عناقيد سُنبليّة الشَّكل المُتطاوِل. سُويقة الزَّهرة أقصر من الكأس، مُتعدِّدة الأزهار أحيانًا. الكأس بيضاء اللَّون، لِبديّة، قصيرة الشَّكل الجُريُسيّ، أسنانُها مُثلَّثة الشَّكل السِّنانيّ، حادّة الرأس، أقصر من السِّنانيّ، حادّة الرأس، أقصر من الأنبوب بقليل. التّاج إلى البنفسجيّ الأزرق، أطول من الكأس بحوالى المَرتين. يزهر من نيسان إلى أيلول على المنحدرات الشبه مُحرَّجة للجبال السّاحلة.

الخصائص والاستعمال – أُعيد تَسجيل هذا النَّبات في الفرماكوبيا الفرنسيّة المحديثة عام ١٩٧٥، وجاء عنه في مَخْزَن دُورْقُو L'officine أنّه نُصح به باسم سَطاقِس الأناضُول(١) Stachys أما إدوار غالب فكتب أنها: «عُشبة بَرِّية أما إدوار غالب فكتب أنها: «عُشبة بَرِّية طبيّة يُقال إنّها من النَّباتات النَّاهِضة النَّاعِظة». يَبقى أن المُرَكِّبات وطرق الاستعمال لم تزل غير متوفّرة.

طوق

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

- عجينة بالريزورسِين

8

غ	٥																	 					ن) <u>-</u>	س	ر	رو	ريز)
غ	١	٠		٠.											. ,				1	٤	ل	;	ال	١	بد		ک	ٔ و	Ì
غ	١	٠		٠.	. ,													 							, .		۔ ا	å	;
غ	۲	٠							٠.													٠.				. 1	ت	ري	,
		4	تي	ل	ید	ز!	ک	1	ď	١	4	ي	۷	بل	<u>ج</u>	J	١	٠	ض	١	,	ام	¥	1		L	ۻ		

۱۸۹ - عجائن للاستعمال البيطري Pâtes pour usage Vétérinaire (F)

- عجينة سُوْسَان

- عجينة السولفاميد

- عجينة أو لَبَن كلس سميك ضد مرض الظلف

ه ه غ	أوكسيد الزنك
٥ غ	كلورور الزنك.
٥٦ غ	ماء

نفتت أو نقطع الكلس الحيّ بطريقة يشكل معها عصيدة أو مهروسًا سميكًا. نجعل العصيدة في علب خشبية نضعها على مدخل الحظيرة أو الزريبة. نمرّر الخراف ونجعل أقدامها تغطس في لبن الكلس. إذا كرّرنا هذا الحمام الساخن ثلاث أو أربع مرات، فإنه كان يشفي تعفّن الظلف الحديث.

نمزج جيّدًا. تستعمل هذه العجينة طازجة لتغطية الجروح المقطّبة والمعقّمة. هي تشكل، عندما تجف، قشرة لاصقة تغني عن استعمال الضمادات.

- عجينة بُلاس الكاوية

۱۰غ	شُولفاميلاميد
۲۰غ	كربونات الكلسيوم
۲۰غ	أوكسيد الزنك
۲٥ غ	لانولين
۲۵ غ	زيت كبد المُورَة

شب محروقحامض سولفوريك كمّيّة كافية

نمزج المساحيق الثلاث. من جهة ثانية، نصهر اللانولين في الزيت ونضيف مزيج المساحيق إلى المادة المصهورة في هاون مُفتَّر.

نحضر عجينة قوامها قوام العسل ونضعها فورًا وبطبقة رقيقة على التهاب رجل الحصان. يجب نزع القرنية التي تزيّن صحن الحافر المريض مسبقًا مع تلافي فيضان الدم. نتابع استعمال هذه العجينة حتى تختفى الأجزاء المريضة.

يمكننا استبدال السولفاميلاميد في هذه التركيبة بأي سولفاميد آخر.

كحول ٩٠ درجةكمّيّة كافية عجي نحضر عجينة للاستعمال الفوري.

- عجينة ليانو الكاوية

انهيدريد زرنيخي (كميات متساوية) كمّيّة مطلوبة مسحوق السابينا أي الأبّهل ... كمّيّة مطلوبة صمغ عربي وماء كمّيّة كافية

لصنع عجينة نصف رَخوة.

۱۸۷ - عجينة أو مُجَمَّدة الثمار الصدرية Pâte ou gelée pectorale de fruits (F)

۰۰۰ غ	ثمار صدرية
۰۰۰ غ	رئ ة عج ل
٢ عدد	أرجل عجل .
٢غ	أشنة (خرز)
۰ ۲۵ غ	صمغ عربي

نَغلي المواد الأربعة الأولى في مقدار معلى المواد الأربعة الأولى في مقدار الثاثين ﴿ ، نُمرِّر ونعصر ونصهر الصمغ في السّائل فوق نار خفيفة. من جهة ثانية ، نحضًر:

۱۰۰۰غ	سكر
	عسل
١٢٥ غ	عصير التوت
٥٧٣ غ	نقاعة صدرية

نحضر شرابًا سكريًّا مصفًّى نضيف إليه

- عجينة ضد التهاب الرجل كلورور الأثمد

(الانتيموان، الكحل) كمّيّة كافية حامض كلورهيدريك كمّيّة كافية لصنع عجينة رخوة.

- عجينة ضد مرض الظلف (تَعَفَّن الظلف)

استات النحاسكمّيّة كافية

نحضر عجينة؛ نضعها على القرح، نضمّدها ولا نرفع الضماد إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام.

- عجينة كانكوان الكاوية

 کلورور الزنك

 أوكسيد الزنك

 طحين قمح

 عاء مقطر

نُقَوْلبها في أسطوانات أو في مخاريط مستدقة الرأس، ونحفظها في زجاجات مقفلة جيّدًا تحتوي كُينيسات من الكلس الحي.

عجينة جيدة للقرحات، وقروح الأدوية المُنفَّطة. إنها تُحدث أو تشكّل نَدَبة أو أثر حرق سميك يقع بين اليوم الثامن والعاشر.

- عجينة كاوية ضد التهاب رجل الحصان

ع ج ي

Pâte de gomme arabique dite pâte de guimauve (F)

١٠٠٠ غ	صمغ عربي أبيض
۱۰۰۰ غ	سكر أبيض
۱۰۰۰ غ	ماء مقطر
۱۰۰ غ	ماء زهر البرتقال
۱۲ عدد	زلال بيض

دستور أدوية ١٩٠٨. نغسل الصمغ ونُذوِّبه في حمام مريم في الماء؛ نعيد المحلول الصمغيّ إلى النّار في دَست مسطح، ودائمًا في حمام مريم، نُضيف السُّكَّر مع تحريك مستمر حتى قِوام العسل السَّميك.

في كمية كافية من الماء للحصول على من جهة ثانية، نَخفُق زُلالات البيض تمامًا مع ماء زهر البرتقال، نضيفها بأجزاء إلى العجينة التي نُحرِّكها بقوَّة على نار هادئة، نتابع خفق العجينة حتى إذا ما وضعنا منها على ظهر اليد بواسطة مِلْوَق لا تعد تلتصق به، عندها نصبُّها على طاولة رخام أو في علب مُغطَّاة بالنَّشاء (دستور ۱۹۰۸). نحفظ فی مزیج من ۳ أجزاء نشاء وجزء واحد من السُّكُّر.

حُذِفت هذه العجينة من دستور الأدوية بموجب قانون ۲۷ حزیران ۱۹۳۵. کان يُضاف في الماضي ممروث الخبيزة إلى هذه العجينة. أمّا اليوم فلم يعد الكلام حصرًا سوى عن عجينة صمغ كثيفة أو مخفوقة. إقترح شيووايك، وهو صَيدلتي من أنْڤر Anvers، اقترح التَّركيبة أدناه

ماء زهر البرتقال ١٢٥ غ ١٨٩ - عجينة الصمغ العربي المسمّاة كحولة الليمون الحامض ١٥ غ عجينة الخبّيزة ننقص الكمِّية في حمام مريم طوال ساعة. نُخلِّص المُجمَّدة من القشرة التي تَشكُّلت على وجهها، ونَصبّها في قوالب من الخَزَف الصينيّ أو من التّنك الأبيض. نحصل بذلك على نتاج شفّاف لذيذ المذاق.

١٨٨ - عجينة حشيشة السعال باليانسون Pâte dite Tussilage à l'anis de Lille (F)

۱۸۰ غ	يانسون
٨٠	رجل القِطّ
ف ۱۲۵	حشيشة السعال

مقدار ١٠٠٠ غرام من النقيع المغلى الذي نحلّ فيه ما يلي:

٤٣٠٠٠ مستخلص السوس النقى

نمزج ونجانس في حمام مريم، ومن ثم نضيف:

زيت اليانسون الدهني

نصت الكتلة على رخامة مزيتة، نقطّعها إلى سيور صغيرة، نلفّ السيور على شكل أسطوانات، نقسم الأسطوانات إلى قطع صغيرة نجففها في المحم ونحفظها في مكان حاف.

نُمرِّر في قماش دقيق ونَعصُر؛ نترك للراحة؛ نُصفِّق السّائل وهو لم يزل ساخنًا؛ نضيف السُّكَّر ومن ثم المستخلص ذاته محلولًا في قليل من الماء ونُبخُر في حرارة لطيفة، مع تحريك مستمر حتى قوام عجينة جامدة تمامًا؛ نَصُبّ العجينة على الرّخام أو في قوالب مُزَيَّنة قليلًا بزيت الڤازلين؛ عندما تبرد نجفِّفها بورق غير مُصمَّغ لكى نزيل الزَّيت القليل الذي علِّق بها، ونحفظها في علبة من التَّنك الأبيض.

تحتوي هذه العجينة حوالي ٢٠,٠ غ من مستخلص الأفيون في كل المعام غ (ملحق دستور، ۲۷ حزیران ۱۹۳۵ ودستور .(1947)

لذكرى التاريخ.

١٩١- عَراوَة مَلَكَة المُرُوج Queen of meadows, Meadow-sweet (E) Ulmaire, Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Spirée filipendule, Barbe-de-Chêne, Herbe aux abeilles, Ormière, Pied de boue, Vignette (F) Echtes Mädesüss, Weisenkönigin (D) Spiraea Ulmaria, Filipendula Ulma-

ria, Ulmaria palustris (S)

نبات معمَّر من فصيلة الوَرْدِيّات يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقه قويّة، جامدة، مثلَّمة؛ أوراقه كبيرة، قاتمة اللَّون الأخضر على صفحتها العُليا، بيضاء الصفحة

اختصارًا للعمليّات اليَدويّة الطُّويلة التي والمغسول في حمام مريم. يتطلُّبُها تحضر عجبنة الخيزة:

> صمغ عربى أبيض مسحوق غ ۲۰۰ غ ۲۰۰ غ سكر أبيض مسحوق

زلال بيض ٣ عدد ماء زهر البرتقال ٦٠ غ

نمزج المساحيق، نضيف زلالات البيض المخفوقة جيّدًا مع ماء الزّهر، نخلط الكتلة بعناية، نُسمِّكها بحرارة لطيفة (حوالي ١٠ دقائق) مع تحريكها المستمر، وعندما تصبح العجينة لا تلتصق على ظهر اليد إذا وضعت عليه بواسطة الملوق، نُقطِّعها على لوحات مرشوشة بالنشاء.

Pâte ١٩٠- عجينة مخزنية بالحزاز officinale au lichen (F)

۱۰۰ غ خَرَز الصخور (إيسْلَنْده) ۰۰۰ غ صمغ عربى سكر أبيض ٠٠٤ غ مستخلص أفيون ٢٠٠٠ غ ماء مقطر كمّيّة كافية

دستور أدوية ١٩٣٧. نضع الخَرَز في الماء؛ نُسخِّن حتى الغليان، نرمي هذا السّائل الأوّل الذي يحتوى على كامل الجوهر المُرّ تقريبًا. نغسل الخرز بالماء البارد، ومن ثم نَغليه لمدّة ساعة واحدة في كمِّية من الماء تكفي للحصول على ٦٠٠ غرام من السّائل المغلّى، نُمرِّر مع العصر؛ نُذوّب الصمغ المجروش

السُّفلى، مُركَّبة من ٥ إلى ١٧ وريقة غير متساوية، مسنَّنة، الوريقة النِّهائية ثُلاثية الفصوص، أذَنات في إكليل نصف دائريّ، مسنَّنة؛ الأزهار زِبديّة اللَّون الأبيض، صغيرة القد، في أعذاق غير منتظمة، خماسيّة الكأسيّات، خماسيّة البَتلات المستديرة، أسديتها تَتَخطّاها؛ البَتلات المستديرة، أسديتها تَتَخطّاها؛ البورة بنيَّة الكُون؛ أرومة عِقْدِيّة، جذر ليفيّ. رائحة وطعم مُستحبّان وعِطريّان.

المُركِّبات - الجذر يحتوي على عفص، زيت دهني. الأزهار تحتوي على مادة ملوِّنة صفراء (سپيرايين، ١٨٤٠)، مادة متبلّرة مشابهة للكافور، زيت دهني مركب على الأكثر من ألْدَهيد سالِسيليك، سالِسيلات المتيل، وكمية ضعيفة من الهليوتروپين ومن الوانيلين ضعيفة من الهليوتروپين ومن الوانيلين (١٨٩٢). أملاح معدنية، فيتامين «ث».

الأستير متيل سالسيليك لا يوجد مسبقًا في النَّبات، ولكنّه يحصل بفضل خميرة تعمل على هيتروسيد هو: مُونوتروپيتوسيد أو (مُونوتروپيتين) تركيبة الكيميائي (مُونوتروپيتين) تركيبة الكيميائي لا مُثاناء عملية التقطير.

في النَّبات المجفَّف لا يوجد لا هيتروسيد ولا أستير متيل سالسيليك. إن هذا النَّبات، وعلى خلاف الوَرديّات المتقاربة منه، يخلو من اللُّعاب ومن الـ HCN.

الخصائص - مَقدِرة قويّة مِغليّة مبوّلة للأزهار ومختلف أقسام النّبات (أطروحة صيدلة، ١٩٣٥). الجذر كان يُستعمل جدًّا كمبوّل وقابض ومضاد للنزلة ومضاد للنزيف. مضاد للتشنج، قابض، مبول، لائم للجرح، معرق، مقوّ، مضاد للالتهاب، منوّم.

الاستعمال – أعيد تسجيل ملكة المروج في الفرماكوبيا عام ١٩٧٥. تستعمل منها الرؤوس المزهرة قبل تفتحها، الأوراق، والجذور. لا يُحفظ النَّبات أكثر من سنة. لا يُغلى بتاتًا لكي لا يتبخَّر الحامض السالسيليكي. تصلُّب الشرايين، الحمام، السلوليت أي التهاب النَّسيج الخَلوي، العُدَّة الوَرديّة، الإسهال، البُوال، النقرس، ارتفاع التوتر، الرُمال، البَدانة الشَّحميّة، الأوديما، الجروح، الروماتيزم، الحميراء، الأوريا، استسقاء.

طريقة الاستعمال - نقاعة ٣ أو ٤ ورقات طازجة، أو ملعقة متوسطة من الأزهار المجفَّفة المقطَّعة مع الأوراق في فنجان ماء ساخن (لا يُغلى أبدًا)، يغطى ١٠ دقائق، ويؤخذ منه ٣ إلى ٥ فناجين في اليوم، بين الوجبات. نقاعة الأزهار في النبيذ ضدّ الاستسقاء والآلام الروماتيزمية. كحولتور، ملعقتان صغيرتان في اليوم. صبغة، ١٠ إلى ١٥ نقطة، ٣ أو ٤ مرات في اليوم. نقاعة مبولة تزيل الحامض البولى:

أوراق كشمش أسود ١٠٠ غ عِرْق اللَّهِب المُتَعوِّج، عِرْق اللَّهَب النَّشُويَ اللَّون الأبيض

Ipécacuanha ondulé, Ipécacuanha blanc amylacé (F)

Richardsonia brasiliensis (S)

دُعى هكذا بسبب حَلَقاته غير الكاملة وصبغته المُبيضَّة اللُّون، وهو نوع من فصيلة الفُوِّيّات يَندر وجوده في الأسواق ويجب أن يُستبعد من التَّداوي؛ يحتوي على بقايا قلويد غير الأماتين.

عرْق الذَّهَب المُخَطَّط الصغير (٢) Ipécacuanha strié mineur, Ipéca strié noir (F) Richardia, Manettia ignita (S)

ضَربان مُتميّزان بشكل واضح من عِرْق الذُّهب المُخطُّط: الكبير، وهو لا يحتوى سوى على القليل من الأماتين؛ أمّا الصّغير فهو الأغنى بالأماتين. وهو نوع كان يُعتقد أنّه يَنتمي إلى جنس «ريشارديا»، إلّا أنّ كلُّا من مَاهُوْ وكارتييه نسباه، عام ١٩٢٧، إلى جنس «مانسا» من فصلة الفُوِيّات.

عرُق الذُّهَب المُخَطَّط الكبر (٢) Ipécacuanha strié majeur, Ipéca gris cendré glycyrrhizé, Ipéca glycyphloea, Ipéca violet (F)

Psychotria emetica (S)

رؤوس ملكة المروج المزهرة ٥٠ غ البنفسج، والفربيون، إلخ. أوراق مُرّان ٥٠ غ ملعقة كبيرة في فنجان ماء غال يغطى ١٠ دقائق، ٣ أو ٤ فناجين يوميًّا. في معالجة التهاب النَّسيج الخَلَوي، ملعقة كبيرة نسكب فوقها ٢٥٠ غرام ماء غال، نتركها طوال اللَّيل، نشربها عند النهوض. من الخارج: أوراق غضة على الجروح، والحروق، والقرحات. كمشتان في ليتر ماء يُغلى ١٥ دقيقة ويوضع منها ساخنًا على الروماتيزم. وفي كمادات على الجروح والقرحات.

١٩٢ - عُرُوق الذُّهَب

Ipécacuanhas (F)

إلى جانب أنواع عِرْق الذَّهب المَخْزَنيّة التي أوردنا دراساتها في غير مكان، هناك أنواع أخرى مختلفة نوردها كما يلي:

عِرْق ذَهَب القديسة مَرْتا(١)

Ipéca Sainte-Marthe (F)

هو صنف نام جدًّا مهده جزيرة القديسة مرتا.

إن كافة هذه الأنواع يشار إليها في بعض الأحيان باسم عروق ذهب غير حقيقيّة. أمّا بقيّة عُروق الذَّهب غير الحقيقيّة الأخرى فهي جذور أنواع مختلفة من

⁽١) التَّسمة العربَّة للمؤلِّف.

۱۹۳ - عَسَم سَنْدَاييق (۱) Combretum, Chigommier (F)

Combretum sundaicum (S)

نبات من قبيلة العَسَمِيَّات وفصيلة الاهْليلَجيَّات يُوجد بكثرة في دولة سيلَنْغُور (شبه الجزيرة الماليزيّة). وهو نبات يستحق تمامًا الاسم الذي أطلق عليه: مُضادّ للأفيون Anti-opium نظرًا لخصائصه الطبية.

المُركِّبات - نَبات خالِ من أي قِلَويد، ومن أي هيتروسيد؛ وفيما عدا القليل من العَفْص، فلا شيء فيه يُفسِّر مَقدِرته المُضادَّة للسَّمَ.

الخصائص - مُضادّ للأفْيُون.

التحضير - لإعطاء هذا الدُّواء، يَجِب التَّقَيُّد بالقَواعد التَّالية، والتي أشار إليها كلِّ من لوبُوبار وجَنِّغْز: نأخذ ٥٠ غرامًا من النَّبات (سُوق وأوراق) ونَضعُها في وعاء مع أربع ليترات ماء؛ نُغطّى الوعاء ونَضعه على النّار لمدَّة أربع ساعات. نَرفعه بعدها عن النّار، نُصفِّيه ونُعيد وضع الوعاء المكشوف على النّار حتى نُقْصان الماء المُستعمَل منذ البداية إلى ربع الكمِّيّة. نَضع النِّتاج الحاصل في زُجاجتين «أ» و«ب» مُقفلَتَين جيِّدًا نَضعهما في مكان بارد. عند ذلك نَحلّ فى الزُّجاجة «أ» جُرعة الأفيون أو المورفين اليَوميَّة التي اعتاد المريضُ الفرمّاكوبيا عام ١٩٧٥.

(المدمن) على تعاطيها.

طريقة الاستعمال - نُعطى عِدَّة مَرّات في اليوم، حوالي ٧ مرات، مقدار ٣٠ غرامًا من محتوى الزُّجاجة «أ»، ونَضع مكان كل جُرعةِ نأخذها من هذه الزَّجاجة مِقدارَها من النَّقيع المُحتوى في الزُّجاجة «ب» (Combretum pur)؛ وعندما تُصبح هذه الزُّجاجة الأخيرة فارغة، نُستعمِل عندها فقط المحلول المُخفَّف هكذا، حتّى يَنتهي.

في حال عدم الحصول على النَّتيجة المَرجوَّة بعد هذا العِلاج الأوَّل، نُعاود عِلاجًا ثانيًا، مع تَخفيض مِقدار السَّمّ المُضاف إلى القارورة الأولى.

ملاحظة - نوعٌ آخر من العَسَم (Combretum altum) يُستعمَل في الطبّ باسم Kinkéliba (أطلب الكلمة في المعجم الرّابع ص ١٩٠ رقم ٢٤٥).

١٩٤ - عُصَارَة الخَسّ Lactucarium Lactuca Sativa, Lactuca virosa (S)

عُصارة الخَسِّ هي العصير اللَّبنيِّ الَّذي يحصل من الخَسِّ المَخزَنيِّ أي الخَسِّ البُستاني L. Sativa ومن خَس السَّم أي اللُّبَيُّنة L. Virosa، الَّذي يَحصل بواسطة الحَزّ ويُجفّف في الشَّمس. وهى عُصارة أعيد تَسجيلها في

كان هذا المُستحضر الَّذي يَتطلَّب يدًا

عاملة مُتخصّصة، أكثر ما يُصنع في بروسيا وفي أوفَرْنيه، وفي الماضي: إيرلندة والولايات المتّحدة الأمريكيّة. يكتسب الخسّ بالزراعة قدًّا عِملاقًا يَصل إلى ٣ أمتار ارتفاعًا، ويبلغ قطرة ٤ سم. نقطع السّاق، في موسم الازهرار، عن بعد ٣٠ سم تقريبًا من رأس النّبات، ومن ثمّ نقطع منه عَرضيًّا شرحة جديدة، كل يوم وحتى شهر أيلول. نضع العُصارة المجموعة في أوعية حيث تجمد؛ نقطعها إلى قوالب صغيرة أو إلى شرائح نُعرِّضها للشَّمس على قطع من الحصير؛ تَجفّ العُصارة بسرعة، فتخسر بذلك من وزنها حوالى بسرعة، فتخسر بذلك من وزنها حوالى المَنيت.

وتحصل أثناء التبخير تأكسُدات وظواهر دياستازية أخرى.

المواصفات - تكون عُصارة الخَسّ، من الدّاخل، بُنِّية اللَّون نوعًا ما، مِكسَرها راتنجيّ ومُصفر اللَّون عندما يتمّ التَّجفيف بسرعة؛ وخلافًا لذلك، فيكون اللَّون بنيًّا قاتمًا نوعًا ما. رائحتها قوية ومُتَميِّزة؛ طعمها ذو مرارة مُفرِطة. وهناك بعض التشابه بينها وبين الأفيون، لذلك دعيت أحيانًا باسم «أفيون الخسّ».

إن مختلف أصناف العُصارة التي توجد في الأسواق تَتَميَّز بأشكالها الخارجيّة التي تُعطى لها أكثر ممّا تَتَميَّز بصفات المادّة ذاتها. فالـ «عُصارات الفرنسيّة»

تُقع في قوالب دائريّة قطرها من ٣ إلى ٦ ع ص ي سم، ووزنها من ١٠ إلى ٣٠ غرامًا؛ «العُصارة الألمانية» تكون في سَكَمات من كُريّات منتظمة نوعًا ما؛ «العُصارة الإنكليزية» تقع في قطع منتظمة الشَّكل، قاتمة اللَّون البُنِّيّ، ترابيّة المظهر.

الخصائص والاستعمال - تَتَمتَّع عُصارة الخَسِّ بخصائص مُهدَّئة. أكثر ما تُعطى في السُّعال، والتَّهيَّج العَصبيّ، وفي الطبّ الولاديّ. تُعطى عُصارة الخَسِّ في بيلولات بمقدار عُصارة الخَسِّ في بيلولات بمقدار أدنى ١٠,٠غ إلى ١٠,٠غ أو في حُبَيبات. تعطى كذلك بالأفضلية بمقدار أدنى على شكل مستخلص كحولي: (١٠، إلى على شكل مستخلص كحولي: (١٠، الى ١٠٠غ للبالغين)، وبمقدار ٢٥ إلى ١٠غ على شكل شراب سُكَّريّ؛ إن هذه الطريقة الأخيرة تبدو الأكثر نفعًا (أطلب شراب عصارة الخس السكري). وتُعطى كذلك على شكل عجينة مَخْزَنيّة بمقدار من إلى ٢٠غ في حالات البرونشيت. تضادّاتها: القِلى.

اعَة ، مِجْزَاعَة ، بَهَا بَرِّيَّة ، مِجْزَاعَة Wild balsam (E)

Balsamine sauvage (F)

Waldbalsamine (D)

Impatiens nolitangere (S)

نَبات حَوليّ من فَصِيلة البُّلْسَمينيّات،

⁽١) التَّسميات العربيَّة والتَّسمية الإنكليزيَّة والألمانيَّة للمؤلَّف.

يعلو من ٦٠ إلى ٨٠ سم. أزهاره كبيرة، ذَهبيَّة اللَّون الأصفر. العُصَيفيرة جنس حُقَن شَرجيَّة. نباتات حَوْليّة أو مُعمّرة، تكون مَرْطاء عمومًا، بَحريّة اللُّون، عُصاريّة. أوراقها مُتعاقِبة، بسيطة، كاملة، مُعنقة، مُسنَّنة النَّصل. أزهارها فَرديّة أو تَؤُمِيّة. التّاج غير مُنتظم. ثلاث كأسِيّات بَتَلانِيَّة، الخَلفيَّة منها مِهمازِيّة الشَّكل. ثلاث بتكلات. مبيض خُماسي الحُجرات.

> الخصائص - مُبوِّلة، مُنَقِّية، مُضادّة للالتهاب، لائمة للجرح، مُضادَّة للبو اسير .

> الاستعمال - بَواسير، قروح مُتَعفِّنة، قُرحات، جروح، رُمال.

طريقة الاستعمال - مسحوق النَّبتة، حَوالي مِلعقتين صغيرتين في اليوم مع العسل أو المُربَّى أو مُذابَة في مَشروبِ ما. نُقاعة ٣٠ غرام نبات مُجفَّف في ليتر ماء غال يُغطَّى نصف ساعة، ٣ فناجين صغيرة يوميًّا. نقيع ٢٠ غرام نبات مُجفَّف في ليتر ماء يُغلى عشر دقائق، يُبرَّد، يُصفِّي، ٣ فناجين يوميًّا. صبغة ٢٠ غرام نبات مُجفَّف في ٥٥ غرام كحول نقى و٤٥ غرام ماء لمدّة عشرة أيّام. نُصفِّي ونحفظ في زجاجة مُلوَّنة. يُؤخَّذ ٢٠ إلى ٣٠ نقطة، مرتان في اليوم مع قليل من الماء أو مع أيّ شراب. من الخارج، النّبات المهروس يُوضع لصوقًا على البواسير والقروح والقرحات. كذلك يصلح نقيع النبات

المَغليّ للحالات ذاتها أو يستعمل في

١٩٦ - عقاقير نباتية Espèces (F)

عقاقير للتدخين

داتُورة شائكة، مَريميَّة، بالتَّساوي. في الرَّبُو. (أطلب سجائر).

عقاقير مُبَخِّرة، عقاقير مُدَخِّنة

بنجوان، مُصْطكاء، بخور، حَبّ العرعر، بأوزان متساوية.

هناك طائفة من البديلات، البعض منها معقد جدًّا، ويبدو، بالحرى، أنه فاسد مَعِيب، إذ إنها تجيز موادًّا عِطريّة صَمغيّة بدلًا من أن تكون راتِنجيّة، وهي مواد، إذا احترقت أو أُحْرِقَت، لا يمكنها إلَّا أن تُعطى رائحة عاطلة تَضرّ في عِطر الموادّ الأخرى. إن تلك العقاقير قد تكون أكثر مُلاءمة إذا ما وُضِعت في كُنسات.

عقاقير مُخدِّرة، عقاقير مُنَوِّمة

أوراق مُجفَّفة من سِتّ الحُسن، الشُّوكران، البَنْج، عِنَب الدّيب أو الحُلو مُرّ، تَبْغ بَحريّ اللُّون (١) Nicotiana glauca خشخاش منوّم، بكمِّيّات مماثلة (١٨٦٦).

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

عُنَيْبات كُرَويّة حمراء اللّون، رُباعيّة عن ب الحُجُرات، مأكولة.

الخصائص - ثماره، الّتي تُسمّى Cranberries كانت مُسجّلة في دستور القِمام الآسيّ. أعيد تسجيلها مع ثمار القِمام الآسيّ والقِمام الأحمر في الإصدار التّاسع للفَرْماكوبيا الفَرنسيّة عام ١٩٧٥. يُرغَب هذا النّوع الفَرنسيّة عام ١٩٧٥. يُرغَب هذا النّوع جدًّا في بلد مهده الولايات المُتّحدة الأمريكيّة حيث يزرع ويُستقطر من ثماره مشروب كُحوليّ لذيذ الطّعم. وذُكِر أنّ أوراقه وفُروعه وجُذوره عافِصَة تُستعمَل في الدّباغة. مُلاحظة: وَرد هذا النّبات في إحدى المَوسوعات العربيّة على أنّه في إحدى المَوسوعات العربيّة على أنّه القِمام الصّغير أو الشّائع، علمًا بأنّ القِمام هو من جنس Vaccinium

المَناقِع (۱۹۷ عُبَّوب رُباعِيّ الْبَتَلات، عُنَبُوب (۱۹۷ Cranberry, Bogberry, (۱) المَناقِع (۱۹۷ Feuberry (E)

Airelle à maurets, Canneberge des marais, Coussinet, Brimble (F)

Moosebeere (D)

Oxycoccos quadripetala, Oxycoccos palustris, Vaccinium oxycoccos (S)

جَنْبَة مُعَمَّرة، عَدُوَّة الكلس، لِيفيّة القاعدة من فَصِيلَة الخَلَنْجِيَّات. ساقها نائمة، مُتجَدِّرة، تَطول من ٢٠ إلى ٨٠ سم. أوراقُها صغيرة، بَيضيّة، حادّة الرّأس، بَسيطة، كاملة، دائمة، مُتعاقِبة، خالية من الأَذَنات، طولها نحو ١٠ مم. أزهارها فَرديّة، طويلة السّويقات، بَتَلاتها أربعة مُتَّحدة القاعدة، زاهية اللّون الوَرديّ، مُلْتَقَة الأطراف نحو الخارج على غِرار سيكلامن صغير. الكأس على غِرار سيكلامن صغير. الكأس رُباعيّة خُماسيّة الفُصوص الأبيدة. النّمار

غ

Odoriferous (۱۹۸ عَافَتْ عَطِر (۱۹۸ agrimony (E)

Aigremoine odorante (F)

Wolliges agremonen (D)

Agrimonia odorata (S)

الغافَث جنس نَباتات مُعَمَّرة، مُنتصبة، من فَصِيلَة الوَرْدِيَّات، يَتَمثَّل في لُبنان بنوعين: الغافَث الغُولانيّ الشَّهير والغافَث العَطِر الَّذي يُضاهيه بالخصائص إذا لم يكن أفضل منه.

الغُولانيّ نَبات وحيد السّاق أو ذو سُوق قليلة السَّماكة والخُشُونة. أوراقه ذات وريقات بَيضاويّة، حادّة قليلًا. ثمرته ذات كأس مُثَلَّمة حتّى القاعدة تقريبًا، وعُقْفات مُنتصِبة. عديم الرّائحة.

العَطِر نَبات مُتعدد السّوق الخَشِنة السَّميكة. أوراقه ووُرَيقاته طويلة وحادة. ثمرته ذات كأس غير مُثَلَّمة حتّى القاعدة وعَقْفات مُنبسِطة جدًّا. غِدِّي وعِطريّ.

الغافَث العَطِر نَبات مُعَمَّر عديد السّوق، يَعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم، سُوقه سَميكة

(١) التَّسمية العربيَّة والإنكليزيَّة والفرنسيَّة للمؤلِّف.

وخَشِنة جدًّا، قَويّة الزَّغَب، أوراقه ريشيّة التَّركيب، قَويّة الزَّغَب، وُريقاتها كبيرة القَدّ، حادّة، مُزوَّدة بغُدد عِطْريّة. أزهاره أكبر من أزهار الغافَث غُولانيّ. الكؤوس الثَّمريّة غير مُثَلَّمة حتّى القاعدة، تَحمل أوبارًا شائكة ومَعقوفة، مُنبسِطة. يُزهر في حُزيران وتموز في الأراضي الصَّوّانيّة، وهو نَبات لُبنانيّ نادر من المُفيد حمايته وتكثيره إذا أمكن.

خصائصه هي خصائص الغافَث غُولاني ذاتها إذا لم تكن أفضل منه؛ غير أنّه من الضَّروريّ جدًّا تَصْفِيَة مُستحضراته، من نُقاعة أو نَقيع أو سوى ذلك، تَصفية جيِّدة بالقُماش تَلافيًا للأوبار الّتي تَكسوه في كافّة أفسامه (أطلب غافَث غُولانيّ، المعجم الأوّل، صفحة ١١٩، رقم ١٩٠).

١٩٩- غُبَارُ الطَّلْع، لَقَاح، لَقَح

Pollen (E)

Pollen (F)

Blütenstaub (D)

غُبار الطَّلْع أو عِكْبِر أو صُوَاح. حبَّته هي الجَدَرَة. وهو الغبار الذي ينشأ في المِئْبَر أي في الجزء المهمّ الأعلى من السَّدَاة في باديات الزَّهْر. كيس اللَّقاح ينشأ في السَّداة ويحتوي على حَبّات اللَّقاح. أنبوب اللَّقاح هو الذي يحصل من استطالة حبَّة اللَّقاح عندما تقع على سِمَة المدقَّة للتَّلقيح. جَدَرَتُه تتكوَّن من

سائل سيتويلازمي يحوى على جبلتين تُمثِّلان خَليَّتين، الخليَّة الزاديّة والخليَّة التناسليّة. وقد تختلف الجدرة شكلًا وحجمًا ولونًا مع اختلاف الأجناس النَّباتيَّة. غير أنَّه يغلب فيها الحجم الذرِّيّ والشَّكل البَيضويّ والكُرويّ مع اللُّون الأصفر.

المُرَكَّبات - أنزيمات، هرمونات النَّمو الجَسَدي، ضروريّات هامّة، ڤيتامينات مختلفة (راجع الجدول).

الخصائص - مُمعدِنة، مُغذّية، مُسكّنة، مُوازنة عُضويّة، مُزوّدة بالحَيويّة، غير سامّة، مساعِدة على النُّمو وإطالة العمر، وقائق من التهابات اليروستات، مجدِّدة للفتوَّة «مُشَبْشِبَة»، مقوّية للشيوخ والمتعبين والحَبَالي، مزيلة للشموم الجسديّة عامة. (راجع الملاحظة).

الاستعمال - النُّمو الجسدي، حالات الكسل الهضمي، التهابات المِعَى، داء العُصَيّات الكولونيّة، إسهال وإمساك (تنظيم الأمعاء)، پروستات، فقر الدّم، حالات الوهن، نرفزة، أرق. . .

طرق الاستعمال - معالجات تبدأ خاصة من سِنّ الأربعين وتَتَكرَّر مَرَّتين أو ثلاث مَرّات، ولمدّة عشرين يومًا في السَّنة. غبائر الطلع سهلة الوجود في أسواق المنتجات المُتخصّصة في الحِمْيات الغذائيّة في أوروبّا، ولكنُّها غير شائعة في بلادنا. إن تعاطى

عِلاجات سنويَّة مجدِّدة للشباب من غ ب ا غبائر الطلع تتوازى تمامًا والعِلاجات التي تتمّ باليخضور أو بالهلام الملكي، خاصّة للنساء وللرياضيين.

التركيب الوَسَطي لغبار الطّلع (ملغ في الغرام الواحد)، بالقيتامينات:

تِيامين أي أنورين «ب١»: ٨، مُضادّ التهابيّ عَصَبيّ. ريبوفلاڤين «ب٢»: ۱۸. حامض نیکوتینیك «ب۳» أو «پ ب»: ١٥٠، مُضاد للحُصاف أي داء الذَّرَة أي بَرَص إيطالي. پيريدوكسين «ب٦»: ٥، مُسكِّن ومُوازن. حامض بَنْتوتانيك «ب٥»: ٣٠. بيوتين «هـ» «H»: ۰٫۱۰ حامض فولیك «ب۹»: ٥، مضاد لفقر الدّم. لَكْتُوفلاڤين «ب٢» في اللَّبن أي الحَليب: ١,٥ . أَكْزِيْرُوفْتُول أي ڤيتامين «أ» بكثرة: مُضاد لجَفَف العَيْن. فيتامين «ب٢»: ١٧، ثمين للتحوُّلات الغذائيّة. ڤيتامين «ث»: ١٥٠ إلى ٤٥٠، مُضادّ لداء الحَفَر. ڤيتامين «د»: ٠,٤، أي كوليكالْسِيفَارُول، مضادّ للكُساح. توكوفيرول «هـ» «E»: ٠,٢٥، ڤيتامين الخصب والإخصاب. إينوزيتول أو إينوزيت (مجموعة ب): ٣٥، يستخرج من أوراق الجَوز وأوراق المُرّان والفاصوليا الخضراء والبزيلًا. ڤيتامين «ب١٢» أي سِيانوكوبالامين المضادّ لفقر الدّم.

ملاحظة - يشبّه الأخصائيّون خصائص حُبوب الطلع الصحية بخصائص غدد

غ ب ي

التذكير عند الأسماك Laitance، إذ إنها بمثابة المَنيّ النباتي الذكريّ. غبار الطلع، كالطين، ليس بالخضار ولا بالفاكهة. ولكنه «غذاء دواء» يصعب إدراجه على أيّة لائحة من المنتوجات التجارية. وهو يقدّم إلى جسم الإنسان عددًا من العناصر الضروريّة التي تفتقدها التغذية الحديثة في غالب الأحيان. إن هذه العناصر تعمل بنداؤب وتعاون كما جَمَعَتُها حِكمة الطبيعة، وليس باعتمادها بنسب كَيْفيّة، كما المصنوعات الحديثة. واستطرادًا فإن غبار الطلع لا يمكن تشبيهه بدواء ما. فهو قبل كل شيء، غذاء يقف غِناه فهو قبل كل شيء، غذاء يقف غِناه الكبير حائلًا لاستهلاكه كيفما كان.

Common service غُبَيْراء مَبْذُوْلَة -۲۰۰ tree (E) Sorbier, Cormier, Alisier (F) Echter Speierling (D)

Sorbus domestica (S)

شجرة جميلة قوية الجذع من فصيلة الوُرَدِيّات تعلو نحو ٢٠ مترًا. أغصانها أفقيّة، قويّة. فروعها ذات براعم مَرْطاء ودَبِقة. أوراقها ريشيّة مفردة، مسنّنة، غير مقوَّرة، مَرْطاء الصَّفحة العُليا، لِبْديّة السُّفلى. إزهرارها هَرَميّ الشَّكل، لِبْديّ. أزهارها ذات كأس تتحدّب لِبْديّ. أزهارها ذات كأس تتحدّب أجزاؤها إلى الخارج بعد تَفتُّح الأزهار. ثمرة إجّاصيّة الشَّكل، ٣ سم، خضراء، ومن ثم بنيّة اللَّون عند نضجها، تُعرف

باسم Corme أو alise أي غُبَيْرَة، طعمها سُكّريّ عندما تصبح هَلُّوطَة.

المُرَكِّبات - حامض تفَّاحي، حامض لَيْموني، حامض دُردي الخَمْر، پكتين، عفص.

الخصائص - مضادّة للإسهال.

الاستعمال - حالات الإسهال، ديسنتيريا. الغُبَيْرات تحتوي على أعفاص.

طرق الاستعمال - لبّ الثمار، على غرار الأكيدنيا، من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ غرامًا في اليوم. نقيع الثمار أيضًا قابض جدًّا. لحاء الغبيراء غني بالعفص ويمكن استعماله نقيعًا مَغْليًّا.

ملاحظة - يمكن الحصول من الغُبيْرات (الثمار) على «نبيذ الإجّاص» اللَّذيذ الطَّعم (Poiré). ولقد ذكر ڤيرجيل في قصيدته الرّيفيّة الثالثة، أنه كان يُصنع من الغبيرات الحامضة شراب متخمِّر يشبه النبيذ.

Gargarismes (F) غُرور -۲۰۱

غرور مُیَوَّد	التوت أو العسل المورَّد بَحَّة، فقد
ماء مقطر	الصوت.
يودور البوتاس٥٠٠ غ	غرور خمري عَقول
صبغة اليود ٤ غ	جوز العفص £ غ
غرور زئبقي	قشور رمان \$ غ ورد أحمر \$ غ
سليمانيّ أكّال ٣٠٠ غ	نبيذ أحمر ١٢٥غ
نقيع الشعير	 نحضّر نقاعة ونضيف إلى السائل:
عسل مورّد ٢٠ غ	عسل مورّد ٢٠ غ
	حامض سولفوريككمية كافية
٢٠٢- غُرَيّاء مُصَفْصَف، الأصُوْق	يستعمل للتَّحْميض بطريقة مستحبّة.
مُصَفْصَف Collodion salicylé (F)	غرور مُلَيِّن
حامض سالِسيليك	عسل أبيض
العزيّاء ونخض حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. يستعمل كدواء كاوٍ خفيف على الثَّفَن والثآليل.	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغليّ؛ نُمرِّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛ نُضيف العسل ونكمل بواسطة الماء للحصول على ٣٠٠ غرام من الغرور
العزيّاء ونخضّ حتى الذوبان الكامل. نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. يستعمل كدواء كاوٍ خفيف على الثَّفَن	الماء تكفي للحصول على حوالى ٢٥٠ غرام من السّائل المَغليّ؛ نُمرَّر على قماشة دقيقة، نُريح السّائل لحظات؛ نُضيف العسل ونكمل بواسطة الماء

روح حشيشة الملاعق } غ

نقاعة المريميةنقاعة المريمية

174

نحلّ ونحفظ في قارورة تقفل جيّدًا.

دواء موضعي مطهّر.

غ ر ي

الغسولات هي مُستحضرات مائيّة تكون كحوليّة خفيفة في بعض الأحيان، تحتوي على موادّ علاجيّة مُختلفة، بشكل محلول أو مُعَلَّق، وتُخصَّص لكي توضع على البَشَرة أو على الأغشية المُخاطيّة. وهي لا تختلف عن التَّبخيرات إلَّا بطريقة استعمالها.

يَرد تحديد الغَسولات في الإصدار التّاسع للفرماكوبيا الفرنسيّة. بينما يصف كتاب الوصفات الوَطني أستات الرَّصاص القاعدي فقط.

إنّ التّركيبات الواردة أدناه هي لذكرى التاريخ .

غسول أستات الرصاص القاعدي، ماء

۲۰غ	لرصاص السائل	نحت أستات اا
۹۸۰ غ		ماء عاديّ
		نمزج.

سائل لبني يجب حركه عند الاستعمال (دستور).

استُعمل كمصرّف في الرّضات والكذمات والصاخات والملخات والتواءات المفاصل.

نظام الجدول Régime du tableau C

إن هذه التَّركيبة، التي ذُكرت في دستور أدوية ١٩٦٥، أعيد ذكرها في كتاب الوصفات لعام ١٩٧٤، الذي يشير إلى تفاعلاتها التَّحديديّة، ويُصنّفها كدواء

مُضادّ للكدمة، ومُصرّف. (واستبدل فيه الماء العادي بالماء الشَروب).

غسول غليسرين

بَوْرَق ٢ إلى ٤ غ
ماءماء
غليسّرين
تشققات، خدوش، تفسّخات الحلمة،

والشفاه، واللسان، والأيدي.

غسول غليسرين مُذَرَّح

<u> </u>	روح نشادر عطري
•	غليسرين
•	_
•	صبغة الذرّاح
١٦٠غ	ماء ندى البحر المقطر
	لتنشيط تفريخ الشعر .

غَسُول غُولاند، مستحلب غولاند التحميلي، ليكور غُولاند

٠ . ي ٠ . ر ر
لوز مُرّ ٩٠ غ
ماءماء في
سليماني أكّال ١٨٠٠ غ
ملح نشادر ۱٫۸ غ
كحول ١٥ غ
ماء كرز غاري١٥
إنّ دستور ۱۸۸٤ يحذف تحضير هذا
الغسول، وكان دستور ١٨٦٦ يصف ما
يلي: سليماني ١ غرام، ملح نشادر ١
غرام، مستحلب لوز مرّ ٤٨٠ غرامًا.

يوجد في كتب الوصفات مستحضرات

مختلفة تتقارب جدًّا من غسول غولاند.

نذكر منها:

 ١° - مستحلب دونكان الزئبقى، الذي غسول مهيئج (مستشفى مار لويس) يصنع من: لوز مُرّ ٥٠غ، ماء مقطر ٥٠٠غ، بيكلورور الزئبق ١,٣٠غ؛

> ٢° - مزيج بِيَت لتحضير الغَسُولات، المحضر من: حامض سيانهيدريك طبي ٨غ، سليماني أكَّال ٠,١غ، مستحلب لوز مرّ ۳۰۰غ؛

> °۲ - مستحضر سِيْمَرْلِنْغ التجميلي، المركب من: لوز حلو ٣٠غ، لوز مُرّ ١٥غ، ماء كرز مقطر ٣٠٠غ، بيكلورور الزئبق ٢٠٠غ، صبغة بنجوان ٢٠غ، عصير حامض ١٥ غ؛

٤° ماء كَليَّدُور، مستحضر إنكليزي مُبَرَّأ كغسول غولاند ولكن تركيبته مجهولة.

إن غسول غولاند، الذي سُمّى هكذا من مخترعه، يتمتع في إنكلترة منذ أكثر من مئة سنة بشهرة واسعة جدًّا كدواء وكمستحضر تجميلي. عندما نريد استعماله نخض القنينة، نبلّل قماشة ونغسل بها الجزء المصاب. في بعض الحالات نترك الكمادة مكانها. أما للنظافة فنخفّفه بالماء.

غسول قلوى

٤١٠٠٠ غ ماء

نذوِّب ونضفی (دستور ۱۸۶۱).

٨ غ	نشادر سائل
٢٥ غ	دهن تربنتين
١٢٥ غ	كحول مكوفر

فرك وتمسيد فروة الرأس ضد القَرَع. نرفع أحيانا مقادير النشادر ودهن التربنتين. لم يزل هذا الغسول يوصف حالتًا.

غسول مهيج إنكليزي

۰۰۰ غ	کحول ۹۰ درجة
۰۰۰ غ	خل مقطّر
۴۰ غ	ملح نشادر

روماتيزم، شَلَل.

٢٠٤- غَفَث مَثْقُوب الوَرَق(١).

Herbe à la fièvre, Herbe parfaite (F) **Eupatorium perfoliatum (S)**

نَبات من فَصِيلة المُركّبات يَتَمتّع بشهرة واسِعة في الولايات المتَّجِدة الأمريكيَّة بالخصائص التّالِيَة: مُقوِّية، مُبوِّلة، مُعرِّقة، مُسهِّلة قَويَّة حسب المقادير.

غ ف ث

غ ف ٹ

۲۰۵ - غَفَث نَدْغِي الوَرَق، مِيكانيا
 غواكُو، غواكُو، هواكُو^(۱)

Guaco, Huaco (E)

Mikanie Guaco, Eupatoire à feuilles
de sarriette, Guaco, Huaco (F)

Eupatorium satureiæfolium (S)

يُطلق اسم غواكو أو هواكو، في أميركا الوسطى والجنوبيّة، وفي الهند الغربيّة، على أنواع مُختلِفة من الغَفَث Eupatorium، وهي أنواع من فصيلة المُركَّبات وقسم ميكانيا، سوقها مُلتفَّة، يستعمل عصارتها سكان البلاد الأصلين (عبيد غرناطة الجديدة، هنود المكسيك) لحماية أنفسهم من لَدْغ الأفاعي السامّة؛ وذلك بإجراء تمسيدات وفرثك بواسطة الجذر المُقطّر في ماء الحياة؛ أو بواسطة العصير الممزوج بالروم. إن هذه الميزة الخاصة بالغواكو، والتي كان أوّل من عَرَّف بها مُوتيس من سانْتافِيْه، قد أكَّدها كلِّ من دوهَمْبُولت وبُونْبلاند، وهما يَعتبران أن الغواكو الحقيقتي الذي يَستعمله الهنود هو الميكانيا غواكو .Mikania Guaco Willd وهـو نـوع عارش، يوجد منه في الأسواق خليط من السوق والأوراق والأزهار؛ أمّا الأولى فهي وحدها تقريبًا المُستعملَة في الطبّ. وأنه من الخطأ ما يذكره بعض المراجع من أن الأوراق هي القسم

الوحيد المُستعمَل في الطبّ من ذلك النبّات.

الخصائص والاستعمال - وجد فُوريه في السوق والأوراق مادّة راتنجانيّة مُرَّة تُدعى غواسِيْن Guacine. نُصِح بنقيع القشرة والأوراق في علاجات موضعيّة ضِدّ السّفلِس (قُنْسان غُومَز)، وعلاج نَوعَى خاص ضِدّ الكَلَب (هاوكنغز)، ولمحاربة الكوليرا (شابَرت)؛ وفي معالجة الرّوماتيزم. ونُصِح، للاستعمال الدَّاخِلَى، بنقاعة ٢٠ بالألف، وبصبغة كحوليّة من ٥ أجزاء من الروم أو من ماء الحياة مقابل جزء واحد من الساق، وبخليط مُؤَثْيَر؛ ونُصِح، للاستعمال الخارجي، بالصّبغات المُؤثيرة والصّبغات الكحوليّة في تمسيدات وفَرْك، وبالنَّقيع المُركِّز وبعصير النَّبات الطّازج.

إن هذا النبّات قد يكون فعّالًا جدًّا ضِدّ الأكزيما وضِدّ الآكلة والأكال والحُكاك والهَرَشان. مسحوق من غرام واحد إلى أربعة في اليوم. مُستخلص مائع غرام واحد مرة واحدة، أربع غرامات في اليوم. صبغة من ٣ إلى ٩ غرامات في اليوم بمقادير صغيرة تُكرَّر غالبًا.

ملاحظة - تُستبدَل في الأسواق أحيانًا سوق الغواكو بسوق أنواع الأرسْتُولُوخية أو بسوق الپاريرا برافًا. إن النَّباتات القَويّة العِطْر المُستحَبّ التي استُعمِلت على أنها غواكو تنتمي كلها، حسبما يقول

⁽١) التَّـميات العربيَّة والتَّـمية الفرنسيَّة الثَّانية للمؤلِّف.

غيبورت، إلى جنس أرِسْتُولوخية. وإن النَّبتة التي تُشكِّل حتى اليوم القسم الأكبر من الغواكو التِّجاريّ هي الأرِسْتُولوخية الصَنْجِيّة (١) Aristolochia (١) الأرِسْتُولوخية الصَنْجِيّة (cymbifera Mart)، التي تُعرَف في البرازيل باسم Milhomens.

Glucose liquide غلوكوز سائل (F)

الغلوكوز السّائل هو محلول مائيّ مُكرَّر بواسطة د - غلوكوز، ومَلْتوز وسُكَّريات ذات أوزان ذَريّة أعلى، شَنِيظَة Polymères د - غلوكوز، تحصل بتحليل النّشاء الغِذائيّ النَّقيّ تحليلًا مُتحفظًا.

يحتوي الغلوكوز السائل على ٢٥٪ كحد أدنى من السّكاكر المُحلِّلة كيميائية، المُعبَّرة بالغلوكوز اللامائي والمَحسوبة بالنِّسبة للمادّة المُجفَّفة؛ بعد التَّحليل المائي، يحتوي منها على ٧٥٪ كحدٍّ أدنى.

المواصفات - سائل سميك جدًا، يُسْحَبُ خيوطًا بالجَذْب، شَفّاف، عديم اللَّون إلى مُصفر اللَّون الخفيف جدًا، عديم الرّائحة، طعمه سُكَّريّ خفيف. يَذوب في الماء، قليل الذَّوبان جدًا في الكحول.

يُستعمل في تحضير مَعاجين مَخْزَنيّة.

مُولُفوغَيّا كُول سولفُونات البوتاسيوم، سُولُفوغَيّا كول Gaïacol sulfonate de مُولُفوغَيّا كول potassium, Sulfogaïacol (F)

 $C_7H_7O_5SK = 242,3.$

غ ي ا

مسحوق بِلُّورِيّ أو بِلُّورات عديمة اللَّون رائحتها رائحة الغيّاكول الخفيفة، طعمه مرّ؛ يَذوب جدًّا في الماء (٥ أجزاء ماء بارد أو جزء واحد ماء غال)، يذوب في ١٥٠ جزء كحول أثيليك؛ لا يذوب في الأثير. يحتوي على ١٦,١٤ من البوتاسيوم الغياكول وعلى ١٦,١٤ من البوتاسيوم بالمئة. يحتوي السولفوغياكول كحد أدنى على ٢٨,١٪ وكحد أقصى على ١٨٨٪ حامض غيّاكوسولفونيك، يُحسَب بالنسبة للمادة اللّامائية. يمكنه أن يحتوي على نسبة خفيفة جدًّا من ملح بوتاسِيّ.

الاستعمال - شراب سولفوغياكول للسكري.

إن شراب غيّاكول سُولفونات البوتاسيوم أو شراب سولفوغياكول بنسبة ٥٪ يوجد في كتاب الوصفات الفرنسيّ الوطني عام ١٩٧٤.

إن السولفوغياكول هو واحد من مُركِّبات عدد كبير جدًّا من المُستحضَرات الصَيدليّة مع الأوكاليپتول والمُطهِّرات التَّنفسيَّة. نَذكُر على سبيل المثال برومْپاكُس، كَمْفُوبنومِين، أوكاليپتين، نيوكوديون، بولموتيول،

إلخ.

⁽١) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

غ ي ا

طريقة الاستعمال - أوصى باستعماله ضِدّ السِّلّ بمقادير من ٢ إلى ٦غ في للجرعة، ٢غ لكل ٢٤ ساعة. شـراب شـكّـري، فـي أقـراص أو مضغوطات من ٠,٥٠غ وفي حقن «Gaïacyl» وتتراغياكولات الكلسيوم شَرجيّة. إنه ليس سامًّا ولا يهيِّج «Galcigal» كانت ولم تزل تستعمل في المجارى الهضمية.

مقادير الفرماكوبيا الحديثة

المقادير الاعتيادية للبالغين: ٠,٥٠غ

إن غياكول سولفونات الكلسيوم البلاد الجرمانيّة. إنها أقل عملًا كاويّا من الغياكول.

٢٠٨- فَحْم حَيَوانِيّ مُنَقّى، أَسْوَد حَيَواني مُنَقِّى Charbon animal purifié, Noir animal purifié (F)

فحم حيواني مسحوق (٢٢) ١ كلغ حامض كلورهيدريك مخزني ١ كلغ ٤ ل ماء مُقطَّ

دستور أدوية ١٩٦٥. ينتج الفحم الحَيواني المُنقى من الفحم الحَيواني المغسول.

نَحلّ الفحم بالماء في إناء أو بَرْنِيَّة سِعَتها ١٠ ليترات. نُضيف الحامض رويدًا رويدًا ونُحرِّك باستمرار. نترك الكل طوال ١٢ ساعة. نُحرِّك من وقت إلى آخر. نترك المزيج يَتركَّد. نُصَفِّق ونغسل بالماء المُقطِّر السّاخن حتى لا يعود ماء الغسيل يُعطى تفاعلًا حامضًا وأن لا يضطرب من جَرّاء محلول من نيترات الفضة NO3Ag. نُسكب على قماش، نُصفّى ونُجفّف. نُسخِّن الموادّ الحاصلة في المِحَم بحوالي درجة ١٥٠ سغ؛ نُمرِّر على منخل حرير ونحفظ في قارورة محكمة.

ملاحظات الكودكس – يُستعمل الفحم

الحيوانيّ المُنقّى في إزالة لَون بعض فحم المُستحضرات العِلاجيّة؛ وتكون قُوّته المُزيلة للُّون أقوى على السّاخن منها على البارد؛ وتكون أشد فعلًا في الليكورات المُعادَلة ممّا تكون عليه في الليكورات القِلويّة. ويَتحلّى أيضًا بخاصَّيَّة تَثبيت مَوادّ مُختلِفة، مثال بعض المُركّبات المعدنية، والستريكنين، والديجيتالين، إلخ. ولكن كافة هذه المواد بالإضافة إلى المواد الملوّنة ذاتها، تبقى من دون تفكّك، فيمكن بالتالى استعادتها من الفحم الحيواني بواسطة حال ملائم. يُحفَظ الفحم الحيواني المنقى في قارورات مقفلة تلافيًا لامتصاص الرّطوبة والغازات الجويّة .

> الخصائص والاستعمال - كان البروفسور سان جاك أول من استعمل الفحم الحيواني المنقى في الطبّ البشريّ بعد الأبحاث التَّجريبيّة التي قام بها البروفسور كُوشلان. وكان يقوم بذلك في زَرْقات ضمَوريديّة من محلول مُعَلّق من الفحم الحيوانيّ (كربون ضمن الوريد .I.V.C). إن تلك المحاليل المُعلِّقة تعمل كمضادة للعدوى على غرار عدد كبير من المواد الغَروانيّة.

> عام ١٩٣٥ نصح الدكتور مَنَتْرال Ménétrel باستعمال الفحم النَّباتيّ المُفَعَّل بدلًا من الحَيوانيّ المُنقّى لأن نَخْلَه الانتقائق كان يُؤدّي إلى فصل

ف رن

الحبوب الزّائدة الحجم عن الحبوب الناقصة الحجم بشكل أسهل، ذلك أن الأولى تُسبِّب السَّدَّات والصِّمامات، والثانية تسبُّ التَّصادُمات.

إن عمل الفحم المضاد للعدوى ضمن الوريد (I.V.C.) يبدو عامًّا جدًّا، ولذلك يُنصح به في حال الإصابات النَّفاسِيَّة، وحالات خَمَج الدم أي تَعفَّنه أو تسمُّمه، وفي حال اعتلالات المفاصل والروماتيزم المفصلي الحاد، وفي الأمراض الجلديّة. كما يُجيز تأثيره المضادّ للسُّمّ Antitoxique استعماله، بالاشتراك مع الستركنين أم لا، في حال التَّسْبيخ البَرْبيتُورِيّ أي الغيبوبة العميقة المتسبّبة عن الأدوية البَرْبيتُورِيَّة. ويُعطى ٧١٠- فُشّاغ الفحم كمضاد للشم مثلاً ، بمقدار ٥ إلى ٣٠ غرامًا عن طريق الفه.

> ٢٠٩- فَرْنُونِيَة طارِدَة للدُّود، رُغْل طارِد Vernonia vermifuge (E) Vernonie vermifuge, Conyze vermifuge (F) Wurmabführendvernonia (D) Vernonia anthelminthica, Conyza anthelminthica, Baccharoides ascaricida (S)

المُرَكِّبات معقودة التَّعريف على اسم البوتاني ڤُرنُون. القرنونية الطاردة للدّود

نَبات معمَّر قويّ يعلو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه متعاقبة، بسيطة، بَيضيّة الشَّكل السِّنانيِّ. رؤيساته عذقيَّة التَّجميع الواسع. أزهاره أنبوبيّة، خُماسيّة السيور، ثُنائية الأقلام المتطاولة المِخْرَزيّة الرّأس. أكناته مُزوّات ومقطومة. مهده الهيمالايا.

الخصائص والاستعمال - نبات مُرّ طارد للدود خاصة بثماره. قيل عن أنواع هذا الجنس عامة أن جذورها دافعة للحمّى، مقيئة، طاردة للدود؛ وأن أوراقها وأزهارها تستعمل استعمال الشاي.

Sarsaparilla (E) Salsepareille (F) Stechwinde (D) Smilax (S)

يُتَّفَق على اعتبار قسم الفُشاغ القِشريّ أنّه أكثر فعالية من المَديتُوليوم^(٢) Méditullium. أجود فشاغ هو الذي يكون طعمه أقوى من سواه وأكثر إغشاءً.

المُركِّبات - يحتوي الفُشاغ على بقايا زیت دهنی، نشاء، راتنج، وعلی ٥٪ صابونوسيدات ستيرويديّة Stéroïdiques جنس نَباتات مُعمَّرة من فصيلة (هـرمـونـات): الـيـارلـيـن، السمِيْلاصابونين، السَّرْصابونين الذي تشطره الحوامض المعدِنيّة إلى غلوكوز

⁽٢) التَّسمة العربَّة للمؤلِّف.

وإلى سَرْصابوجانين.

الخصائص - يَتحلَّى بخصائص مبوَّلة، فيؤخذ من نقيعه المغلي حوالى ٥٠٠ ملل في اليوم (٥غ لكل ١٠٠ غ)؛ ويُستعمل كمنتٌ في الروماتيزم وأمراض الجلد.

الاستعمال - روماتيزم، أمراض جلدية، رُمال، سفلس.

طریقة الاستعمال – مسحوق من ۳ إلی ۲، مستخلص مائي من ۰٫۰ إلی ۲، مستخلص کحولي من ۰٫۰ إلی ٤؛ مستخلص مائع من ٤ إلی ۱۲؛ شراب بسیط أو مرکّب من ۲۰ إلی ۱۰۰؛ نبیذ بسیط أو مرکّب (دهن مرکّز) من ۲۰ إلی ۱۰۰، صبغة (دستور ۱۹۳۷) من ا إلی ۱۰، غرامًا؛ نقیع ۰۰ بالألف.

زهورات تحضر بالنقاعة السّاخنة الطَّويلة الأمد: Digestion.

يشتهر الفشاغ أنّه أفْعَل بكثير وهو غَضّ ممّا إذا كان مُجفَّفًا. لذلك يستعمل في بلاده الأصليّة Per Os، وبنوع خاص في نقيع مغليّ، ضدّ السفلس والأمراض الجلديّة. مستحضر كبير الانتشار في أمريكا باسم "فشاغ بريستول"، هو عبارة عن نقاعة فشاغ مُكَحْلَلَة بعض الشّيء ومشحونة بالحامض الكربونيّ ممّا يجعلها مشروبًا غازيًّا.

لكى يدخل الفشاغ في هذه المستحضرات، أو لكي يُسَلَّم كما هو، يجب أن يُشَق طوليًّا، ومن ثم يُقطع

بالعَرْض. ولكي يسهل شقّه نرشّه ببعض ف ش ا الماء أو ندعه القبو لبعض الوقت. إن أهم أصناف الفشاغ الكاذب هي جذر شعادى الرّمال (۱) Carex arenarial L. الني يُعرف بفشاغ ألمانيا والذي أعيد تسجيله في الإصدار التاسع للفرماكوبيا الفرنسية، وجذر "باهرة كوبا" (۱) Agave cubensis (۱) وجذر الأرالية العارية Aralia موجذر الأرالية العارية الهند (۱) المنافق (۱) وحتى جذر الوَقُل (۱) الخاشع . Chamærops humilis L.

China smilax, وَشَاغَ صِيْنِي -۲۱۱ Chinese root (E) Squine, Smilax de Chine, Salsepareille squine, Esquine, Racine de Chine (F) Chinastechwinde, Chinawurzel (D) Smilax china (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة الزَّبْقيّات. ساقه ليفيَّة قليلة الشَّوك. أوراقه بَيضيّة الشَّكل، قلبيّة القَّكل، قلبيّة القاعدة، مُستدقّة الرّأس، نصلها جامد النَّسيج الأخضر اللّامع، عادم الشَّوك. جذره وتديّ الشَّكل تكتنفه بعض العساقل المستطيلة الحمراء اللون المأكولة. جذوره أو بالحري ريزوماته تصل الأسواق من الصين واليابان، وتقع في قِطَع كبيرة ومتدرِّنة كالبطاطا؛ وتكون في بعض الأحيان متطاولة

⁽١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

ف ص

الشَّكل المسطَّح، بنيَّة اللَّون الخارجيّ، متورِّدة الباطن، ويكون نسيجها تارة راتنجيّ متراصّ وصلب جدًّا، وطورًا خفيف وإسفنجيّ. وهي قِطَع عديمة الرّائحة وطعمها حِرِّيف.

المُركِّبات - عفص، راتنج، صابونينات.

الخصائص - مُنَتَّ، أعيد تسجيله في الفرماكوبيا عام ١٩٧٦.

الاستعمال - في كل الحالات التي يُستعمل فيها الفُشاغ السَّهْميّ.

طريقة الاستعمال - مستخلص مائي بمقدار ٢٠,٢٠غ إلى غرامين في اليوم.

٢١٢- فَص الحِمار(١)

Donkey-fart (E)

Pet d'âne (F)

Eselfurz (D)

Onopordum 1 (S)

جنس نباتات مُحولة من أُنبُوبِيَّات الزَّهر وفصيلة المُركَّبات، شائكة جدًّا وغالبًا ما تكون كبيرة القَدّ. رُؤيساتها فرديّة أو عِذْقيّة التَّجميع، ضُرِّيّة، عديدة الأزهار. قُناباتها كاملة تمامًا، مُتراكِبة، شائكة أو مُستدقّة الرّأس. قرصها لحميّ بعض الشَّي، الرّأس. قرصها لحميّ بعض الشَّي، ومُنخَرَب. التّاج مفتوح. خيوط الأسدية مرْطاء وحُرّة. الأكنات مَرْطاء، رُباعيّة الزَّوايا. القُنزُعة مُعبِلة، حرائرها خشنة الزَّوايا. القُنزُعة مُعبِلة، حرائرها خشنة

أو ريشية. يتمثّل هذا الجنس في لُبنان بثلاثة أنواع. من أسماء هذا الجنس: أقْسُون، طُوْبَه، رأس الشَّيخ، شُكاعَى، فَصّ الحمار. الاسم الشَّعبيّ السّوري: قَنْدَريس.

٢١٣ - فَص الحِمار الحَرْشَفي، أَقْسُون
 حَرْشَفي الشّكل، قَنْدَريس لُبْناني، أَقْسُون
 نَديفي (٢)

Cardoon's shape donkey-fart, Cardoon's shape onopordon, Lebanese donkey-fart (E)

Onopordon carduiforme, Onopordon floconneux, Onopordon du Liban (F) Flockig eselfurz, Libanesisch eselfurz (D)

Onopordum carduiforme, Onopordum libanoticum, Onopordum tel-avivense (S)

نَبات مُحول عَنْكَبوتي الكساء أطحل اللَّون قد يَتَخطّى المتر. ساقه مُنتصِبة، قليلة التَّفرُّع الهاميّ، قصيرة الجناح، شائكة على كامل طولها. أوراقه ريشية التَّقسيم إلى شُدفات شائكة جدًّا. قطر رؤيساته من ٣ إلى • سم من دون الأشواك. قُنابات القُلافة لا تَتَخطّى ٥ ملم في عرض قاعدتها، تستطيل إلى شوكة ضيِّقة يبلغ طولها ٢ سم وأكثر،

⁽٢) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا التَّسمية العربيَّة الأولى والتَّسميات اللَّاتينيَّة.

مُسطَّحة الصَّفحة الدَّاخليَّة، حادَّة الرَّأس جدًّا. أشواك القُنابات الدُّنيا مُنبسطة أو مُنحنية نحو الخارج، الأشواك الأخرى مُنتصبة.

الرّأس الجِمار الخُرْشُوفيّ، أَقْسُون خُرْشُوفيّ، أَقْسُون خُرْشُوفيّ الرّأس، قَنْدَرِيْس خُرْشُوقيّ Donkey fart's artichoke (E) الرّأس (۲۱۶ Onopordon à tête d'artichaut, Pet d'âne à tête d'artichaut (F) Eselfurz artischoke (D) Onopordum cynarocephalum (S)

نَبات مُحول أخضر اللَّون دقيق الغدد الدَّبقة. ساقه مُرتفِعة، عِذْقيّة التَّفرع، تعلو من ١,٥ إلى ٢,٥ مترين. فروعه طويلة، تكسوها أجنحة ريشية التَّقسيم ومُزوَّدة بأشواك قويّة. أوراقه السُفلي سنانية، فُقاعية الصَّفحات الخشنة، ريشيّة التَّفصيص أو التَّقسيم إلى فصوص قصيرة الشُّوك؛ الأوراق السَّاقِيَّة مقتصرة ولاصقة على السّاق. الرّؤيسات كبيرة القدّ، قطرها ٣,٥ إلى ٥ سم من دون الشُّوك. القُنابات مَرْطاء أو خفيفة الكساء العَنكبوتي، مُتراكِبة، حادة، تبلغ ٥ إلى ٨ ملم في أقصى عرض لها، متطاولة الشَّكل المثَلَّث، تعرض قليلًا عند حولى ثلث طولها الشَّفلي، وتخفّ بعدها تدريجيًّا إلى رأس حادٌ، جارح.

Heterospiny (۲) مُغَايِر الشَّوكُ donkey's fart, Heterospiny onopordum (E) Onopordon à épines variées, Pet d'âne à épines variées (F)

٢١٥- فَصّ الحِمار المُغايِر الشَّوْك،

Onopordum heteracantha (S)

نَبات مُحول لِبديّ الكساء، أطحل اللَّون، قد يعلو أكثر من متر. ساقه بسيطة أو قليلة الفروع، هامشها ضيِّق ودقيق الشَّوك. أوراقه سِنانيّة، ريشيّة التَّقسيم، كثيفة الشَّوك، الأوراق الساقيّة مُختَصَرة ولاصقة على السّاق. رؤيساته كبيرة القد قطرها ٢,٥ إلى ٤ وحتى ٧ سم من دون الأشواك. القُلافة لِبديّة، قُناباتها السُّفلي مُتراكِبة قصيرة الشَّكل المُثلَّث، قصيرة الأشواك، الوسطى أمتطاولة، تخف إلى شوكة طويلة، ٢ إلى الأعلى تنتهى بشوكة حادة.

الخصائص والاستعمال - إن مركبات أنواع فَص الحمار غير متوفّرة، وهي أنواع مأكولة تُعرَف شعبيًا باسم «قَنْدَريس». ولقد أوردت الموسوعة في علوم الطبيعة أن هذا النبّات «يُقَشَّر طريًا ويؤكل فيدفع التّشنُّج والكزاز» (جزء أول، ص ١٠٦، رقم ١٨٩١، طبعة ثانية). أما «فص الحمار» فترجمة اسم الجنس اللّاتيني من ONOS حمار ومن Pet ، PORDUM

⁽١) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة.

٢١٦- فوافُوتْسِي، ثِمار بَيْضاء **ف** و ا

Voa-Fotsy (E)

Voa-Fotsy (F)

Voa-Fotsy (D)

Aphloia sp. (S)

الفوافوتسي هي أوراق تأتي من أنواع مختلفة من جنس أفْلُويا وفصيلة النُّعْضِيَّات، مهدها مدغشقر، وجزر المحيط الهندي وبعض جبال أفريقيا الشُّرقيّة. إن كلمة فوافوتسي هي تعبير مَلْغاشي يعني «ثمار بيضاء» بسبب العُنَيْبات الصَّغيرة العديدة التي تُغطّي بالملاريا. فروع الشَّجرة في موسم النضج، وهي عُنيبات مأكولة. الشُّجيرات لا تَتَخطّى ٣ أمتار؛ أزهارها صغيرة جدًّا، أوراقها من ٢ إلى ٤ سم، سِنانية، حادة الرأس، مُفَرّضة الحوافي بعض الشيء.

أنواع للتّداوي، منها:

- Aphloia mauritiana Baker (Syn.: Aphloia theæformis Benn., Neumannia theæformis A.Rich. et variété integrifolia Benn.).
- Aphloia madagascariensis Clos
- Aphloia minima Bak.

وهم يفضِّلون الضَّرب الصَّغير الورق، ويستعملون الأوراق النصف مُجفَّفة ذلك أن التَّجفيف يذهب بقسم من الخصائص الطسة.

إلى هذا العقار كلّ من هاكل عام ١٩٠٩، شوڤالييه ودَنْدريو عام ١٩١٠، إلخ. عزل ر. پاریس عام ۱۹٤۲، من الأوراق تتراهيدروكسي فلاڤون متبلّر، دُعي أَفْلُويْدُول، ونسب إليه جُزئيًا عمل الأوراق. الطبّ الشّعبيّ يَستعمل الأوراق ضد إصابات مختلفة: الحَبَن، الاستسقاء، التَّعقيبة وحُرقة البول؟ القشرة قد تكون مقيّئة، ولكن عملها الأساسيّ هو الحُمّي الصَّفراويّة الدَّمويَّة البَيْلَة، التي يصلها الأطباء عادة

طريقة الاستعمال - يُعطى المريض عدة كبايات في اليوم، وقدر ما يريد، من نقيع ٣٠ إلى ٥٠غ وراق في ليتر ماء؛ يمكن إعطاء النَّقيع ذاته في حقن شُرجيّة، ولكن ينصح بعدم إعطاء الكينين طوال فترة يَبدو أن الملغاشيّين يَستعملون عدّة النُّوبة (وإذا لزم الأمر يُسمح بشرب خمر الكنكينا). لهذه المعالجة تأثيرات مُدرّة للصَّفراء، مسهِّلة وتُبدِّل مظهر البول بسرعة ملحوظة. تعطى نقاعة بنسبة ١٠ بالألف، وصبغة يؤخذ منها ٢ إلى ١٠غ، ومستخلص مائع من ١ إلى ٣غ. وبالتعميم، نُصح بمستحضر يدعى أَفْلُويْن تشترك فيه الأوراق مع نباتات أخرى، وهو مستحضر يُخصّص لاتقاء الاضطرابات الدورية الدموية أو محاربتها.

المُنْ الْمِنْيَاس، سترِيكُنُوس إِيْنِياس ف و ل St. ignatus bean (E)
Fève de Saint-Ignace, Strychnos ignatier, Vomiquier amer (F)

Bittere ignatie, Ignatienbaum (D) Strychnos ignatii, Ignatia amara (S)

جَنْبَة عارشة سَرْعيّة من فصيلة اللُّوغانِيَّات. أوراقها بَيضيَّة الشَّكل مُستدقَّة الطَّرف. أزهارها بيضاء. ثمارها كُرويَّة بحجم البرتقال الصّغير، طولها من ٢ إلى ٣ سم وعرضها ١٥ إلى ٢٠ ملم. الفول غير منتظم ومُشوَّه الشَّكل بسبب الضغط المتبادل بين البزور داخل النَّمرة، وهذا ما يُشكِّل عِدّة وجوه مسطَّحة. وجه النُّمرة قاتم اللَّون النُّنِّيِّ أو كامد اللُّون البُنِّي. مُبرغَل المظهر أو دقيق التَّحبُّب، مُرَخَّم ببقع مَرَدُّها إلى الأوبار. على أحد طرفي الثَّمرة سُرّة ظاهرة جيّدًا. أما السُّويداء التي تحيط بجنين نباتي صغير وجالس، فهي قَرْنيّة القِوام، بُنيَّة اللَّون. إذا عولجت الثَّمرة بالماء الغالي الذي ينفخها ويُليِّنها، فإنها تَنثر رائحة تُرابيّة وغير مُستحبَّة، بزورها من ١٠ إلى ١٢، يعلوها زغب هُلْبيّ الشَّكل. إن طعم فول إينياس شديد المرارة وسام الخصائص أكثر من خصائص جوز القيء.

المُركَّبات - يحتوي فول إينياس على ستريكنين، وبروسِين مشتركين مع حامض إينيازوريك؛ تَتوزَّع القِلَويدات على كافة خلايا السُّويداء. يُعطى هذا السويداء،

افُريقيا ، فَواكَنْغا أَفْرِيقيا ، فَواكَنْغا أَفْرِيقيا ، فَواكَنْغا أَفْرِيقيا ، فَواكَنْغا Thouarsi's Voacanga (E)
Voacanga d'Afrique, Voacanga de
Thouarsi (F)
Afrikanischer Voacanga, Thouarsische Voacanga (D)
Voacanga africana, Voacanga
Thouarsii (S)

نَبات طبِّي من فصيلة الدِّفْلِيَّات مهده غينيا، منه نوعان: الأفريقيّ والثوارسيّ المنفرج. قام بدراسة هذين النَّوعين، وبالوقت ذاته تقريبًا، كلِّ من كوڤوفيليه وغُوتارَل وجانو في فرنسا، عام ١٩٥٥؛ وكلٌّ من لابار وجِيلُو في بلجيكا.

المُركِّبات - أشار المؤلفون أعلاه إلى وجود نسبة ١ إلى ٣,٥ بالألف من القِلَويدات التي تمّ الحصول عليها بحالتها المُتبلَّرة، في قشور الجذع والجذور: فواكامِيْن، فواكَنْغِين، فُوبْتُوزِيْن Vobtusine.

الخصائص - كشفت الدراسات الفرماكودينامية أنها قلويدات مُهبَّطة للتَّوتُّر الشِّريانيّ، وبالإضافة إلى ذلك، إن قِلويدات فواكنغا أفريقيا هي مُقوِّية قلبيّة بُطَيْنِيّة تعمل مباشرة على عضلة القلب. إن تأثيرات هذه القِلويدات القلبيّة والدوريّة الدَّمويّة هي مشابهة لتأثيرات المقوِّية للقلب.

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

ف و ل

على غرار سُويداء جوز القيئ، بالتَّحليل المائتي مع حامض سولفوريك بنسبة ٣٪، مَنُوز وغَلَكْتُوز. ومن المحتمل وجود مختلف أنواع المَنّانات والغَلَكْتانات ذات الوزن الذري المختلف، في البزور. أما لتعيير القِلَويدات في فول إينياس فيتم التَّقَيُّد بما جاء عن ذلك في مقال جوز القيء.

إن فول إينياس وجوز القيء يحتويان على الكمِّية ذاتها تقريبًا (٢,٥٠٪) من القِلَويدات العامّة. ولكن فول إينياس هو الأفعل من هذين العقارين لأنّه يُوجد، في مجمل قِلويداته العامة، حوالى مرتان أكثر من الستريكنين مما في قِلَويدات جوز القيء.

الخصائص - إن خصائص فول إينياس واستعمالاته هي ذاتها خصائص واستعمالات جوز القيء والستريكنين. وذكر أنها مُقوِّية، مُشهِّية، هاضمة، وهي ترياق ضِد المنوِّمات البَرْبِيتُوريّة.

الاستعمال - وَهَن، كسل المعدة، سَيلان مَنوي، سَلَس بَول ليلي، شَلَل كُحولي، تسمَّم بالمهدَّئات والمنوِّمات البربيتورية.

طريقة الاستعمال - مسحوق البزور الدى ١٠,٠٠ في أقسراص أو بيلولات؛ المقادير القصوى حسب دستور الأدوية ١٠,٠٠ لجرعة واحدة، ٣٠,٠٠ لكل ٢٤ ساعة للبالغين. وهو يستعمل فقط لتحضير نقاط بُوميه المرّة (صبغة فول إينياس المركّبة) التي يساوي

الغرام الواحد منها ٥٤ نقطة. المقادير الاعتيادية ١٠,٠غ للجرعة، ٣٠,٠غ لكل ٢٤ مناعة للبالغين. المقادير القصوى ٢٥,٠٠غ لمرة واحدة، ٢٥,١٥غ لكل ٢٤ ساعة، حسب دستور ١٩٤٩. المقادير الولادية: من صفر شهر إلى ٣٠ شهرًا، لا يستعمل؛ من ٣٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٤ إلى ١٠ نقاط.

سامّ. - جدول Toxique. - Tableau A

Calabar bean (E) فُوْل كَالابَار - ٢١٩ Fève de Calabar, Physostigma vénéneux (F)

Kalabarbohne (D)

Physostigma venenosum (S)

نَبات عارش من فَصيلة القَرْنِيَّات الفَراشِيَّة يَنبت في أفريقيا الغربيّة عامّة، وعلى ساحل كالابار في نيجيريا بنوع خاص. ساقه ليفيّة سماكتها ٥ سم تَعلو حتى ١٥ مترًا؛ يتَميَّز هذا النَّبات بسِمَته المُنتفِخة الشَّكل الهلاليّ (الاسم العِلميّ من كلمتين بمعنى نَفَخَ، سِمَة). أوراقُه عريضة، مُتعاقبة، مُثلُثة، أزهاره فراشيَّة الشَّكل، عُنقوديّة التَّجميع المُتدلّي.

الثَّمرة قَرْن قاتِم اللَّون البُنِّي، طوله من ١٥ إلى ٢٠ سم، يحتوي على ٣ حبوب أو فُولات لَونها كالشوكولاته، طولها من ٢ إلى ١٥ ملم الى ٤ سم، عرضها من ١٠ إلى ١٥ ملم وتزن حوالى ٣ غرامات؛ وهي عديمة الطَّعم، عديمة الرّائحة، سطحها مالس أو قليل التَّحبُّب، لونها بُنِّي شوكولا.

أُعيد تَسجيلها في الفرماكوبيا عام ١٩٧٥.

هناك ضرب من نوع متقارب جدًّا من فول كالابار تُطلق عليه تسمية: فول كالابار تُطلق عليه تسمية: Physostigma macrocarpum تكون حَبَّه نسبيًّا أقل عرضًا وأكثر طولًا. يكون طرف هذه الحبوب المحدَّب مُخْتَرَقًا طُوليًّا بثلم أسود (سُرَّة) بارز جدًّا ومالس جدًّا يبلغ عرضه ٢ ملم. وهو معقوف على شكل مِزراب ومُطرَّز بنوع من النتوء مع شريط وسَطى رقيق.

ويكون الطَّرف الآخر مستقيمًا تقريبًا. وتبرز على الطَّرف الأكبر حجمًا فجوةٌ صغيرة هي السُّمّ (ثقب البُييْضَة النَّباتيّة).

وتَتألّف اللّوزة من فلقتين بَيضاويّتي اللّون، كبيرتي الحجم، مُحَدَّبَتين مُقَعَّرتين، تبرز فجوة ظاهرة بين سطحيهما البطنيّين. إن هاتين الفلقتين، الطّحينيّتي المظهر، المملوءتين بالنّشاء، هما مندمجتان متماسكتان، لا يمكن حزّهما بالظفر الذي يترك عليهما أثرًا لامعًا فقط. الفُولة الجافة تَطفو على الماء؛ طعمها خفيف، رائحتها معدومة الماء؛ طعمها خفيف، رائحتها معدومة وهي باردة؛ ولكنّها تَنثر، بتأثير الحرارة، رائحة حامزة بعض الشيء.

سام . - جدول Toxique. - Tableau A الخصائص العلاجية - وَصف هذا الفول الدكتور دانيال عام ١٨٤٦ في إنكلترة، ودرسه من النّاحية السَّميّة، عام ١٨٥٥، كريستِسُون الذي لاحظ أن عمله يرتكز على شلل القَلْب؛ وكان هذا الفول

يستخدم في مقاطعة كالابار قديمًا كفول تجربة أو امتحان Ordeal bean, Fève d'épreuve يُسمّيه أهل تلك المنطقة شعبيًّا أزارا éséré؛ وكان المُتَّهمون بجريمة يُخضَعون لتجربة قُوَّته السامّة بهدف تقرير براءتهم أو ذنبهم. تحتوي تلك الفولة بالحقيقة على قِلَويد بُنِّي اللَّون الأصفر، عديم الشَّكل، سامّ جدًّا، دعاه كل من جُوْبُسْت وهَس فِيزوسْتِغْمِين، ودعاه سواهما أزارين الذي اشتهر، كالفول ومستخلصه الكحولي، بخاصة تقليص البؤبؤ. وهو مُعاكس الأتروبين والبلّادون. إن تأثيره هذا يَحدُث إذا أعطيناه بالفم أو موضعيًّا. إن طريقة استعماله الموضعيّ الأكثر شيوعًا في الماضى كانت في ما يُسمّى الورق المُكَلْبَر (۱) Papier Calabrisé أو ورق كالابار، وهو مصنوع من ورق بَرْزَاليوس Berzélius المشبع بحلول من مُستخلَص فول كالابار؛ يُقسَّمُ ذلك الورق إلى قِطَع من سم واحد وإلى قطع من أعشار السمّ المربع؛ يحتوي كل سم على ٢ ملغ من المستخلص. إستَبْدَل هارْت الورق بالجيلاتين فصنع منه أقراصًا صغيرة ومَرنة، تُشبه قوالب الأختام الشفّافة، وتنحَلّ أجزاؤها الدَّقيقة بسرعة في العين. غيرالدس استعمل بنجاح قطرة مُركَّبة من جزء واحد مستخلص محلول في ٥ أجزاء غليسرين، نقطة واحدة من

ف و ل

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ف و ل

هذا المحلول بين الجفنين تكفي للحصول على تَقلُّص البؤبؤ. وحسب روبرتْسُن وغرانييه، إن وضع هذا الفول على العين يُحدث قِصَر النَّظر Myopie في بداية الأمر، ومن ثم تقليص البؤبؤ. إن تلك التأثيرات يقضي عليها الأتروبين، وبطريقة متبادلة، فإن تأثيرات تلك تلغي تأثيرات هذه.

نُصِح بمسحوق فول كالابار ضِدِّ بالمئة مَن الرَّقَص (مَرض عَصَبيّ)، واستُعمل في الهيوليّات. أميركا بنجاح في حالة تَكزُّز صَدْميّ، وفي إصابات الجهاز فول كالابار العَصبيّ؛ محلول المستخلص المُغَلْسَر غرام من الة استُعمل بنَجاح أيضًا في التَّخلُجات عند تُخلط أح الأولاد؛ ويمكن وقف التَّسمُم بواسطة المُقُوْنَة ana المَنور أو وقف تَخلُجات الكزار وهي طرق بواسطة جرعة مناسبة.

استَخرجَ كلَّ من فِيْه ولُوفَن من فول كالابار قِلَويدًا يَتبلَّر بنسبة ١٠,١٠ إلى ٢٣٠٠ بالمئة، دعياه أزارين. واستخرج منه هَرْناك قلويدين هما فيزوستِغمين أو أزارين، يذوب في الأثير، ويمتلك عملًا Myotique؛ وكالابارين، لا يذوب، وتكزّزي.

وأشار من ناحية أخرى، كلًّ من بولونوفسكي ويَتْزُبَرْغ (١٩١٥) إلى أهمية قِلَويد خاص، جانازارِيْن، يقارب الأزارين ويختلف عنه بذرة واحدة أكثر من الأوكسيجين. وأن الأمر لهو كذلك أيضًا بالنسبة لمشتقات قاعدتين هما: أزارولِين وأزاراتول، جانازارولين

وجانازاراتول. كذلك استخرج هَسٌ من هذا الفول ستيرولًا هو الستيغماستيرول، مشابه للفيتوستيرول.

ولقد وجد فرايز الأزارين في نوعين برازيليّين من جنس متقارب هو جنس Dioclea .

يوجد في فول كالابار، إضافة إلى ما تقدم، حوالى ٥٠ بالمئة من النشاء، ٢٥ بالمئة من الأليرون، ٢٠ بالمئة من الهيوليّات.

ونرى بنتيجة التحاليل أن ١٠٠ غرام من فول كالابار تحتوي على حوالى ٠٫٨٠ غرام من القلويدات.

تُخلط أحيانًا حبوب الكالابار مع حوب المُقُوْنَة Mucuna ومع حبوب نخل الزّيت وهي طرق في الغش يسهل كشفها وتمييزها.

يُستخدم فول كالابار فقط لتحضير الأزارين المستعمل في طبّ العيون لزَرق العَين، وذلك على شكل سالسيلات.

أشكال صيدلية ومقادير - مسحوق الحبوب، من ٠,٠٥ إلى ٠,٠٠ ملغ مستخلص؛ ٢ ملغ إلى ٠,٠٠غ صبغة خماسية من ٠,٥٠غ إلى غرام واحد، في عدّة مرّات.

Phénole فينول سُولْفُوريسيني Sulforiciné (F)

من مُشتقّات الفينول الرئيسيّة.

سائل يحصل بحل ٢٠ غرام من الفينول في ٨٠ غرام من سولفوريسينات الصوديوم (بالإضافة إلى هذا المحلول من ٢٠٪ من الفينول، يمكن كذلك تحضير محاليل من ١٠، ٣٠، ٣٠، ٤٠٪). نُصح به في ملامسات ضِد أغشية الدَّفتيريا الكاذبة، بمعدل ٥ أو ٢ مرات في اليوم، وكذلك ضد قُرْحات البلعوم السَّلية.

سُولْفُوكَرْبُول، أَسَيْتُول (F) Sulfocarbol المؤلفُوكَرْبُول، أَسَيْتُول الرئيسيّة.

حامض سُوزُولِيك؛ حامض أورتوفينول سولفونيك: يتمّ الحصول عليه صناعيًا،

بترك الحامض السولفوريك مع الفينول، على البارد ولمدّة عدّة أسابيع.

إنّه السّائل الشَّرابيّ القوام الأقل كيًّا من الفينول، الّذي يذوب في الماء، والكحول، والغليسرين. وهو يتألَّف على الأكثر من حامض أورتوفينول - سولفونيك مع كميّة صغيرة من مُشتقّات الكحول العادي الأثيريّة (إذا صحّ أن تحضيره الصناعيّ يعتمد إضافة المحول في النّهاية).

استُعمل كمطهِّر، بديلًا عن الفينول، في محلول مائي بنسبة ٢٪، وآخر بنسبة ٥٪.

ف ي ن

٢٢١ - قانَة بُرْتُقاليّة، مَكْلُورَة بُرْتُقاليّة، شَجَرَة القَش Osage orange, Bow-wood tree (E)

Oranger des Osages, Bois d'arc, Maclure (F)

Osagen apfel, Osagedorn (D) Maclura aurantiaca Nutt., Maclura pomifera Schneid, Toxylon pomifera Rafin. (S)

شَجرة جميلة من فصيلة التُّوتِيَّات تعلو من ١٢ إلى ٢٠ مترًا. جذعها المُعمَّر يَتشقَّق. هامتها واسعة. أغصانها فاتحة · اللُّون الرَّمادي، تكسوها أشواك بسبطة وجالسة. أوراقها عابلة، تبضيّة الشَّكل قَلْبِيَّة القاعدة بعض الشَّيء، مستدقّة الرَّأْس، مُعَنَّقَة، طولها ٣ إلى " سم، أوروبا، وهي اليوم في لبنان. البالغة منها مَرْطاء. أزهارها ثُنائية المَسكِن، الذِّكريّة رُباعيّة الأسدية، طولها ٢ إلى ٣,٥ سم، الأنثى في رؤيسات كُرويّة الشَّكل. الثَّمرة ثقيلة، خضراء ومن ثم صفراء فبرتقالية اللُّون عند النضج، حجمها كالبرتقالة، قطرها ٧,٥ إلى ١٢,٥ سم، سطحها غير منتظم الرقعة، تقع عند النُّضج في تشرين الثاني. تزهر في حزيران.

المُركّبات - نسغ لَبَني يسيل من جَرّاء حَزّ الشَّجرة وأغصانها. الأوراق واللَّحاء ولُت الثِّمار غنيّة بالموادّ الملوِّنة الصَّفراء، القشرة غَنتة بمادة دباغتة.

الاستعمال - الثّمار مأكولة ولكنّها تخلو من المذاق المُستحب، كان هنود الأوزاج وهم هنود أمريكيون من قبائل البشرات الحمر، يَصبُغون بشراتهم باللُّون الأصفر يواسطة لُت الثِّمار، قشور الشجرة والأغصان كانت تُستخدم في دياغة الجلود وفي استخراج صباغ أصفر. وكان الهنود يصنعون سهامهم من خشب المكلورة.

تصلح المكلورة سياجًا شائكًا دفاعيًا، كما تصلح لزينة الحدائق والطُرق والمَنْشِيّات حيث يمكن زرعها منفردة أو متجمِّعة. تتكاثر بالبزور وبتعقبل الجذور. منها ضروب سَرْحة وأخرى مرقّشة الأوراق باللُّون الأبيض. تُزرع سياجًا فى المِسْيسيبي، وتزرع للزّينة في الولايات الشَّرقيَّة، كما تزرع أحيانًا في

٢٢٢- قُبَّريَّة جَمِيْلَة، قَنْبَر جَمِيْل (١) Beautiful corydalis (E) Corydalle belle (F) Schöne Kletternder (D) Corydalis formosa (S)

القُبَّريّة جنس نَباتات حَوليّة أو مُعمَّرة من

⁽١) كل التَّسمات للمؤلِّف ما عدا اللاتنيَّة.

Corydalis (E) - قُبُرِيَّة جَوْفَاء Corydalle creuse (F) Kletternder (D) Corydalis cava (S)

ق ب ر

نبات عُشبيّ معمّر من فصيلة الشَّاهْتَرَجِيّات، درنته تحترابيَّة جوفاء تُعطي ساقًا بسيطة منتصبة تَعلو حوالى ٣٠ سم. أوراقه ذات شُدْفَة أو شُدفَتين مزدوجة التَّقطيع الرِّيشيّ الثُّلاثيّ. قُناباته بيضويّة كاملة. أزهاره عُنقوديّة التَّجميع المهاميّ، أرجوانيّة اللَّون الوَرْديّ أو بيضاء، مهمازها دائريّ طويل ومُنْحَنِ. كل أقسام النَّبات سامَّة عنيفة.

المُرَكَّبات - عندما تَجفّ الدَّرنة، سُرعان ما تُصبح جَوْفاء، وتَبعث عِطرًا مُخَدِّرًا ويكون طعمها مرًّا وتحتوي على قَلْويدات عديدة، أهمها: كوريدالين، كوريبولين، كوريدين، كوريكاڤين، إيزوكوريبولبين، بولبوكاپنين وهو عنصر مُهَلُوس، زيت طيار، راتنج...

الخصائص - هابِط للجهاز العَصَبيّ المَرْكَزِيّ، خافِض للتوتَّر الدَّمويّ، يُخفِّف الحركة الاستِداريّة في المِعَى الدَّقيق، مُهَلُّوس. البُولْبُوكاپيرين يقضي على، أو يخفِّف الإحساس بالألم، يؤثِّر على القَلب وعلى التَّنفُّس، يُنشُط الإفراز الدَّمْعِي واللُّعابي.

الاستعمال - إضطرابات عَصبيّة خطيرة، دوخات، رجفات، إصابة فصيلة الشّاهْتَرْجيَّات. أروماتها ليفيّة أو دَرنيّة. أوراقها مُتعاقِبة خالية من الأذّنات، نَصلُها كثير التَّقسيم إلى فصوص أو سُيور. إزهرارها عُنقوديّ أو عِذْقيّ. أزهارها غير منتظمة، كأسيَّتان مُعبِلتان بَتَلانِيَّتان، أربع بَتَلات مُتَّحدة القاعدة، العُليا كبيرة قاعدتها تَستطيل بمهماز، ست أسدية ثُنائيّة الباقة (ديادَلْف). الثَّمرة عُليبة عديدة البزور. العُبريّة الجميلة نَوع مُتقارب من القُبريّة الجَوفاء.

المُركِّبات - أسُسها الفَعّالة هي: شالِيدُونِيْن أوكالِيدُونِيْن وهو قِلَويد تركيبُه الكيميائيّ C₂₀H₁₉O₅N دواء مُخدِّر الكيميائيّ يُستعمل بديلًا للأدوية الأفْيُونيّة، كُورِيدالِيْن تركيبه الكيميائيّ كُورِيدالِيْن تركيبه الكيميائيّ (أحد قِلَويدات لأفيون): C₁₁H₁₃O₅N، ومادّة تُدعى كالِيدُوكْزَنْتِيْن Chélidoxanthine).

الخصائص - مُقوِّية، مُبوِّلة.

الاستعمال - الجذور والرّيزوم المسحوق في نَقيع مَغليّ أو مُستخلَص.

طريقة الاستعمال – مُستخلص مائع من 0,0 غرام إلى غرامين في اليوم. صبغة الجذور الخماسيّة $\left(\frac{1}{6}\right)$: من ٢ إلى ٦ غرامات في اليوم.

الأسماء العربيّة والأجنبيّة هي ترجمة الاسم العلمي Formosus ، Formosa: de belle forme أي جميل الشكل.

ق ر 1

لمعالجة داء باركنسون وداء الشَّلَل -المُرَعِّش، كونها مهدِّئة وكذلك لعملها البحر الأبيض المتوسِّط. المخدِّر المماثل لعمل المورفين.

طرق الاستعمال - الطبيب فقط: نُقاعة الدرنات أو نقيعها. إنّ تَعاطى نُقاعة القُبَّريَّة بمقادير قَويّة قد تُؤدّي إلى آلام في الرأس مُشابهة للآلام التي تحدث عن التهاب السَّحايا. وقد تُؤدِّي إلى وخصائصه، فإنَّنا نورده بهدف التَّعَرُّف الموت وذلك بإحداث شَلَل قَلْبِيّ أو شَلَل تَنَفَّسِي .

> ٢٢٤- قُرّاص غِشائيّ، قُرّاص مُذَنَّب، قرّاص مُريب Doubtful nettle, Caudate nettle, Membranaceous nettle (E) Ortie douteuse, Ortie à queue, Ortie

Zweifelhaftnessel, Schwanznessel (D) Urtica dubia, Urtica membranacea, Urtica caudata (S)

membraneuse (F)

نَبات حَولي من فصيلة القُرّاصِيّات. ساقُه مُنتصِبة تعلو من ١٠ إلى ١٢٠ سم، مُربَّعة، مُرتخية التَّزَركُش بالأوبار. الذُّكريَّة أطول من الأوراق ولها محور مُفَلْطَح، وهي منبسطة ومُنحنِية، ضَيَّقة جدًّا، مُتَوأَمَة، مُزنَّدة قد تبلغ ١٥ سم. أزهاره بَيضاويَّة الكأسِيّات التي تَصْطبغ

دِماغيّة؛ تَمَّ اللَّجوء إلى خصائص القُبَّريَّة بالأرجوانيّ أحيانًا. إزهراره من كانون الثاني إلى أيّار. إنتشاره على سواحل

ملاحظة - قُرَّيص لبنانيّ لم نقع على ذكره في المراجع المتخصّصة بالنّباتات الطبِّيّة، ربما لأنّه ليس من الأنواع الشَّائعة في أوروبًا. وإنَّنا إذ نَستبعِد أن يَخلو هذا النَّوع من مُركِّبات القُرَّاص إليه أكثر منه بهدف التداوى به، بانتظار المُعطيات العِلميّة المُرتَقبة التي قد تُوضح الطُّريق. هذا، وإن كافَّة الأسماء الَّتي اقترحناها له إنّما هي ترجمة لأسمائه العِلمية الثَّلاث التي من أصَحِّها Dubia أى مُريب. غير مُحدّد.

٢٢٥- قُرَّاص كَاو، قُرَّيْص رُوْمَاني، نَيَات النار Roman nettle (E) Ortie à pilules, Ortie romaine (F) Pillennessel (D) Urtica pilulifera (S)

نَبات حَولتي من فصيلة القُرّاصِيَّات. ساقه تعلو من ٢٠ سم إلى مترين وأكثر، أوراقه بَيضيّة مقطوعة القاعدة، قَويّة وهي مَكسوَّة بوبر حارق مُتفرّق، ومربّعة التَّسَنُّن، أوبارها حارقة مُتفرِّقة، عنقُها المَقْطع، فَرْعاء، مُنتصبة. أوراقه بَيضويّة مساو لطول النَّصل تقريبًا. إزهراراته تطول حتى ١٢ سم، قلبيَّة الشَّكل القاعدي أو مقطوعة، هامشها عميق التَّسنين بأسنان حادّة الرّؤوس، وبأوبار حارقة متفرّقة. إزهراراته الذُّكريّة عُثكوليَّة الشَّكل، مُتَوأَمة على إنط

الأوراق العُليا، مُنتصِبة، فَرْعاء، مُرتخِية، أزهارها مجتمعة في جَشُوات مُرتخِية، أزهارها مجتمعة في جَشُوات Glomérules صغيرة عليها بعض الأوبار الحارقة. الإزهرار الأنثويّ في جَشُوات فَرديّة أو مُتَواْمة، قصيرة أو طويلة الزِّناد، ٣ إلى ٥ ملم عند الإزهرار، ١٠ إلى ١٢ ملم عند البلوغ. كأسيّات خضراء، ميضويّة، غير متساوية، كثيفة التَّزَرْكُش بالأوبار الحارقة.

استُعمِل هذا النَّبات ضِدّ الإسهال. وأعيد تسجيله في الفرماكوبيا الفرنسية عام ١٩٧٥.

Persicaire douce, (۱) قَرْدَب حُلو –۲۲٦ Pilingre, Renouée persicaire (F) Polygonum persicaria (S)

نبات حَوْلِيّ من فصيلة البَطْباطِيَّات. سوقه منبسطة، صاعدة أو منتصبة، طولها من ١٠ إلى ٢٠ سم، متفرِّعة، مرْطاء، محمرَّة اللَّون غالبًا، عِقدها في العادة قليلة الانتفاخ. أوراقه سِنانيّة أو متطاولة، طولها ٢٠٥ إلى ١٢ سم متطاولة، طولها ٢٠٥ إلى ١٢ سم أوبارها لاصقة، قصيرة على العُروق التَّحتيّة والحوافي، أحيانًا لِبديّة عَنكبوتيّة من والحوافي، أحيانًا لِبديّة عَنكبوتيّة من الأرجوانيّ على الصَّفحة العُليا. غُمَيْداته رقيقة وشفّافة، بُنيّة اللَّون، قصيرة، لاصقة رقيقة وشفّافة، بُنيّة اللَّون، قصيرة، لاصقة الأوبار القصيرة، مقطومة، حافتها طويلة

الأهداب. السُّويقات مفصلية عند رأسها، غير غِدِّية. كأسيّات ٥. أسديّة ٢، نادرًا ٧-٨. أقلام ٢-٣ مُتَّحدة حتى وسطها، سِمَاتها كُرويّة. الأكنات مزدوجة التَّركيب، معظمها عَدَسيّ الشَّكل، أحيانًا تكون مسطَّحة مُحدَّبة أو مثلَّثة الزَّوايا، كلُّها سوداء اللَّون، مالسة، لامعة.

الخصائص والاستعمال - إن أوراق هذا النَّوع، الذي يملك كامل هيئة فلفل الماء وسيماءه P. Hydropyper، تكون معرَّقة باللَّون الأسود، وهو نَبات كان يُعتبر قابضًا ومنظَّفًا. أعيد تسجيله في الفرماكوبيا الفرنسية الحديثة عام ١٩٧٥.

(۲۲۷ قَرْدَب سيبُولْدِي، عقَيْدَة مُدَبَّبَة (۲۲۷ Pointed persicaria (E)

Renouée de Sieboldi, Persicaire pointu (F)

Spitzig Knöterich (D)

Polygonum sieboldii, Polygonum cuspidatum (S)

نَبات بَرِّيَ من فصيلة البَطْبَاطِيَّات يطول من ١ إلى ٣ أمتار. سوقه الحولية مستديرة، في باقات واسعة، كثيفة الأشكار، متفرِّعة الرؤوس، فروعها منبسطة ومنحنية. أوراقه من ١٣ × ١٠ سم، بَيضويَّة الشَّكل المستطيل، حادة الرأس ومقطومة القاعدة. أزهاره في

ق ر د

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

ق ر د

عناقيد إبطيّة، حُزميّة التَّجميع، بيضاء اللَّون. مهده اليابان. منه ضربان: واحد متراصّ الشَّكل يعلو نحو ٦٠ سم، والثاني جميل أوراقه مُوشَّحة بالأبيض والأحمر.

المُركِّبات والخصائص - سحب پَرْكِن، عام ١٨٩٥، من قردب سيبُولْدِي هيتروسيدين من الأمُودِيْن، سُمِّي أحدهما پولِيغُونِيْن.

ولقد قام كل من غوريس وكرِيْتَه بدراسة هذا النبات، وحددا موقع الانتراكينونات في الريزوم، بواسطة مَحلول بوتاسيّ مشعشع جدًّا.

إن الجرعة المسهلة بالنسبة لهذين الباحثين، قد تكون الضعف (بالوزن) بالنسبة لمسحوق الجلهم. ولقد درس مُوْران أيضًا، عام ١٩٢٦، أنواعًا مختلفة أخرى، كان أفعلها جذر أنجبار Bistorte وساق قردب سيبولدي.

ومن ثم، سحب في السنة ذاتها، كل من بريدال وبَغْوَان، هيتروسيدًا جديدًا من القشرة الطازجة ومن جذر قردب سيبولدي، وبالطريقة البيوكيميائية، أطلقا عليه اسم پُولِيداتوسيد، تركيبه الكيميائي المرجّح 30H₂C₂₀H₂₂O₅, 3OH₂ عند 108-108° سغ، يتحلّل مائيًّا بواسطة الحوامض المخفّفة أو بواسطة الرامنُودياستاز معطيًا بذلك سكرًا متقاربًا من الغلوكوز والبُوليداتوجينول C₁₄H₁₂O₃.

(۱) الله عَرِيرِيَّة (۱) آرانيا عَرِيرِيَّة -۲۲۸ Silky corneltree, Silky dogwood, Silky dogberry (E)
Cornouiller Soyeux (F)
Seidenhornstrauch, Weichkornelbaum (D)
Cornus Sericea (S)

(راجع القُرْنُوس الملفوف، المادّة التالية).

Cornus circinatus (S)

القُرنوس جنس أشجار أو شُجيرات من فَصيلة القُرْنُوسِيَّات. أوراقُها متقابلة عمومًا، نادرًا ما تكون نَباتات عُشبيّة. أزهارها خُنثويّة، كأسها ذات نَصل رُباعيّ الأسنان؛ أربع بَتَلات مُصَرَّعة (ذات مصاريع)؛ أربعة أسدية. أسطوانة مِخَدِيَّة الشَّكل. مَبيض ثُنائيّ الحُجُرات، وحيد القلم. الشَّمرة عُنيبة بَيضانيّة أو وحيد القلم. الشَّمرة عُنيبة بَيضانيّة أو مُتطاوِلة، ثُنائيّة الحُذور والبُدور.

القُرنوس الملفوف تَشتهر قِشرتُه على أنّها طاردة للحمّى. كذلك تَشتهر قشرة القُرنوس الحريريّ على أنها طاردة للحمّى.

⁽١) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة.

Anone des marais, Corossolier des marais, Corossol des marais (F)
Alligatorapfel, Wasserapfel (D)
Anona palustris (S)

نَوع من القِشطة يَرغب الأراضي الرَّطبة. ثماره صغيرة القَد قَلبيّة الشَّكل، عاديّة الصِّنف، غَبراء اللَّباب الغزير العُصارة المُعتدِلة الحلاوة.

Collyres (F) قُطْرَة، شياف -۲۳۲ Augentropfen (D)

القَطْرات هي أدوية وَصْفِيَّة تُخصَّص لمعالجة إصابات العَينين. إذا نظرنا إليها بشكل عام نرى أنّها قد تكون جافَّة، أو رَخُوَةً، أو سائلة، أو غازيّة.

°۱ - القَطْرات الجافّة هي مساحيق دقيقة من الشَّب، الكالومَل، سُولفات الزِّنك، التي تُذَرِّ في العَينين بواسطة أنبوب دقيق. لم تَعُد مُستعملة حاليًّا.

" القطرات الرَّخوة هي مَراهم تُسمّى عَينيّة. كان لهذه المُستحضرات عند القدامي، وفي غالب الأحيان، شكل ذنب الجرذ، وكانت تُعطى بواسطة مادّة لاصِقة، بسبب الطَّريقة الخاصّة المُتَّبعة في استعمالها. وكانت القطرات الرُّومانيّة القديمة البُنيّة والحمراء التي وُجدت في رايْمس وحُلّلت، على شكل قوالب صغيرة مستطيلة، تَضيق عند طرفها.

٣ - القَطْرات الغازِيّة تكون في العادة

Chirimoyas, قِشْطَة شَرِيمُوْلِيا –۲۳۰ Purple-apple (E) Chérimolier, Chirimoyer, Corossol d'Asie (F) Chirimoya, Purpurapfel (D) Anona cherimolia, Anona asiatica (S)

شَجرة صغيرة القدّ من فَصيلة القِسْطِيّات تعلو نحو ٥ أمتار. أوراقها بَيضيَّة، مُوبِرة، جميلة اللَّون الأخضر. أزهارها مِحوريّة مُتَدلِّية. بَتلاتها مستطيلة الشَّكل بَيضاء الصَّفحة العُليا الدّاخليّة، خضراء السُّفلى الخارجيّة. ثمارها Chérimoles رُمْداء اللَّون حجمها حجم البُرتقال. لبابها عاجيّ المادّة، غزير العُصارة، لُبابها عاجيّ المادّة، غزير العُصارة، العَرْف المُستحَبّ. إن هذا النَّوع هو الأجود صنفًا، يليه القشطة السَّهْفيّة فالقشطة السَّهْفيّة.

الخصائص - أوراقها وثمارُها الخضراء تُعطي نُقاعات مُهدِّئة، مضادة للخضراء تُعطي نُقاعات مُهدِّئة، مضادة للتَّشنُّج، قابضة ومُضادة للإسهال. بُزورها ولحاؤها طاردة للدود. نقيع الجذور المَغليّة نُصِح به ضدّ التَّوصِيم الحُمِّيّ أي وَجع الجَسَد وتَكَسُّر بسبب الحُمِّي، كما نُصِح بعصير الأوراق ضِدّ القَمْل. بُزورها المسحوقة استُعمِلت المَّميد للحشرات. إن «قلب الثور» هو نوع متقارب جدًّا من الشريموليا.

Alligator apple, قِشْطَة مَنْقِمِيَّة –۲۳۱ Cork wood (E)

ق ط ر

سوائل طيّارة جدًّا (بَلْسَم فيوراڤَنْتي، سائل النَّشادر)، تُسكَب على راحةِ البَد ومن ثم تُوضع أمام العَينين، بطريقة تُغطِّيها من دون ملامستها. وهي تَرِد هنا لذكرى التّاريخ.

إلى القَطْرات السّائلة المائيّة، يَجب إضافة القَطْرات الزّيتيَّة التي أدخلها إلى التَّداوي البروفسور باناس وأحد طُلّابه، ولكنّها قَطْرات تُهمَل الآن.

القَطْرات المائية تكون سَوّاغاتُها الاعتيادية إمّا المياه المُقَطَّرة، أو مياه النُقاعات. ومن الواجب تسليم هذه القَطْرات مُعَقِّمة، وتكون عمومًا في أوعية خاصة: زجاجات مُزوَّدة بقطّارات، أمْبُولات، قَطْرات.

ولكي تكون القَطْرة مُعقَّمة في العادة، يَجب أن لا تُستعمل إلّا مَرَّة واحدة. فعندما نفتح الزُّجاجة يُصبح من الصَّعب الحِفاظ على العُقْم، إلّا إذا أضفنا إليها المواد المطهِّرة المسموح بها.

قطرة ألومينيّة أو عَقُولة:

قطرة ألومينية - رصاصِية، ماء دوقة لَمْدال:

١٢٥ غ	ماء ورد
١٢٥ غ	ماء لسان الحمل
١ غ	سولفات ألومينيوم
٥,٠ غ	أستات الرصاص
	نخض وقت الاستعمال.

قطرة أمونياكية، مسحوق ليسون

٣غ	كلس مُطْفئ
۱ غ	قرفة
٤ غ	ملح أمونياك
۱ غ	كبش قرنفل
۱ غ	فحم نباتي
۲ غ	طين أرمينيا

نخلط أكبر كمِّية مُمكِنة من الكلس مع الفحم ونُدخِل الخليط في قارورة محكمة القفل، بطبقات متعاقبة بواسطة ملح الأمونياك؛ نُغطّي بالمواد العِطرية، نُضيف فوقها أيضًا ما تبقّى من الكلس

المخلوط مع الطّين، ونُضيف أخيرًا بعض نقاطٍ من الماء لترطيب المادّة ونقفل. عند الاستعمال، نفتح القارورة ونمرّرها تحت العينين.

Glass-wool (E) تُطْن مَعْدِنيّ – ۲۳۳ Coton minéral, Coton de verre, Laine de verre, Soie de verre (F)

إن القُطن المَعدِنيّ الّذي يُستعمَل في تصفية السَّوائل في المُختبرات يتألَف من زُجاج مُنصهِر، مَمْطوط، مسحوب على شكل خيط يَلتَفّ ويَنطوي حول أسطوانة مَعدِنيّة يُصار إلى تحريكها كدولاب المِغْزَل في غَزْل الكتّان. ويبدو أن الرُّجاج البُوهيميّ يَتلاءَم أفضل من أيّ اللَّيْفات تكون دقيقة بقدر ما تكون عليه خيوط الحرير أو خيطان القُطن؛ وهي مُعاومة مَتينة ومُميَّزة جدًّا بليونَتِها وطراوتها الزَّائدة المُفرطة.

إن القُطْن المَعدِنيّ أو الصّوف الزُّجاجيّ يُودِّي حَسَناتٍ كبيرة في تَصفية المحاليل الحامضة أو القِلَوِيَّة، حتى المركَّزة منها، ومُختلَف الموادِّ الأخرى، مثال نيترات الفضَّة، والزُّلال، والغُريّاء، وشراب فَه لِلنَّع Fehling، إلخ. إن تصريف السّائل في التَّصفِية سريع جدًّا، كما أن القُطْن المَعدِنيّ ليس له سيئة التَّخلي عن الموادِّ العُضويّة إلى السّائل، كما هي الموادِّ العُضويّة إلى السّائل، كما هي الحال في مصافى الورق أو القماش.

وهو لا يمتص كذلك الجواهر العِطرية للمياه المُقطَّرة والكحولات. يُمكن استعماله إلى ما لا نهاية تقريبًا وذلك بغسله جيِّدًا بالماء الوافر وتجفيفه بالهواء بعد كل عمليّة تصفية.

إستنادًا إلى ملاحظة قديمة، إن بعض أصناف القُطُن المَعدِنيّ يحتوي على سيليكات الرَّصاص، وبإمكانها زَجِّ هذا المَعدِن في محاليل التَّصفية المُعدَّة للتَّحليل المِخبريّ. إن هذا الواقع قد يُؤدّى إلى حدوث أخطاء خطيرة.

۱۳۶- قَلُوِیْدات الْخَرْبَق والْخُرْبُوق Alcaloïdes d'helleborus et du veratrum (F)

من القلويدات العديدة التي تستخرج من مختلف أنواع الخربق والخربوق، كجذور وريزومات الخربق الأخضر والخربق الأبيض، وبذور السِّفْدِيل أي حشيشة القَمْل. أكثر ما يستعمل منها إذًا هو مزيج الپروتوڤيراترين "أ» و"ب» المستخرجان من الخربق الأبيض؛ وهما مزيج يستخدم في معالجة ارتفاع الضغط لعمله المُهبِّط لضغط الدَّم، وهو عمل تدريجي وطويل الأمد؛ وهما بالتالي لا يبدِّلان من عمل الأدرينالين الموترِّ للأوعية الدموية والموسِّع العروق الإكليلية.

الخصائص - إن الپروتوڤيراترين «أ» و«ب» هما مضادان للحرارة ومانعان

ق ل و

ق ل ی

للحمّى، يزيدان من جرّاء ذلك عمل المُبَنِّحات العامة؛ إلَّا أنهما يشكلان تداؤبًا سامًّا مع الديجيتالين والكينين.

طريقة الاستعمال - يُعطى مزيج اليروتوڤيراترين «أ» و«ب» بالفم، بمقدار ($\frac{3}{1}$) الملّغرام إلى ١,٥ ملغ في اليوم، مقسَّمة وبعيدًا عن الوجبات؛ ويُعطى تحت الجلد أو ضمن العضل بمقدار ١٠٠ إلى ٤٠٠ ميكرون غرام كل ٤ إلى ٦ ساعات؛ وضمن الوريد من ٦٠ إلى ١٠٠ ميكرون غرام، ومن ثم ٢٠ میکرون غرام بعد مضي بضع ساعات. إن البروتوڤيراترين قد يحدث اضطرابات مختلفة (هضمية، دَوريّة، قلبيّة، حِسِّيّة قابلة للتَّبَلُّر. ونفسانيّة)، يبطلها الأتروبين والأفدرين. تضادات الاستطباب هي ذبحة الصدر والعجز الكلوى.

> ٢٣٥ - قِلْى، قِلَّى، أَشْنَان وقِلَويْدَات، قِلُوانِيّات، أَشْباه قِلَمِي Alkalies and Alkaloids (E) Alcalis et Alcaloïdes (F) Alkali und (D)

إنّ الكّلمات الفَرنسيّة والإنكليزيّة والألمانيّة أعلاه مصدرها لُغَتُنا العربيّة حيث أرَدْنا بها الإشارة إلى كَرْبُونات الصوديوم المُستخرَجَة من رَماد عُشْبة سَمَّيناها «قِلْي». بَعد ذلك، أطْلَق الخيميائيُّون اسم قِلْي على ثلاثة عناصر هي البُوتاس، أو القِلْي النَّباتي؛ الصود، بعض مَناطق البلاد التُّركيَّة. أوراقُه

أو القِلْي المَعْدنيّ؛ والنُّشادِر، أي القِلْي الحَيُوانيّ. ومن ثمّ بَعد ذلك أيضًا، وحوالى أيّام لاڤوازييه، عُرف باسم قِلْي، بالإضافة إلى ما تقدّم، أثربَة قِلَويّة، ألبَريْت (أوكسيد الباريوم)، الكلس، المَغنيزيا، السّترونْتيان (أوكسيد السترونتيوم).

قُسّمت القِلْي قديمًا إلى قسمين: القِلْي المَعْدنيّة، أي التي ذُكِرت أعلاه، والقِلْي النَّباتيَّة أو العُضُويَّة، والتي تُسمَّى أيضًا قِلَوِيْدات وقواعد نَباتيّة. آنّ هذه القِلْي وتلك تَتَّحد مع الحوامِض المُخَفَّفة لكى تُشكِّل أملاحًا، تكون في أكثر الأحيان

إنّ عَمل القِلْي على الأنسِجة الحَيّة هو من أفْعَل الأعمال، نَقِيَّة كانت أو مُركَّزة؛ لذلك، فإنَّها غالبًا ما تُستعمَل من الخارج لِكَيِّ البِّشَرة والقضاء على بعض الأنسجة، لفَتح بَعض الخُراجات، وللقضاء على النّتوءات الفُطريّة. أمّا إذا أُدخِلت الأشنان إلى الجسم، فإنّها سموم عنيفة.

٢٣٦- قِمام جَبَلِيّ Oriental whortleberry, Trebizond tea (E) Airelle de Cappadoce, Thé de Trébizonde (F) Broussatee (D)

Vaccinium arctostaphylos (S)

قِمام من فَصِيلَة الخَلَنْجيَّات يَكثر في

دائمة، مُتعاقِبة، بَسيطة، نَصْلها جامد الصَّفحة الضَّيِّقة المُسنَّنة الحوافي. أزهاره كأسِيَّة الشَّكُل، إبطيَّة الارتكاز، بيضاء اللَّون، أُحاديَّة أو ثُلائيَّة التَّجميع. ثماره عُنيْبات عديدة البُزور، حمراء اللَّون، حامِزة وعَقُولَة. أوراقُه طِبِّيَّة تُستعمَل استعمال الشّاي.

ربيّ (١) قِمام المَوْحِل، قِمام تُربيّ (٢٣٧ Cranberry, Mossberry (E)
Airelle des fanges, Airelle des marais,
Canneberge (F)
Moosheldelbeere (D)

Vaccinium uliginosum (S)

جَنبَة إلفُ الجَبَل Orophile من فَصِيلَة الشَّكُر، تَعلو الخَلَنْجِيَّات، زاحِفة، طويلة الشُّكُر، تَعلو من ٣٠ إلى ٨٠ سم، فُروعها مُستديرة، مُرْطاء، بَحريّة اللَّون. أوراقُها عابلة، مُتعاقِبة، بسيطة، كاملة، مُتعكِسة الشَّكُل البَيْضويّ، بَحريّة اللَّون على صَفحتها الشَّكُل السُّفلي. أزهارها في عناقيد صغيرة السُّفلي. أزهارها في عناقيد صغيرة إبطيّة الارتكاز، مُتورِّدة اللَّون الأبيض. الكأس رُباعيَّة خُماسيّة الأسنان. التّاج الكأس رُباعيَّة خُماسيّة الأسنان. التّاج الفُصوص. الأسدية ٨ إلى ١٠. قلم واحد بسيط. سِمَة مَرُوْسَة. الثَّمرة عُنيَّبَة مُرُورة اللَّون الأسود، عديدة البُزور، مُأولة، سُكَّريّة الطَّعم وصالحة للتَّقطير.

(١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة الأولى للمؤلِّف.

مُلاحظة - وَرد هذا النَّبات باسم قِمام ق ن ب المَناقِع في المَوسوعة في عُلوم الطَّبيعة. الاسمان المُقتَرحان أعلاه هُما ترجمة للاسم العلمي Uliginosum أي للاسم العلمي Fangeux أي يَرغب الأماكن المُتَوحِّلة أو التُّربيّة الجَبَليّة. أمّا بالنِّسبة للخصائص، فمن المُفيد العودة إلى القِمام الآسيّ والأحمر.

Chanvre (طریقة استعمال) –۲۳۸ (Mode d'usage) (F)

كان القُنَّب الهنديّ قليل الاستعمال. ولقد جُرِّب ضدّ الجُنون ووَسُواس المرض، كما نَصح البعضُ بمستخلص المائيّ الكحوليّ في بعض إصابات المعِدة، بمقدار ٠٠٠٥ غرام في اليوم.

إن مقدار ۱,۰ غرام وحتى مقدار ٥,٠ غرام من الحَشِيشِيْن يُؤدِّي إلى التأثيرات ذاتها التي قد يُؤدِّيها مقدار ٢ إلى ٤ غرامات من المُستخلَص الدَّسِم، أو ٢٠ إلى ٠ Dawamesk إلى ٣٠ غرام من الدَّوامِسْك Dawamesk وهو يُعطى في بيلولات وصبغة وجَروعات وحقن شَرجيَّة، وقد أدِّى بمقدار ٢٠٠، غرام إلى تأثيرات شديدة جدًّا.

القُنَّب الهِنديِّ قَلَّما يُستعمل كما هو، ولكنه يُدخَّن في بعض البُلدان أو يُلاك على غرار التَّبغ في تركيا ومصر وتونس والجزائر، إما لوحده أو ممزوجًا مع التَّبغ أو مع مواد أخرى. في تركيا هناك مُستحضر من الحشيشة يُعرف باسم

ق ن ب «أسرار» ويُؤخَذ على شكل شراب سُكّري الطّيب ودُهن الورد والمِسْك. تُضاف إليه الموادّ العِطريّة والنّاعِظة، أو يُدَخَّن في مُلَبِّس تزن الواحدة حوالي ٤ غرامات، تُصنع من عجينة الأسرار المُحمَّصة بعض الشيء ومن نُقاعة قويَّة من البُنِّ. أما «مَدْجُون» الجزائريين فهو مزيج من العسل ومسحوق الحشيشة المُحمَّص قليلًا. كما تُحضَّر من العُشبة بالذات نُقاعات ونَقيعات مَعليّة، ومشروبات مُختلفة. إن ماء القُنَّب المُقطِّر هو خال من التأثير المُخَيِّل.

> أما مُستخلَص الحشيشة الدَّسِم عند العرب فيتم الحصول عليه بغلى رؤوس النبات المزهرة الغَضَّة مع الزُّبدة وبعض الماء. نُمرِّر عندما يَتبخُّر الماء وتَتشبُّع الزُّبدة بما يكفى من الجوهر الفَعّال. نحصل على مُستحضر دِهاني الشَّكل(١) Unguentiforme، لاصِـــق، لازِج، مُخضر اللُّون الأصفر، طعمه ورائحته هما طعم الزُّبدة والحشيشة ورائحتها المُغثيان؛ وهو المُستحضَر الأقوى فَعالية الذي يحصل عليه العرب من الحشيشة. مقداره من ٢ إلى ٤ غرامات تُؤخذ على شكل كُرات صغيرة أو في قهوة مرّة. ولكن العرب نادرًا ما يستعملونه بهذا الشَّكل بسبب طعمه الحامز، فيعطونه أشكال المعاجين العسلية والمُعَجّنات والمُلبَّس، ومن ثم يُضيفون إليه الأفاويه، كالقرفة والڤانيليا وجَوز

أمّا ما يُسمّى دَوامِسك أو قهوة مِسْك أو الدُّواء المِسكيّ فهو المستحضر الأساسي من بين المستحضرات المذكورة، وهو مُستخلص دسم يُضاف إليه السُّكَر والفستق واللُّوز والأفاويه التي يجب أن يكون المِسْك واحدًا منها تقيُّدًا بأصل التَّسمية. ويُعْتَقد أن العَرَب يُضيفون إليه الذِّرَّاحِ أحيانًا لكي يجعلوه ناعظًا. وقد تَمَّ الكشف فيه عن وجود جوز القَيْء أيضًا. إن هذا المُستحضر هو ما كان يُطلَق عليه «مُرتِي إسكندر دوماس» أو «مُرتِي بُودْلير»؛ يُؤخذ بمقدار ٢٠ إلى ٣٠ غرامًا بشكل كُرات أو محلولًا في قهوة عادية. تبرز تأثيراته خلال نصف ساعة إلى ساعة واحدة وتبرز أحيانًا بعد فترة أطول من ذلك بكثير تبعًا لأمزجة الذين ىتعاطونە .

يُطلِق العرب اسم كَيْف أو هَوَى على ذلك النُّوع من الخَبَل الشّهوانيّ الذي تُحدِثه الحشيشة والذي لا علاقة له إطلاقًا بالخَدر الذي يُحدثه الخمر. الحشيشة يجب أن تُؤخَذ على الرِّيق. استعمالها الطويل قد يُؤدّي إلى الجنون. في الجزائر يُطلَق اسم كَيْف على النَّبات بحدّ ذاته. أما في أمريكا الشماليّة فقد انتشر تدخين القُنَّب منذ فترة حديثة نسبيًّا حيث أطلقوا عليه اسم ماريجوانا، وهو اسم يَشتَق من كلمة مكسيكية تشير إلى مصدر جغرافي.

بالحشيثة حوالي العام ١٩٥٥ في الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة بنوع خاص وفي البلدان الأوروبيّة الغَربيّة عامّة، وهو يُستعمل في بلدان جَنوب البحر المتوسط من زمن بعيد. تَتوقَّف تأثيرات الحشيشة على نسبة الرّاتنج؛ بعض الأنواع الأوروبيّة تحتوي منه على ٣٪ وهي بالتالي ليست أكثر خطورة من سِمات الذَّرة الصَّفراء. ولكن الأنواع الهنديّة وأنواع البلدان الحارّة قد تحتوي على نسبة ٣٠٪ من الرّاتنج. أما المسؤول في الراتنج ذاته فهو التَّثراهيدروقَنَّابينُول: Tétrahydrocannabinol الذي يُسبّب المَرَح والغِبْطَة، بينما يكون أحد مُتَجازِئَيْه سبب التأثيرات الهَلُوسِيّة: فاستعمال الحشيشة يُؤدِّي إلى «سُكْرِ» تَطَوُّريّ يبدأ بمرحلة من الإثارة المَرحة، فإلى مرحلة خَبَليَّة اخْتِلاطيَّة (خَبَل واختلاط العَقْل) Confusionnelle تُرافقها اضطرابات في التمييز النَّظريّ والسَّمعي، تليها مرحلة من القلق والحصر النَّفسيّ مع تَهيُّج الذاكرة، ومن ثم في النهاية تأتي المرحلة الانهيارية، فالنوم.

كتب بُودلير: عندما يستيقظ «المسافرون» يحتفظون بذكرى، ما رؤوا وما سمعوا. إن الإدمان على الحشيشة يبدو إدمانًا نفسيًا بنوع خاص. ويُخشى معه على الأشخاص الضَّعيفي الشَّخصية

إِذْمَانُه وسِمَامَتُه - إنتشر التَّسمُّم من حوادث ذُهانِيَّة الله المتراك المحشيثة حوالى العام ١٩٥٥ في ودائمة. بالإضافة إلى ذلك، إن اشتراك ولايات المتَّحدة الأمريكيّة بنوع خاص الحشيش مع مخدرات أخرى، كالداتورة في البلدان الأوروبيّة الغَربيّة عامّة، وهو والكحول والأفيون، قد يُؤدّي إلى متعمل في بلدان جَنوب البحر المتوسط الإدمان الفيزيولوجي، وبالتالي إلى زمن بعيد. تَتوقَّف تأثيرات الحشيشة الإصابة بالبرونشيت المزمن وإصابات للى نسبة الرّاتنج؛ بعض الأنواع الفم والحنجرة وإلى آلام شقيقيّة وإلى أوروبيّة تحتوي منه على ٣٪ وهي المغص. يُقدّر الاستهلاك الفرنسي عام لتالي ليست أكثر خطورة من سِمات العنية الكيف، من ٥ إلى ليسة.

۱۳۹ - قَنْطُرِيُوْن أَسْمَر ، رَأْس الدُّوري Black centaury, Brown rayed knapweed (E)

Jacée, Jacée des prés, barbeau, Tête de moineau, Centaurée jacée, Chevalon, Malon (F)

Weissenflockenblume (D)

Centaurea jacea, Jacea communis (S)

نَبات عُشبي من فَصيلة المُركَّبات، يَعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. جذرُه وَتَديّ. ساقُه مُربَّعة، مُنتصِبة، مُورِقة، مُتفرِّعة، خفيفة الزغب. أوراقُه مُتعاقبة، سِنانِيَّة الشَّكل، مُعنقة أو لاطِئة. رُؤيساتُه فَرديّة، هامِيَّة الارتكاز. أزهارها أرجوانيّة أو مُتورِّدة أو بَيضاء أحيانًا. قُلافاتُها من قنابات عديدة مُتراكِبة. النَّمرة هي أَكنة بيضاء اللَّون. نَبات واسع الانتشار الأوروبي، ولكنّه يُفضِّل الأراضي البور والخرائب وجوانب الطُرُق.

المُركِّبات - سَنْتُورين، مادَّة صِباغِيَّة،

ق ن ط

ق و ی

بُوتاسيوم، عَفْص، لُعاب، مَغنازيوم.

الخصائص - مُقوِّ مُرّ، نافع للمَعِدة، مُبوِّل، طارد للحُمّى.

الاستعمال - الجذور. نُقاعة، مُستحضر خَمريّ، صبغة، مُستخلَص سائل، مسحوق، ماء مُقطَّر.

ملاحظة - لم يَزَل هذا النَّبات يُستعمل اليوم في الأرياف الأوروبيَّة لمنافعه الهَضْميَّة، ولكي يُهدِّئ حُمِّى الأولاد. السَّنتُورين هو جَوهر مُرِّ فَعّال جدًّا في حالات عُسر الهضم. ماءُ النَّبات المُقطَّر يُستعمل قطرة لمعالجة، التهاب المُلتحمة، على غرار التُّرُنْشاه.

(۱) الْعَابِ (۱) الْعَابِ (۱) الْعَابِ (۱) Sauge des bois (F)
Salvia Silvestris Salvia sylvestris
Hort., = (S. nemorosa var. superba
Stapf.) (S)

الفصيلة - شَفَويّات Labiatæ.

الوصف - ترجمة الاسم العلميّ، من Silvester أو Silvester، هي بَرِّي أو حُرجيّ؛ لذلك دعوناها قويسة الغاب. ولقد ورد اسمها «قويسة الجبل» في الموسوعة في علوم الطبيعة. نبات بَرِّيّ مُعمَّر. ساقه زباء، فَرْعاء تعلو من ٢٠ إلى ١٠ سم. أوراقه إهليلجيّة ضيِّقة، نصلها جامد الصفحة المُسنَّنة الخَمليّة البشرة.

أزهاره عُنقوديّة التَّجميع، زرقاء اللَّون، بنفسجيّة المُواج.

الازهرار - حزيران إلى آب (٦-٨). المنبت - الأراضي الجبليّة.

ملاحظة - جاء عنها في الموسوعة في علوم الطبيعة: «منافعها الصحية المِعويّة عديدة ويُقال إنها تُستعمل في علاجات الفالج».

مَشْبَهُ ، عُشْبَهُ ، عُشْبَهُ - ۲٤١ Ground cypress, قَيْصُوم أَنْمَى ، عُشْبَهُ لَعُلَمْهُ . كُفُدَّسة ، بَابُوني Lavender cotton (E)

Santoline, Santoline petit cyprès, santoline blanche, santonique, Aurone femelle, Faux cyprès, Citronnelle, Garde-robe (F)

Zypressenheiligenpflanze, zypressenkraut (D)

Santolina chamæcyparissus, Santolina Incana (S)

نَبَات مُعمَّر من فَصِيلة المركَّبات، يَعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقه ليفيّة القاعدة، غليظة، عديدة الفروع المُنتصِبة، المكسوَّة بالزَّغَب. أوراقُه خَمليّة، مُبيضَّة اللَّون، صغيرة، ضَيِّقة، فُصوصُها في ٤ إلى ٦ صغوف متُراصة. أزهارُه ذَهبيّة اللَّون الأصفر، أنْبُوبيّة، في رُؤيسات فَرديّة، كُرويّة، هامِيّة الارتكاز. أقراصُها مُشَذَّرة. أكنتُها مُفَلْطَحة، رُباعيّة الزَّوايا، زاويتان منها أكبر من الأخرى. رائحة

النَّبات قَويّة جدًّا. طعمه مُرَّ، حامز وعِطريّ.

المُركِّبات – زيت دُهنيّ، زيت ثابت، راتنج، عَفْص، قِلويد مُرّ.

الخصائص - مُضاد للتَّشَنُّج، مُطمِث، مُنشَّط، طارد للدود على غرار حشيشة الشِّفاء والبزور المضادَّة للدُّود Semen وأنواع الأرطماسيا.

الاستعمال - أقصور، صَفَر، تَعَب، حَشَرات، طُفَيليَّات. الرؤوس المُزهرة، البزور، الأوراق قبل الازهرار. أعيد تسجيل القيسون في الإصدار التاسع للفَرماكوبيا الفَرنسيّة عام ١٩٧٤.

طريقة الاستعمال - البزور: يُؤخذ منها مِلعَقة مُتوسِّطة في مقدار فنجان ماء غال يُغطّى عشر دقائق، فنجان واحد كل صباح ولمدَّة أسبوع (عند نقص القمر). يُعاوَد العلاج لفترة ثلاثة أشهر. مسحوق البزور: تُؤخَذ في أقراص من ٠٥٠٠غ، إلى ٨ أقراص في اليوم، أو ٢ إلى ٤

غرامات تُؤخَذ مع العَسَل. الزَّيت الدُّهنيّ: يُؤخَذ منه ٣ إلى ١٠ نقاط في كبسولات تُؤخذ ٢ أو ٣ مَرّات في اليوم مع سوائل غزيرة. طارد للدُّود للأولاد: مسحوق بزور القيسون: غرامان، شَراب سُكَّريّ من أزهار الدرّاق: ٣٠ غرامًا، دَواء عَسليّ بسيط Mellite: ٧٠ غرامًا.

مُلاحظة - ينسب عُلماءُ الاشتقاق مصدرين مُحتَملَين إلى اسم القيسون، الأوّل من الإيطاليّة Santo سَنْتُو أي مُقدَّس، نظرًا لخصائصه الكبيرة. التّاني من اليُونانيّة Xanthos زَنْتُوس أي أَصْفَر، تذكيرًا بلون الأزهار.

يحتوي القيسون على ١٠,٠ بالمئة، كنتاج وسَطيّ، من زيتٍ دُهنيّ كثافته ١٠,٠ من مُركِّباته السَّنتُولينون والتَّربينات. القيسون المهروس يُوضع على مكان وَخْز الحشرات، فيعمل فَورًا على تخفيف الألم. كما أنّه يشفي الجروح البسيطة ويلئمها بشكل سريع.

<u>ای</u>

Camphre naturel گافُور طَبِيعي -۲٤۲

- مُوَاصَفات الكَافُور اليَمِيْن (الطبيعي)
يقع الكافور المكرَّر في قوالب من كيلو
إلى كيلوغرامين؛ ويكون في كتل عديمة
اللَّون، شَفّافة، فَتُوتة، دُهنيَّة الملمَس
الزَّيتيّ، يمكن حَزُّها وتَخْديدها بالظِّفر؛
مِكسرها لامِع، قوامها بِلَّوري، طعمُها
حار ولاذع، رائحتها شديدة ونَفّاذة؛
ثقل الكافور النَّوعيّ ٢٩٩، عند حرارة
الكافور النَّوعيّ ٢٩٩، عند حرارة
نقطة غليانه ٢٠٤ سغ؛ وهو يتطاير عند
الحرارة العاديّة، ولا يُسحق جيّدًا إلّا إذا
ترطَّب بالكحول، وأفضل منه بالأثير.
الكافور سريع الالتهاب.

إنه قليل الذّوبان بالماء (١/٨٤٠)؛ غير أن الماء يكتسب منه الرائحة والطعم المُكَوفَرَيْن. إن الماء المُشْبَع بحامض الكَرْبونيك يَحلّ من الكافور نسبة أقوى بكثير. وهكذا يكون الحال، وهو أمر مُلفِت، مع الماء الذي نغليها مع الكافور طويلًا. ويُعتقد أن المُستحضر المعروف في إنكلترة باسم Tower's

solution of campher إنما يُحضَّر بهذه الطَّريقة عينها.

إن الكافور الذي يُنثَر على وجه الماء يُعانى من حَرَكات دَوْريّة تُنسَب إلى تَبخّره المُستمرّ والذي يَتوقّف بإضافة أصغر قدر ممكن من مادّة دُهنيّة. وهو قابل للذّوبان في ٠,٦٥ جزء من كحول ٩٥ درجة؛ وإذا أَضَفْنا الماء إلى هذا المُذاب أو المحلول فإن الكافور يَترسَّب فيه على شكل مسحوق نَدِيْف (بَلْسَم الكافور magistère de camphre). إن المحلول الكحوليّ الذي يُشحَنُ على السّاخن يَجعل الكافور يَركد على شكل بلّورات جَميلة عندما يبرد. إن الكافور قابل للذُّوبان في جزء واحد من كحول ٩٠ درجة، وفي ٠,٥٧ جزء من الأثير الأثيليك، وفي ٣٣,٠ جزء من الكلوروفورم، وفي ٠,٥٥ جزء من حامض الخَلِيك، و٤ أجزاء من زيت الزيتون، و١,٥٥ من دهن التربَنْتين. وهو بالتّالي ذَوّاب جدًّا في الأسيتون، والبنزان، وذَوّاب في الزّيوت الثّابتة والطيّارة، وفي الموادّ الدُّهنيّة والرّاتنجيّة المُنصهرة، إلخ. وهو يذوب بالغليسرين.

الكافور مُيَامِن: إذا قِيس بحرارة ٢٠ سغ في محلول من الكحول النَّقيّ الصِرْف الحاوي على ١٠ غرامات من الكافور في كل ١٠٠ ملل من المحلول. إن طاقته اللَّوْرية تخفّ مع تخفيف المحلول وتتغيّر مع درجة تَمَيَّه الكحول.

- حِفْظُ الكَافُور

الكافور الطبيعي يجب أن يُحفظ في أوعية مُقفلة.

- إِسْتِعْمَالات الْكَافُور

الكافور بمقادير صغيرة، يُنشِّط الأجهزة الوِعائية والعَصَبية مع إثارة نَفسانية (هَذَيان مَرِح) في البداية، ومن ثم يَظهر عمله المُسكِّن والمُخبِّل. إذا أعطي الكافور تحت الجلد، وهذا هو عمله الأساسي، يبدو مُتفوِّقًا على الأثير في محاربة الاسترخاء وانحطاط نَسيج القَلْب العَضَليّ. وإذا أعطي بمقادير مُرتفِعة، فإنّه مُهيِّج قَويّ حتى الخطورة (تَخلُّجات في عقبها حالات شَلَل وسُبات قد يكون مميتًا).

كان يُنسب إلى الكافور مَلَكَة تَهدئة بعض التهابات المثانة أو تداركها واتقاؤها، خصوصًا تلك التي تُسبِّبها أنواع الذُّرّاح Cantharides؛ كما كان الأطبّاء الممارسون يَرُشون الأدوية المُنفَّطة ويَذرُّونها به. ونُصح بمسحوق الكافور لضماد القَرْحَة البدائية. فهو بالفعل مطهِّر خفيف. أما بالنِّسبة لعمله المُجْفِر الذي يُفقِد شهوة الجماع، فإن ذلك أمر مشكوك فيه جدًّا.

- أَشْكَالُه الصَّبْدَلِيَّة

مسحوق، ماء مُسكّنة، ماء حياة، كحول، بَلْسَم، مَرْهَم الصّابون المُكَوْفَر Opodeldoch، خَلّ، محاليل أثيريّة،

سجائر، مرهم، زيت مُكَوفَر، صبغة كا ف الأفيون المكوفَرة، مُذابَة زيتية كافوريّة للحصف المحقف المحقف المحقف المحقفرة المحقفرة المحقفرة المحقفة.

- مَقَادِيْرُه، جُرْعَاتُه

من ٠,١٠ غرام إلى غرام واحد على شكل مسحوق، بيلولات أو جَروعات. في حِقن تَحْجلدية (مُذابة زيتية أو أثيرية من جزء من عشرة). يجب أن لا نتخطّى مقدار غرام واحد في اليوم يُعطى في عِدة حِقن. عند الأولاد، يوصف من ٠,٠١ إلى ٠,٠٢ غرام لكل سنة من العمر.

طَرِيْقَة اسْتِعْمالِه - المقادير المتَّبعة للبالغين، عن طريق تحت الجلد: ١٠,٠ إلى ٢٠,٠ غرام للجرعة وحتى غرام واحد لكل ٢٤ ساعة.

المقادير القصوى: غرام واحد لجرعة واحدة و غرامات لكل ٢٤ ساعة. المقادير الولادية، عن طريق تحت الجلد: من صفر إلى ٣٠ شهرًا: ٥،٠٥ غرام إلى ٢٠ شهرًا إلى ١٥ سنة: ٢٠,٠ إلى ٠,٥٠ غرامًا.

الامتناع عن استعمال الكافور من عمر صفر إلى ٣٠ شهرًا، في معالجة جلدية أو على الأغشية المخاطية التنفسية.

تَضَادًاتُه - أنْتِي پيرِيْن، كلورال، نَفْتُول، فينول، حامض سالسيليك،

Cayapona (F) (۱) گَرُوِيّة کُرُوِيّة (۲٤٣ – کَايَا پُوْنِيَا کُرُوِيّة (S)

تُستعمل الثَّمرة، أي يِطِّيخة الكاياپونا، وهو نَبات من فصيلة القَرْعيَّات، في أمريكا الوُسطى والبرازيل في الطبّ البيطريّ على الأخصّ كونها دواء ماسِط. استخرج أَنْدرال من هذه الثَّمرة جوهرًا فعّالًا اسمه كَايَاپُونِيْن Cayaponine، وهو جوهر ذو طاقة مُسهِّلة لا تُضاهى، إذ إن مقدار سِت ملغرامات منه فقط تكفي لإحداث بِرازات وافرة ومَصْليّة جدًا، وذلك من دون ألم ومن دون مَغْصَات.

Purging flax, فَرْقُ – ۲٤٤ Cathartic flax (E) Lin purgatif (F) Purgier-lein, Purgier-Flachs (D) Linum catharticum (S)

عُشبة مَبذولة شَغْريّة مُعمَّرة من فَصيلة الكَتّانِيَّات تعلو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ساقها مخشوشبة فَرْعاء. أوراقها طبيّة مُسْهِلة، السُّفلي منها ضُمِّيّة التَّجميع، الوُسطى والعُليا مُتعاقِبة خطيّة. أزهارها كبيرة القَد لونها إلى الصفار التِّبنيّ.

المركّبات - وجد Pagenstecher في الكتّان المُسهِل، عام ١٨٤١، مادّة تُدعى لِينِيْن، تقع على شكل بِلَّورات صغيرة حريريّة المظهر، قليلة الدَّوبان

ريزورسين، مَنْتول، سالُول، إلخ. (الكافور يعطي مع هذه المواد خليطًا سائلًا أو عجينيًا).

يَتمتَّع الكافور من جهة ثانية بملكة تميع عدد كبير من المواد التي يتم خلطها معه: صموغ، راتنجات، صموغ راتنجية، ما عدا صَمْغ الصَّنَوْبر أو الصَّمْغ النَّفْطي، والمُرّ، وراتنج الجَلبة، كلورال، فينول، نفتولات وفينولات أخرى. إن المواد السائلة الحاصلة من اتّحاد الكافور مع فينولات، أي الفينولات المُكَوفرة، التي فينولات، أي الفينولات المُكوفرة، التي درسها دوسَكَالَ وأدخلها إلى التّداوي، هي مُطهّرات قوية جدًّا، استُعملت ضدّ الشّبحات والإصداءات السّلية، إلخ.

إن المحلول الحاصل من حَلّ الكافور في مقدار وزنه من الكحول الصّرْف (محلول روديني الكافوري) يَتمتَّع بخاصَّة إذابة بعض الموادِّ العِلاجيّة، أَ من اليودوفورم مثلًا. البيروكْسِلَيْن يَذوب فيه بسهولة: نضيف جزءًا من هذه المادّة للى ٤٠ جزءًا من محلول روديني، نحصل على سائل دَعَاه مَرْتِنْدال Camphoïde، التبخير قشرة كامدة، لَدْنَة مَرِنَة وتقاوم بالتبخير قشرة كامدة، لَدْنَة مَرِنَة وتقاوم الغسيل؛ وهي تذوب بسهولة بحامض سالسيليك، واليود، والريزورسين، والكريزاروبين، واليودوفورم، والتي يمكن بهذه الطريقة استعمالها على الجلد يمكن بهذه الطريقة استعمالها على الجلد سهولة.

⁽١) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

في الماء، ذوابة جدًّا في الكحول والأثير. وتحتوي النبتة أيضًا على راتنج وعلى مادّة مُلوِّنة صفراء.

الخصائص والاستعمال - اللّينين هو بالتأكيد من طبيعة هيتروسيديّة. إن خصائصه المسهلة القويّة كانت مدار حَدل.

وكان النَّبات يُستعمل في الماضي كمسهل قوي بمقدار ٦ غرامات من المسحوق، وبمقدار ١٥ غرامًا في نقاعة في الماء الغال. أعيد تسجيله إلى الفرماكوبيا عام ١٩٧٥.

الفُنْدُس، رُوح إفْراز القُنْدُس، رُوح إفْراز Alcoolat de castoréum, Esprit الفُنْدُس de castoréum (F)

إِفْرَازِ قُنْدُس ٢٠ ع كحول ٦٠ درجة ٢٠ غ نَمْرُث ونُقَطِّر ٨ غرامات. يُشير البَعض إلى كُحولة إفراز القُنْدُس المُركَّبة الَّتي يَدخل فيها مواد أفاويهيّة مُختلِفة إلى جانب الإفراز.

كُحُولَة التَّرَبَنْتِيْن المُركَّبَة، بَلْسَم فِيُوراڤَنْتِي، كحولة فِيُوراڤَنْتِي Alcoolat de térébenthine composé, Baume de Fioravanti (F)

 أشق

 ١٠٠

 مُر

 ١٠٠

 عُنيّات الغار

 ٥٠

 خُولَنْجان

 ٥٠

 زَدْوار

 ٥٠

 قِرْفَة سيلان

 ٥٠

 كَبْش قَرَنْفُل

 ٥٠

 مَوز طِيْب

 ٥٠

 دَقْتَمون أبيض (ورق)

 ٥٠

 كحول ٨٠ درجة

نَسْحَق المواد بشكل خَشِن ونَمْرُثها في الكحول الّذي نَضعه في حَمّام مريم أمْبيق نُغطِّي جوانبه بورق سميك نُثبَّته بواسطة الصَّمْغ تلافيًا لالتصاق المَواد الرّاتنجية بالمعدن، نُطيِّن جيِّدًا ونَترك الكُلِّ في مكان بارد لمدّة ٤ أيّام؛ نُضيف التَّربَنْتين، الرّاتنجات والصَّموغ الرّاتنجية، الألْوة والأصطرك؛ نَترك المَرْث لمدَّة يَومين إضافيَّين ومن ثمّ النَّاج (حُذِفت هذه الكحولة من دستور الأدوية بعد العام ١٩٤٩).

المواصفات والاستعمال - سائل صاف، عديم اللَّون، يَضطرب بإضافة نِصف حجمه من الماء المُقَطَّر إليه؛ عياره الكحوليّ عند ١٥° سغ هو ٨٢ إلى ٨٥ درجة؛ فُضالته مَعدومة (دستور ٤٩). استُعمل في الماضي لمعالجة المَغْص

Y . Y

ك ح و

raifort composé (F)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	فجل خيْل
٠٢٥	قِشر بُرتُقالق
10.	جَوز طِيب
{ · · ·	كحول
1	ماء
	نُقطِّر ٤٠٠٠ (لندن).

راجع أيضًا كحولة المِلْعَقيّة المُركّبة (دستور ۱۹۳۷)، الكحولة القديمة المُضادّة للحَفَر (دستور ١٨١٨).

كحولة المُلسَّة المركَّة، ماء داردَل Alcoolat de mélisse composé, Eau de Dardel (F)

17.	كحولة نُعْنَع بسيطة
١٢.	كحولة نَدَى البَحر
۹.	كحولة مَريميّة
۸٠	كحولة زُعْتَر بسيطة
١٦٠	كحولة مَلِيسَّة مُركَّبة
	نَمزُج معًا .

قِشر حامِض طازجطازج هـ عنده الكحولة هي تَبسيط لوصفة كُحول ٨٠ درجة من الوصفة الكَرْمَليِّين، ولكنَّها قَريبة من الوصفة

كُحُولَة نَمْل مُركَّبة، ماء الأرْيَحِيّة، ماء الشَّهامَة, Alcoolat de fourmis composé, Eau de magnanimité (F)

٧٢٠	نَمْل أحمر
1.4.	کحول ۸۲ درجة
الكحول لمدَّة ٥ إلى ٦ ل الجَفاف ونَنْقَع في	

الكلوي من الدّاخل بمقدار ٥ إلى ٦ نُقاط، ولم يعد بَلْسَم فيوراڤَنْتِي يُستعمَل من الدّاخل، بل في تَمسيدات خارجيّة لمُعالجة الرّوماتيزمات أو الكُساح.

كُحولة الفرمبواز، روح الفرمبواز Alcoolat de framboise, Esprit de framboises (F)

J. 1

قرمبوار منطف
كحول ۷۰ درجة
نَسكُب الكحول على الفرمبواز
المَهروس، نَتركه ٢٤ ساعة ونُقُطِّر غرامًا
واحدًا (أي جزء من أربعة). نُحضِّر مثله
كحولة الشَّنْلَك.

كحولة فيوراقنتي Alcoolat de Fioravanti (F)

كُحولة اللَّيمون الحامض، روح قشرة الحامض Alcoolat de citrons, Esprit d'écorce de citrons (F)

نَمْرُث لمدّة يَومين، نُقطِّر في حَمَّام مَريم الحقيقيّة إلى حدٍّ كبير. حتّى سَخْب كمِّيّة الكحول كلّها (كودكس ١٨٦٦). نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها كحولات البَرْغَمُوت، الكُبّادَة، البُرتُقال وأزهاره.

> كحولة مضادّة لداء الحَفَر، إكسير فجل الخيل المركّب، روح فجل الخيل المركّب Alcoolat antiscorbutique, Elixir de raifort composé, Esprit de

ك ر ف	رائحة مُميَّزة، طعمه حارِق، مَذاقه مَذاق
	قِشْرِ الحامِض، يَضْطرب قليلًا مع حجمه
	من الماء ويَضطرب بشكل بارز بإضافة ٤
	أو ٩ أحجام من الماء إليه.

الاستعمال - لَيموناضة الحامِض المَغنازيّة (دستور ١٩٦٥). شَراب الحامِض اللَّيمونيّ (دستور ١٩٦٥). شَراب كلورهيدروفوسفات الكلسيوم (دستور ١٩٤٩).

Alcoolature كُحُولَتُور البُرْتُقال الحُلُو d'orange douce (F)

نُحَضِّر قُشور البُرتُقال كما فَعَلنا مع قُشور اللَّيمون الحامِض أعلاه.

سائل عنبري اللّون الأصفر، رائحته مُمَيَّزة، طعمة لاهِب، مَذاقه مَذاق قِشر البُرتُقال، يَضطرب بشكل واضح بإضافة حجم واحد، أربعة أحجام أو تسعة أحجام من الماء إليه.

Mountain parsley كَرَفْس الجَبَل - ٢٤٧ (E)

Athamante Selin persillée, Persil de montagne (F)

Augen Wurz (D)

Athamanta oreoselinum (S)

نَباتان من فَصِيلة الخَيمِيَّات، بُزورهما طِبِّيَّة مُنَشِّطة ومُبوَّلة كانت مُسجَّلة في دستور أدوية ١٨١٨، وأُعيد تَسجيلُهما في الفَرْماكوبيا عام ١٩٧٥؛ النَّباتان هما جَزر الرُّعاة (أطلبه في المعجم الرَّابع ص

الحاصل ما يلي:

نُقَطِّر من جديد حتَّى الجفاف.

يُعطي غِيبُورت تركيبة مُماثلة ولكنّه يَعكُس عمليّة التَّحضير: فيجعل نُقاعة النَّمل في ماء الكحولة العِطريّ.

الخصائص - كحولة قَلْبيّة، نافعة للمَعِدة، مُبوِّلة بمقدار ٤ إلى ٨ غرامات في سائل ملائم من الدّاخل، وفي فَرْك وتمسيد خارجيّ في حال الشَّلَل وضَعْف المَفاصل. النَّمْل يُكسِب الكحولة الحامِض الخاص به، أي الحامِض النَّمْليّ (فُورميك).

Alcoolature گُخُولَتُور الحامض +۲٤٦ de citron (F)

قِشر حامِض طازج کحول ۸۰ درجة

نَرفع طَبَقة القُشور الخارجيّة الّتي تَحتوي على جيوب زَيتيّة ؛ ونَمْرثها في الكحول لمدّة ٨ أيّام، في وعاء مُقْفَل، مع تحريكها من وقت إلى آخر. نُمرُّر مع العَصْر ونُصفِّى (دستور).

المواصفات - سائل مُخضَر اللَّون الأصفر، الأصفر،

4.9

كرف

ه م رقسم ۱۱ ، Athamante de Crète (۱۹ والثَّاني هو كَرَفس الجبل، وهو نَبات وهو ضَرب من الجنْسَن. أمَّا الخَيْمِيَّتان عُشبيّ بَرِّي طبِّيّ مُعمَّر مَنبِتُه الجبال فهما: كَرَفْس الماء الضيّق الورق، العالية. ساقُه مُخْشوشِبة تَعلو من ٢٠ وكرفس الماء العريض الورق. إلى ٤٠ سم. أوراقُه مُستطيلة الأعْناق، كثيرة التَّفريض والتَّشريم. أزهارُه صِيْوانيّة ٢٤٩- كَرَفْس الماء الضَّيِّق الوَرَق، التَّجميع صغيرة القَدّ وَرديّة اللَّون. بُزُوره كَرَفْس الماء المُنتَصِب، سِيُوم ضَيّق مُنشِّطة ومُدرّة للبول.

> ۲٤٨- كَرَفْس الماء، سِيُوْم^(١) Water Celery (E) Berle (F) Wasser Sellerie (D) Sium (S)

> كَرَفْس الماء أي سِيُوم هو جنس نباتات مائيّة وإلْف الرُّطُوبة من فَصيلة الخَيْميّات. أزهارُها بيضاء. كأسُها خُماسية الأسنان. بَتَلاتُها بَيضاويّة الشَّكل المُنْقِلب، مُقوَّرة، نَصِلُها مَلُوي. ثمرتُها بَيضاويّة أو مُتطاولة، مَضْغوطة جانِبيًّا. مَريكَرْباتها Méricarpes خُماسيّة الضُّلوع الخَطّية. أوراقُها ريشيّة التّشريح.

خَيْمِيتان من هذا الجنس كانتا مُسجَّلَتين فى دستور أدوية العام ١٨١٨ باسم Berle، بفضل خَصائِصهما المضادَّة لداء الحَفَر والمُدرّة للبول، وأعبد تسجيلهما في الفرماكوبيا الفرنسية بإصدارها التّاسع عام ١٩٧٥. كما يَنتمي إلى هذا الجنس عينه النّبات الصّيني المُسمّى

نَنْزِي (۲) Sium Ninzi أو سِيُوم نَنْزِي (۲)

Prickly water celery, angustifoliate water celery (E) Berle à feuilles étroites, Berle dressée **(F)** Steifwassersellerie (D) Sium angustifolium, Sium erectum, Sium berula, Berula erecta, Berula angustifolia (S)

نَبات عُشبي طبِّي مُعمَّر من فَصِيلة الخَيْمِيّات، جذره زاحف، رئديّ. ساقُه محزَّزة، ناسُوريّة، فَرعاء، تَعلو من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقُه ريشيّة التَّشريح إلى وُرَيقات مُتطاولة، مُشَرَّمة ومِنْشاريّة التَّسنين. الخَيمات من ٨ إلى ٢٠ شعاعًا، مُعظمها إبطى، صغير، مُزوَّدة ىقُلافَة وقُلَيْفَة جَيِّدة النُّموّ ومُؤَلَّفة من قُنابات عُشبيَّة، سِنانيّة، غالبًا ما تكون مُسنَّنة أو مُشرَّمة. الثَّمرة صغيرة، بَيضانيّة، ضُلُوعُها خَيطيّة، بارزة في النِّهاية. إزهراره من نيسان إلى أيلول في الحُفَر والأقنية وضفاف الجداول والسّواقي.

⁽٢) التَّسمية للمؤلِّف.

⁽٣) كل التُّسمات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتـــّة.

الخصائص والاستعمال - كان هذا النَّبات مُسجَّلًا في دستور أدوية ١٨١٨ بفضل خصائصه الطبية المضادّة لداء الحَفَر والمُدِرَّة للبَوْل، وأُعيد تَسجيلُه في الفرماكوبيا الفرنسيّة، الإصدار التّاسع عام ١٩٧٥.

٢٥٠- كُرْكُم صِبَاغِي، هُرْد، عَقِيد هِنْدِيّ Curcuma, Turmeric, Long rooted curcuma (E) Curcuma, Curcuma long, Safran des Indes, Souchet des Indes, Racine de Safran, Terra merita (F)

Gilberingwer, Gilbwurzel (D) Curcuma longa, Amomum curcuma

(S)

الكُرْكُم الصّباغيّ هو اسم يُطلَق على ريزوم نَبات من فَصِيلة الزَّنْجَبيليَّات يَنبتُ في الهند الشَّرقيّة والصِّين. إن هذه الرِّيزومات تشبه الزَّنْجَبيل بَعض الشَّيء من حيث الشَّكل والرَّائحة، وتختلف عنه بلونها الدّاخليّ الأَصْفَر.

المُواصَفات - تُعْرَض ريزومات الكُركُم في الأسواق عمومًا بشكلَيْن: فتكون تارة دَرَنات بَيْضيّة الشَّكل، بحجم بَيضة الحمامة وأكثر، تكسوها قشرةٌ مُرمَدَّة اللُّون، ومُزيَّنة بِدَمْغاتِ دائريَّة، وأَثْلام غير مُنتظمة، وبَقايا جذور عَرَضيّة، خصائص الكُركُم هي عِطريّة، مُنبِّهة، تَكُونَ غَالِبًا مُقَطِّعة (كُركُم مُستدير أو كُركُم صيني)؛ وطورًا تكون الدَّرَنات مُتطاولة الشَّكل، نحيلة الطُّرفين، بحجم حالات عديدة جدًّا.

الأَصْبَعِ الصَّغيرة، ويكون سطحها مُخضَرِّ ك رك اللُّونَ الرَّماديّ، مُحَبَّب، مُمرَّك بأثلام عَرَضيَّة عديدة، وعليه بعض النُّتوء التيُّ تُمثِّل البراعم (كُركُم طويل). مِكسَرُها واضح، مُحمَر اللُّون الأَصْفَر، بَرَّاق نوعًا ما، مُمَرَّك بتَنْقيطاتِ ظاهرة جدًّا في القشرة وفي الخشب.

> يُعطى سطحُ مَقطَع الريزوم لونًا أحمر مع نقطة واحدة من محلول البوتاس KOH؛ ويُعطى لَونًا بَنَفْسجيًّا مع نقطة واحدة من حامض سولفوريك ،H₂SO . أمّا المسحوق فكون مُحمر اللُّون الأصفر.

المُركّبات - يَحتوي الكُرْكُم على نشاء، زَيت دُهنتي طَيّار مُفَلْوَر أُو فُلُوريّ، مَوادّ راتِنجيّة، مادّة مُلوّنة تُدعى كُرْكُمين Curcumine، يَتمّ الحُصول عليها بسهولة بواسطة الأثير، خاصّة بعد تَخَلُّصِها من الزَّيت الطَّيّار والمَوادّ الراتنجية بواسطة كبريتور الفحم (سُولْفُور الكَربون). القِلي تُلوِّنها بالأحمر. بالإضافة إلى ما تَقدُّم، لُوحظ وجود سَتُون سَسْكى تريينيك تركيبه ، C₁₅H₂₀O بُـدعــى تُـورْمَـارُون . Turmérone

مُبوِّلة. ويُستعمل في الصِّبغة الصَّفراء. خصائصه المُدرَّة للصَّفراء تَثَبَّتت في ٢٥١- كَرْلِيْن ذَهَبِي، كَرْلِيْن شائع، وفقًا لما يلي: خَرْشُوف بَرِّيُ Carline thistle, Common Carline (E) Chardon doré, Carline vulgaire (F) Kleine oberwurz (D) Carlina vulgaris (S)

نَبات شائك من فصيلة المُركّبات يَعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم، أوراقُه شائكة، كبيرة القدّ، شديدة التَّفريض، خَمْلتة الصَّفحة السُّفلي. رؤيساتُه الزَّهريّة ضُرِّيّة، قطرها من ١٠ إلى ١٢ سم. قُلافاتها شائكة. قُنابات القُلافة مُتعدِّدة الصّفوف، الخارجية منها شائكة، الدَّاخليَّة سَرْحَة، رقيقة وشَفَّافة، ذَهبيَّة اللَّون الأصفر، ٧٥٣ - كلُورُور حديديك(٢) تَنبسط غالبًا، وتكون مُهدَّبة الرأس أو بكاملها. زُهيراتها كلها خُنثويّة. الأسدية حُرّة الخبوط. الأكنات أسطوانيّة، مُزَوَّات القاعدة، حريريّة، سُرَّتها قاعديّة. ملح لامائي الخصائص والاستعمال - يُقال إنه من نُحضِّره كما يلى: النَّباتات الطبِّيّة التي تفيد إفادة الحرشف سَسْكي أوكسيد الحديد كمية مطلوبة والأرضى شوكى (إدوار غالب). وجاء عنه في أحد المراجع الفرنسيّة العلميّة أنه نبات كان يحظى بشهرة واسعة في الجفاف. معالجة الأمراض الطاعُونِيّة والوَبائِيّة. جذره لم يزل يُستعمل في يومنا أحيانًا كمقو للخيل.

۲۰۲- كلُورُودِيْن Chlorodyne (F)

دواء شعبيّ في إنكلترة، كان يتركّب

(١) التَّسمية العربيَّة الأولى للمؤلِّف والثَّانية لإدوار

٦٠ ملل	كلوروفورم
٦٠ ملل	كحول
۱۲۵ ملل	دِبس شَونْدَر
ائع ١٥ غ	مستخلص السوس الم
٢,٥ غ	كلورهيدرات المورفين
۰,۰٦ غ	سولفات الأتروبين
۰٫۵۰ غ	دهن النعنع
١٨ ملل	حامض سيانهيدريك
١,٢٥ غ	صَّمْغ الكُثيراء
۳۰۰ ملل	ماء مقطَّر، كمية تكفي

ferrique, Perchlorure de fer, Muriate de fer (F)

Sel anhydre (F)

حامض كلورهدريك كمية كافية نُذوِّب ونُبخِّر في حَمَّام مريم حتى

ملح يَتبلَّر في صُفَيْحات بنفسجيَّة اللَّون، سمراء المُواج الذَّهَبِي. وهو مَيُوع جدًّا. وكانت ميوعته، التي تتشكِّل من امتصاصه للرطوبة الجوِّيّة، يُشار إليها في الماضي باسم زيت المريخ. وهو يذوب جدًّا بالماء، يذوب بالكحول وحتى في الأثير.

⁽٢) التَّسمة للمؤلِّف.

Soluté كلورور حديديك محلول officinal de Chlorure ferrique, Chlorure de fer hémostatique, Liqueur du Dr Pravaz (F)

من أسمائه: مُذابة كلورور الحديد الرَّقوء، المَخْزَنيّة، كلورور الحديد الرَّقوء، كلورور الحديد اللاكتور كلورور الحديد السّائل، مشروب الدكتور پراڤاز الرّوحي، . . . كان دستور أدوية ١٨٨٤ يُحضَّره وفقًا لما يتبع:

نُعالج ١٠٠٠ غرام من خُراطة الحديد بواسطة ٣٠٠٠ غرام حامض كلورهيدريك مَخْزَنيّ، تُخفَّف في مقدار مَرَّتين حجمها من الماء؛ نُحرِّك من وقت لآخر حتى يتوقَّف انبعاث الغاز؛ نجعل عندئذٍ

الپروتوكلورور الحاصل يُسجِّل ١,١٠
بالمكثاف؛ نتركه يتركّد؛ نُصفِّق؛ نَضع
المحلول في مجموعة من أوعية وُولف
Woulf، نمرِّر فیها مجری من الکلور
المغسول، حتّى لا تعد تعطي بقايا من
لون أزرق پروسِيَا بواسطة السِّيَانور
الأحمر. نَضمٌ عندها مجموع السائل؛
نُضيف بحذر وبتحريك مستمرّ، محلولًا
من الكلورور الحديديّ Ferreux حتى
تختفي تمامًا أيَّة رائحة كانت (مع تلافي
زيادة من الكلورور الحديديّ بالوقت
ذاته). ومن ثم يُعاد محلول كلورور
الحديديك Ferrique إلى كثافة ١,٢٦
بإضافة كمّية كافية من الماء المُقطَّر.

بومِيه	كثافة المحاليل الحاصلة	ماء مُقطَّر		مَحلول مَخْزَنتي
٥٢°	تعطي محلولًا كثافته ١,٢١	■ غرام	+	۲۰ غرام
۰۲۰	تعطي محلولًا كثافته ١,١٦	۱۰ غرام	+	۲۰ غرام
°1°	تعطي محلولًا كثافته ١,١١	۲۰ غرام	+	۲۰ غرام
°1•	تعطي محلولًا كثافته ١,٠٧	٤٠ غرام	+	۲۰ غرام

بواسطة هذا المحلول المَخزنيّ، يُمكننا تفاعله حامض مع دَوّار المحلول، غير الحصول بسرعة على محاليل مختلفة قابل للفساد في الهواء أو في الضوء، التَّركيز، وذلك بتحضير الأمزجة التَّالية: وهو يحلّ الهيدروكسيد الحديديك مُتلوِّنًا

مواصفات المُذابَة المَخزَنيّة - يحتوي لونُه أقتم ع محلول پركلورور الحديد المَخزنيّ المحلول. بشكل محسوس، وفي ١٠٠ جزء، ٢٦ جزءًا من پركلورور الحديد الذي يُفتَرض الخصائه أنّه لامائيّ، أي ٩ بالمئة من الحديد. وهو في الماضي يشكّل مشروبًا روحيًّا صافيًّا، محمر اللَّون خارجيّ، و البُنِّيّ، طعمه عَقول جدًّا، كثافته ١,٢٦، فهو بالواقع

تفاعله حامض مع دَوّار المحلول، غير قابل للفساد في الهواء أو في الضوء، وهو يحلّ الهيدروكسيد الحديديك مُتلوّنًا باللَّون البُنِّيّ تحت تأثير الحرارة، فيصبح لونُه أقتم على أثر تَبدُّد الكلورور الحديدك المحلول.

الخصائص والاستعمال - إستُعمِل جدًّا في الماضي كدواء رقوء داخليّ، وخاصّة خارجيّ، وهو في يومنا يُهمل أكثر فأكثر. فهو بالواقع، وفي الاستعمالات الخارجيّة،

717

ك ل و

ك م ا

Alchémille couronnée, Alchémille à diadème (F)

Diadem Sinau, Diadem frauenmantel, Beumkränzensinau (D)

Alchemilla diademata (S)

نَبات مُعَمَّر مَحصور الوجود في لُبنان من فَصِيلَة الوَرْدِيّات. سُوقه مُنتصِبة فصاعدة تَعلو من ١٠ إلى ١٥ سم، قاعدتها كثيفة الهُلْبِ بأوبار مُتَفرَّقة في قسمها العُلويّ. الأوراق القاعدية شبه كلوية الشُّكُل، مَرْطاء الصَّفحة العُليا، هُلْبيّة الصَّفحة الشفلي، عرضها ٣ إلى ٤,٥ سم، وطولها أقل من عرضها، وهي مُشَرَّحة حتى ثَلثها إلى ٧-٩ فُصوص، كلّ فَص منها مُشَرَّم بدوره إلى ٦-٧ أسنان من كلّ جهة، وهي أسنان قَلَمِيّة الشَّكْل، قليلة الاتِّجاه نَحو الوَسَط. الأوراق السّاقية صغيرة، نصف مُستديرة، خُماستة الفُصوص غير الكاملة. الأزهار قصيرة السُّونِقات، مَرْطاء تمامًا. النَّمرة بَيضاويّة، قُرْبيّة الشَّكْل.

Break (۲) كَمَالِيَّة الْحُقُول stone, Colic wort, Persley piert (E) Alchémille des champs, Perce-pierre des champs (F)

Feld sinau, Feld frauenmantel, Steinbrech (D)

Alchemilla arvensis, Aphanes arvensis (S)

نُبَيَّتَه حَوليَّة من فَصِيلَة الوَرْدِيّات سُوقها

يُحدِث في غالب الأحيان نَدَبات وآثارًا للحروق، ويمكنه إحداث سَدًات وهَمامات مُميتة؛ وأكثر من ذلك، فإنّه شبه عديم الفَعالية من الدّاخل. وهو يُستعمل لتحضير سيترات الحديد النّشادريّ، وسَسْكى أوكسيد الحديد المُميّة.

مستحضرات مختلفة من الكلورور الحديديك:

- يُحضَّر تحت اسم «رقوء الحقيبة» قطع من الصّوفان المُنتخب والمُجفَّف سلفًا، يتم تشرّبها بالبركلورور. ويكفي للاستعمال بوضع صوفانة على الإصبع أو على الفتحة الدامية، وضغطها لمدة الى ١٥ دقيقة والاحتفاظ فيها بواسطة رباط.

- وحسب بيازًا، فإن كلورور الصوديوم قد يُخفِّف التأثيرات المثيرة ليركلورور الحديد؛ ومن هنا المستحضرات المُسمَّاة كلورور الحديد والصوديوم، كالتركيبة التالية:

محلول اليركلورور المتعادل

إن هذا السائل يسجِّل ٢٠ درجة بومِيه.

''کمالِیَّة مُتَوَّجَة ، کَمالِیَّة مُکَلَّلَة''' Diadem lady's mantle, Crowned lady's mantle (E)

(٢) التَّسمية العابيَّة للمؤلِّف.

خَيطيّة الشَّكُل تَطول من ٤ إلى ٦ سم، وهي بالكاد هُلْبِيّة. أوراقها القاعديّة مُسوَّقة، مُتَصَبِّعة، سريعًا ما تَذوي. الأوراق الساقيّة السُّفلى مُسوَّقة بوضوح، مُؤذَّنة، عُنقها من ٢ إلى ٣ مم، ونصلها من ٤ إلى ٥ مم، مِرْوَحيّ الشَّكُل، شبه كلويّ الشَّكُل. أزهارها في جَشُوات صغيرة جدًّا، أنبوب كأسها جُريسيّ الشَّكُل.

الخصائص - قيل عن كافّة أنواع الكّماليّة إنّها تَتَحلّى بالخواصّ الطبّيّة وإنّها شابِقة وتُؤتّر أغشية البّكارة فتفيد اللَّواتي فَقَدْن كَيْنَهُنّ (أطلب كمالية مَبذولة لمزيد من التّفاصيل في المعجم الأوّل ص ٣٢٧ رقم ٢٤١).

۱۵۵- الكَنْكِيْنا وتَركيبها الكيميائي Quinquinas et leur composition chimique (F)

إن تركيب الكنكينا الكيميائي هام جدًا؛ وهو مُعقَّد ويختلف من نوع إلى آخر. إن الجواهر الخاصة الموجودة في قشور الكينا هي القِلَويدات التّالية: سينكونين ومُتجازِيْه السينكونيدين (كينيدين الألمان)؛ كينين ومتجازِيْه الكينيدين (كونكينين هَسّ).

هناك علائق بين هذه القِلَويدات الأربع تُبيِّنها تركيباتُها الكيميائيَّة. كان ب.أ. جُوْمَس B.A. Jomes أوَّل مَن استخرج من الكنكينا مادّة أطلق عليها اسم

سينكونين، ولكن مَن اكتشف الكينين والسينكونين وعَرَّف بهذه القِلَويدات كان كلّ من پَلاتييه وكاڤَنتُو، عام ١٨٢٠. وقد تمّ الحصول على السينكونيدين، وهو الاسم الذي أطلقه عليه پاستور عام ١٨٤٠، بفضل وينكلَر، عام ١٨٤٧، الذي أطلق عليه اسم كينيدين، بتركيب كيميائي أطلق عليه اسم كينيدين، بتركيب كيميائي أطلق عليه اسم كينيدين، بتركيب بيلورات لامائية تذوب في ١٩٠ جزء أثير، وفي ١٦٠ جزء كحول.

عام ۱۸۳۳، أطلق اسم كينيدين على قلويد تركيبه C₂₀H₂₉N₂O₂ درسه پاستور عام ۱۸۵۳ وبيّن مشابهته لما دُعي بيتا- كينين. وهو قلويد يوجد في كنكينات پيتايو على الأكثر.

من القِلَويدات الأخرى: هيدروسينكونيدين، هيدروسينكونيدن، كوپرايين، سينكونامين، هيدروكينين، هيدروكينين، هيدروكينيدن، إلخ (أي ما مجموعه ٢٥ قلويدًا عُزلت من قشور الكنكينا).

السينكونامين C₁₉H₂₄N₂O=296,4 عام الذي اكتشفه أزنود Arnaud عام ١٨٨١، مفيد بتكوينه الذي يتقارب من اليُوهِمْبِيْن ومن الستركنين من جهة، ويتقارب من السينكونين والكينين من جهة ثانية.

الكينامِين $C_{19}H_{24}N_2O_2$ اكتشفه هَسّ عام ۱۸۷۲ في الكنكينا الحمراء . Succirubra وهو شبه عديم الذوبان في الماء، يذوب في الكحول (۱۰۰ جزء)،

كنك

كنك

وفي الأثير (٥٠ جزءًا)، وفي البنزين، إن هذه المحاليل لا تعطي تَلَايُوكينين Thalléioquinine

الپاریسِیْن الذی تمّ اکتشافه فی قشرة Buena hexandra Pohl.=Cascarilla ، أمّ اکتشافه ثانیة فی hexandra Pohl. (C16H18N2O ترکیبه ۱۳۰۵) ینصهر عند ۱۳۰ سنځ؛ وهو خامل فی الضوء المُسْتَقُطَب.

إن الأسماء: أريسين ، C₂₂H₂₆N₂O₄ سينكوڤاتين، كُوسْكُونِين، پَلْتُوشِين، قَرْطاجِيْن، بسودوكينين، هي أسماء أُطلِقَت على قلّويدات مستخرجة من بعض القشور المنخفضة الجودة، مثال قشور سينكونه پَلاتيية الزغبية (۱) أو كنكينا پَلاتيية الزغبية (۱) pubescens vahl, Var. Pelletierana wedd.

الكينيسين C20H24O2N2، لم يوجدا والسينتُونيسين C19H22N2O، لم يوجدا بحالة طبيعيّة في الكنكينات، ولكن باستور حصل عليهما بإخضاع الكينين والسينكونين لعمل الحرارة في شروط معيّنة.

الكينويدين هو مزيج من مختلف قِلَويدات الكنكينا.

السينكوجانين وجده دَسْتُوش في فُضالات كنكينات رَماديّة.

كذلك نجد في قشور الكينا الحامض الكينيك الذي اكتشفه هوفمان عام الامرديك الامرديك الامرديك الامردية عديمة اللون وشفّافة، كبيرة، لا تفسد في الهواء، تذوب في 7,0 جزء من الماء وفي الكحول، وتنصهر عند ١٦٢° سغ.

Por کنکیننا کولُومْبیا الصفراء، کنکیننا Quinquinas Jaunes de پیتَایُو (۲) Colombie, Quinquina Pitayo (F) Cinchona pitayonsis (S)

نوع من الكنكينا الصَّفراء، الفقيرة

المظهر، ولكنها غنية بالكينين، إن

البيتايو الرقيق يعطي حتى ٤٠ غرامًا من سولفات الكينين في الكيلوغرام الواحد. من ضروب الكنكينا الصفراء نذكر أيضًا القشور المختلفة التي تنتج من شجرة سيننكونه رُمْحِيّة الوَرَق(٣) Cinchona والتي تختلف لونًا وقدًا ودقة في النسيج. أعيد تسجيل هذا النوع، كما سينكونه بيتايو، في الفرماكوبيا بإصدارها التاسع عام

١٩٧٤. يكون معظم هذه الضروب

برتقالي الصبغة، ويكون بعضها أصفر

اللون، ويعضها الآخر أحمر اللون

تقريبًا. بعضها يكون ملفوفًا، بعضها

الآخر مُقَوسًا، الأكبر حجمًا يكون

⁽٢) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

⁽١) التَّسمتان العربتَّان للمؤلِّف.

مسطّحًا .

ك و ث

الأصناف الرئيسية هي كاليزايا سائتا في (٢٠ Calisaya de Santa-Fé التي تعطي من ٣٠ إلى ٣٠ غرامًا من سولفات الكينين في الكيلو الواحد؛ كنكينا مُوتِيس البرتقالية اللون الأصفر، من ٢٥ إلى ٣٠ غرامًا من سولفات الكينين في الكيلو الواحد؛ الكنكينا القرطاجية الليفية، من الواحد؛ الكنكينا من سولفات الكينين. وأخيرًا، هناك كنكينا متقاربة جدًّا من السينكونه الرمحية الورق، هي كَنْكِيْنا السينكونه الرمحية الورق، هي كَنْكِيْنا

إن گنكينا ماراكايبُو، أو گنكينا قلبِية السورَق (٢) Cinchona Cordifolia Mutis التي تصل من غرناطة الجديدة يجب أن يستبعدها الصيادلة ومصانع سولفات الكينين. تحتوي بنوع خاص على سينكونيدين وعلى ٢ إلى ٣ أجزاء من سولفات الكينين.

الكِينِيدِيْنِ (١) التي تعطى من ١٤ إلى ١٥

غرامًا من الكينيدين بالألف.

إن هذه الأنواع الثلاثة الأخيرة التي تأتي من غرناطة الجديدة، تشترك فيما بينها ببعض المواصفات التي تميّزها بوضوح عن الكاليزايا: نسيج قسمها الخارجيّ فلينيّ بدل أن يكون ليفيًا، وعلى سطحها الخارجيّ قِطع صُفَيحات رقيقة، لامعة، طُلْقِيّة أو مِيكِيّة المظهر مقوجد هنا وهناك؛ وتختلف Micacé

(١) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.
 (٢) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلَّف.

دقة الألياف حسب جودة القشور: فتكون خشنة جدًّا في الماراكايبو، وقد تصبح هذه الألياف في الضروب الجيدة من كنكينا بيتايو أو الرمحية الورق، تصبح مفكّكة وذرورة بقدر ما تكون عليه في الكاليزايا.

۲۵۷ - گُوثَلُ الْكَاشُو، أَطْمَاطُ الْكَاشُو، Areca-palm, Betel-nut تَانْبُول، فُوفَل palm (E)

Arec ou Aréquier, Noisette d'Inde (F) Arekapalme, Pinangpalme (D)

Areca faufel, Areca catechu (S)

شَجَرة هندوماليزيّة من فَصِيلَة النَّخْلِيَّات. ساقُها وَحيدة تَعلو من ١٠ إلى ٢٠ مترًا، ضعيفة القُطر، خالية من الأوراق على مُعظم طولها. أوراقها إكليليّة التَّجميع المُفَرَّق، طولها من متر إلى مترين، عديدة الشُويكات، عريضة، طَرِيّة، غير مُنتظِمة التَّسنين الطَّرَفيّ. تُعطي هذه الشَّجرة ما يُسمّى Noix d'arec، أي جَوز الكَوْئَل أو جَوْز الأطْمَاط(٣).

جَوْزَةُ الكَوْئُل - ثَمرة كَوْئُل الكاشو، وهي بزرة صُلْبة وثَقيلة، كُرَويّة، بَيضانيّة أو مَخروطيّة نوعًا ما. يَبلغ طولها من ٢ إلى ٥ سم. بُرتُقاليّة أو حمراء اللَّون. مُسطَّحة القاعدة المَبْعُوجة الوسط حَيث يُوجد باقة ليفيّة صغيرة، هي بقايا علائق البزرة إلى غلاف الشّمرة. سَطحها

⁽٣) التَّسمة العربيَّة للمؤلِّف.

ك و ث

الخارجيّ شبكيّ الشّكل المُعَرَّق، قِرْفيّ اللَّون البُنِّيّ. غلافها الخارجيّ الرَّقيق يَدخل في تَنْية عميقة في نسيج البزرة، ويَبرز على المَقْطَع كلون بُنِّيّ على أرضيّة مُبْيَضَّة لكامل الكُتلة الثّمريّة. رائحة البزرة زبديّة عند كسرها. طعمها قابض عَقُول خفيف المرارة. إنّ البزرة المُسمّاة «جَوزة الكُوثَل»، والمُستخرَج المُسمّى «كاشو» أعيد إدراجهما في الفَرْماكوبيا الحديثة.

المُرَكِّبات - إذا طُحنت جَوزة الكَوثل مع الكلس الحاصل من قُشور المَحار ومع التَّنْبُول تُعطي عِلكًا يُستعمَل جدًّا عند الهندوس والأندوشينيّين والملازيّين.

جَدَّد جانز Jahns، سنة ۱۸۹۱، أربع قِلْویدات في جَوزة الکوثل وهي: أریکُولِیْن (۱) arécoline، أریکاییْن arécaïne (وهو الذي عُرف فیما بعد علی أنّه مُماثل للتّالي)، أریکاییدیْن arécaïdine، غُوڤاسِین guvacine، وکان جانز قد أشار إلی وجود کُولِیْن.

واكتُشف في الجوزة فيما بعد arécolidine (1) الأريكوليديُون (1) Isoguvacine والإيزوغوڤاسِين (1) وهي والغوڤاكولين guvaco-Line وهي تحتوي أيضًا على ٥٠ إلى ٦٠ بالمئة من المَنّان mannanes أي ما تركيبه: $(C_6H_{10}O_5)$ الّتي تُعطي المَنُوز

بالتَّحليل المائيّ، ومن مَوادِّ الغالَكْتان (۱) galactanes التي تُعطي الغَلَكْتُوز بالتَّحليل المائيّ، وعلى كُولِين، وعَلَى كُولِين، وعَلَى كُولِين، المَّانِّة، وعلى المائدة مُلوَّئة.

أبْسَط تركيب كيميائي هو للغُوڤاسِين: $C_6H_9O_2N$ وهـــو حــامِــف هيدرونيكوتينيكي؛ أما الغُوڤاكولين فهو الأشتير المَتيليكي للغوڤاسين؛ كذلك الأريكولِيْن: $C_8H_{13}O_2N$ هو الأستير المتيليكي للأريكاييدِين. أمّا المُركِّبات الفَعّالة الأساسيّة فهي الأريكولين والأريكايين.

الخصائص والاستعمال - لجوزة الكَوْثَل استعمالات مُهمّة في الطّبّ البيطريّ؛ وهي فَعّالة لمعالجة الدُّودة الوحيدة Ténia عند الكَلْب بمقدار ٤ إلى ٦ غرامات من مَسحوقها الحديث الطّازج.

وتُستعمَل جَوزة الكَوْثَل في بلاد مصدرها كدواء طارد للدود عند الخَيْل والبَقَريَّات، وكدواء مُضاد للإسهال عند الإنسان، إلخ.

كما تُعطي الجوزات مع الماء السّاخن مُستخلَصًا مائيًا طالما اعتُبر وكأنّه الكاشو الخالي من الكاتشين؛ ولقد عُرف بالتّالي أنّه ليس خالٍ منه تمامًا.

وتُستعمَل الجوزات أيضًا لاستخراج الأريكولِيْن (دراسته الأُحادِيّة مستقلَّة).

۲۵۸- كُوْكَا، كُوْكَه، خُوْكا

Coca, Spadic busch (E)

Coca, Khoka, Hachich des péruviens, Hachich des mexicains (F)

Cocastrauch (D)

Erythroxylum Coca, E.C. var. bolivianum, E.C. var. novo-granatense, E.C. var. spruceanum (S)

الكوكا هي الورقة المُجفَّفة من شَجرة الكوكا وهي شُجرة صغيرة من فصيلة الكُوكِيّات مهدها البيرو وتُزرع منذ عهدٍ قريبِ في بوليفيا وجاوا وسيلان. ورقة الكوكا كاملة، قصيرة العُنق، بَيضويّة الشَّكل، حادّة أو مُنفرجة، رقيقة النَّصل، طولها حتى ٦ سم وعرضها ٣ سم، دقيقة العُروق الشَّبكيّة مع عرق وَسَطَى بارز، على جانبيه خَطَّان مُنحنيان يَمتدّان من القاعدة إلى الرّأس. طعم الورقة مُرّ، يُحدِث بعد مضى فترة من الزمن إحساسًا بالتَّخدير.

تَتمتَّز كوكا بوليڤيا Var. Bolivianum عن كوكا البيرو Var. Novo-granatense بأوراق أكبر ويخطِّين جانبيِّين أكثر بروزًا؛ وهي أغنى بالكوكايين. زُرعت الكوكا منذ حوالي ٧٠ عامًا في أمريكا الجنوبيّة من جهة، وفي سيلان وجاوا من جهة ثانية. كوكا جاوا هي ضرب صغير الأوراق الستى تُسنسب إلى Var. Spruceanum، وهي أغنى بالقِلَويدات من كوكا أمريكا.

ك و ك أَكْغُونينِيّة Ecgoniques أهمّها الكوكاييني المُياسِر أي البَنْزُويلِ مَتِيلِ أَكْغُونِينِ ؟ مُعدُّل القِلُويدات الوَسَطيّ فيها ٢ بالمئة.

> بالإضافة إلى ذلك نَجد في أوراق الكوكا هِغْرِينَيْنِ اثنينِ هما قاعدتان سائلتان تُجَرّان بالبخار المائي، سِينَّامِيل كوكايين، إيزاتروييل كوكايين، بَنْزُويل أَكْغُونِين، تروكْسِلِّين أَلْفًا وبيتًا، القليل من الشَّمع والزَّيت الدُّهنيّ والعَفْص وحامض الكوكاتانيك. تَنتمي كل هذه القِلُويدات، ما عدا الهغرينين، إلى قِلُويدات البَاذِنجانيّات الموسّعة لبؤبؤ العين.

إن كوكا جافًا الفقيرة بالكوكايين، والغَنيَّة بالسِّينَّامِيل كوكايين، تحتوي على قلوید خاص بها: تروپاکوکایین؛ وهی تُستعمل لتحضير الكوكايين الصّناعيّ (دستور).

الحفظ - تَفقد أوراق الكوكا نسبتَها بالقِلَويدات رويدًا رويدًا، ممّا يوجب حفظها في مكان جاف وتجديد مَخزونها كلّما أمكن ذلك.

مُنخَبِّل . - جدول - Stupéfiant. Tableau B

الاستعمال - كانت الكوكا شائعة الاستعمال في أمريكا الجنوبية منذ أبعد الأزمنة، كذلك في بوليڤيا، البيرو، المكسيك، على شكل عَلُوك يُلطِّف الجوع. وهي دواء تَوْفيري على غرار تحتوي أوراق الكوكا على عدَّة مُركِّبات القهوة والشاي وسواهما. تُستعمل

الكوكا في نُقاعة، مسحوق، سجائر، بيلولات، مستخلص، مستخلص مائع، إكسير، شراب، صبغة، نبيذ. إستعمالها الأكثر شيوعًا هو نقاعة الأوراق بالماء بنسبة ٥ إلى ١٠ غرامات في ليتر ماء غال. كل هذه المستحضرات لم تعد مذكورة في كودكس ١٩٦٥ ولا في كودكس ١٩٧٠. المسحوق والمستخلص المائع والصبغة والنبيذ كانت مُسجَّلة في دستور ١٩٤٩. مقادير المسحوق القصوى هي غرام واحد للجرعة الواحدة، ٨ غرامات لكل ٢٤ ساعة (دستور).

Larger كَوْكَبِيَّة كَبِيْرَة، هَرْقَل -٢٥٩ astrantia, Master wort (E) Astrance majeure, Grande astrance, Radiaire, Sanicle de montagne, Sanicle femelle (F) Grosse sterndolde, Meisterwurzel (D) Astrantia major (S)

نبات عُشبيّ مُعَمَّر من فَصيلة الخَيْمِيَّات يعلو حَوالي المتر. ريزومه ليفيّ، أسود اللَّون، عِطريّ الرَّائحة، يُعطي ساقًا قَوِيَّة، مُنتصِبة، مالِسة، عطريّة، قليلة التَّفَرُع. أوراقُه القاعِديَّة، مُركَّبة، تَحضن السّاق بعنقها الطَّويل. وهي راحِيَّة التَّفْصيص إلى ٥ أو ٧ فُصوص بَيضِيَّة الشَّكُل المُتطاول، مُستدِقَة الرَّأس. الأوراق العُليا صغيرة، بسيطة، لاطئة. الأزهار صغيرة القَدّ، بيضاء اللَّون في خَيماتِ صغيرة القَدّ، بيضاء اللَّون في خَيماتِ

الكوكا في نُقاعة، مسحوق، سجائر، فَردِيَّة أو مزدوِجة أو ثُلائيَّة، تُحيطُها بيلولات، مستخلص، مستخلص مائع، قلافة واسعة مؤلَّفة من قنابات كبيرة، إكسير، شراب، صبغة، نبيذ. إستعمالها رَقِّيَّة الرُّقْعَة، وَرديّة اللَّون الباهت. الأكثر شيوعًا هو نقاعة الأوراق بالماء الثَّمرة هي أكنَة خشنة الملمس.

المُركِّبات - مَوادِّ صِباغِيَّة، أَملاح مَعدِنيَّة، عُنصر مُسهِّل قَويِّ، عَفْص، راتنج، زيت دُهنيِّ يُنشُط الشَّهيَّة ويُسهِّل إفرازات العُصارة المعويَّة.

الخصائص - نافع للمعِدة، مُنشَّط للشَّهِيَّة، مُدِرِّ للبَوْل، مُنَقَّ، مُسهِّل قَويّ.

الاستعمال - في نُقاعة، نَقيع، أو مسحوق. الجذر هو حامز ومُرّ الطَّعْم، اشتهر كمسهِّل قويّ في كودكس ١٨١٨. أعيد تسجيلُه في فرماكوبيا ١٩٧٥.

طريقة الاستعمال - نَقيع مِلعقة من الجذر المجفّف المفروم في مقدار كوب من الماء الغالي، يُغطَّى لبعض الوقت، يُبَرَّد، يُصفِّى، ويُؤخَذ دُفعة واحدة. إن الأقسام الهوائيّة هي مُدرَّة خفيفة للبَوْل، يُؤخذ منها ٤٠ إلى ٥٠ غرامًا من النَّبات المُجفَّف المُقطَّع في ليتر ماء غال يُغطَّى نصف ساعة. يُؤخذ منه حَوالي أربع فناجين في اليوم.

ملاحظة - الكَوْكَبيّة الكبيرة غنية بالأزهار الصَّيفيّة، تَصلُح تمامًا لتزيين الحدائق الصَّخريّة، وترغب جيّدًا التربة الطِّينيَّة الكِلسيّة. تكثيرها يَسهل بالبزور أو بفسخ الأرومة. وهي بالتالي تصلح تمامًا لتشكيل الباقات الزَّهريّة الجافّة.

کی ن Kino d'Australie (F)

يَنتج من الأوكاليبتُوس الرَّاتِنْجِيّ ('):

Eucalyptus resinifera وهـو شـجرة
كبيرة من فصيلة الآسِيّات، قشرتها
ليفيّة، دائمة. أوراقها سِنانيّة. مِظلّاتها
من ٥ إلى ١٠ زهرات. جِراؤها متوسّط
القَدّ، بَيضانيّة إلى نِصف دائريّة الشّكل.

Kino de la (۱) کِیْنُو الجَمَایِیْك – کِیْنُو الجَمَایِیْك – الجَمَایِیْك – Jamaïque (F)

يَنتج من الكُوكُولُوب المُعَنْقَد (۱): Coccoloba Uvifera الني يُستمى كذلك وِدْن الفِيْل، عِنَب الشَّط، من فصيلة البَطْبَاطِيّات، دعاه إدوار غالب: كُكْلُوب كِيْنُو.

إن كلّ هذه الأصناف من الكينو لها خصائص كينو المَلبار ذاتها.

يَصل من سُومَطْرة مع الغَمبير المكَعّب، غمبير آخر قوامه قوام المستخلص، غَني جدًّا بالعَفْص الصِّباغيّ، يَصنعه أهل البلاد الدّاخليّون وأهل شمالها.

ويُصنع نوع من المستخلص أو الكينو من نوع من السَّنْط القَزِم الذي ينبت في أفريقيا الجَنوبيّة، بزوره أو فولاته التي يرغبها جدًّا أرْوَس القُطْب، فتدعى لذلك فُول الأرْوَس Fèves d'Elan.

كذلك تُستعمل الكوكبيّة في الطّبّ البيطريّ لزيادة شَهيَّة الطروش. إن كلّ أقسام النَّبات هي سامَّة خفيفة، ممّا يُوجب الحذر عند استعمالها المنزليّ.

۰۲۹- کِیْنُو Kinos (F)

لقد أوردنا في دراسة سابقة مُواصفات نُوعين من الكينو، هما: كينو غَمْبير أنكاريا، وكينوتوز مَلَبار. أمّا أصناف الكينو الأخرى فهى التّالية:

Kino de (١) كِيْنُو أَفْرِيقْيَا - كِيْنُو غَمْبِيا ، كِيْنُو أَفْرِيقْيَا - Gambie (F)

ينتج من التُوز القُنْفُذِيّ (۱):

Pterocarpus erinaceus

من الكينو له صفات مماثلة لكينو الهند

الّذي يَنتج من تُوز مَلَبار، من حيث

ذَوَابيّته ومن حيث خصائصه الكيميائيّة.

Kino du (١) كِيْنُو البُوْتِيَّة، كِيْنُو البَنْغَال Bengale (F)

ويُسمّى أيضًا كينو پاتاس Patas أو پُولاس Pulas، الّذي يَنتج من بُوْتِيَّة اللَّكَ: Butea frondosa، من فصيلة القَرْنِيَّات.

- كِيْنُو بُوْتَانِي بَايْ، كِيْنُو أَسْتِراليا(١)

إڭريتى في المعجم الثّالث ص ١٩٧ رقم . (YOA

٢٦٢ - لزقة Emplâtre (F)

لزقة حجر التوتيا، لزقة حجر سُلَماني (سيليكات الزنك الطبيعي)

غ	٦	٠		حجر توتيا
غ	١	٠	•	شمع نباتي
غ	٥	8	٠	لزقة راتنجية

يفضّل بعض الأطباء هذه اللزقة على اللزقة الرصاصية الأساس، لكى توضع على القروح الحيَّة.

نحصل على هذه اللزقة بمدّ كتلة لاصقة على قماشة مؤلّفة من ٣٠ جزء مرهم (مَرُوخ) مُشمّع لاصق، ١٠ أجزاء

١غ	كلورور زئبقي
٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢	كلورور الأمونيوم
١٥غ	شمع أبيض
۴۰ غ	ألامي منقى

تستعمل هذه اللزقة بدلًا عن لزقة فِيغُو.

٢٦١- لاذَن قُوَّيْسِيِّ الوَرَق Sage-leaved⁽¹⁾ rockrose (E)

Ciste à feuilles de sauge (F)

Salbeiblatt cistrose (D)

Cistus salviifolius (S)

جَنْبَة ليفيّة مُعمَّرة من فصيلة اللّاذَنيّات تَعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم، فَرْعاء من قاعدتها. سُوقُها وفُروعُها زغبيَّة سُرِعان لزقة بالكالومِل (زئبق حُلُو) ما تَخشوشب. أوراقُها بَبضاويّة الشَّكل الإهليلجيّ أو بَيضاويّة، أوبارها نَجميّة الشَّكل على الصَّفحتين. أعناقها غير منسطة القاعدة. سَنَماتها جانبة الارتكاز مؤلَّفة من ١ إلى ٣ زهرات كالومِل، ٣ أجزاء زيت خروع. بيضاء يَبلغ قُطرها ٢ إلى ٤ سم. لزقة كلورو - زئبقية الكأسيّات واضحة الشَّكل القَلبيّ عند قاعدتها، خضراء اللُّون، مُزيَّنة بأوبار نَجميّة قصرة، الثلاثة الخارجيّة منها أعرض، تَستُر الاثنتين الأخريين. القَلَم قصير جدًّا أو غير موجود. الثَّمرة عُليبة لاصقة الزغب.

الخصائص والاستعمال (اطلب لاذَن

٢٦٣- لِسان الحَمَلِ القَرْنِيّ، قَرْن الأَيِّل، لاصف Buck's-horn plantain, Star of earth (E)

Plantain corne de cerf, Coronope (F) Hirschorn wegerich (D)

Plantago coronopus (S)

نَبات حَولي إلى مُعمّر من فصيلة الحَمَلِيَّات يعلو من ١٥ إلى ٢٠ سم، لاصق أرغبي. أوراقه مُتطاوِلة سِنانيّة طولها ٨ إلى ١٠ (١٢) سم، عرضها ١ إلى ٢ سم، ريشية التَّسنين أو ريشية التَّحزيم، فصوصها خطِّيّة أو سِنانيّة. سُويقاته الزَّهريّة صاعدة، تَتَخطّى الأوراق أم لا، طولها ٥ إلى ٨ سم. سَنابله أسطوانية حَصْرًا. قُناباته بَيضاوية، حادة أو مُستدِقَّة الرّاس، ضيِّقة الحوافي، قصيرة الهلب اللاصق. الكأسيات الأمامية إهليلجية طولها ٢ إلى ٣ ملم، مهدَّنة الحافة، الكأستات الخلفية أطول منها بقليل. أنبوب التّاج زغبيّ. فصوص النَّصل بَيضاويَّة سِنانيَّة، مُستدقَّة الطَّرَف. العُلَيْبة بيضاويّة، حجراتها ثُنائيّة الحُجَيْرات الوحيدة البزرة. بزوره بَيضاويّة مُتطاولة، مُسطَّحة، مُتحدِّبة الوجهين.

من هذا النُّوع في لبنان ضربان أو نويعان.

لسان الحمل التي تذكر في مراجع طبّ جذره وتديّ كثير الجُذيرات. أوراقه الأعشاب إلى جانب لسان الحمل الكبير قاعديّة خُمّية التَّجميع على الأرض،

الفَتيّة الغضَّة تُؤكل، مثل أوراقها، في ل س ا السَّلطات. جاء عنه في «الموسوعة في علوم الطّبيعة»: «منافعه الطبّية منافع رفاقه إلّا أن مادّته الجوهرية أقلّ فعالية».

> ملاحظة - الأيّل جنس حيوانات برّية عاشبة لَبُونة مجترّة من الأيايل: Cervinés وفصيلة الأَيْليَّات Cervidés، قرونها متشعّبة حَوليّة الانسلاخ. قيل إنه مولع بأكل الحيّات يطلبها حيث وجدها وربما لسعته فتسيل دموعه إلى نقرتين تحت محاجر عينيه يدخل الإصبع فيهما فتتجمَّد تلك الدموع وتصير كالشَّمع فيُتَّخذ ترياقًا لسمّ الحيّات وهو البادزهر الحيواني وأجوده الأصفر. أما قرن الأيل فمادّة طبّية، يُبرش أو يُحرق أو يُقطّر، وهو يُعطى ما يسمّى بزيت دِيْبًل، ومواد أخرى متعدِّدة. عدم إشراكه مع النَّبات الذي يحمل اسمه.

٢٦٤- لِسَانُ الحَمَلِ المُتَوسِّط، مَصَّاصَة Medium plantain, Hoary صَغِيْرَة plantain, Lamb's tongue (E) Plantain moyen, Plantain bâtard, Langue d'agneau (F) Mittlerer wegerich (D) Plantago media (S)

نَبات بَرِّيّ عُشبيّ معمَّر من فصيلة الخصائص والاستعمال - هو من أنواع الحَمَلِيَّات يعلو من ١٠ إلى ٥٠ سم. والمتوسِّط والسِّنانيّ أو الصَّغير. أوراقه عريضة الشَّكل البَّيضويّ الإهليلجيّ،

ل س ا

بارزة. الشِّمراخ منتصب أو صاعد بعض الشَّىء، أسطوانتي الشَّكل، ينتهي بسُنبلة غليظة أسطوانيّة. الكأس من ٤ كأسيات ملتحمة، فصوصها عريضة الشَّكل إلتهاب الوريد (فلابيت). البَيضويّ ومزوَّدة بالأوبار. التاج يبلغ ٤ ملم طولًا، أبيض اللَّون، قِمعيُّ الشَّكُل. الأسدية ٤، مئابرها بنفسجية اللُّون وحوالى ٥ مَرّات أطول من التّاج. الثَّمرة جَرُو ثُنائتي الحُجرات، بزورها إهليلجيّة، مزوّات. النَّبات بكامله مغطّى ببعض الأوبار المتفرِّقة.

> المُركِّبات - أوكُوبيْن، عفص، بكتين، حوامض، صابونين، صمغ، أملاح معدنية، كبريت.

الخصائص - منق للدم، منق للرئتين، منقّ للمعدة، قابض، مليّن، ملطف، مصرّف، شاف للجرح، لائم، مقشع، مبول، مضاد لأمراض العين، يزيد خثورية الدم Coagulabilité .

الاستعمال الداخلي - ضعف عام، هزال، تأخّر نموّ الأولاد (يعتبره البعض بمثابة زيت كَبِد الموريه)، نزيفات مائع ٢ إلى ٣ غ في اليوم. (رُعاف، رحم، نفث الدم...)، المزاج النزفي، سِل، برونشيت مزمن، التهاب البلعوم، إلتهاب الحنجرة، التهابات الكلية، إسهالات، إمساك، ديسنتريا، سيلان المهبل.

> الاستعمال الخارجي - إلتهابات الملتحمة، الرَّمد، التهاب الجفون، قروح، جروح، قرحات الساق،

كاملة النَّصل، يَخطُّها • إلى ٩ عروق إلتهابات اللُّئَّة، قُوبات، حَبِّ الشَّباب، أمراض جلديّة قِشريّة، رُحام (إلتهاب الرِّحِم عقب الولادات)، وخرز الحشرات، لدغ الأفاعي، رُعاف،

طريقة الاستعمال الداخلي - نقاعة، نقيع، مرث، ماء مقطر، شراب سُكَّريّ، مستخلص رخو، مستخلص مائع، سلطة. . . المرث أو النقاعة أو النقيع في غرغرات ومَضمضات للفّم في إلتهاب الحنجرة والبلعوم والعُصابات السِّنِّية، غسيل العين المتكرّر في التهاب العين، حقن أو غسيل فَرْجِيّ في سَيَلان المهبل. مرث ٣٠ إلى ٦٠ غرام ورق في ليتر ماء يغلى دقيقة واحدة، يغطى طوال الليل، ويشرب خلال ٢٤ ساعة. نقاعة ١٠٠ غرام من الورق في ليتر ماء غال يغطى عشر دقائق، ويؤخّذ منه إلى ٤ فناجين في اليوم. عصير النبات الغض من ٤٠ إلى ١٠٠ غرام في حالات نَفْث الدّم وسيلان المهبل. مستخلص رخو ١ إلى ٢ غ في اليوم في بيلولات. مستخلص

طريقة الاستعمال الخارجي - الأوراق الغضّة المهروسة هي ضماد ممتاز على الجروح، وقرحات الساق، ولدغ الأفاعي. وهي من أشهر النَّباتات كدواء طارئ للجرح. الأوراق المهروسة يُفرك بها وخز الحشرات كالنَّحل والزَّنانير والبرغش... وتؤكل مع السَّلطات فتيَّة غَضّة. وهي أوراق أعيد تسجيلها في

الفرماكوبيا الفرنسية لعام ١٩٧٥ إلى جانب أوراق لسان الحمل السّنانيّ والكبير .

مختلف - جَروع ضدّ الإسهال:

مستخلص لسان الحمل الرَّخو ١٠ غ ۽ ۽ ء غليسرين ماء، كمية تكفى لمقدار ٢٠٠ ملل يؤخذ منه ٢ إلى ٤ ملاعق كبيرة في

مرهم ضد حب الشباب:

اليوم.

ماء لسان الحمل المقطر ١٥ غ لانولين لامائي٥ غ قازلينقازلين عالم ١ نقطة دهن الورد

٢٦٥- لَصُوْقَات من وَرَق، كِمَادَات من Cataplasmes en feuilles, وَرَق Sinapismes en feuilles (F)

قدّم كلِّ من بُوغّيُو، عام ١٨٦٥، وريغُولُو، عام ١٨٦٧، شكلًا جديدًا ومفيدًا جدًّا من اللَّصوقات، بأسماء لزقة بوغّيو الخردليّة، لزقة ريغولّو الخردليّة، وسُجِّل هذا الشَّكل في دستور الأدوية باسم لزقة خردليّة من وَرَق، أو ورقة مُخَرْدُلة، أو ورقة خردل.

يتطلّب تحضير هذه اللّصوقات شرطين لنجاحه: ۱° - استعمال طحين خردل خالِ من أيَّة مادَّة دُهنيّة؛ ٢° - وضع سائل لاصق دَبق لا يحتوي على ماء، ولا كحول، ولا راتنج، ولا مادَّة دُهنيّة أو لاصقة Emplastiqué.

تَتمّ إزالة الزَّيت من مسحوق الخردل بواسطة الكَبْس القَويّ وغَسله بواسطة كبريتور الفحم أو بواسطة روح النَّفْط أي البنزين. أما السّائل الدَّبِق فهو من محلول ٤ إلى ٥ أجزاء من المطاط، في ١٠٠ جزء من مزيج كبريتور الفحم والبنزين.

نمد طبقة سَويّة مُتناسقة من السّائل الدَّبق على الورقة، بواسطة أداة مصنوعة كما تُصنع أداة صنع اللَّصْقات المُشَمَّعة Sparadrapier. وبقدر ما تَتَقدُّم الورقة المُغطَّاة بالبرنيق نحو خارج الأداة المذكورة، نُحرِّك فوقها منخلًا يحتوي على مسحوق خردل مُزال زيته والذي يمسك بلزوجة السائل ويمربين أسطوانتين أو لَفِيفَتَيْن، فيصبح بذلك مثبتًا على الورقة بعد تبخير السوائل الطيّارة في حرارة المِحَمّ.

ومن الطّبيعي ضرورة توفيق حركات المنخل وتنظيمها تبعًا لتقدّم الورقة في الآلة ويالدقَّة المطلوبة.

تُقطّع الوَرقة بعد ذلك إلى قطع بالقياسات المرغوبة.

هذه اللَّزقات الخردليَّة يجب أن تعطى كحدّ أدنى ٠,٠١٢ غرامًا من الألُّيل -سَنَاڤول لكل ١٠٠ سنتمتر مربّع، وتحفظ بمعزل عن الرّطوبة.

٢٦٦– لُعاب Mucilage (F)

> لعاب الحلزون حلزون مفروم

TYO

ل ع ا

٤ عدد

ماء

٠١٢ غ هيدرات أوكسيد البيشموث ١ إلى ٤ غ ۰٫۱۰ غ ٢٧غ مستخلص البلادون ... ٨غ شراب المورفين الشُّكريّ ٣٠غ بملعقة كبيرة من ساعتين إلى ساعتين،

في آلام المعدة.

۲٦٧ ليكور Liqueur (F)

١٢٥ غ ۲۰ غ حامض سيتريك ماء غال ١٠٠٠ غ ننقع في الحرارة لمدّة ٢٤ ساعة، نُصفّى

ليكور كوشكن

٦ إلى ٢٤ نقطة في اليوم.

ع غ ملح نشادر ١٥ غ ٠١٥٠ غ

من الدَّاخل، ضِدَّ الصَّرْع والسَّفْلِس؛ من الخارج، في ضماد القرحات الزُّهَريّة .

ليكور هُوْلتُن

٥٧ غ	أفيون
۳۰ غ	حامض أستيك مركز
٥٧٧ غ	ماء مقطر
uni « - ". 1 -	

ننقع في حرارة لطيفة لمدّة ٤ أيّام، نُمرِّر؛ ٤ نقاط تمثل ٠,٠٥ أفيون.

نخفق بشدّة طوال ربع ساعة، نمرّر لعاب الصمغ العربي ونضيف:

شراب الشكر ماء زهر البرتقال

لعاب الصمغ العربي، لُعاب عربى

صمغ عربي مسحوق ١٠٠ غ ماء مقطر

نهرس المسحوق مع الماء في هاون رُخامي حتى الحصول على سائل ليكور بُورتر متجانس. دستور ۱۹٦٥. يشير دستور أفيون الأدوية إلى صنع لعاب صمغ الكثيراء أثناء تحضير أقراص النعنع وأقراص القرمز (۱۹۳۷) كذلك عند تحضير اللُّعوق الزَّيتيُّ.

لعاب صمغ الكُثيراء

صمغ كُثيراء كامل ١٠ غ كلورور النحاس ۹۰ غ ماء مقطر بارد

نَضع الصمغ الكامل والمُنظَّف مع الماء في وعاء من الفَخّار أو الخَزَف الصّينيّ؛ عندما يَنتفخ جيِّدًا، نُمرِّر مع العصر القويّ في قماشة مُتراصّة النَّسيج. نَجمع اللُّعاب في هاون رُخاميّ ونخفقه لکي نجعله متجانسًا (دستور ١٩٦٥).

يُستعمل صمغ الكثيراء، مسحوقًا أو بشكل لعاب يُحضّر في وقته، في تحضير مختلف الأقراص المَخزَنيّة (باستثناء أقراص النعنع والقرمز) وفي تحضير اللَّعُوق الأبيض.

الكحول العِطْرِيّ يَتركَّب من: دهن له ي ك ليمون حامض ٣٠غ، دهن نعنع ٢٥غ، دهن خزامى ٢٥غ، دهن نيرولي ٢٠غ، دهن لوز مرّ ١٠غ، دهن قرفة ١٠غ، كحول ٨٥ درجة ٨٠٠ غرام.

	ليكور وقائي ضدّ السفلس
١٥٠ غ	شب متبلّر
۱۰۰ غ	سولفات الحديد
۱۰۰ غ	سولفات النحاس
٦٠ غ	كحول عطرتي
۱۰۰ غ	ماء شائع

~

Matico مَاتِیْکُو، مَاتِیْکَا ۲۹۸ مَاتِیْکُو، مَاتِیْکُو

Matico (F)

Pipper angustifolium, Pipper elongatum, Pipper camphoriferum (S)

تُحصل أوراق الماتيكو من عدّة أنواع من فصيلة الفِلْفِليَّات تنبت في أمريكا الجنوبيّة: پيرو، برازيل، فنزويلا، كولومبيا، كوبا، وهي تامول ضيِّق الورق، تامول مُتطاوِل^(۲)، وتامول الكافور^(۲)، إلخ. أَذْخَل دورڤو هذا الكاقر إلى المادّة الطبيّة الفرنسيّة عام المعرض الدّولي الذي أقيم ذلك العام في لندن.

ولكي نُميِّز الماتيكو، نَذكر أنّه أوراق طويلة، عروقها بارزة جدًّا، طولها من ٥ إلى ٢٠ سم وعرضها ٣ إلى ٤ سم، رائحتها رائحة الكبابَة والنَّعنع على السواء، طعمها حامز ومُرّ، تحتوي على دُهْن خفيف اللَّون المُخضر، يَنقلب إلى اللَّون المُصفر تحت تأثير الضّوء، وعلى جوهر مُرّ خاص يُدعى مَاتِسِيْن. وَجد فيه

مَاركُوت، إضافة إلى ذلك، حامضًا متبلِّرًا هو حامض أرتانيك، وعَفْص، وراتنج، ويخضور، ومادّة مُلوِّنة، وأملاح، إلخ.

يَصل الماتيكو إلى أوروبا في حُزْمات ونِنة الواحدة حوالى ١٠ كيلوغرامات، مرصوصة بقوّة في جلود أو بالات صغيرة Surons مُغلَّفة بجلد ثور أو بقر يكون شعره إلى الدّاخل. دخل الماتيكو الى فرنسا أوّل الأمر على أنّه مُضاد للنزيف. في البيرو يُطلق عليه أيضًا اسم المغشبة الجُندي، نظرًا لخصائصه العَقُولة القابضة والشّافية على الجروح والقروح. في إنكلترة دخل الماتيكو في الممارسات الطبّية لعدد كبير من الأطبّاء لوقف السّيلانات البيضاء من أيّ نوع الخ.) والسّيلانات البيضاء من أيّ نوع الخ.) والسّيلانات الدّموية على السّواء، وكعقّار قابض.

إستنادًا إلى أبحاث قام بها عدد من العُلماء، تم التَّعرُّف إلى نوعين من الماتيكو في الأسواق، مُتميِّزين تمامًا عن بعضهما، النَّوع الأوّل الذي يقابل التامول المُتطاوِل هو α-Cordulatum والنَّوع الثاني هو β, Ossanum ويقابل التامول الضيِّق الورق.

وكان النَّوع الثّاني يُغذِّي تجارة العقاقير لفترة طويلة، ولكن الأول أصبح فيما بعد النَّوع الوحيد المُستعمل تقريبًا. أوراق هذا الأخير هي أعرض بكثير من أوراق النَّوع الآخر، أقلَّ طولًا، وتكون بشرة

⁽١) التَّــميتان العربيَّتان لِلمؤلُّف.

⁽٢) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

نَصلها العُليا مُرَقِّشة وخَشِنة.

تختلف نسبة الزّيت الدُهني وتركيبه بشكل بارز تبعًا للمصدر البوتانيكي. تحتوي الأوراق على ٣ إلى ٦٪ من الزَّيت الدُّهنيّ الذي يحتوي على أزارون، وعلى مَتيل أوجينول، وسَسْكى تريانات، وأيبُول يُشبه أبيول الشُّبْث. إن وجود كافور الماتيكو والبورنيول لم يتمّ الحصول عليهما في كافّة الأنواع البوتانيكية؛ أمّا كافور الماتيكو الذي اكتشفه فلوكيجر يبدو أنّه كان كحولًا $C_{15}H_{26}O$ ترکیبه تربانیکی، ترکیبه (التركيب العام ذاته الذي لكافور شاي المروج: Ledum).

استُعمل بنجاح بارز ماء الماتيكو المُقطِّر في زَرْقات، مُضافًا إليه كمِّيَّة ضئيلة من ملح قابض.

وُضع زَيت الماتيكو الدُّهنيّ في شكل أقراص بالغلوتين، بالاشتراك مع بلسم كوباهو. وهو الذي يمتلك خاصّية إبطال رائحة الكوبا هو وجعله أفضل احتمالًا.

طريقة الاستعمال - يمكن استعمال الماتيكو على شكل مسحوق من ٢ إلى ٤ غ؛ ومستخلص كحولى ٠,٢٠ إلى ٠,٦٠ غرامًا في اليوم؛ صبغة ﴿، من ٤ المُركِّبات - البزور تَحتوي على زَيت إلى ٨ غرامات؛ زهورات ١٠ إلى ٢٠ غرامًا في ليتر ماء؛ شراب سُكِّري ٢٠ إلى ٦٠ غرام؛ بيلولات؛ ماء ماتيكو مقطر، إلخ.

٢٦٩– مَازَرْيُون، دَفْنَة سَامَّة، أُتُم، زَيْتُوْن الأرض Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E)

Bois gentil, Daphné mézéréon, Bois de garou, Bois joli, Daphné joli bois, Bois d'oreilles (F)

Echter seidelbast, kellerhals (D) Daphne mezereum, Thymelœa prœcox, Thymelœa mezereum, Mezereum officinal (S)

جُنَيْبَة بَرِيّة صَغيرة من فَصيلة المازَرْيُونِيَّات، تَعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقُها لِيفِيّة، مُتَلَوِّيَة، رَمادِيّة اللَّحاء المُرَقَّشِ. فُروعُها مُنتصبَة، مُرمَدَّة اللُّون، زَغِبَة. الجذر ليفيّ. أوراقُها كامِلة، مُعبلة، مُهدَّبة، مُتعاقبة، الهامِية منها خاصَّة، طُولُها من ٤ إلى ١٠ سم، وعَرضُها من واحد إلى ثلاث سنتمرات، سِنانيَّة الشَّكل المُنْعَكِس، تبرز في نهاية الإزهرار. الأزهار في ضُمّات صغيرة، إبطية الارتكاز، عديدة جدًّا، لاطئة، عِطريَّة، تبرز خلال شباط وآذار. غِلاف الزَّهرة وَرديّ إلى أُرجوانيّ اللَّون، زَغِب. ثمارها عُنيبات زاهية اللُّون الأحمر، وحيدة البزرة. نَبات غير لُبنانيّ، لَدينا من جنسه نَوعان بَرِّيَّان.

شُخميّ ليس له أيّ استعمال. أوراقُها مُسهِّلة قَويَّة. عُنَساتُها، من ٥ إلى ١٥، هي كذلك مُسهِّلة قَويَّة. قُشورُها، وهي القسم المُستعمَل، تَحتوي على سُكَّر،

ماز

شَمْع، زَيت، لُعاب، حامض تُفّاحيّ، مادَّة مُلوِّنة صَفراء، هيتروسيد يُدعى دَفْنَايين أَو دَفْنِين، راتِنج حامِز جدًّا يُدعى مازارايين (٧ إلى ٨٪). إن المازارايين هو الَّذي يُكسِبُ النَّباتَ مُجَمَّدة الخبز خَصائصه المُنَفِّطة، وعلى الأرجح أنه أيضًا هو الَّذي لا يَسمحُ باستعمال

> الخصائص - مُهيِّج ومُثير، مُحمِّر للبَشرة، مُنَفِّط، مُسَهِّل قَويّ ماسِط، مُبوِّل، مُعرِّق (حسب المقادير).

> النَّبات إلَّا كمنَفِّط ومُبَثِّر خارجيّ:

. Épispastique

المقادير المرتَفِعة تجعله سُمًّا. الدَّفْنين هو عنصر يُؤدِّي إلى الهَلْوَسَة أيضًا.

الاستعمال - نَقيع، صِبغة، مُستحضر يُحضّر من: شَحمي. نادرًا ما يُستعمَل المازريون بسبب خطورته. إن مراهمه ودُهونه يجب أن لا تُعطى إلّا بإشرافٍ طِبِّي. أعراض التَّسَمُّم بثماره تَظهرُ حُروقًا في الحَلْق، استفراغات، نزيف. الاتّصال فورًا بالطَّبب.

غالبًا ما يُستعمل المازريون من الخارج، ولكن دائمًا بإشراف طبِّي، وذلك بتحضير مَروخ منه يُهدِّئ أُوجاعَ الرُّوماتيزم، أُو لَزْقَاتِ مُنَفِّطَة، فَعَالة جَدًّا، تُحدِثُ على البَشَرة احمرارًا ونَفْطاتٍ عديدة. ويُستعمل المازريون في الطِّبِّ التَّجانُسيّ نَعلى طحلب كورسيكا لمدّة ساعة في معالجة بعض الأمراض الجلديّة واحدة في كمّيّة كافية من الماء حتى والتهاباتها. إن بعض الطيور التي تأكل ثمار المازريون لا تَتَسَمَّم.

۲۷۰ مُجمَّدات، خثيرات Jelly (E) Gelées (F) Gelee (D)

غ	١	٨	•		٠	 . ,	 	 ,		٠.					٢	-	کَ	(0	ور م	خبز	_
غ	٣	•	٠	•		 	 		 			. ,		 	 						باء	0
			,		,																-	

نُغلى لَمَدَّة ساعة واحدة، نُمرِّر ونَضيف إلى كل ٢٧٠ غرامًا من السائل:

٠٦ غ	نبيذ إسبانيا
۸غ	ماء القرفة
١٥ غ	عصير حامض
٥٤ غ	سکر

إن ما يسمّى La Panade عند الإنكليز

۱۸۰ غ	خبز شيلم مُحمّص
۸غ	قشر حامض
۲ غ	قرفة
۷۲۰ غ	نبيذ أبيض
	· . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

نطبخ ومن ثمّ نصفي.

مُجَمَّدة طُخلُب كورسيكا

۳۰ غ	طحلب كورسيكا
۲۰ غ	سكر أبيض
٦٠ غ	نبيذ أبيض
ه غ	غراء سمك

الحصول على حوالي ٢٠٠ غرامًا من السّائل، نُمرّر، نَعصُر، نُضيف إلى

السّائل الموادّ الأخرى (غراء السّمك المُليَّن في الماء)، نَطبُخ حتى قِوام مناسب، نُمرّر ونُبرِّد. لمقدار ١٢٥ غرامًا مُجمَّدة (١٨٨٤).

بيرال يُحضِّر هذه المُجمَّدة بواسطة شراب طحلب كورسيكا السُّكَّريّ، ١٨٠ غرامًا؛ مُجمَّدة كحوليّة من غراء السَّمك ٩٠ غرامًا؛ نُنْقِص حتى ٢٥٠ غرامًا. بالإمكان كذلك تحضير هذه المُجمَّدة بواسطة مَلْتُوت طحلب كورسيكا السُّكَريّ.

إن مُجمَّدة مَرْسَلَيني الطَّاردة للدَّود تحتوي بالإضافة إلى ذلك على السَّرْخَس الذَّكر، ومُستخلَص السَّرخس الذَّكر المُؤثْيَر. يُستبدَل السُّكَّر بشراب التَّوت السُّكَّري.

Édulcorants (مُحَلِّ) -۲۷۱ (F)

إن الإحساس بالمُسَكَّر، أي الحُلُو، ينتج عن عدد كبير من المُركّبات الكيماويّة الطبيعيّة أو الاصطناعيّة المصدر التي تمتلك مقدرات مُسَكِّرة تختلف نوعًا وكَمَّا.

إن التَّحْلِيات تستخدم لأغراض شتى:
- لتحلية وتخفيف (حِدَّة) بعض الصفات الطَّعْمِيَّة الذَّوْقِيَّة للأطعمة أو للمشروبات؛

- لخصائصها المغذية (السُّكِّر على

أنواعه)؛

- للحاجات العِلاجيّة أو الوقائيّة: في داء السُّكِّر، في الحِمْيات المنخفضة الكالوريات أو الحُريْرات (سَكَارِيْن، سيكُلامات، أشپارْتام،...)، لصنع السكاكر والحلويات غير لـCariogènes (سوربيتول، كزيليتول...)، في غذاء الحِمْيّة: حِمْيات منقصة للموادّ السكريّة (فركتوز، سوربيتول)، لإرضاع المواليد الجدد (لكتوز)؛

- لحاجات فنية، كدواء مُرطُب (غليسرول، سوربيتول...)، مواد ملوَّنة (كراميلة)، مواد مُبَعْثِرة أو مُذَرِّية أو مُشَنَّتَة، مواد حالّة لإضافات وتكميلات أخرى (غَلوكوز، لكتوز، سكّاروز، غليسرول، سوربيتول).

إن أهم المُحَلِّيات المستعملة حاليًّا أو التي لم تزل قيد الأبحاث يمكن تجميعها في خمس فصائل منها ثلاث تتعلّق بمركبات قد تكون طبيعيّة المصدر، والفصيلتان الباقيتان تتعلّقان بمركبات نصف اصطناعيّة أو اصطناعيّة.

- ۱ سکاکر.
- ٢ كثيري الكحول.
- ٣ مركبات طبيعية غير سكرية.
- ٤ مُحلِّيات نصف اصطناعية.
 - ٥ مُحلِّيات اصطناعية.

هناك تشكيلة كاملة من المركبات الطبيعية غير السكّرية هي اليوم موضع

177

م ح ل

أبحاث في عدد من البلدان. إن أوراق «الظِلَم الرَبُودِي» (١) Stevia rebaudiana مسجّلة في الفرماكوبيا الفرنسيّة إلى جانب نباتات طبيّة أخرى. والظِلَم هو نبات من فصيلة المركبات تتحلّى أوراقه بطعم سُكريّ بارز جدًّا. حتى إن الستافيوسيد Stevioside قد تمّ تصنيعه في مؤسسات غير فرنسية. كما أن هناك مزيج من اللكتوز ومن السّكاروز، بطعم

السوس، يباع في اليابان بحرية تامّة.

من المُحلِّيات النصف اصطناعية، نِيُوهَسْپارِيديْن دِيهيدْرُوشَليكُون: وهو مُحَلَّ مشتق من بِيُوفلافُونُوييد نِيوهَسْپارِيْدِيْن اللَّيمونة الهندية: Citrus . وهو يُحضر نِيوهَسْپارِيْدِيْن اللَّيمونة الهندية . وهو يُحضر اصطناعيًّا استنادًا إلى النّارِنْجين الذي يُعْزَل من قشور الليمون الهندي المرّة عَدًّا. إنه مُسَكِّر ألفَ مرّة أكثر من السكّاروز. ولقد أوصِي باستعماله في المشروبات الخالية من الكحول، والألبان الرائبة المنخفضة الحُريْرات، والأطعمة الحِمْييَّة.

وبالرغم من أن الدراسات السمامية المتوسطة والطويلة الأمد التي تمت حتى اليوم توصّلت إلى نتائج ملائمة، غير أن المجلس الأعلى للصحة العامة في فرنسا قد رأى من الحذر عدم إبداء رأي مؤيد لاستعماله في التغذية.

Bile, مرّة الثَّوْر، صَفْراء الثَّوْر – ٢٧٢ Gall (E) Fiel de bœuf, Bile de bœuf, Amer de bœuf (F)

Galle (D)

Fellis bovis (S)

المِرّة سائل مُخضَرّ اللَّون الأصفر، أو مُسُودٌ اللَّون، دَبق، رائحته خاصّة وطعمه مُرّ وغير مُستحبّ. يُوجد في مرارة البَقرة والثور. نُؤخّر إنحلاله وفساده بإضافة الأستير أستيك إليه.

كثافة المرّة المتوسطة ١,٠٢. وهي تحتوي بنوع خاص على تُوروشُولات وعلى غليكوشُولات الصّوديوم، وعلى كولسترول، وعلى موادّ دَسِمة، وموادّ مُلوّنة، وعلى هَيُولينات وأملاح مَعدِنيّة. تفاعلها قِلَويّ. وهذا ما يفسّر لماذا تكون المِرّة صالحة لإزالة الشَّحم، وهو استعمال يَتمّ اللّجوء إليه غالبًا.

كان يُستعمل في الماضي مستخلص مِرّة النَّور أو صفراء النَّور، مِرّة مُكَنَّفَة؛ وهي مِرّة كان يَتمّ الحصول عليها بثَقْب مرارات الثور الحديثة، وأخذ السائل الذي يسيل منها على شاش رقيق وتبخيره في حمام مريم مع تحريكه المستمرّ حتى قوام المستخلص الجامد (دستور ١٨٨٤). إن هذا المستخلص الخام أخلى مكانه إلى مستحضرين جديدين مُنَقَّين مُكرَّرين.

777

⁽١) التَّسمية للمؤلِّف.

Extrait de bile مستخلص صفراء الثور de bœuf (F)

Extractum fellis bovis (S)

مستخلص صفراء الثور المُنقَى المُجفّف، Extrait de bile de bœuf أملاح صَفراوِيّة purifié • desséché (F)

نُحضِّر مُستخلَص المِرَّة المُكرَّر المُجفَّف كما نُحضِّر مُستخلَص مِرّة الثُّور، ولكن قبل تقطير الكحول في آخر العمليّة، نعالج المحلول الكحولي بواسطة مزيج من ٥ غرامات من الفحم المُفَعَّل و٥ غرامات من تراب دَعَاك Terre à foulon لكل ١٠٠ ملل من المحلول الكحولي. نُحرِّك لمدَّة ساعة، ومن ثمّ نترك للرّاحة طوال ٤٨ ساعة في قارورة مُقفَلة، نُمرِّر على مِصفاة من الورق مع استعمال قمع مُغطّى. نركّز السّائل الصافى تحت ضغط مُخفّف وبحرارة أقل من ٤٠° سغ حتى قِوام العجينة السَّميكة. تُمدَّد هذه العجينة على ألواح، وتُجفُّف في مِحَمّ خال من الضغط نُسخّنه حتى ٤٠° سغ.

يُسْحق النّاتج الجافّ، ويُمرَّر المسحوق

في منخل رقم ٢٤، ويُحفظ في قارورات مرهم مقفلة جيِّدًا ومَطْلِيَّة بالپرافين (دستور ١٩٤٩).

إن مستخلص المِرّة المُكرَّر والمجفَّف هو مزيج بنسب مختلفة من غليكوشولات الصّوديوم الصّوديوم ومن تُوروشُولات الصّوديوم ومن أملاح صَفراويّة أخرى؛ وهو يقع في مسحوق فاتح اللَّون الأصفر، إسترطابيّ، مُعَطِّس، طعمه قليل الحلاوة ومن ثمّ مُرّ؛ إن هذا المسحوق ذَوّاب جدًّا في الماء ويُعطي محلولًا Aphrogène؛

يحتوي مُستخلَص المِرّة على ٤٥ إلى ٥٥٪ من الحوامض الصَّفراويّة الحرّة والمشتركة المُعبَّرة بالحامض الكُولِيك Ac. cholique

طريقة الاستعمال – المقادير الاعتيادية للبالغين عن طريق الفم: ٠,١٠غ لجرعة واحدة، ٣٠,٠غ لكل ٢٤ ساعة.

Pommade (F) مَرْهُم

مرهم أُثْرُجِيّ، مَرُوخ أُثْرُجِيّ، مَرُوخ ضدّ الجرب

حامض نيتريك ١,٣٩ هـ ٠٨غ نحل على البارد ونسكب في مزيج منصهر ونصف بارد (٣٥°) من:

لذكرى التاريخ .

نحوِّك لكى نحصل على مزيج تام، وعندما يبدأ المرهم بالتَّجمُّد، نصبّه في قوالب من الورق (دستور ۱۹۰۸). نُقسِّم الكتلة إلى مُربّعات صغيرة قبل التَّربد الكامل.

استُعمل هذا المرهم تمسيدًا ضدّ القُوبات وبنوع خاص ضِدّ الجرب. زيت زيتون وهو يُحدِث التلعُّب بمقادير قوية جدًّا.

يجب تجديده في غالب الأحيان مُجَفِّف للقرحات. إن مرهم كِرْكَنْد للحؤول دون حفظه السّيِّئ. وفي رأي بَكّ، من بروكسل، أن سبب التغييرات التي تطرأ على تركيب المرهم الأترجى مرهم بوري اليودي ولونه هو بنوع خاص تَعرُّضه لملامسة الهواء ممّا يسبّب في اختفاء الحامض النيتريك السريع؛ ولكى نحفظه لأطول مدّة ممكنة، يجب أن نصبّه إما في أوعية من البورسلين محكمة القفل، وإما في قارورات صغيرة سوداء اللُّون واسعة مرهم الخلّود أو المُخلَّدة العنق العريض تقفل فور تعبئتها بواسطة الزجاج المحفوف.

مرهم أصفر (الأخ قُووم)

شمع أصفر ٧٥ غ
زیت وردي ۱۵۰ غ
کافور ۳۰غ
مستخلص السَّكْب (ملح رصاص) ٤٥ غ
يُمَد على قماشة توضع على القرح
السَّرطاني بعد استعمال «كاوي قُوْوم»،
وبالتالي عندما تقع أيضًا قطعة الغاريقون
التي توضع مباشرة بعده لذكري التاريخ.

مَرْهَم بُوتَ الشَّمْعِي (Cérat de Pott (F ۰۰۰ غ مَرْتَك ٠٠٤ غ خَلَ ٠٥٠ غ صابون

نسخّن حتى اختفاء الرطوبة مع تحريك مستمر، ومن ثم نضيف:

۰۰۰ غ ٥٠٠ غ شمع أصفر

الشمعيّ ليس إلّا شكلًا من مرهم بُتّ.

۰٫۵۰ غ	يود
كمّيّة كافية لحلّه	كزيلول
۰۰ غ	ڤازلين

لذكرى التاريخ.

۲ غ	۳	عصير مخلّدة
۲ غ	٢	شحم خنزير
۽ غ	٤	زيت لوز حلو

مرهم دوتوكسيد الزئبق المكوفر

۲ غ		 	بيوكسيد الزئبق
٤ غ	٠.	 	شحم خنزير
ه غ		 	كافور

تركيبة بيَتّ تحتوي على كمّية أقلّ من الكافور.

مظاهر سفلسية جلدية مصحوبة التي توضع مباشرة بعده لذكرى التاريخ. بالحكاك. لذكرى التاريخ.

م ر ھ	مرهم ضدّ الشَّرَث (بروك)	مرهم سيترات الكينا
1	•	سيترات كينا ٢,٠ غ
		شحم خنزير } غ
	حامض سيتريك ٠,٥٠ غ	في تمسيدات تحت الإبطين ضدّ
	راسب أبيض ٢٠٨٠ غ	الحميات المقلعة.
	صبغة المسك	
	مرهم ضدّ الشَّرَث (كنُولْزَر)	مَرْهَم شَمْعِي بالمُورْفِين Cérat morphiné (F)
	أفيون ١٠	كلورهيدرات المورفينكلورهيدرات المورفين
	كافوره غ	مرهم شمعيّ أبيض٢٠ غ
	كربونات الأمّونيومكربونات الأمّونيوم	نذوّب المورفين في كمّيّة ضئيلة من
	أستات الرصاص ٥ غ	الماء، ومن ثمّ نمزج جيّدًا.
	شحم خنزير ٣٠غ	مَرْهَم شَمْعِي مُؤَفْيَن Cérat opiacé (F)
	مرهم ضدّ الشَّرَث (مَايَت)	مستخلص أفيون ١ غ
	شحم خنزير ٣٠غ	مستخلص أفيون
	شب محروق ٥غ	
	يودور البوتاس متبلّر۲غ	نحلّ المستخلص في الماء ونمزج مع
	لودانم روسو ٢ڠ	
	مرهم وردي ٥ غ	قرحات وتقرّحات مؤلمة.
	مرهم ضدّ القَرَع (بورياس)	مرهم صَاقِل
	وَدَك ٢٠ غ	حامض پيروغَلِّيك٩ غ
	شحم خنزير ١٥٠ غ	حامض سالسيليك ٤ غ
	سولفات الزنك ٣٠غ	زیت کبریتی ۱۰ غ
	تمسيدتان في اليوم بما يوازي حجم	قطران ١٠ غ
	البندقة .	صابون أسود٢غ
		لانولين ١٠ غ
	فحم خشب مسحوق ٢٦ غ	قازلینقازلین ۳۰
740	كبريت مصعَّد ٢٥ غ	تركيبة قريبة من مرهم بروك.

مرهم غُونُدريت، مرهم نشادري، كاو		م ر هـ
نشادري، منفُط نشادري	كربونات بوتاسيوم ١٢ غ	
وَدَكَ خَرُوفَ١٠ غ	شحم خنزير	
شحم خنزير ١٠ غ	مرهم ضدّ القَرَع (بِيْنَل)	
نسيِّل في قارورة عريضة الفتحة.	راسب أحمر ١٠ غ	
ن <i>ض</i> یف: 	كربونات صوديوم جاف ١٥ غ	
نشادر سائل ۴۹٫۹۲۰ غ	سولفات الزنك ٢ غ	
نقفل القارورة، ونخضّها في الما	توتياء Tuthie ع غ	
البارد بقوّة حتى تبرد (دستور ١٨٨٤).	كبريت ١٥ غ	
إن تركيبة غوندريت الحقيقيّة هي	شحم خنزير ١٢٥ غ	
التَّالية: شحم ٣٢غ؛ زيت لوز ٢غ؛	ندهن الأجزاء المريضة بهذا المرهم	
نسيِّل جزئيًّا ونضيف: نشادر سائل عند	مساء ونغسلها في اليوم التالي بماء	
°۲۵ سغ، ۱۷غ؛ ومن ثم نخِض حتّی	الصابون الساخن.	
التبِريد. يجب تلافي إضافة النَّشادر إلى		
الشَّحم السَّاخن جدًّا.	مرهم ضدّ القَرَع (ماهون)	
' ·	كلس مطفئ ٤ غ	
 ملم لكي يَكُوي الجلد، في بعض 	كربونات صوديوم٢ غ	
الإصابات الدِّماغيّة بنوع خاص. يجب	شحم خنزير ۴۰	
أن يُغطَى برفادة سميكة لكي تركّز عمله؛	نزيل القشور بواسطة لصوقات، ومن ثم	
فالمرهم هذا لا يعدو كونه مُحمِّرًا للبشرة	ندهن الأجزاء المصابة بالمرهم. إن	
إذا فركت به في الهواء الطلق. وهو	مراهم الدكاترة بِيَت، كازناڤ، پَتَل،	
يحدث مع الرفادة السميكة تلفظًا خلال	ضدّ القرع لا تختلف عن المرهم أعلاه.	
١٠ إلى ١٥ دقيقة ويشكّل ندبة خلال	t//11.5 to 1	
حوالى نصف ساعة .	مرهم ضدَّ المَرَط	
يوضع في بعض الأحيان بهدف تطبيق	نخاع الثور الشوكيّ 1٠ إلى ٦٥ غ	
الطريقة الماصة للحرارة. وهي طريقة	زيت خروع ٢٥ إلى ٣٠ غ	
فعَّالة ناجعة في الكُمُّنَة وتوسُّع الْبؤبؤ.		

(أو دهن وانيليا عدّة نقاط)٣غ الأمونياك، والأمونياك يَتَّحد إلى الشَّحم

إن هذا المرهم لا يعمل إلَّا بواسطة

صبغة ندى البحر

مع الوقت، لكي يشكُل صابونًا، وبالتّالي يجب عدم تحضيره إلا عند الحاجة.

عدّل البعض تركيبة هذا المرهم كما يتبع: شحم بنزويني ١٠غ. زيت لوز ٥غ. نشادر سائل ١٥غ. وحتى إنه اقترح استبدالها بمزيج من الصلصال (كمية مطلوبة) ومن النشادر (كمية كافية) نحفظها في قارورات جيّدة القفل.

مرهم قطران (غیلیوت)

201	سنحم محترير
۲ إلى ٤ غ	تحت كربونات الصوديوم
٢ إلى ٤ غ	زيت الكاد
٢ إلى ٤ غ	قطران
	,

ضد أكزيما اليدين. يستبدل بعض الأطباء زيت الكاد والقطران بزيت القطران الثقيل وبعدة نقاط من دهن ملح مرهم منغانيز البارود الجاوي.

مرهم كاو

شحم خنزير۸غ
شب۱
سَبينة مسحوقة
كالومُل١ غ
للقضاء على النابتات أو الناميّات.

مرهم كربونات الرصاص، مروخ الرازي الأبيض

١٠غ	كربونات رصاص
٥٠ غ	شحم خنزير بَنْزوينيّ
÷:::	دستمر ۱۸۸۶ ان هذا الم

بسرعة كبيرة، فلا نُحضِّره إلَّا عند الحاجة. عدد كبير من كتب الوصفات يَنصح بمرهم الشَّمع الخالي من الماء سَوّاغًا له.

في ضماد الحروق.

إذا أضفنا إلى المقدار أعلاه غرامًا واحدًا من الكافور المسحوق مع قليل من الزّيت، نحصل على المروخ الأبيض المكوفر المذكور في فرماكوبيا بَتاڤيا، بولونيا، همبورغ، وعلى المرهم الإلهيّ المذكور في بعض الفرماكوبيات الأخرى.

مَرهم يَتلوَّن بالأصفر الجميل بملامسة القليل من حامض الأستيك ومن محلول يودور البوتاسيوم.

بيوكسيد منغانيز وشحم خنزير (بالتساوي). في القرع، والجرب، والقوبات.

مرهم اليود

	- 52
١٥ غ	شحم خنزير
١ غ	أو: يود
٤٢ غ	شحم خنزير
خير يعطى لإخفاق	إن المرهم الأ

البَثْرات الجدرية. لذكرى التاريخ.

مرهم يودور الرصاص

١٨٨٤. إن هذا المرهم يَزْنخ يودور رصاص

مرھ

كحول ٨٠ درجة	شحم بنزويني	900
تركيبة أخرى يطلق عليها في بعض	دستور أدوية ١٩٣٧ . مُذيب ومصرِّف.	
الفرماكوبيات اسم مروخ صابونيّ مركّب:	مرهم يودور الكبريت	
صابون أبيض٧٠ غ	يودور كبريتا غ	
كافور ٣٥ غ	شحم بنزويني ٢٠ غ	
روح ندى البحر ٤٣٥ غ	دستور أدوية ١٨٦٦. نعالج اليودور	
ماء مقطّر	بقليل من الكحول ونمزجه مع الشحم.	
	يستعمل في الإصابات الجلدية.	
في تركيبة أخرى نجد بالإضافة إلى ما	:	
تقدّم، دهن الزعتر والنشادر المحلول.	مرهم يودوفورم	
مروخ صابونيّ مكوفر، صابونولة(١)	يودوفورم مسمَّققازلين ١٠ غ قازلين ٩٠ غ	
الكافور، صبغة الصابون المكوفرة، بلسم	_	
الصابون (F)	نحضّر مرهمًا بواسطة الهرس والدقّ	
صبغة صابون ٥٠ غ	(دستور ۱۹۳۷). لذكرى التاريخ.	
زیت لوز حلو ٥ غ	مرهم يودوفورم (غلوير)	
كحول مكوفر 83 غ	·	
دستور ۱۸۸٤.	يودوفورم ٢ إلى ٤ غ مرهم شمعي بسيط ٣٠ غ	
مروخ صابونيّ هيدروسولفوريّ، مرهم		
هيدروسولفوري	في تمسيدات ضد عدّة إصابات عَصِيّة في البشرة، البَرَص، الحَصَف، الأكزيما	
زیت خشخاش منوم ۲۰۰۰ غ	المزمنة.	
صابون أبيضمابون أبيض	,	
سولفور البوتاس الجاف	Onguent, دِهان ۲۷۶ مروخ، دِهان	
المسحوق ١٨٠ غ	Liniment (F)	
زيت الزعتر الطيار ٨ غ		
مقدار ٣٠غ في فركات ضدّ الجَرَب.	مروخ صابونتي	
را) التَّسمية للمؤلِّف.	صبغة صابون ٥٠ غ	
1. 11 - 11 (1)	زیت لوز حلو ہ غ	<u>የ</u> ሞለ

نسخّن في حمام مريم الصابون الدقيق بقدر الإمكان، مع ٥٠ غرام ماء مع تحريك حتى الحصول على التجانس التام؛ نضيف الزيت على مهل، ومن ثم سولفور البوتاس مع الهرس والتحريك حتى المزج الكامل. إن هذا المروخ موخ مهيّج يجب أن يحضّر عند الحاجة فقط لأنّه سريع التلف في الهواء.

مروخ مبول ١٠غ ديجيتال ¿ ٥٠ ماء غالماء ننقع في الماء الغالي، نمرّر ونضيف: ٠٣٠ غ دهن التربنتين ِ ه غ مستخلص إشقيل ۲ عدد صفار بیض تركسة أخرى:

غ	١	۲		 	 		 			 				Ĺ	ļ	ني	٠.	إذ		نة	ښ	م
غ	١	۲										4	ل	l	=	و	_	د		نة	Ļ	0
غ	١	۲		 						 		ان	جا		:	ر	٠	ىپ	,	فة	Ļ	م
غ	۲	٤		 						 		 			,	<u>ۇ</u>	ئو	<	4	J	٠,	زي
غ	٦	٠.	 	 		 						 			ل	ئ	٤	u	,	در	٦	نٿ

في تمسيدات على الخَثْلَة (ما بين السُّرّة والعانة) وداخل الفخذين، ضِدّ الاستسقاء. إن مروخ شميدت المبوّل يحتوى زيادة على ما تقدّم التبغ البَحريّ اللُّون .

مروخ مُسَكِّب، بلسم عالميّ، زبدة السَّكْب، صابون للحمى القوية ومصرّف

مستخلص ملح الرصاص (سَكُب) ١ جزء زيت زيتون ٢ جزء

٤٠ غراما	بلسم فيوراقانتي
١٥ غرامًا	كحول مكوفر
٤٠ غرامًا	زيت لوز
ه غرامًا	نشادر

حالات شَلَل، حالات روماتيزم، غنغرينة (دستور أدوية ١٨٦٦).

۲۷۵ - مَزيج، مَزيجات Mixture (E) Mixture (F) Mixtur (D)

مزيج برازيلي

۹۰ غ	كوباهو
۳۰ غ	صفار بیض
٣٠	شراب صمغ
٨ غ	كحول زعفران
۲۵۰ غ	ماء
	41 5 .

ضد التعقيبه.

مزیج برازیلی (لوپیر)

بالتربنتين المكرر.

٢٦٠ غ	كوباهو مُسَمَّك
١٢٥ غ	بلسم مكّة
ولي ١ غ	مستخلص زعفران بيل
ستبدال بلسم مكة	يقت ج يُمشاردا ا

744

م ز ي

م ز *ي*

مزیج دُردی ناری، نقاط طاردة الحمّی، نضیف رویدًا رویدًا: صبغة طاردة الحتى سكر مسحوق خشن

سائل دردي ناري Pyrotartrique غ الماء العالق بالهيدرات بكامله. حامض سولفوريك ٥١ غ غير ناجع، معرّق، طارد للحمّى.

استعمل هذا المزيج ضدّ الكوليرا.

مزيج ضُرَاسِي إنكليزي

دهن تربنتيندهن تربنتين كافور٨غ

نقطة واحدة على قطنة.

مزيج مسهل قوي

دموع 18 غ	مَنَ
ر السُّنَا ١٠ غ	ثما
ي حامض البوتاسيوم ٤ غ	درد
رة، زبیب، خنشار،	کزب

من کل واحد ۶ ۳۲۰

نغلي حتى إنقاص ١٩٠، يؤخذ صباحًا ٢٧٦- مُسْتَحلَبات ١٩٠، على الريق.

مزيج المغنازيا المُمَيَّهَة

مغنازيا محروقة خفيفةمغنازيا

نغلي في مقدار ٢٠ مرة وزنها من الماء حتى التميُّه الكامل، نرميها على قماشة، نتركها لكى تجف، نعصرها بقوة شديدة بواسطة مكبس جيّد. تُمزج كتلة الهيدرات

٠١١٢غ روح الأنجليك ١٨٠ غ نخض المزيج حتى يذوب السكر في

كافور ٢ غ
ماء ٣٩٣ غ
كحول ٤ غ
نمرّر. البعض يضيف ١٥ غرامًا من
السكر .

مزيج مُكوفَر مغنازي

كافور	
ماء	٦٤ غ
كربونات المغنازيوم	۱۰ غ
ندقّ الكافور ونهرسه مع الكربونات،	٤ غ
ومن ثمّ نضيف الماء رويدًا رويدًا. في الاسْتِهْياء الأوريك أي البولي Diathèse.	۲ غ ۲۳ غ

مستحلب بالكلوروفورم

كلوروفورم صِرف۲غ
زيت لوز حُلو۸غ
صمغ عربي مسحوق ٤ غ
شراب زهر البرتقال السكري ٣٠ غ
ماء مقطّر

كان دَانسِي ينصح بهذه الطريقة لإعطاء الحاصلة في هاون رخامي مع كمية كافية الكلوروفورم من الداخل. نحضّر كذلك من الماء حتى يزن المجموع ٨٠٠ غرامًا ؛ الطريقة ذاتها «مستحلب بالبروموفورم».

إن مزيج الصمغ النشادري أو الحليب النشادري ومزيج أو حليب الحلتيت يحضّران من ٨ غرامات من الواحد أو من الآخر من هذه الصموغ الراتنجية ومن ٢٥٠ غرام ماء.

مستخلص، مستخرج، تصنیف Extraits, Classification المُسْتَخُلَصات des extractions (F)

يميّز دستور أدوية ١٩٦٥ أربع أصناف من المستخلصات:

°۱ - المستخلصات السائلة (مستخلصات مائعة)؛

٢° - المستخلصات الرخوة التي يكون
 لها قوام العسل السميك والتي تحتوي
 على حوالى ٢٠ بالمئة من الماء؛

٣ - المستخلصات الجامدة التي لا تسيل (تَنْصَبٌ) وتحتوي ١٦ إلى ١٥ بالمئة من الماء؛

3° - المستخلصات الجافة، التي يمكننا سحقها والتي لا تحتوي على الماء بالمرة تقريبًا، ولكنّها تكون استرطابِيَّة جدًّا.

الفرماكوبيا تجعل المستخلصات في ثلاث أصناف تحدّدها كما يلي:

۱° - مستخلصات سائلة أو

مستخلصات مائعة تُحضّر عمومًا م س ت باسْتِنْزاف العقارات بواسطة عملِيَّتي حَلْحَلَة متتاليتين ومن ثم بتركيز المحلول الثاني الحاصل. يُمزج المحلولان بعد ذلك بطريقة تعطي مستخلصًا يكون وزنه مقابلٌ تمامًا لوزن العقار الجافّ المستعمل.

°۲ - المستخلصات الجافة الضعيفة المضمون بالماء؛ وهي مستخلصات تكون ذَرُورِيَّة وسهلة التَّذَرُر Pulvérulables . وهي غالبًا استرطابية .

۳° - المستخلصات المسمّاة رخوة أو
 جامدة ذات قوام متوسّط وسميك نوعًا
 ما .

من المستخلصات المسجّلة في الفرماكوبيا الحديثة:

° - أحد عشر مستخلصًا مائعًا هي مستخلصات الزعرور، البُلْدُس أي شجرة الكبد، العَسَم، الغرنداليا، الهِدْرَسْتُس، عِرْق الذَّهب، النَّبْق، الكولا، الآلاميّة، الكينا الحمراء، والأَفْلُوس.

°۲ - مستخلصان جامدان أو رَخوان هما: مستخلص النَّبْق الجامد، مستخلص الجنطيانة الرخو.

٣ - مستخلصات جافة هي: مستخلص
 الكولا، وجوز القيء، والرّاتانيا.

نجد في حينه طريقة التحضير الخاصة بكل منها.

7 2 1

م س ت

او کحولیّة أو Extraits alcooliques ou هیدرو کحولیّة hydro-palcooliques (F)

Extrait de gentiane الجنطيانا (F)

نُحضِّره كمستخلص الكَسْكارا.

مُستخلص رَخو مُحمر اللَّون البُنِّيّ، رائحته عِطريّة وطعمه مُرّ جدًّا. غرام واحد من المُستخلَص يذوب في ٥ ملل كحول ٦٠ بالمئة.

Extrait de مستخلص الجنطيانا المُثْبَتَة gentiane stabilisée (F)

نُبلِّل مسحوق الجنطيانا بشكل سَوِيّ بواسطة ٥٠٠ غرام كحول. بعد ساعتين من البَلّ في وعاء مُقفَل، نَضع الكُتلة في رَاوُوق. نُضيف الكحول وفقًا لقواعد التأشين ونتركه مَمْروثًا لمدّة ٤٨ ساعة. نتابع العمليّة كما هو مذكور في مستخلص الكشكارا، ولكن عدم تركيز السّائل المُصفّى إلّا حتى قوام المستخلص الرَّخو.

المواصفات - مُستخلَص فاتح اللَّون النَّيّ، طعمه مُرّ، يُعطي مع كحول ٦٠ درجة مُذابَة شبه صافية. وهو يحتوي على جَنْطِيُوپيكرِيْن Gentiopicrine

(جَنْطيوپيكروسيد)، وعلى جَنْطِيَانوز Gentianose وهما تختفيان بسرعة أثناء التَّجفيف، الأولى منهما هي نافعة للمعِدة بنوع خاص وطاردة للحُمّى. ولهذا السَّبب فإن تحضير مُستخلص الجنطيانا المثبَّتة قد سُجِّل في دستور الأدوية.

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُستخلَص النَّاردين المُثَبَّة، دستور ١٩٦٥.

مستخلص زهرة العُطاس d'arnica (F)

أزهار أرنيكا 1۰۰۰غ كحول ٥٦ درجة ٣٥٠٠

نَجعل الأَرْنيكا في مسحوق نِصْف دقيق؛ نُبلًله بمقدار ٥٠٠ غرام من الكحول المطلوب؛ نُكدِّسه بشكل ملائم بين حاجِزين في أسطوانة من قصدير؛ بعد ١٢ ساعة، نغسل المسحوق بما بقي من الكحول؛ عندما تخترق آخر دفعة من الكحول المسحوق، نترك هذا الأخير مُغطَّى بطبقة من الماء، ونُوقف العملية عندما يسقط في السّوائل الأولى عندما يسقط في السّوائل الأولى نُقطِّر الصِّبغات الكحولية في حمّام مريم التَّبخير في حمّام مريم التَّبخير في حمّام مريم حتى قوام المستخلص (١٨٣٧).

الخصائص والاستعمال - مُنشَّط الجهاز العَصبيّ ومُهيِّج يُستعمل في

الشَّلَل المَثانِيِّ بمقادير من ٠,٠٥ إلى ،١٠٠ غرام في اليوم.

يُستعمل بحذر، فقد يحدث غثيانات، وتَقيّوءات، وإغماءات.

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُستخلَص جذر البَقْس، وجذر الخَرْبَق الأسود، وجذر الجلاب الحقيقي.

Extrait de مستخلص القنّب الهندي chanvre indien (F)

قنّب مسحوق نصف دقیق (منخل ۲٦) کحول ۹۰ درجة

نعمل كما هو مطلوب في مستخلص البلادون. عندما ينتهي التأشين، نُصفي السّائل الحاصل قبل تقطير الكحول. بعد التَّقطير، نُركِّز الفُضالة من دون تصفيتها مسبقًا، بحرارة أدنى من ٥٠° سغ وتحت ضغط مخفَّف حتى قِوام المستخلص الجامد.

المواصفات - نحصل على نتاج قاتم اللَّون الأخضر، رائحته خاصّة وغير عاديّة، يذوب في كحول ٩٠ درجة. إن محلول غرام واحد من هذا المستخلص في ٩ ملل كحول ٩٠ درجة يُعطي اضطرابًا لَبَنيًّا مخضرًّا قويًّا بإضافة حجم مماثل من الماء (دستور ١٩٤٩).

إن تحضير هذا المستخلص يختلف كثيرًا حسب الفرماكوبيات؛ وكان دستور

الأدوية، عام ١٨٨٤، يحتوي على تركيبة م س ت مستخلص رخو يحضر بكحول ٦٠ درجة.

Stupéfiant. - B مُخَبِّل. جدول Tableau B

إستعمل كمخدّر ومزيل للألم ضدّ الآلام المعويّة.

مقادیره القصوی: ۰٫۰۵غ لجرعة واحدة؛ ۰٫۱۰غ لکل ۲۶ ساعة (للبالغین).

ملاحظة - مرسوم فرنسي رقم ٥٣٢٤١ تاريخ ٢٧ آذار ١٩٥٣: مَنْع استيراد وتصدير وإنتاج وتجارة واستعمال القنّب الهندي في مستحضرات تحتوي منه أو تُصنَّع منه.

مستخلص الكَبَابَة (Extrait de cubèbe (F)

مسحوق كَبَابة (منخل ٢٦) ١٠٠٠ غ كحول ٩٥ درجة أثير مصحَّح

نستنزف مسحوق الكبّابة في آلة تقطير، مع الأثير أوّلًا، ومن ثم بالكحول. تُقطِّر الصّبغتين مُنفصِلتين كلّ على حدة مع أخذ الحيطات الضَّرورية؛ نُبخِّر في حمّام مريم الفُضالة الكحوليّة؛ نُضيف إليها المُستخلص المُؤثير. إن ألف غرام من مسحوق الكبابة تعطي حوالي ٢٠٠ غرام مستخلص زيتيّ - راتنجيّ (دستور مستخلص زيتيّ - راتنجيّ (دستور).

المواصفات - مستخلص قاتم اللَّون

م س ت

البُنِّيّ، نِصف سائل، غير متجانس، رائحته عِطريّة، لا يذوب في الماء. يَتلوَّن بالأحمر الأرجوانيّ إذا أضيف إليه حامض سولفوريك مُركَّز (تفاعل كوبايِيْن). نَخضه أثناء الاستعمال لنجعله متجانسًا (دستور ١٩٠٨).

الخصائص والاستعمال - يُستعمل كمنشّط، مُدِرَ للصَّفراء وفي التَّعقيبة، في برشامات تحتوي على ٠,٧٥ غرام.

إن مُستخلَص پوش الكحوليّ من الكَبابة يتمثّل في صِبغة من الـ "كُوبان": Cubène يُتمثّل في صِبغة من الـ "كُوبان": بالنَّقل تُحضَّر بمعالجة مسحوق الكبابة بالنَّقل بواسطة كحول ٥٦ درجة بكميّة مناسبة للحصول على وزن مستخلص سائل يُساوي وزن المسحوق المستعمل.

مستخلص الكولا (F) مستخلص الكولا المسحوقة بدقة

نُبلِّل سَوِيًّا مسحوق الكولا بواسطة •• ■ غرام كحول ٦٠ درجة، وبعد مضي ساعتين من البَلِّ في وعاء مقفل، نضعه في راوُوق؛ نُضيف الكحول وفقًا لقواعد التَأشين، ونتركه ممروثًا طوال ٢٤ ساعة.

نُباشر التَّأشين مع ما بقي من الكحول اللازم، على أن نضع جانبًا أوَّل ١٠٠٠ غرام تحصل منه العمليّة. نُقطِّر السّوائل

لكي نسحب منها الكحول ولا نضيف الألف غرام الموضوعة جانبًا إلّا في نهاية العمليّة، ومن ثمّ نُركِّز في حمّام مريم حتى الحصول على قِوام المُستخلَص الجامد بحرارة أدنى من ٥٠ سغ وتحت ضغط مخفّف.

يمكن للمستخلص أن يُصبح مُحبَّبًا أثناء التَّبخير؛ ففي هذه الحالة، وعندما يكتسِب المستخلص القوام الرِّخو، نُضيف إليه حوالى ثمن $(\frac{1}{h})$ وزنه كحول Λ درجة، نمزج جيِّدًا ونُنهي العَملِيّة كما ورد أعلاه.

المواصفات - مستخلص كَسْتنيّ اللَّون. إذا حُلّ في مقدار ١٠ مرّات وزنه من الماء المُقطَّر، يُعطي مُذابَة عَكِرة جدًّا، تَتَحوَّل بعد التَّصفية، إلى لون مُحمَر على بعض الكثافة. إن لون مُحمَر على بعض الكثافة. إن الجامد يجب أن تحتوي على الأقل ه غرامات كافيين حُرّ ومُركَّب، يُقدَّر بالكافيين اللّامائي.

الاستعمال - يُستخدم مُستخلَص الكولا السُّكَّري الجامد لتحضير مَلْتوت الكولا السُّكَّري المحبَّب، بينما يُحضَّر إكسير الكولا (دستور ١٩٣٧) بواسطة المستخلص المائم.

تتقارب من ٠,٦٠غ من المُستخلَص، م س ت توزن بدقة. مُستخلص الكينا الصّفراء يجب أن يحتوى كحد أدنى على ١٢٪ من القِلُويدات العامّة.

> الخصائص والاستعمال - يُوصف هذا المُستخلَص الطارد للحمّي بنوع خاصّ، في بيلولات أو جَروعات بعيار ١ إلى ٤غ عند البالغ وبعيار ٥٠,٠٥غ إلى ٠,١٠غ لكلّ سنة من العمر للولد. وفي حال غياب المواصفات المطلوبة، يُعطى مستخلص الكينا الحمراء المائي (دستور).

مستخلص الآلامية المائع Extrait fluide de passiflore (F)

أطلب مُستخلَص الزّعرور المائع. فُضالة جافّة: ١٠ إلى ١٦٪ (دستور .(1970

مستخلص الغرنداليا المائع fluide de grindelia (F)

نَستعمِل رؤوس الغرنداليا المُزهِرة في مسحوق نصف دقیق (منخل ۲٦)، وكحول ٧٥ درجة ونُنجز العمليَّة كما هو مذكور في الزَّعرور بترطيب المسحوق بواسطة ٥٠٠ غرام كحول ٧٥ درجة وإيصال الوزن إلى ١٠٠٠ غرام بواسطة كحول ۷۵ درجة.

فُضالة جافّة: ١٥ إلى ٢٠٪.

المواصفات - سائل مُخضر اللُّون البُنِّي، راتنجي، رائحته عِطريَّة، طعمه مُرّ جدًّا. إذا أضيف إليه ١٠ أحجام من

مستخلص الكينا الصفراء Ex. de quinquina Jaune, Ex. alcoolique de quinquina (F)

كَنْكَيْنَا صَفْرَاء فِي مُسْحُوقَ دقيق (٢٤) كحول ٦٠ درجة نُرطُب مسحوق الكينا بشكل سَويّ بواسطة ٥٠٠ غرام كحول. نُتابع العَمليّة كما هو مذكور لمستخلص الكسكارا، ولكن عندما يبلغ المستخلص قوام العَسَل، نُكمِل التَّجفيف في المِحَمَّ من دون تخطّی ۵۰° سغ، بطریقة نحصل معها على مستخلص جاف.

المواصفات - مُستخلَص محمر اللَّون البُنِّي، طعمه مرّ جدًّا وعِطريّ خفيف، يُعطى مع الماء مُذابة مُعتكِرة. وهو يذوب بكامله تقريبًا في كحول ٦٠ درجة؛ المذابة تكون مُحمرَّة اللُّون، وإذا خُفَّفَت في ٤ إلى ٥ مرّات حجمها من الماء المُقطِّر، فإنَّها تُعطى بعد التَّصفية، سائلًا، إذا تَحَمَّض بعض الشيء، يترسب بوفرة كبيرة بواسطة زئبقى يودور البوتاس المتعادل (دستور .(1989

تعيير القلويدات العامّة - نعمل تمامًا كما ذُكر في دراسة مستخلص الكينا الحمراء، مع استعمال كمِّيّة تَجريبيَّة

۲۸۰ مستخلصات مائية Extraits aqueux (F)

مستخلص أفيون عام Extrait total d'opium (F)

يَتَأَلُّف مُستخلَص الأفيون العامّ بشكل جَوهري من كلورهيدراتات قِلُويدات الأفيون.

يَتمّ تقدير المورفين في المسحوق الحاصل. مُستخلّص الأفيون العامّ يجب أن يحتوى على ٥٠٪ من المورفين اللَّامائيّ، أي ٦٦٪ من الكلورهيدرات. وفي حال يكون المسحوق الحاصل لا يحتوي على هذا العيار، نحله في ٣,٥٠٠ ليتر من الماء المُقطِّر ونضيف الكمِّية الضَّروريّة من كلورهيدرات المورفين لكى نحصل على العيار المطلوب. نترك السائل يرتاح عِدّة أيّام ونُصفِّي. نُقطِّر السّائل في ضغط منخفض حتى الحصول على فُضالة جافّة. نُسحَق هذه الفُضالة وننخلها في منخل ٣٢. نحصل هكذا على حوالي ١٨٠ غرامًا من مستخلص الأفيون العامّ. في حال كان عيار النِّتاج الحاصل أعلى ممّا يجب من المورفين، نحلّه في مُستخلّص عام للحفظ.

المواصفات والاستعمال - يقع مستخلص الأفيون العام في مسحوق مُرْمَدٌ اللُّون الأصفر، يذوب بكامله في مقدار ٢٠ مرّة وزنه من الماء البارد. م س ت الماء، يُعطى اضطرابًا مُبْيَض اللَّون (دستور ۱۹۲۵).

الخصائص والاستعمال - مُضادّ للتَّشنُّج يُستعمل بمقادير اعتياديّة من ٠,٥٠ غرام إلى غرام واحد للجرعة الواحدة، ومن غرام واحد إلى ٤٤ لكلّ ٢٤ ساعة (للبالغين).

(غرام واحد يساوي ٥٦ نقطة).

مقادير الفرماكوبيا الاعتيادية للبالغين عن طريق الفم: ٠,٥٠غ إلى غرام واحد لجرعة واحدة، ومن غرام واحد إلى ٤غ لكلّ ٢٤ ساعة.

مستخلص الفَرَنْدَل المائع Extrait fluide de salicaire (F)

رُؤوس فَرَنْدَل مُزهِرة في مسحوق دقیق كحول ٤٥ درجةكمية كافية

نُحضّر كما هو مكتوب في مُستخلّص الزُّعرور المائع.

سائل بُنِّي اللَّون الاحمر يَضطرب بإضافة ١٠ أجزاء من الماء (دستور .(1970

فُضالة جافّة: ٨ إلى ١٢٪.

يستعمل كدواء ممضاد للإسهال بمقدار ٠,٥٠غ إلى ٢ غرام في اليوم.

مستخلص الفشاغ المائع Extrait fluide de salsepareille (F)

مستخلص الأفيون العام يجب أن يحتوي على ٥٠٪ من المورفين القاعدة وعلى ٣٠٪ من قِلَوِيدات الأفيون غير المورفين. إن هذا المُستخلَص، المؤلَّف بشكل أساسيّ من كلورهيدراتات قِلَويدات الأفيون، كان يُستعمل على شكل مُذابة مزروقة، عيارها سنتغرام واحد في كلّ مللتر، أي ٥ ملغ من المورفين.

مُسخَسبُسل. جسدول - Stupéfiant. مُسخَسبُسل. Tableau B

طريقة الاستعمال - مقاديره الاعتيادية عن طريق الفم: ٢٠,٠٥غ إلى ٢٠,٠٥غ. لجرعة واحدة للبالغين. المقادير القصوى للبالغين عن طريق الفم، للجرعة الواحدة: ٢٤,٠٤غ، ولكل ٢٤ ساعة: ١٠,٠٠غمام.

Extrait de مستخلص الخشخاش المنوِّم pavot (F)

مستخلصات محسوبة في مستخلصات من ١٠٪ من المورفين.

تؤخذ في برشامات، مضغوطات، بيلولات، تحاميل.

جدول: Tableau B

Extrait brut السوس الخام de réglisse (F)

إن المادة التّجاريّة التي تُسمّى، عن غير وجه حقّ، عصير السّوس، هي مُستخلّص مائيّ مُجفَّف من جذر السّوس تُوجد ممزوجة معه أملاح تُرابِيّة مصدرها الماء

الشائع الذي يُستخدم في تحضيره وكذلك مَوادّ المُستخلَص التي أفسدتها الحرارة. نجد فيه غالبًا موادّ مُضافة كالسُّكَّر، والنّشاء، إلخ. (١٩٦٥).

المواصفات - يكون، إمّا في مسحوق، أو في كِتَل، وإمّا في قضبان أسطوانيّة الشَّكل مُفَلطَحة من أحد طَرفَيْها، وإمّا على شكل كُريّات. وهو أسود اللَّون وكَسُور، مكسره لامع. يمكن سحقه في هاون. طعمه مُسكَّر، أحيانًا يكون حامزًا بعض الشَّيء. وهو لا يذوب بكامله في الماء؛ محاليله المُصَفّاة تُرغي بالخضّ وتتَرسّب بالحوامض.

التركيب والاستعمال - مُستخلَص السّوس المَخْزَنيّ الخام يجب أن يحتوي على ١٠٪ كحدٌ أدنى من الغليسيريزِيْن النُشادريّ المُعيَّر هكذا.

يدخل في تحضير عجينة السوس المَخْزَنيّة، وفي عجينة السوس المَخْزَنيّة بالقطران، وفي بلسم طولو (دستور ١٩٦٥).

۲۸۱ مُسَهِّلات، مُلَيِّنات البَطْن Laxatifs (F)

من فعل Laxare اللاتينيّ، بمعنى أرْخَى، حَلَّ. وهُنا: أسْهَل، لَيَّن البَطن. إن الإمساك هو أكثر الاضطرابات الهَضميَّة شيوعًا، وهو يُصيب امرأة من ثلاثة، ورجلًا من سبع

م س ھ

رجال، ويكون ذلك في المدن بنوع قوامها وتسهِّل إخراجها. خاص. الإمساك هو مرض البُلدان الغنية.

> تنتمي الأدوية المُستعمَلة في معالجة الإمساك إلى ٤ مجموعات تبعًا لطريقة عملها.

- عمل میکانیکی
- زيت الپرافين: مُزَيِّت، مُزَلِّق لا يُمْتَص .
- صموغ ولُعابات: تزيد حجم وتَمييه المواد البرازية عن طريق امتصاص الماء.
 - عمل مهيج

إطلاق الحركة الاستدارية اللولبية وإفراط الإفراز اللَّعابيِّ. إنَّها المسهِّلات القويّة Purgatifs .

- مسهلات قوية مِلْجية.
 - أنتراكينونات.
- فينول فتالايين (فينولفتالايين).
- عمل منشط الحركة الانعكاسية التَّخْفِيْفِيّة Exonérateur.
 - تحاميل.
- حُقَن صغيرة، ميكرو حُقَن (١١) -Micro . lavements
- عمل مُدِرّ الصَّفراء، مُفرز الصَّفراء أو تَناضُحِيِّ تَنَافُذِيِّ Osmotique .

إن المسهّلات هي أدوية تُسرّع العبور المِعَويّ الأمْعائق وتُكسِب الكتلة البرازيّة

من الملائم تمييز المُسهّلات عن المُسهِّلات القويّة التي تُؤدّي إلى تفريغ عنيف للمواد الموجودة في المعي الغليظ. وحتى إذا تُصرَّف المُسهِّل القوى الذي يُؤخذ بكمِّيات ضعيفة، كدواء مسهِّل فقط، فإنَّ تقنيّات عمله تبقى مختلفة. المُسهِّل يجب أن لا يحدث مغصات، ولا إسهال، ويجب أن يكون تأثيره ميكانيكيًّا وأن لا يَتدخَّل بالمواد النَّزْلِيّة Cathartiques أو الأنْتراكينونيكية التي يكون لها عمل مُدِرّ للصَّفراء أو عمل Diastique.

وهي: الموادّ الغَنيّة بالسلّولوز كنُخالة القمح (ملعقة صغيرة في نهاية الوجبات، إمّا في مُحبّبات أو في بسكوت)؛ اللّعابات: أغار أغار، ١٠ إلى ٣٠ غرامًا في اليوم ممزوجة مع حساء الخضار، ومع الحليب، ومع المُربَّيات، تُؤخذ مساء خلال الوجبات؛ بزور الكَتَّان والخردل الأبيض، مِلعقتان إلى ٤ ملاعق كبيرة كلّ يوم، تؤخذ إمّا صباحًا أو مساء، بزر قطوناء، ١ إلى ٣ ملاعق صغيرة في اليوم؛ المُسهّلات المُسَكِّرة المُخصَّصة للأولاد بنوع خاص: العسل، ٢٠ إلى ٥٠ غرامًا، المَنّ، ٥ إلى ١٠ غرامات، الغليسرين (مهيِّج قليلًا) مِلعقة أو ملعقتان صغيرتان في اللّيتر، أو تحاميل من ٧٥,٠غ إلى غرام واحد، لُبِّ الثمار: لُبِّ سَنْط العَنْبَر (٤

إلى ٨ غ)، تمر هندي (٥ إلى ١٠ غ)؛ الحَوْخ الكبريت المغسول (٥ إلى ١٠ غ). الحَوْخ المحقف في كمپوت، شراب زهر الدراق السُّكريّ (ملعقة صغيرة أو كبيرة). (أطلب لُعاب في المعجم الخامس ٢١٥ رقم ٢٣٥).

إن زيت الفازلين يزيد ميوعة محتوى الأمعاء، بمقدار ملعقة أو ملعقتين كبيرتين صباحًا ومساءً أو خلال الوجبات طوال عدّة أيّام، يكرّر لعدّة فترات من ١٥ يومًا تفصلها مراحل من فترات من ١٥ يومًا تفصلها الطّويل يُحدِث حالات من عُسر الهضم ويحلّ الكاروتين ويمنع امتصاصه، وقد يَحدُث عن ذلك ظواهر نقص بالڤيتامينات التي المواد الدّسمة (A.D.E.K.). تذوب في المواد الدّسمة (A.D.E.K.). بالإضافة إلى ذلك يُعرّض مَن يَستعمله إلى المجازفة بالنّز الشَّرْجِيّ، أو الرَّشْح الشَّرجيّ، أو الرَّشْح الشَّرجيّ.

زيت الزَّيتون، من ١٠ إلى ٤٠ غرامًا بالفم، صباحًا أو خلال وجبة وفي حقنة شَرجيّة من ٨٠ إلى ١٥٠ غرامًا تعطى مساء.

اللَّعابات تزيد حجم البراز. غير صالحة في إصابات الأنبوب الهضمي التضييقِيّة، وقد تُحدِث إحساسًا بتطبُّل البطن.

يَجب ألّا يُستعمَل المُسهِّل بانتظام. ويجب الامتناع عنه في حال البواسير، وفي حال التهاب المستقيم. من الضروري أن نعرف، أن ابتلاع المُسهِّلات، في عدد من الحالات،

أكان ذلك عن طريق الفم أو الشَّرْج، يَجب الامتناع عنه، واتباع طريقة غذائية ملائمة، ونَمَط حياتي نشيط. وهذا ما قد يمنع حصول الإمساك. كما أن الحمية الغذائية تُعدَّل، فتشارك فيها الخضروات، والعسل، والخوخ المحقف (مثلًا). إن استعمال المسهّلات يُؤدِّي إلى الإدمان، وفيما المسهّلات يُؤدِّي إلى الإدمان، وفيما عدا بعض التَّركيبات، فإن التَّهيتُج المعويّ قد يصبح معها مزمنًا.

Alcool: كحولِيّة - ٢٨٢ Spiritueux (F)

بالإضافة إلى الكُحول والرُّوم، نُورِد بعض السّوائل الكُحوليّة التِّجاريّة المُختلِفة الّتي تَستعملها الصَّيدليّة في بعض الأحيان. وهي سَوائل تَشتهر بأسماء مُختلِفة، حسب المَوادّ التي تَنتُج عنها، أو حسب دَرَجات تركيزها. أهمُها ما يلي:

أراك، راك، سُمْشُو Arach, Rack (F)

سائل كُحوليّ تجاري تستعمله الصَّيدليّة في بعض الأحيان ويَحصل في الهند الشَّرقيّة من الرزّ المُتَخمِّر (مع إضافة الكاشو إليه) أو يَحصل من عصير القَصَب مع إضافة قِشرة عِطْرِيّة. وهو مَشروب يَدعوه الصِّينيُّون «سُمْشو» Sumchou.

م ش ر

م ش ر جن وویشکی Gin et Whisky (F)

يَتم الحُصول عليهما في بريطانيا وهولُّنْدة وبلجيكا من سوائل ثُفْل الشُّعير وحُثالته المُتخمِّرة، ومن بَقيَّة الحبوب، مع أو من دون عِنَبيّات العَرْعَر. وهما يحتويان على ٥٢ بالمئة من الكحول.

Kirsch, Kirsch-Wasser (F) کیرْش

مَشروب كُحوليّ يُصنَع في سويسرا وألمانيا، ويأتي أفضلُه من «الغابة السوداء، في القُوج، ويَنْتُج عن تَقطير عصير كَرَز الطُّيْرِ أي الكَرَزِ البَرِّيّ ومن عَصير الكَرَز الأسود المُتخمّر، وإجراء التَّقطير على النَّوَى. يَدين الكبوش برائحة اللُّوز المُرّ إلى الحامض اليروسِّيْك أي السِّيانْهيدريك. إذا خُفُّف الكيرش فيُصبح كُحولة الكَرَز الأسود في الفَرُ ماكوبيا الألمانية.

ماءُ الحَياة، كُونياك، قِنْدِيْد، بَاذَق Brandy (E) Eau-de-vie, Cognac (F) Spiritus vini (S) Branntwein (D)

ماء الحياة هو الكُونياك، اسم المِنْطَقة الفرنسيّة التي تُنْتِج أشهر أصنافه، وهو سائل كُحولي يَحصل من تَقطير النَّبيذ باستثناء أيّ سائل كُحولتي آخر. يجب أن لا يحتوي على أقل من ٤٥ بالمئة ولا على أكثر من ٥٥ بالمئة من حجمه من الكُحول الأثيليكي .

المواصفات - سائل باهت اللَّون العَنْبريّ الأصفر، يَدين بلونه إلى البَراميل التي يُحْفَظ فيها. رائحته مُمَيَّزة وتَفاعله حامِض. ولكى نَتَأكَّد من جُودته نَقوم بالتَّجربة التَّالية: نُبَخِّر عند ١٠٠° سغ وحتّى ثبات الوزن، مِقدار ٢٠ ملل ماء الحياة في وعاء تَبخير مُعَيِّر؛ الفُضالة يَجِب أن لا تكون أكثر من ٠,٥ بالمئة.

الخصائص والاستعمال - إذا أعطى الكُونياك بجرعات مُعتدِلة، فإنّه يُستعمَل كدواء مُقَوِّ عامَّ ومُنشِّط في مُقاومة ظواهر الوَهْن وضَعْف الحَيويّة أو انحطاط القُوى، كما يُستعمَل أيضًا كغذاء مساعِد.

ماراسکی زارا (Marasquin de Zara (F) ماراسکی

إنّ الماراسُكيُّ الذي يُنتّج في دَلْماسِيا من تَخمير الخَوْخ والدُرَّاق، ليس سوى صنفًا منه.

ملاحظة – إنّ كُحول وماء حَيَاة البَطاطا والحُبوبِ تَحتوى كلُّها على زَيت طيّار مُحْتَرٌ، يُكسبها طعمًا ورائحة خاصَّين، كما يُكسِبها خَصائص سامّة. ولقد تَمّ التَّوصُّل في صِناعَة هذه الكُحول إلى نَزْع هذه المادّة العِطْريّة بطريقة يَتمّ معها الحصول على كحول ليست له سوى رائحته النَّوعيَّة؛ وهو يُدعى الكُحول الطُّيِّبِ المَذاقِ. إنَّ كلِّ المَشروبات الكُحوليّة هي إذًا بحاجة لأن تَتَنقّي من ذلك الزّيت الذي يُصار إلى فَصْلِه بتكريره في آلات صناعية كبيرة.

مع ا	صمغ عرب <i>ي</i> طين أرمينيا ٩٠ غ	Opiate (E) معاجين الأفيون - ٢٨٣ Opiats (F)
	يؤخذ في الديسنتيريا. يعطي البعض، باسم معجون أفيون مضاد للديسنتيريا بَلْسَمي، التركيبة ذاتها يضيف إليها ٦٠ غرامًا من بلسم لوكاتَللّي.	معجون أفيون طارد للحمّى (بورجوا) سولفات الحديد
	معجون أفيون منظف أسنان بالفحم (بَرْييه) فحم صفصاف فحم حيواني مغسول	مستخلص العرعر كمّية كافية يؤخذ منه صباحًا ومساء قبل الوجبات بقدر البندقة في قليل من الخبز الفطير أو مع ملعقة من الحساء. معجون أفيون مضاد للتعقيبة (بايران) كوباهو مغنازيا محروقة ٣غ كبابة مسحوقة ٣٤ غ دهن النعنع ٢٠ نقطة دهن القرفة ٢٠ نقطة
701	المحروق ١٢٥ غ قرن أيّل محروق ١٢٥ غ كريم الطرطير (درديات) ٤٥ غ شب محروق ٦ غ قرمز ١٥٠ غ سوسَن ٣٠ غ عَسَل ٢٢٥	معجون أفيون مضاد للتعقيبة (دِيْدَاي) كوباهو ١٢ غ كبابة ١٨ غ جَلَب (جَلَبة) ٣ غ صمغ نقاط ١٠٠٠ غ شراب الورد الجوري السكري . كمّية كافية يؤخذ منه مرتان في اليوم .

۲۸٤- معجون عَسَلي Eléctuaires (F)

-۲۸۵ مُعَلَّات، محفوظات -۲۸۵ **(E)** Conserves, Electuaires simples, Saccharolés mous (F) Konserve (D)

معلّبات النياتات الغضّة

مُعَلِّب الملْعَقِيّة

أوراق ملعقية ١ جزء ٣ أجزاء سکر

نَهرس المادَّتَين في الهاون لكي نَجعل ١٠غ منهما لُتًا نُمرِّره بواسطة منْرَشة Pulpoire كبريت مُمَيَّه ١٠ غ في مُنْخُل شَعْر رقم ٢ (كودكس ١٨٨٤).

حُمَّاضِ العيد، القُرَّة، نَفَلِ الماء، بَقْلَة الملوك، أزهار الدرّاق والبنفسج، وكافَّة ٥٠ غ النَّباتات الغَضَّة.

مُعَلَّبِ الكرز الغازي

۰٫۰۵ غ أوراق كرز غازى غضّة ١ جزء

الملعقبّة. كما نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُعَلَّبات أوراق الأنواع التّالية:

أَبْسَنْت. زُوفا. قَرَنْفُل. فَرْفَارة. شيح. خشخاش منثور. برتقال. مَلَّيسة. فَيْجَن. خُبَّيْزَة. فاوانيا. عَرْعَر. أَبْهَل. عِنْبِيَّة. كَفْنَهُ .

مُعلِّب مُضادّ لداء الحَفَر

مِلْعَقِيَّة (حشيشة الملاعق)، قرَّة العين، نَفُل الماء، عصير فجل الخيل، عصير

	معجون عَسَليّ طارد للدودة الوحيدة
۱ غ	مستخلص (جوز العَفْص)
۷ غ	معجون السَّنا العسليِّ
عند	يؤخذ ٦٠ غرامًا في ٤ جرعات،
	المساء.

معجون عَسَلتي مضادٌ للبواسير مَنّ دموع سولفات البوتاسيوم نيترات البوتاسيوم عسل أبيضكمّية كافية نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها مُعَلَّبات: يؤخذ من ٨ إلى ١٥ غرامًا في اليوم.

معجون عَسَلي مضادّ للتعقيبة

كوباهو دهن النعنع هيدروكلورات المورفين كسبة لوز حلو كمّية كافية لتسع مقادير سكر كمّية كافية لتسع مقادير سكر يُحضِّر وفقًا للطَّريقة المُتَّبعةِ في مُعَلَّب

معجون عَسَلي مضادّ للقوياء

		a
غ	•,10	سليماني أكال
غ	10	سولفات الأنْتي موان
		راتنج الغاياك
غ	۳.	مستخلص الشاهترج
فية	السكري كمّنة كا	شراب قشور البرتقال

النارَنْجَة (أبو صفير)، بكمِّيّات مُتساوية، وكمِّيَّة كافية من السُّكَّر.

مُعلّبات النباتات الجافّة المسحوقة

مُعلّب الورد الأحمر

ورد أحمر مسحوق به الخرامات ماء الورد به الورد به الورد به الورد به الورد في الماء، ونتركه به السنة السنة ساعتين، عندها نُضيف السنة والغليسرين ونجعل من الكلّ مزيجًا متجانسًا.

إن هذا المستحضر هو أقلّ لذَّة بكثير من مُستحضر كُتُب الوصفات القديمة: نَدُقّ في هاون بتلات الورد الغضّة مع ٣ أجزاء من السكّر ونضيف كمّيّة كافية من ماء الورد.

TA٦- مُغَلْسَرَة، مُغَلْسَرات (Glycérés (F

مُغَلْسَرَة بالكلورور الزئبقي، مُذَابَة الكلورور الزئبقي المُغَلْسَرَة

سامة (دستور ۱۹۰۸) - استعمال لغليشرولة الكلوروفورم: بيطرى.

مُغَلِّسَرَة بكلورور الزنك:

كلورور الزنك۱غ غليسرين عليسرين

نُحضِّر بالطَّريقة ذاتها غليسرولات بيكلورور الزَّئبق، كلورور الأَنْتي موان، سيانور البوتاسيوم، اليودور الزَّئبقيّ، الحامض الزَّرنيخي Arsénieux، الحامض الزَّرنيخيك^(۱) مالحده أرسينيات البوتاسيوم، زرنيخات الصوديوم، البوتاس الكاوي، المورفين، سولفات المورفين، الستركنين، الكينين الأتروپين،

مُغَلِّسَرَة الغُرَيّاء:

غُريّاء ٢ أجزاء غليسرين ٨ أجزاء

ضدّ الشرث، والخَصَر والحروق.

مُغَلْسَرَة الكلوروفورم:

كلوروفورم ٢٠٠٠ خاسترين إنكليزي ٢٠٠٠ خاسترين إنكليزي ١٩٠٠ الكلوروفورم إذا استبدَلْنا نِصف كمِّية الكلوروفورم بصبغة الزَّعفران، نَحصل على الغليسَرولة المُضادّة لحكَّة الأسنان الأوّل الشَّديدة. عِدّة نقاط في فَركات على اللَّثِين لكي نستبدل شراب الأسنان السُّكري. وقد أعطى كارِّيه التَّركيبة التّالية لغليسَرولة الكلوروفورم:

غ	۲	•	كلوروفورم	
غ	٤	٥	غليسرين	
غ —	۲	•	كحول	

١٠٠ غ (١) التَّسمية للمؤلِّف.

704

م غ ل

الغليشرين هو أفضل سَوَّاغ لاستعمال الكلوروفورم الدّاخليّ.

١٨٧- مَغْنُولية بَحْريّة اللّون Magnolier glauque, Magnolier de Virginie (F) Magnolia glauca, Magnolia virginiana **(S)**

جَنْبَة من فصيلة المَغْنُولِيَّات تعلو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها نصف مُعبلة، بيضيّة الشَّكل المُتطاول، فاتحة اللُّون الأخضر على صفحة النَّصل العُليا، بَحريّة اللُّون على الصَّفحة السُّفلي. أزهارها بنضاء قطرها من ٨ إلى ١٠ سم، رائحتها مُستحبَّة حدًّا.

لحاؤها الذي يَتقارب من لحاء السَّاصَفراء، نُصِح به كعقّار مُعرِّق قَويّ في حالات الرّوماتيزم وكطارد للحُمّي. خشبها يُدعى «خشب القديسة لوسيّة».

أنواع أخرى طبيّة:

(١) التَّسمية للمؤلِّف.

مَغْنُولية كُوبُس^(١) M. Kobus، شجرة مهدها اليابان يبلغ ارتفاعها ٢٠ مترًا، حملها شبه هرمى الشَّكل، أوراقها مُعبلة، أِزهارها ناصعة اللُّون الأبيض. أوراقها وفروعها تُعطى زَيتًا دُهنيًّا يُدعى «دهن الكوبوشي»، وهو يحتوي على سيترال، أنيتول، مَتيل شافيكول، إلخ.

المَغْنُولِية العَذْبَة (١) M. Suaveolens،

إستنادًا إلى الدكتور موردوك، إن والمَغْنُولية التَّمينة (١): M. Preciosa, إلخ. بزورها طاردة للحُمّى وأزهارها عِطْريَّة تُستخدم في صناعة العطور.

۲۸۸- مُغوّلات Alcoolés (F)

مُغَوِّل الحامض السُّولْفُوريك، ماء رابَل، نِقاط حامضة مُقَوِّية، حامض سُولْفُوريك مُلَطِّف Alcoolé d'acide sulfurique, Eau de Rabel, Gouttes acides toniques, Acide sulfurique dulcifié (F)

حامِض سُولفوريك مَخْزنتي١٠٠ کُحول ۹۰ درجةکول ۹۰ درجة خَشْخاش مَنْثُور

نَمزُج على مهل بسكب الحامض فوق الكحول؛ نُضيف بَتَلات الخَشْخاش إلى المزيج بعد أن يبرد؛ نَمْرُث الكلّ لمدّة ٤ أيّام؛ نُصفّى. (كودكس ١٩٣٧).

خطر - الجدول Dangereux - Tableau C

الخصائص - قايض، مُطهِّر، رَقُوء. غرام واحد من الدّاخل في مقدار ١٢٥ غرام ماء؛ استُعمل هذا المُغوَّل أحيانًا وهو مُشَعْشَع جدًّا في زَرْقات؛ ويُستعمَل كذلك أحيانًا لوقف سَيلان الدم الذي يَتَسبُّب عن وَخْز العَلَقِ. يُحضُّر منه أيضًا شراب رَابَل.

تَذكُر الفَرْماكوبيات الألمانية مُستحضَرين مُماثلين للكحول السولفُوريك، هما:

°۱ - إكسير ديبًل الحامض المُركّب من

حامِض سُولفوريك ٣٠، كحول ١٥٠. نُلوِّن هذا المزيج بواسطة ٨ من الزَّعْفَران ومثله من القِرْمِز الحَيَوانيِّ.

٣ - إكسير هالر الحامض أو ليكور هالر الحامض المُركَّب من الحامض والكحول بالتساوي. إن ماء رابل تقع إذًا في وسط هَذين المُستحضَرَين، بالنِّسبة لقُوَّتهما.

- ٢٨٩ مُغَوّل النَّفْتالين، صِبْغة النَّفْتالين Alcoolé de naphtaline (F)

نَفْتالِين نَفْتالِين ماء حَياة ٥٨ درجة ٣٠

نُذَوِّب. إقتُرِح هذا المُغَوِّل لكي يَحلَّ مَحلَّ ماء الحياة المُكَوفَر. كذلك لاستبدال الكحول المُكَوفَر تَمَ اقتراح الكحول النَّفْتالينيّ: نَفْتالين ٣٠، كحول ٣٦ درجة ١٠٠٠.

Alcoolé مُغَوَّل الفوسفور، كحول مُفَسْفَر de phosphore (F)

مُغَوّل البوتاس، مُذابة البوتاس الكُحوليّة Alcoolé de potasse (F)

مُغَوّل البوتاس الكَربُوناتِيّ، صِبغة مِلْح الدُّرْدِيّ، مذابة كربونات البوتاسيوم الكُحوليّة Alcoolé de potasse carbonatée (F)

> نَحْرُق الملح بقوّة في مِذْوَب، نَصُبُه في هاوَن ساخِن، نَسحُه بسرعة ونَسكُب الكحول فوق المسحوق وهو لم يزل ساخنًا.

-۲۹۰ مِلَاط الطَّبَرْخَى، قَرْن اصطناعي Mastica à la Gutta percha, (بيطري) Corne artificielle (F)

غوتا بَرْخا ٢ جزء مشغ أمونياك ١ جزء نُسخِّن في حمّام مريم الطَّبَرْخى وصَمْغ الأمونياك المُقسَّم إلى أدق ما يمكن حتى اللَّيونة الكافية ونصنع مزيجًا جيّد التَّجانس. في الصَّيف نَستعمِل أجزاء متساوية من المادَّتين.

يُستعمل هذا المِلاط لإصلاح الفُتْحات والنُّغرات في أقدام الخيل وللحَدِّ من مساوئ الأقدام السيَّئة التكوين.

صمغ الأمونياك هو صمغ نَبات من فصيلة الخَيْمِيَّات ينبت في العجم.

م ل ا

م ل ع

banana, Lucky banana (E) Bananier fétiche (F) Fetischbanane, Glücksbringerbanane

Musa religiosa (S)

نَبات بَرِّي إفريقي من فَصِيلة المَوْزيّات مَهِدُه المناطق الاستوائية. أرومتُه مُعِقّة. ساقُه تَعلو حوالي ١٠ أمتار. حَمْلُه أقصر وأكثف من حَمْل مَوز الحَبَشة. أوراقه المُضَلَّع تحت القِشرة. فُروعه المُعمَّرة أكثر انتصابًا وجمودًا، كبيرة القَدّ، مُزوّاة قليلًا، مَلْساء ومَرْطاء؛ الفُروع مُتدلِّية الأطراف. نَصلُها جامِد الصَّفحة المالسة، يَحري اللَّون الأخضر. كِياسَتُه كبيرة القدّ، ناريّة القُنابات، أرجوانيّة الطُرْطُب. ثمارُه دقيقة، مُستطيلة، ناشِفة، لا تؤكل. ي

الاستعمال - يُنصح بهذا النوع لزرع

banana, Indian banana (E) Bananier de Chine, Bananier d'Inde **(F)**

Chinesischbanane, Indischbanane **(D)**

Musa Sinensis (S)

نَبات عُشيق مُعمَّر من فَصِيلة المَوْزيّات. وقيل عن مختلف أنواع الملعى إنّها أرومتُه مُعِقَّة. ساقُه تَعلو من ٤ إلى ٨ تَحتوى على عُصارة حامِزة ومُنفِّطة، أمتار. أوراقُه إهْليلجيّة الشَّكل، مُتوسِّطة القَدّ، مُنفرجة الانتشاب. نَصلُها فارش الصَّفحة المُنبسِطة العديمة الالتواء، لَونُه

٢٩١ - مَلْعَى عَنَمِي، مَرْعان، حَبْل مِسْكِي ٢٩٢ - مَوْز السَّعْد، مَوْز الفَأَل Clématite à vrilles, Clématite toujours verte (F) Clematis cirrhosa (S) Evergreen clematis (E) Einfachblättrige waldrebe (D)

نَبات مُعمَّر ليفيّ عارش من فصيلة الحَوْذانِيَّات يَبلغ ١٠ أمتار. جذعه مُغطِّى بِقِرُفِ Rhytidome رَمادي اللَّون البُنِّي؛ وهو ليفي، خشبه قَويّ التَّثْليم الحولية مَرْطاء أو خفيفة الزغب فوق العِقَد. أوراقه مُتقابلة، مُعنَّقة، خضراء، زغبة في فَتاوتها، ومن ثمّ مُستَمْرَطة. النَّصل بسيط، مُسنَّن أو مُفرَّض كبير الأسنان، بَيضوى إلى بَيضوي الشَّكل المستطيل، قَلبيّ القاعدة. أزهاره كبيرة أَجَمات قَويَّة تُقاوم عَمَل الرِّياح. قطرها من ٢٫٥ إلى ١٠ سم، فَرديّة أو من ٢ إلى ٤. كأسيّاتها من ٤ إلى ٥ ٢٩٣- مَوْز الصِّيْن، مَوْز الهند Chinese ذات ٣ عروق مُتفرِّعة، زغبة حريريّة من الخارج. إزهراره من تشرين الأوّل إلى شياط.

> المركّبات والخصائص - ذُكر أن عُصارة أوراق هذا النّبات قليلة المادّة القِلَويّة السّامّة لكنَّها حِرّيفة تَحرُق الجلد.

وإنها كانت تُستعمل ضِدّ السَّرطان. ولكنُّها اليوم غير مُستعمَلة. إلى الخضار الباهت. كِباسَتُه عديدة ماء أكَّال، هيدرولة زئيقية كلسية متوسِّطة الصِّنْف.

> الاستعمال - (راجع مُوزة في المعجم الخامس ص ٢٥٠ رقم ٢٦٥).

٢٩٤- مَوْزِ اليابان، مَوْزِ بَاسْجُو Japanese banana, Basjoo banana (E) Bananier basjoo, Bananier japonais **(F)** Japanisch banane (D)

Musa basjoo, Musa japonica (S)

نَبات عُشبي مُتَشجّر مُعمّر من فَصيلة المَوْزيّات يَعلو من ٢ إلى } أمتار. أوراقُه تَطول من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم وتَعرض من ٥٠ إلى ٨٠ سم. مَهدُه اليابان. نَصْل أوراقه جامد الصَّفحة النَّاعِمة العابقة اللُّون الأخضر. أرومَتُه مُعِقَّة Dragonnant. ساقُه حَمراء اللَّون. كِنَاسَتُه مُنعقِفة مُتَدلِّبة عديدة الأمشاط. قُناباتُه أرجوانيّة. طُرْطُبه مَخروطيّ الشَّكل، بَنفسجي اللُّون. ثمارُه مأكولة مُستحبَّة الطُّعم مُعتدِلة الغَلاظة والطُّول.

المركّبات والخصائص - (أطلب مَوْزَة في المعجم الخامس ص ٢٥٠ رقم . (770

٢٩٥ مياه عِلاجية مختلفة Eaux minérales (F)

الأمشاط. ثماره ضخمة قصيرة مأكولة سليماني أكّال ١٠٠٤ غ ٤ ١٢٠ ماء كلس

نحلّ الملح في مقدار ١٠ غرامات ماء مقطّر ونمزج الكل.

نحرّك قبل الاستعمال (دستور ١٨٨٤).

الاستعمال - لوسبونات للقرحات الزُّهَريَّة وللقضاء على الهوام.

ماء برومُوفُورميّ

بروموفورم ٤ غ ٤١٠٠٠ غ ماء مقطّ

نحفظه في قارورات مقفلة جيّدًا من الزجاج الملوَّن.

ماء بنِّي اللَّون (وَرْلُومُونْت)

غ	١	•		•	 	 				بَوْرَق
غ	٥				 	 		البَنْج	ىلص	مستخ
غ	١	٨	•		 	 	بزة	الخب	جذور	نقيع

الاستعمال - كمادات على إصابات العينين الحادة.

ماء خُزامَي سميث دهن الخُزامي (اللّاوَنْده) ٠٦٠ غ صبغة العنبر ۰۰۰ غ ماء كولونيا

٤١٠٠٠ غ كحول

يشير بعض المؤلّفات باسم «ماء الخزامي الإنكليزي» إلى المستحضر

YOV

م ي ا

م ي ا

- 11-11

	، تعالي ،
٤ ٧٥٠	كحول منقّى
۴۷٥ غ	ماء الورد
٤ غ	دهن البرغموت
۴۰,۳۰ غ	عنبر رماديّ
١٥ غ	دهن الخزامي
۲ غ	نشادر سائل
٠٠٠ غ	مسك
۳۰ غ	أزهار الخزامي
ول على كيلو واحد من	نقطِّر حتى الحص

ماء رَمادي اللّون

النتاج.

۸غ	زئبق
٠٢ غ	حامض نيتريك
	نحلّ ونضيف:

عصير بقلة الخطاطيف ونقيع الأرستولوخيا بالتساوي ٢٧٥ غرام.

نصفّي. ماء كان يستعمل في الماضي في لوسيونات للقرحات الزُّهَريّة.

الاستعمال - القضاء على السَّعْدَانات Condylomes، وهي أورام قنبيطيّة قرب الشرج وأعضاء التناسل.

٢٥٨ ماء غُولارد، ماء أبيض، ماء نباتي كُرة نانسي

معدنتي، ماء زُحَل

۲۰ غ	تحت أستات الرصاص السائل
۹۰۰ غ	ماء النهر
۸۰غ	كحولة شافية للجرح
	نمزج.

في تبخيرات، لوسيونات، ولصوقات، كدواء مجفِّف ومصرِّف.

إذا استبدلنا الكحول بماء الحياة المكوفر، نحصل على ماء غولارد المكوفر. إن دستور أدوية ١٩٤٩ لم يحتفظ إلّا بالماء الأبيض البسيط: Aqua plumbi (تحت أستات الرصاص السائل ٢٠ غرامًا؛ ماء عادي ٩٨٠ غرامًا). أطلب مُذابَة أستات الرصاص القاعدية (دستور ١٩٦٥).

نخض وقت الاستعمال.

إن ليكور تحت أستات الرصاص المحلول الذي يستعمله الصيادلة الإنكليز، يتركّب من ٤ غرامات أستات الرصاص السائل، ٥٠٠ غرام ماء مقطّر، ٤ غرامات كحول.

الماء الأبيض المكوفر يحضر من: ماء حياة مكوفر ٨٠غ ماء أبيض، كمية تكفي لمقدار ١ ل صبغة پاناما ٢٠ نقطة

ملاحظة - عدم الإشراك مع ما يسمّى نقاط غَلَارد البيضاء.

ماء الكُرَة كُرة نانسي ١ (عدد)

ماء غالكمّية كافية م ي ا نترك الكُرة في الماء الغال بضعة دقائق. للحصول على ليتر من النقيع المغلي. الماء المخبّز المحضّر بواسطة شُواية خبز محمّص يعطي مشروبًا أَلَدٌ يكون

ماء مُسَكِّن، ماء نشادري مُكَوْفَر

مقويًا خفيفًا. يؤخذ بكبّايات.

رقم ۱ رقم ۲ رقم ۳ ۲۰ ۸۰ ۲۰ نشادر سائل ١٠غ كحول مكوفر ١٠ ١. ٠٦٠ غ ملح بحري ٦. <u> ۱۰۰۰</u> ۱۰۰۰ غ

نذوِّب الكل على البارد. نخض كل مرّة ماء مُبارَك (شَاريتيه)، جروع مقيِّئ نريد الاستعمال. لكي نتلافى تشكيل حُبيبات الكافور، نصح لاليو بمزج مقتى مقتى وخض المحلول المالح مع النشادر ٢٥٠غ أوّلًا، ثمّ إضافة الكحول المكوفر، ومن ثمّ الماء، وذلك مع التحريك المستمرّ.

الخصائص والاستعمال - يخصص الماء المسكّن القوي، رقم ٣، للأشخاص ذوى البشرة القاسية والجاسِئة الخشنة أو للحيوانات؛ الماء المسكّن المتوسّط، رقم ٢، يصلح في 7,0 غ حال وخز الحيوانات السامة؛ أما الماء المسكّن رقم ١، فهو الماء الذي كان رَسْيائِل Raspail يستعمله عمومًا، وكان إن هذه التركيبة تصلح تمامًا لحاجات حتى يحلُّه بالماء للأشخاص ذوي

يمكن تعطيره إذا أردنا.

٦٠غ إعتمد دستور أدوية ١٩٤٩ تركيبة

الاستعمال - من الخارج على

الكدمات؛ من الداخل، في اليَرَقان وسَيَلان المهبل.

ماء مُبارَك

غ	١	٥	٠.	٠.				 	 	 					٠.		ر	٠	١	فر	-	ساد	a)
غ	٣	٠				 		 				 				٠.				ں	لعر	سو	d
غ	٣	•	٠							 		 						ر	,	کل	,	اء	4
																				-			

نمرّر بعد يومين من النقع.

مستحضر يتقارب من ماء كلس ماء شائع كُرْمَايْكل.

للرشامين

يعطى على دفعتين، تفصلهما ساعة، في حال مَغْص الرسامين (عِلاج شاریتیه).

ماء مُتَأْكُسِج مُبَوْرَق

مستحضر فورى لوقته؛ نحل على البارد:

حامض بوريك ٥,٠غ بَوْرَق في ماء مُتَأْكُسِج مخزني

مبحث أمراض الأذن والأنف والحنجرة. البشرات الحسّاسة جدًّا.

ماء مُخَبَّز

خبز قمح

709

م ی ا

متقاربة من التركيبة رقم ١، ولكنّه حدّدها ﴿ كَبْشُ قُرْنَفُلُ كماء مقطّر. نحصل على هذا الماء قرفة المسكّن بتذويب ٥٣ غرام كلورور دهن النعنع الصوديوم العادي في ٨٨٥ غرام ماء مقطّر، ومن ثمّ بسكب ٩ غرامات كحول مكوفر، ونضيف، بعد الخضّ صبغة العنبر القوى، ٥٣ غرام نشادر سائل عادى.

وقت الاستعمال.

نظام الجدول C.

الخصائص والاستعمال - ضد كبش قرنفل الشقيقة، الاحتقانات والحميات الدّماغية، الإصابات الروماتيزمية. نضع بأديان هذا الماء في كمادات على المكان المؤلم في الرأس، مع الانتباه إلى أن لا يسيل منه في العينين. يقول المؤلّف إن تأثيره سريع دهن نعنع المعنوب جدًّا. ويستعمل أيضًا في لوسيونات كحول ٥٠٠ وتمسيدات ولصوقات، إلخ.

> ولقد تمَّ اقتراح تحضير ماء مسكِّن مُنَفْتَل يُستبدل فيه الكحول المكوفر بالكحول المُنَفْتَانِ.

> > تركيبته هي التالية:

غ	٣	٠	نشادر سائل
غ	٣	•	كحول منفتل
غ	۲	•	ملح بحري
غ	۲	٠	ماء

نمزج.

ماء منظف أسنان

أطلب كذلك: إكسيرات منظّفة أسنان. ٠٣٠غ يانسون

٤١,٢ ٥٧٨ غ قنديد

نمرث لمدّة ٨ أيّام، نصفّي ونضيف: ع غ

منظّف أسنان مستعمل جدًّا. بعض نحفظ في قارورة مقفلة بعناية. نخض المؤلِّفين يضيف إليه ٢ غرام قرمز، ١٥ غرام كينا حمراء.

تركيبة أخرى:

قر فة ق مز ۲٥ غ دُردِيّات حامض البوتاسيوم ۲٥ غ ۲٥ غ ۶ ۸۰۰۰ غ

نجرش الأفاويه ونضعها في الكحول، كذلك نضع الزيت الطيّار. من جهة أخرى، ندق القرمز مع درديات حامض البوتاسيوم وقليل من الماء؛ نضيف هذا الخليط إلى الأوّل؛ نترك الكلّ معًا عشرة أيّام ونصفّي.

٢٩٦- ماه معدنية اصطناعية Eaux minérales artificielles (F)

ماء غازی بسیط , Eau gazeuse simple Solution aqueuse de gaz carbonique **(F)**

إن استعمال الماء الغازي البسيط هو

م ي ا

نمزج للحصول على شراب.

يحرص الصناعيّون على تحضير الليموناضة الغازيّة وفقًا لحاجاتهم، ذلك أنها سيّئة الحفظ، إلّا إذا أضيفت إليها موادّ حافظة مسموحة.

نحضر كذلك ليموناضات بواسطة

شرابات سكّرية من الليمون (حامض)، الكشمش، الفرمبواز، الخَلّ، الرمّان. لتحضير الليموناضات بالكِيْرش، أو الرّوم، أو الكونياك، نمزج ليترين من الشراب السكّري الحامض مع ليتر واحد من الكيرش، أو الروم، أو الكونياك، نستعمل ١٤٠ غرامًا من هذا المزيج في زجاجة ماء غازي. الشراب السكّري الحامض نحصل عليه من ٥٠ كلغ من الماء، ١٦٥٠ كلغ من حامض السيتريك، ومن ١٦٥٠ كلغ من الصمغ المذوّب في مقدار وزنه من

ماء غازي مُنتَرِج، ماء غازي بـ پروتوكسيد Eau gazeuse azotée, Eau الأزوت gazeuse au protoxyde d'azote (F)

الماء.

إن هذا الماء، الذي يُحضّر على غرار الماء الغازي البسيط، هو محلول مُشبَع من پروتوكسيد الأزوت تحت ضغط ٥ إلى ٦ جَوِيّات، أي إنه يحوي ٥ إلى ٦ أحجام من هذا الغاز. وهو، مثله، يمتلك طعمًا سُكّر يًّا مَحسه سًا.

استعمال عاديّ متكرّر. نحصل عليه بتشبيع الماء بحامض الكربونيك تحت ضغط قدره ٧ جَوِّيّات. نستعمله عندما لا نتوخّى إلّا العمل المنشّط الخاصّ بهذا الغاز. إنّ هذا الماء هو بالذات الماء الغازي الذي يُقَدَّم يوميًّا إلى الموائد باسم «ماء سَلْتز» الذي لا يصلح له البتة. وهو ما يصلح كسّوّاغ لمعظم المياه المعدنية الأخرى المُفْتَعَلة المياه المعدنية الأخرى المُفْتَعَلة اصطناعيًّا. ويمكنه أن يستخدم كذلك كسوّاغ لطائفة من المواد العِلاجية الغريبة عن المياه المعدنية.

Eau غازي مُحَلّى، لَيْمُوناضة غازية gazeuse édulcorée, Limonade gazeuse

شراب حامض سکّري ماء غازي۱ زجاجة

نحصل على نتاج ممتاز بالطريقة التالية (حسب سُوبايْران):

۱° - قشور برتقالة غضّة ۱۲ عدد كحول ۳۳ درجة ۱ ل

نمرث لمدّة ٨ أيّام ومن ثمّ نُصفّق.

۲° – حامض ليموني ١ جزء ماء١ جزء

نذوّب.

۳° - صبغة البرتقال أعلاه ۲۰ سنتل محلول الحامض أعلاه ۲۰ سنتل شراب سكرى بسيط ۱۰ ل

۲۹۷ - مَيْسَم، مَيَاسِم، يَافُوْخ (E)

Cautère, Fonticules, Fontanelles (F) Ätzmittel, Brennung (D)

المَيْسَم هو الحديدة أو الآلة أو الأداة التي يُوسَم بها أثر الوَسْم أي الكَيّ. إن المياسم تَخلَّت عن دورها منذ زمن بعيد إلى خُرّاج التَّشْيِت Abcès de fixation. أما المقال التالي عنها فهو من باب الاستدلال والتَّوْثيق. فالمياسِم هي جروح صغيرة هدفها إحداث تَقَيَّح مُصَرِّف في مكانٍ ما والمحافظة عليه.

تُجرى المياسم على الرَّقَبة في إصابات العينين، وفي أعلى الجمجمة Vertex في إصابات المخ، وعلى الذراع في إصابات الصَّدر، وعلى الفخذ أو فوق الرّكبة في إصابات البطن، مع تلافي مجاورة وَتَرِ (طرف عضلة) أو عظمٍ أو وعاء دمويُّ كبير أو عصب ما، مُجاورة كبيرة. ولكى نُحدِث الميسم نجعل في الجلد أحيانًا ثَنْية نَشقُّها بالمِبْضَع ونُدخِل في الشقّ حَبّة الميسم رويدًا رويدًا. ونبدأ أحيانًا أخرى بإحداث نَفْطة نحوّلها إلى ميسم بإدخال حبَّةٍ في وسطها على مهل. وفي أكثر الأحيان نُحدِث الميسم بواسطة مادَّة كاوية. في هذه الحالة نَقصّ قطعة لَصْقَة مُشَمَّعة قطرها من ٤ إلى ٦ سم ونجعل في وسطها تقويرة مستديرة على قدر الجرح الذي نريد إحداثه؛ نضع اللَّصْفَة المُشمَّعة على الجلد؛ نضع حَبَّة

حَجَر الميسم في التّقويرة حيث نُثبّتها بقطعة أخرى من اللَّصقة المُشَمَّعة Sparadrap .

إن استعمال حَجَر الميسم Pierre à cautère أهمل اليوم بشكل كامل تقريبًا لكى يَحلّ محلّه مسحوق ڤيينًا الأقلّ منه تَلَيُّنَّا وانسيالًا. ومهما يكن من أمر، نرفع الأداة التي وضعناها بعد مرور ١٠ إلى ٣٠ دقيقة؛ نَشْقَ الجُرح على شكل صليب بواسطة المِبْضع أو سكّين حادً؛ نَرْفع البَضْعات الأربعة ومن ثمّ نضع مَيْسَمًا مكانها (البعض ينتظر حتّى تقع النَّدَبات لوحدها، ممّا يستوجب من ٥ إلى ٦ أيّام). عندما يدخل الميسم مكانه نبدأ بالتضميد: فنضع فوق الميسم أوَّلًا قطعة من الورق أو من التفتة المُبَرِّدة؛ نُثَبِّت الكل بضماد من القماش أو أفضل من ذلك، نُثبِّته بواسطة صفيحة مَيْسَم Plaque à cautères أو بواسطة رَبطة ذراع مطّاطيّة، من التَّنك أو من الخَشَب المُلَبِّس. إن وسائل الضماد الجيّدة تسهّل العناية بالجرح كثيرًا. نغيّر الميسم كل ٢٤ ساعة بشكل عام.

إذا التهب الميسم نطرد الالتهاب بواسطة لَصُوقات، وإذا أحدث حَكّة وكان محيطه ينزّ دمًا نغسل المحيط بالماء الأبيض (أي ماء غُولارد: أطلبه). إذا أنْتَن نستخدم ضمادات كلورورية أو ضمادات من ميسم من الفحم؛ ومن ثم نتلف النتوءات

. infernale

إذا لم يعمل الميسم بالإمكان تنشيطه

والانتفاخات الدهنيّة التي قد تتشكّل غالبًا بتغليف حَبَّته بالمرهم المهيِّج أو المنفّط م ي س حول الميسم بواسطة الشُّبّ المحروق أو (كمرهم الخردل مثلًا) أو بمرهم بواسطة حَجَر جهنّم أي حَجَر الكّي Pierre البازِيليكُم وإمّا باستعمال حَبّة ميسم مُسَيِّلَة للقَيْح.

۲۹۸ - نَخْلُ مَلَكِيّ Royal wine palm (E) Palmier royal, Oréodoxe royal (F) Königspalme (D) Oreodoxa regia (S)

شجرة معمّرة من فصيلة النَّخليّات. ساقها هزيلة، مِغزليَّة الشكل، تعلو حوالى ١٥ مترًا. أوراقها إكليليَّة التَّجميع الهامي، خفيفة التَّقَوُّس، طولها من متر إلى متر ونصف، شُدفاتها ضيّقة، طويلة الرأس المستدق، لامعة اللُّون الأخضر، طولها ٣٠ سم. أعناق الأوراق مُغمِّدة، سَرْحَة. الأزهار وحيدة المسكن. مبيض ثلاثى الخُدور.

- ٢٩٩ نشاء البطاطا - ٢٩٩ de terre (F) Amylum solani (S)

tuberosum، تحضيره بسيط جدًّا. نبرش الدَّرنات ونُقطِّع اللَّبِّ في الماء ونَضع ميكرون، ولها سُرَّة مَرْكَزيَّة قليلة البُروز، الكلِّ في منخل؛ يحمل الماء النَّشا معه وهي مُجرَّدة من الخُطوط المُتراكِزة. عندما يمرّ بالمنخل؛ نترك للراحة، نُصفِّق وتكشِف في الضَّوء المُسْتَقْطَب بوضوح ونغسل الرّاب النَّشويّ حتّى يُصبح أبيض اللُّون تمامًا. نَسْتَنْضبه على القماش، ومن السُّرَّة.

ثمّ نُجفِّفه في الهواء الطلق أو في المِحَمّ. يَتَأَلُّف نَشَا البطاطا من حبَّات مُنعزِلة، بيضانيّة الشَّكل بمعظمها، مع طبقات مُتراكِزة واضحة جدًّا وطرف ضيّق يُظهر سُرّة مُنحرفة المركز. وتكون تلك الحبّات النَّموذجيَّة مُترافِقة مع حبَّات أخرى أصغر منها، مستديرة الشَّكل أو مبتورة، تلتحم فيما بينها أزواجًا أو ثُلاثًا، وتكون طبقاتها المُتراكِزة أقل وضوحًا. يختلف طول الحتات من ١٥ إلى ١١٠ ميكرونات.

يُمثِّل هذا النّشاء صفات نشا القمح الكيميائية، ولكنه يُعطى صمغًا خفيفًا Empois أكثر شَفافيّة وأقلّ ميوعة. وهي تعطى في الضوء المُسْتَقْطَب ظاهرة الصَّليب الجديد الوَقتى Croix nova الواضحة تمامًا.

يُحضَّر من هذا النّشاء عَصيدات مُغَذِّية ويُستعمل كذلك في لَصُوقات.

٣٠٠- نَشَاءُ الرِزّ Amidon de riz (F) Amylum oryzae (S)

يُستخرَج من بُرَّة الرِّز Oryza sativa من فَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّاتِ. يظهر هذا النَّشاء تَحت نَشاء يُستخرج من دَرَنات Solanum المِجهر على شكل حُبوب صَفّاحِيّة بسيطة أو نادرًا مُرَكَّبة، عَرضها من ٢ إلى ١٠ عن ظاهِرة الصَّليب الأسود المُركَّز على

- (أطلب: نشاءات مَخْزَنيّة في المعجم الثاني ص ٢٧٩ رقم ٣٤٢).

Red clover, نَفَلُ المُرُوحِ، نَفَل بَنَفْسَحِيّ، بَرُسِيم أَحْمَر، رَطْبَة Meadow clover, Purple clover (E)
Trèfle des prés, Trèfle rouge, Trèfle violet, Trèfle commun, Triolet, Tramène, Lucotte (F)
Klee, Roteklee, Wiesenklee, Rotod-kopfklee (D)
Trifolium pratense (S)

نَبات عُشبي مُعمَّر، مُستمرط أو لاصِق الهُلْب، من فَصيلة القَرْنِيَّات، له أَرُومة كثيفة وضُمّة من الأوراق القاعِديّة. ساقه مُنتصبة، مُزَوّات، أو صاعدة، تَعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أُذَيْناتُها غِشائية، بَيضاوية الشَّكل، تَنتهى فجأة إلى عرفٍ قَصير شائك. أوراقُه بَيضاويّة أو مُستطيلة الشَّكل، العُليا منها حادَّة، الباقية مُنفرجة، وهي ثُلاثيّة الأقسام، مُتعاقبة، وريقاتها ذات بقعة بَيضاء اللَّون، سَهْميَّة الشَّكل المُميَّز. رُؤيساته الزَّهريّة هاميَّة الارتكاز، نصف كُرويَّة أو بَيضاويَّة، مُقَلَّفة بزوج من الأوراق، تَنْحَسِر أحيانًا إلى أُذَيناتها، طولها وعرضها من ٢ إلى ٢,٥ سم. الكأس خَيطيَّة الأسنان. التّاج أرجوانتي اللُّون الوَرديّ.

المُركِّبات - مَوادَّ عَفْصِيَّة، عَلوَّكُوسيدات، حَوامِض عُضُويَّة، مَوادَّ مُلوِّنة.

الخصائص - صَدريَّة، نافِعة للمَعِدة. الاستعمال - الرُّؤيسات المزهِرة: برونشيت، سُعال، بَحَح وتَلَف الصَّوت، إسهال، حَمَّامات خارجيَّة، أمراض جلديَّة.

طريقة الاستعمال - نُقاعة من ستّ ملاعق صغيرة من الأزهار في ليتر ماء يُغلى قليلًا ويُغطَّى عشر دقائق. يُصفَّى ويُؤخَذ بكامله خلال النَّهار. يدخل نَفَل المروج في تركيب مَخاليط نافعة للصَّدر ونافعة للمَعدة؛ وهي بالإضافة إلى ذلك، ذات عمل مُصلِح للطَّعم والرّائحة. حَمّامات خارجيّة ولُبْخات مُرَطَّبة من النُقاعة لمعالجة الأمراض الجلديّة. نَبات مِغشَرَى هام جدًّا.

Gouttes (F) نقاط -٣٠٢

نقاط روسِيَّة مضادّة للكوليرا:

بتأثير الكوليرا. المقدار هو ١٥، ٢٠ أو ٢٥ نقطة في كباية صغيرة من الخمر الجيد. نكرّر هذا المقدار من نصف ساعة إلى نصف ساعة حتى حصول ردّ الفعل.

ن ق ا

غ	روم الغيّاك۸	نقاط طاردة للدود:	ن ق ا
غ	يود	مستخلص قشرة الجوزة الخضراء ٨ غ	
غ		ماء القرفة ١٠٠ غ	
غ		مئة نقطة في اليوم.	
	تؤخذ نقاطًا .	نقاط مضادة لاعتلال المفصل:	
		صبغة بزور السورنجان ٤ غ	

٣٠٣- هُباب، دُخْنَة، سُخام Noir de fumée (F)

أسود الدُّخان هو مادّة تَحصل من حرق الفُضالات الرّاتنجيّة غير المُستعمَلة، نفلشه فوق الموقد.

٣٠٤- هُرْبُون مُقَلْنَس، دَرَقَة مُقَلْنَسَة (١) Skull cap (E) Scutellaire galériculée, Herbe judaïque, Toque (F) Scutellaria galericulata (S)

نَبات جوانب الحُفر والخنادق المائتة في عِدّة مناطق أوروبّية، من فصيلة الشُّفُويَّات. رائحته ثوميّة خفيفة، طعمه مرّ، تفاعله الكيميائي حامض.

الهُرْبُون الجَانِبيّ الوَرَق (٢) Scutellaria laterifolia 1.

نبات الولايات المتّحدة الأمريكية وكندا حيث يشتهر فيها كدواء مضمون ضدّ الكَلَب.

(٢) التَّسمة للمؤلِّف.

تَمَّ استعماله كمضادّ للذَّبحة، وطارد للدود، ونافع للمَعِدَة، ومُضادّ للكَلّب: Antilyssique. دُعى قنطريون أزرق، Tertianaria، بسبب خصائصه الطاردة للحُمّى التي كانت تُنسب إليه. في الهند يُستعمل ضِدّ الأطام (أي اضطراب البَيْلة) و ضدّ التَّعقسة .

إستخرج منه العالمان كاديت وغاسيكورت عام ١٨٢٤، هيتروسيدًا مُرًّا دُعى سكُوتَلارين الذي وُجد أيضًا في عدّة أنواع أخرى من الجنس عينه نَلتقطها ونجمعها بواسطة قماش خشن والذي عُرف تركيبه الكيميائي فيما بعد كالتَّالَى C₂₁H₁₈O₂؛ وهو يَتَحلُّل مائيًّا إلى سكوتلارايين وإلى حامض غلىكورونىك.

الهُرْبُون الهنْدِي (٣) Scutellaria indica L. هو نبات مُعمّر من فصيلة الشَّفُويّات، في ضمّات كثيفة تعلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أزهاره لازوردية اللون، سُنبلية التَّجميع الطُّويل الهاميّ الإرتكاز. مهده اليابان والصين، حيث يُستعمل كطارد للحُمّى. إسمه المحلّى Curanga.

ه ۲۰۰ مِنْدَبِ Pissenlit bessarabique $(\mathbf{F})^{(4)}$

Taraxacum bessarabicum (S)

نَياتِ مُعمَّرِ هزيل من فصيلة المُركَّبات، وَبْره متفرِّق النُّمو يبرز خاصة تحت

هن د

⁽١) التَّسمِيتان العربيَّتان والتَّسمية الفرنسيَّة الأولى

⁽٣) التَّسمية العربيَّة للمؤلِّف.

⁽٤) التَّسمة الفرنسيَّة للمؤلِّف.

الرَّؤيس، أوراقه عَمليًّا مَرُّطاء، لَحميَّة إلى أورويًّا. وهو النَّبات الذي يُطلَق بعض الشَّيء، قليلة التَّفصيص. على قشرته اسم هوانغ نان التي مُجِّدَت فصوصها ضيِّقة الشَّكل المثلَّث. قُنابات القُلافة ضيِّقة، مخطَّطة باللَّون البُنِّيّ المحمر. أزهاره ذهبيّة اللُّون الأصفر، أرجوانيّة اللُّون الأحمر من الخارج. أكناته رَماديّة اللَّون البُنِّي، شَوكيّة نُحو رأسها. يزهر في الخريف في الأتربة القليلة الملوحة، من ٧٠٠ إلى ٢٥٠٠ مترًا.

هِنْدَبِ أَسْمَانِيُّ (١) Pissenlit assemani **(F)**

Taraxacum assemanii (S)

نَبات مُعمَّر من فصيلة المُرَكَّبات موبر في قاعدته فقط. أوراقه ضيّقة الشَّكل السِّنائي البيضاوي، أسنانها حادة؛ فصوصها كبيرة القَدّ. القُنابات القُلافيّة الخارجيّة قاتمة اللَّون البُنّي إلى الأسود، فاتحة الحافة. أزهاره باهتة اللُّون الأصفر. الأكنات باهتة اللَّون الأصفر. يزهر في الصيف، في المواقع الرطبة، خاصة في الأتربة الكلسية، من ٧٠٠ إلى ٣٠٠٠ مترًا.

هُوَانْغ نَان، ستريكْنُوس غُلْطَارِيّ (٢) Hoang-Nan (F) Strychnos Gaultheriana (S)

نَبات سامّ جدًّا من فَصِيلة اللُّوغانِيَّات، أَدخَلَه المُرْسَلُون عام ١٨٧٧ من تُونُكن

كدواء للكلّب والبَرَص وبعض الأمراض الجلديَّة. وكان يُقال إنَّه لا يُستعمل من تلك القشرة سوى الغُبار المُحَمر اللَّون الذي يُغَطِّيها (وهو أُشْنَة)، وهو مزيج من الشُّبِّ ومن رَهْج الغار أي الزَّرنيخ الأحمر Réalgar. القشرة الخارجية تكون مَغْراء اللُّون الأحمر، ونادرًا ما تكون مُسودّة اللُّون الرَّماديّ. مكسرها واضح، يُظهر خَطًّا مُبيَضِّ اللَّون، تَتميَّز به قشرة شُجرة جوز القَيء Strychnos Nux-Vomica التي تمتلك كافّة مواصفاتها تقريبًا، باستثناء عناصرها المُتَخَشِّبة النَّادرة التي تكون في حُزَمِها اللِّفيَّة النَّجَبيَّة.

المُركّبات - أظهر التّحليل الكيميائي أن الهوانان يَحتوي على قِلُويدات جَوز القَيء ذاتها وبالنِّسب عينها تقريبًا، وهي ٥٪ من الستركنين والبروسين.

الخصائص - مُقوِّية عَصبيَّة وعَضَليَّة، هاضمة، ناعِظة، مُزيلة للألم.

الاستعمال - نُقاهات، كسل المَعِدة، عجز جنسي، رُوماتيزم، آلام الأعصاب.

طريقة الاستعمال - من الدّاخل: مَسحوق بمقدار ٥,٠٥ إلى ٢٠,٠ غرامًا في اليوم، في أقراص من ٠,٠٥ غرامًا للقرص الواحد. مُستخلَص مائتي كُحولتي بمقدار ٢٠,٠٠ إلى ٠,٠٥ غرامًا في اليوم.

⁽١) التَّسمية العربيَّة والفرنسيَّة للمؤلِّف.

⁽٢) التَّسمتان العربَّتان للمؤلِّف.

خَليط مُشَهِّ: صِبغة هُوانان ٤٤، صبغة جُنْجُل ٦غ، صِبغة نَفَل الماء ٥غ، صبغة

الشُّوكة المُبارَكة ٥غ، كُحولتور عُشبة الشُّفاء ١٠غ؛ يُؤخَذ من هذا المزيج ٣٠ نقطة مع قليل من الماء، قبل الوجبتَين

الرَّنستَّيْنِ.

من الخارج: تُستعمل صبغة الهوانان في مَرُوخ وتَمسيدات مَوضِعيّة. مُستخلص القشرة الكُحولي يكون بُرتقاليّ اللَّون الأصفر، مُرّ الطَّعم جدًّا، يذوب في الماء. مَحلولُه يعطى كافَّة التَّفاعُلات الكيميائيّة التي تُشير إلى وجود القِلَويدات. من جهةِ أخرى، دكَّت التَّجارب التي أُجريت على الحيوانات أن مستخلص الهوانان يَعمل بالطريقة ذاتها التي يعمل بها البروسين والستريكنين.

٣٠٦- هُوْرا البرازيل، أَسَّاكُو^(١) Bresilian Sandbox (E) Sablier du Brésil, Hure du Brésil (F) Brasilianisch Sandbücksenbaum (D) Hura brasiliensis (S)

شَجرة من جنس هُورا وفصيلة الفَرْبِيُونِيَّات يُطلِق عليها البرازيليون اسم Assacou «أسّاكُو»، تحتوى بدورها أيضًا على عُصارة كاوية يستخدمها أهل يارا الأصليون، لمعالجة البَرَص، من بين الأمراض الأخرى التي يستخدمونها في

(١) كل التَّسميات للمؤلِّف ما عدا اللَّاتينيَّة.

(٢) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

معالجتها أبضًا.

قشرة الأستاكُو صلبة، سميكة، مُرمدة اللُّون، عديمة الرّائحة، بالكاد حامزة الطعم، أعطيت، على شكل مستخلص، بمقدار ۰,۰۱ إلى ٠,٠٥ غرامًا، وعلى شكل نقاعة، في معالجة البَرَص. بمقادير مرتفعة تصبح مقيئة ومسهلة قوية.

(أطلب كذلك هورا مُفَرقِعَة في المعجم السّادس ص ٢٤٩ رقم ٣٠١).

٣٠٧- هِيلُونيا هیلُونیا صَفْراء ، كارُولينا(٢) Hélonias Jaune (F) Helonia dioica, Chamælirium carolinianum (S)

عُشبة مُعمَّرة ذات ريزوم أمْرَط من فصيلة الزَّنْبَقِيَّات تَنبِت في مناقع أميركا الشِّماليّة. أوراقها جَذريّة دائمة، مُغَمِّدة، سِنانيّة حادة. أزهارها سُنبليّة التَّجميع الكثيف فوق شِمراخ مُنتصِب يعلو نحو ٣٠ سم. غلاف الزُّهرة دائمًا، مُتورِّد اللُّون. الأسدية ستة، الأقلام ثلاثة. الشَّمرة عُلَيبة بَيضانية الشَّكل، ثُلاثيَّة الحُجُرات المتباعدة.

الخصائص والاستعمال - ريزوم الهيلونيا الصَّفراء دَرَنيّ يحتوي على صابونِيْن. وهو يَتمتَّع بخصائص مُبوِّلة وطاردة للدّود، ولكنّه أكثر ما يُستعمل كعقّار مُقوِّ في التَّريَّة أي سَيَلان المَهْبِل،

وفي انقطاع الطُّمْث، وعُسُر الطُّمْث، جزءًا من الأثير. والسَّيلان المَنوي، وكسل الأعضاء التَّناسُليَّة .

وهو يُستعمل أحيانًا لغش عِرْق الذَّهَب. طريقة الاستعمال - مسحوق الرّيزوم، من ٣ إلى ٦ غرامات، مَرّة أو مَرّتين في اليوم؛ مُستخلَص مائع، من غرام واحد الملح ثابتًا بشكل جيّد عند ١٠٠° سغ إلى ٥ غرامات؛ صبغة كحوليّة، من ٢ إلى ٨ غرامات في اليوم.

> ٣٠٨- هيُوسِيَامِين (سولفات) Hyoscyamine (Sulfate d') (F)

 $(C_{17}H_{23}O_3N)2$, H_2SO_4 $2H_2O=713$. يَقع سولفات الهيوسيامين في إبر بَيضاء

اللُّون دقيقة، مُتَزَهِّرة، تنصهر عند ٢٠٦° سغ (ملح لامائيّ) تذوب في ٠,٥ جزء من الماء عند ١٥° سغ، ٤,٥ أجزاء كحول ٩٠ وتحت الجلد. درجة، وفي ٤٢ جزء كحول صرف، ٢٣٠٠ من الكلوروفورم، وفي ٢٥٠٠

يحتوي على ٨١,١٨ من الهيوسيامين، ١٣,٧٦ حامض سولفوريك، وعلى ٥,٠٦٪ من ماء التبلّر.

وهو مُياسِر.

في محلول مائي متعادل، يكون هذا (الانتباه إلى استعمال كباية متعادلة تمامًا). طعمه مرّ. يعطى تفاعلات الهيوسيامين المتميزة وتفاعلات السولفاتات.

طريقة استعماله - مقاديره الاعتياديّة عن طريق الفم أو تحت الجلد: ٢٠ الملغ للجرعة الواحدة، بم الملغ لكل ٢٤ ساعة عند البالغ.مقاديره القصوى: أطلب هيوسيامين، عن طريق الفم

سامّ. - جدول Toxique. - Tableau A

العُليا إهليلجيّة سنانيّة أو بَيضاويّة ون ك مُتطاولة، مُخفَّفة الطَّرفين، كلُّها قصيرة الهُدْب الدّقيق الصلب على الحوافي. سُويقات إبطيّة، تساوى أو تتخطّى الأوراق. فصوص الكأس خَطِّيَّة سِنانيَّة، حادة، قصيرة الهُدب الصَّغير على الحافّة، مَرّتان أقصر من الأنبوب التاجيّ. جِرَابيات متوأمة، مُقوَّسة، دقيقة التَّخطيط، ملساء. يزهر من آذار إلى نيسان في الأراضي الصَّخريّة والأماكن الحرجيّة.

> الخصائص والاستعمال - ذُكر أنّه من الأنواع المُستعملة في التَّداوي الشَّعبيّ إلى جانب الونكا الكبيرة والصّغيرة وسواهما، خاصة في منطقة أوروبا الشُّرقية.

٣٠٩- وِنْكَا عُشْبِيَّة، عِنَاقِيَة عُشْبِيَّة، قَضَاب مُسَطِّح^(۱) **Herbaceous** periwinkle (E) Pervenche herbacée (F)

Grasartig sinngrün (D)

Vinca herbacea (S)

نَبات عُشبي مُعمَّر من فصيلة الدِّفْلِيَّات. سوقه كلُّها نائمة أو مُرْتَدَّة على الأرض، غير مُتجذّرة، طولها من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه قصيرة الأعناق، السُّفلي بَيضاويّة،

⁽١) التَّسميتان العربيَّتان والتَّسمية الإنكليزيَّة

حتّى الهَذَيان الغاضب العنيف.

ي

ملاحظة - ورد اسم الفصيلة «مَللابِيَّات» Malpighiacées في الموسوعة في علوم الطَّبيعة، وهو اسم اقترحه إدوار غالب.

اکبی (۱۰ کانجی) کانجی (۲۱۰ کانجی) Yagé, Ayahuasca, Caapi (F) Banisteria caapi (S)

اليَاجَة نبات عارش في أحراج أمريكا الجنوبية من فصيلة المَلْبِغِيَّات (٢)، وهي فصيلة أجناسها ٥٠ وأنواعها ٢٠٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية الأمريكية. جميعها أشجار وشجيرات وجَنْبات. أوراقها متقابلة معنَّقة بسيطة أو مركَّبة. أزهارها خماسية البتلات، عنقودية التَّجميع، صفراء اللَّون أو بيضاء أو حمراء. ثمارها عُلَيبات عديدة البزور.

جنس نباتات مُعايِشة مُلازِمة، غير طُفيلية، من فصيلة السَّحْلَبِيّات، ذات دُرينات كاذبة مزدوجة الأوراق. أوراقها واسعة، متموِّجة، عناقيدها الزَّهرية مُتدلِّية، شحيحة الزهر. زهرتها كبيرة تعتبر واحدة من أغرب أنواع السَّحْلبيّات بشكلها. تزرع في سِلال مُعلِّقة، في سماد من طُحْلُب المناقع والخنشار. أما اليوهيمُب المُعايِش فشَجرة تنبت في الغابون، وأواسط الكونغو، والكامرون الغابون، وأواسط الكونغو، والكامرون عي شجرة يُذكِّر مظهرها حيث يطلق عليها اسم Yumbehoa أو السَّنديان، طبيّة سامّة يندرج قلويدها في المحدول A، أدخِلت قشرتها عام ١٨٩٦ إلى الخزانة الطبيّة الأوروبيّة.

المُركِّبات - إستُخرِج من الياجَة قِلَويد بِلَّوري يُدعى ياجايين أو تَلاپاتِيْن، يماثل الحَرْمِيْن الموجود في الحَرْمَل أي غَلْقَة الذَّئب.

الخصائص والاستعمال - يُحضِّر أهل بالسِّنديان، طبَّية سَّامة يندرج البلاد الأصليّون من الياجّة مشروبات الجدول A، أدخِلت قشرتها تحدث اضطرابات مَرثيّة ملوَّنة، ومن ثمّ إلى الخزانة الطبيّة الأوروبيّة. لا تناسقًا مُحرِّكًا، وتَهيُّجًا عنيفًا قد يصل

المُركِّبات - في القشرة ٤ قلويدات على

⁽١) التَّسميات العربيَّة للمؤلِّف.

⁽٣) التَّسميتان العربيَّتان للمؤلِّف.

الأقل، أهمّها اليُوهِمْبِيْن. إستخرج كارَّر من ماء تبلير اليوهمبين قلويدًا دعاه كُورِينَنْايِيْن، وهو مزيج من ٣ قلويدات فصلها العلماء إلى كُورِيْنَنْيْيدِيْن أي أَلْفا يوهمِبين، كُوري - يَوهمِبين، كُوري - نَنْاييدين؛ القلويدان الأخيران لهما نواة أساسيّة مختلفة عن نواة اليوهمبين.

الاستعمال - أهل البلاد الأصليون يستعملون نقيع القشرة كطارد للنوم Somnifuge وبنوع خاص كناعظ. القشرة فعالة ضدّ الاضطرابات الحيضيّة. وهي ليست سامّة. تُستعمل في صبغة بمقدار ١ إلى ٣غ في جَرُوع، أو خليط؛ في مستخلص مائع، بمقدار ٥٠٣٠غ إلى غرامًا واحد؛ مستخلص

مائي كحولي من ١,١٠ إلى ٢,٠٠ غرام. وهي مستحضرات تؤخذ في العجز الجنسيّ والبرود الجنسيّ، وشحّ الطَّمث وعسره، وارتفاع التَّوتُّر الشِّريانيّ، مرض Raynaud، شَرَث، خَصَر، إمساك مزمن. ملاحظة - إن النَّوع يُوهِمْب ترِيلًّازِي (١) Pausinystalia Trillesii

الفُوِّيَّات الذي ينبت في الكونغو حيث الفُوِّيَّات الذي ينبت في الكونغو حيث يُطلِق عليه الزِّنوج اسم Endun، هو نوع يختلف قليلًا عن اليوهمب المُعايش؛ تحتوي قشرته على قلويد يعتقد بعض الكيميائين أنّه مماثل لليوهِمْبين.

ی و ه

⁽١) التَّسمة للمؤلِّف.

مَلاحِق/ Appendices مَلاحِق

YVV	الفصائل النَّباتيَّة	-	١
	عربيّ - فرنسيّ - لاتينيّ - إنجليزيّ		
۲۸۰	المُركِّبات الكيميائيَّة في النَّباتات	-	۲
	فرنسيّ- عربيّ		
٣٠٤	الوَصْفات الطِّبِّيَّة	-	٣
	فرنست - إنجليزي - عربي		

١ - الفَصائِلُ النَّباتيَّة

عَرَبِيّ - فَرَنْسِيّ - لاتِينيّ - إنجْليزيّ

Araliacées (F) Araliaceæ (SE)	أَرَالِيًّات
Ulmacées (F) Ulmaceæ (SE)	٠٠. اَنْجُرِيَّات
Combrétacées (F) Combretaceæ (SE)	إهْلِيْلَجِيًّات
Solanacées (F) Solanaceæ (SE)	ءِ مِنْ رِبِ باذِنْجانِيَّات
Sterculiacées (F) Sterculiaceæ (SE)	برازيًّات
Bérbéridacées (F) Berberidaceæ (SE)	ؠؘۯؙؠؘڔۘؠڛؚؾۘٵت
Polygonacées (F) Polygonaceæ (SE)	بَطْباً طِيَّات
Anacardiacées (F) Anacardiaceæ (SE)	بُطْمِيًّات
Balsaminacées (F) Balsaminaceæ (SE)	بَلْسَمِيْنِيًّات
Typhacées (F) Typhaceæ (SE)	بُوْطِيَّات
Moracées (F) Moraceæ (SE)	تُوْتِيَّات
Borraginacées (F) Borraginaceæ (SE)	ج مْجِمِيًّات
Plantaginacées (F) Plantaginaceæ (SE)	حَمَلِيًّات
Renonculacées (F) Ranunculaceæ (SE)	حَوْذانِيَّات
Malvacées (F) Malvaceæ (SE)	خُبَّازِیَّات
Artocarpées (F) Artocarpæ (E)	خُبْزِيًّات
Papavéracées (F) Papaveraceæ (SE)	خَشْحاشِيَّات
Ericacées (F) Ericacæ (E)	خَلَنْجِيَّات
Caprifoliacées (F) Caprifoliaceæ (SE)	خَمانِيًّات
Scrofulariacées (F) Scrofulariaceæ (SE)	خَنازِيْرِيَّات
Ombellifères (F) Umbelliferæ (SE)	خَيْمِيَّات
Dipsacées (F) Dipsaceæ (SE)	دِبْساسِیًّات

YVV

Apocynacées (F) Apocynaceæ (SE)	دِفْلِيًّات	
Plombaginacées (F) Plombaginaceæ (SE)	َ رَصَاصِیًّات رَصَاصِیًّات	
Aristolochiacées (F) Aristolochiaceæ (SE)	َ زَراوَنْدِیَّات	
Liliacées (F) Liliaceæ (SE)	رَ نُفَقِيًّات رَنْفَقِيًّات	
Zingibéracées (F) Zingiberaceæ (SE)	٠٠٠٠ زَنْجَبِيْلِيَّات	
Oléacées (F) Oleaceæ (SE)	٠٠٠ . بِدِرَة زَيْتُونِيَّات	
Tiliacées (F) Tiliaceæ (SE)	 زَيْزَفُوْنِيًّات	
Sapindacées (F) Sapindaceæ (SE)	سابن <u>ُ</u> دِیّات	
Loganiacées (F) Loganiaceæ (SE)	سبِيْجالِيَّات، هي لُوْغانِيَّات	
Orchidacées (F) Orchidaceæ (SE)	سَخُلَبيًّات	
Atriplicées (F) Atripliceæ (SE)	سَرْمَقِيًّات	
Cupressinées (F)	سَرُويَّات: سبط صَنَوْبَريَّات	
Cypéracées (F) Cyperaceæ (SE)	سَرْوِيَّات: سبط صَنَوْبَرِيَّات سُعْدِيَّات	
Cupulifères (F)	سِنْدِيانِيَّات، هي البَلُوْطِيَّات	
Colchicacées (F) Colchicaceæ (SE)	سُوْرَنْجانِيَّات	
Césalpinacées (F) Cesalpineæ (SE)	سِيْزالْپِيْنِيَّات	
Fumariacées (F) Fumariaceæ (SE)	شاهَتْرَجِيَّات	
Labiées (F) Labiatæ (SE)	شَفَوِيًّات	
Renonculacées, Anemonées (F)	شُقَّارِيَّات: سبط شَقِيْقِيَّات	
Cactacées (F) Cactaceæ (SE)	صَبّارِيَّات	
Asclépiadacées (F) Asclepiadaceæ (SE)	صُقْلابِيَّات	
Crucifères (F) Cruciferæ (SE)	صَلِيْبِيَّات	
Ulmacées (F) Ulmaceæ (SE)	صَلِيْبِيَّات غارْغاجِيَّات ِ: هي الأَنْجُرِيَّات	
Hyménoptéroïdes (F)	غِشائِيًّات الأُجْنِحَة	
Euphorbiacées (F) Euphorbiaceæ (SE)	فَرْبِبُوٰنِيَّات	
Pipéracées (F) Piperacæ (SE)	قِلْفِلِيًّات	
Urticacées (F) Urticaceæ (SE)	قُرَّاصِيَّات	
Cucurbitacées (F) Cucurbitaceæ (SE)	قَرْعِيَّات	
Cornacées (F) Cornaceæ (SE)	قُرْنُوْسِيَّات	777

Légumineuses (F) Leguminosæ (SE)	قَرْنِيًّات
Anonacées (F) Anonaceæ (SE)	قِشْطِيًّات
Légumineuses (F) Leguminosæ (SE)	قُطانِيًّات، هي القَرْنِيَّات
Aracées (F) Araceæ (SE)	قُلْقاسِيَّات
Ménispermacées (F) Menispermaceæ (SE)	قَمَرِيَّات
Erythroxylacées (F) Erythroxylaceæ (SE)	كُوْكِيَّات
Cistacées (F) Cistaceæ (SE)	لاذَنِيَّات
Loganiacées (F) Loganiaceæ (SE)	لُوْغانِيًّات
Thyméléacées (F) Thymeleaceæ (SE)	مازَرْيُونِيَّات
Crassulacées (F) Crassulaceæ (SE)	مُخَلَّدات
Composées (F) Compositæ (SE)	مُرَكَّبات
Orthoptères (F) Orthoptera (SE)	مُسْتَقِيْماتُ الأَجْنِحَة
Magnoliacées (F) Magnoliaceæ (SE)	مَغْنُوْلِيَّات
Malpighiacées (F)	مَلابِيًّات ^(۱)
Malpighiacées (F) Malpighiaceæ (SE)	مَلْبِيْغِيًّات (٢)
Musacées (F) Musaceæ (SE)	مَوْزِيَّات
Rhamnacées (F) Rhamnaceæ (SE)	نَبْقِيَّات
Graminées (F) Graminaceæ (SE)	نَجِيْلِيَّات
Palmacées (F) Palmaceæ (SE)	نَخُلِيًّات
Flacourtiacées (F) Flacourtiaceæ (SE)	نُعْضِيَّات
Rosacées (F) Rosaceæ (SE)	وَرْدِ يًّات

⁽١) التَّسمية لإدوار غالب. (٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

٢- المُركِّباتُ الكيميائيَّة في النَّبَاتات

فرنسيّ - عربيّ

1- Acaroïde, Acroïde

- أكارُويد، أَكْرُوْيد

نَعْت تَعريفي يُطلَق على راتنج يَتمّ الحصول عليه من نَبات من الغال الجَنوبيَّة الجديدة، اسمه العِلميِّ Xanthorrhaea arborea. يَقع في قطع بُنيَّة اللَّون الأحمر، تُستخدَم في صُنع شَمع الأختام ومِلاط غُولاز.

- أسارِيْن –

اسم يُطلق على غلوبُولين يُستخرَج من زَيت أخضر اللَّون يُحضَّر من بزور القَيْقَبِ السُّكَّرِيِّ Acer saccharinum، أو القَيْقَبِ الأبيض.

3- Acer saccharinum (Sirop)

- قَيْقَب أَبْيَض (شراب الـ)

سائل مزيج يُستخرج من النّسغ السُّكَّريّ في القَيْقَب الأبيض، وهو يحتوي على ٣ إلى • بالمئة من السَّكَاروز.

4- Acétylvanillone

- أَسَتِيل قَانِيلُون

جسم كيميائيّ تركيبُه C9H10O3 يُستخرَج من جُذور الخَوْشان القُنَّبِيّ C9H10O3 مُرادفُه: أَيُوسِينين.

– أَكُوشي – أَكُوشي

راتِنْج سائل يَتمّ الحُصول عليه من حزوز تَجري في لحاء لُبايَة تُدعى Protium . وهو تَجميليّ، ويُستعمَل في مُعالَجة القروح.

- أَكْرِيفُولِين – أَكْرِيفُولِين – أَكْرِيفُولِين

قلوید ترکیبُه الکیمیائیّ $C_{16}H_{23}O_2N$ یُعزَل من الخُدْرِیَّة أو رِجْل الذِّئب Lycopodium acrifolium

- أَدْهَا تُودِيّ - Adhatodique

نَعْت تَعريفيّ يُطلَق على حامض مُختلِط مع قلويد يُدعى Vasicine، ويوجد في أوراق الأَدْهاتُودَة Adhatoda vasica الهندِيّة.

8- Adlumidine – أَذْلُمِيدِيْن –

قلويد مُتبلِّر تركيبه الكيميائيّ $C_{19}H_{15}O_6N$ ، يُستخرَج من الأقسام الهَوائيّة للأَدْلَم الشَّمعيّ (١) . Adlumia cirrhosa

9- Adlumine – أَذْلُمِيْن –

قلويد يُستخرَج من الأذْلُم الشَّمعيِّ (١)، النَّوع الوَحيد المعروف من هذا الجنس. تركيبه الكيميائي C₂₁H₂₁O₆N. مرادف الاسم العلميِّ أعلاه هو Adlumia fungosa.

10- Aegicérine – آجِيسارِيْن

اسم تَعريفيّ يُطلَق على صابونين غير مُحدَّد، تركيبه الكيميائيّ هو $C_{22}H_{30}O_4(OH)_6$. Aegiceras majus (١)، يُستخرَج من الآءَة الكبيرة (٢)،

11- Ageratum (ess.) – غَوْلَان (دُهن الـ)

اسم يُطلَق على عِدَّة زيوت دُهنيَّة تحصل من تقطير الغَوْلان الطِّباقيِّ Ageratum . conyzoides

- أَغُونِيادِيْن – أَغُونِيادِيْن

غلوكوسيد يحتوي على مجموعة مِيتُوكْسي، تركيبه $C_{30}H_{40}O_{18}$ ، يُستخرَج من البلُومارية السِّنانِيَّة $\binom{(1)}{2}$: Plumeria lancifolia .

- ثُوْم (دُهن) – ثُوْم (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من فصوص الثوم Allium sativum، وهو برائحة الثّوم المُميَّزة. يَتألَّف هذا الزَّيت من مزيج من سُولفور الألَّيْل ومن سُولْفُورات $C_{10}H_{10}S_2$.

- ثُوم (صبغة) – ثُوم (صبغة)

صبغة النَّوم هي سائل عَنبريّ اللَّون الأصفر، له رائحة الثوم، يتمّ الحصول عليه من مَرْث دُرَينات النَّوم في كحول بنسبة ٦٪، لمُدَّة عشرة أيّام.

⁽١) التَّسمية للمُؤلِّف.

- كُرّاتُ الدُّبّ (دُهْن)

15- Ail des ours (ess.)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من ثوم الدُّبّ Allium ursinum، وهو سائل قاتم اللَّون البُنِّيّ وله رائحة الثُّوم. يحتوي على سُولفور الڤِينيل بنوع خاصّ.

- أَجَاسِين – أَجَاسِين – أَجَاسِين

اسم يُطلَق على مادَّة تركيبها الكيميائيّ $C_{34}H_{46}O_9N_2.2H_2O$ تُستخرَج من عائق الحدائق Delphinium ajacis .

- أَجَاكُونين – أَجَاكُونين

قلويد يُستخرَج من بزور عاثق الحدائق، تركيبه الكيميائيّ C₁₇H₂₉O₂N.

- قِلَوِيْد – قِلَوِيْد – قِلَوِيْد

اسم جِنْسيّ يُطلَق على بَعض الموادّ العُضويَّة المُنتُرَجَة التي تُعْزَل من نباتات عديدة، وتَتحلّى بخصائص قاعِدِيَّة، وهي ذات نَشاط فيزيولوجيّ شديد، وتُعطي تَفاعُلاتٍ مُشتَرَكة مع بعض الكواشِف المُسمّاة «كواشِف القِلويدات». تركيب القِلويدات يكون مُعقَّدًا جدًّا بشكل عامّ، ولم يَتِمّ الاصطناع إلّا للبعض منها.

- فِصَّة، بِرْسِيم (صابُونين الـ) – فِصَّة، بِرْسِيم (صابُونين الـ)

صابُونين يستخرَج من الفِصَّة Medicago sativa. تركيبه الكيميائيّ C₂₇H₃₇O₁₆N. وهو وَسيط بين الصابُونينات الحَقيقيَّة وبين القِلَويدات.

- قِرْمِزِيَّة – قِرْمِزِيَّة – قِرْمِزِيَّة

اسم يُطلَق على دَواء عَسَليّ يُحضَّر من القِرْمِز الحَيوانيّ، كان يُستعمَل في الماضي كدواء نافع للمعدة. كذلك يُطلق على شراب رُوحيّ Liqueur أساسُه قرفة سيلان، الإيْكَر، حَبُّ المِسْك، كبش القرنفل، قشر جوز الطِّيب، ماء الورد، مُستخلَص الياسَمين ونُقاعة السَّوْسَن. مُرادِفه: قِرْمِز مَخْزَنيّ Kermès officinal.

21- Barosma pulchella (ess.) (دُهن) (دُهن) - بَارُوسْمَة أَنيقة (١)

زيت دُهنيّ يُستخرج من أوراق البارُوسْمَة الأنيقة (١)، ويحتوي على د - سيترونيلّال، مَتيل هَپْتانُون، د - مَنْتُون، د - سيترنيلُول، وعلى حامِض سِيترونَلْيك.

زيت دُهنيّ في أوراق الباروسمة الجميلة المُجفَّفة. يحتوي على أشتراغول، مِيرسان، أستات الميرسانيل، شاڤيكول.

- بَان، يُسْر (زيت) Ben, Béhen (huile)

سائل عديم اللَّون يُستخرَج من اليُسر العَربيّ (١) Moringa arabica. يحتوي على فيتوسْتارُول، غليسَّريدات زَيتيَّة ونَخليَّة وشَمْعيَّة وبانِيَّة. أمَّا صَمْغ البان فهو صمغ مُتقارِب من الكُثيراء ويَتمَّ الحصول عليه من البان المُسمَّى Moringa pterygosperma.

- تامُول، تَنْبُل (دُهن) - عامُول، تَنْبُل (دُهن)

زيت دُهنيّ برائحة الكريوزوت والشّاي، يُستخرج من أوراق التّامُول Piper زيت دُهنيّ برائحة الكريوزوت والشّاي، يُستخرج من أوراق التّامُول، أليّل betel يحتوي على شاڤيباتُول، شاڤيكول، كادينان، مَتيل - أوجينول، أليّل پيروكاتيشول، كاريوفيلان.

- بيقُوسِيْن - 25- Bicucine

قِلويد تركيبه الكيميائي C20H19NO7 يُعزَل من القُبَّريَّة الذَّهبيَّة (١).

- بِيكُوكُولِّين – Sicuculline

Dicentra : أَنُسِيَّةُ الْبُرْنُسِيَّةُ $C_{20}H_{17}O_6N$ مَادِّةً البُرْنُسِيَّةً $C_{20}H_{17}O_6N$ مادّة كيميائيَّة ويكيبُها cucullaria .

- بَتُولا، بَتُولَة، سَنْدَر - بَتُولا، بَتُولَة، سَنْدَر

- خَشَب الد: خَشَب يَشْتَعِل بتَوهُّج يُستعمَل لصنع أعواد الثَّقاب. - قشرة الد: قشرة دابغة تُستعمَل في تَصنيع الجلد المُسمّى الجِلْد الرُّوسيّ. - دُهن بَراعم الد: سائل أصفر اللَّون يُستخرَج من البَّتُولا البَيضاء Betula alba. يحتوي على باتُولُول بنوع خاصّ. - دُهن قشرة الد: هو دُهن البَّتُولا. - عُصَارة الد: هو نسخ البَّتُولا، يُستعمل لصنع مَشروبات رُوحيّة كُحوليَّة، أو لاستخراج السُّكَروز منه.

- تَزْبِيْل^(۱)، تَرْوِيْث (۱)

التَّرْبيل عَمليَّة تَرتكز على بَلِّ قماشَة مُخَضَّبة (مَصبوغة) في حَمَّام من الزِّبْل بهدف تَثبيت المادَّة الكيميائيَّة، المُستعمَلة في تثبيت اللَّون أو الصِّبغة، بشكل أَصْلَب وأَمتن.

(١) التَّسمية للمُؤلِّف.

– زِبْل، رَوْث –

هو براز الحيوانات المُجتَرَّة. يُستعمَل في مَنْعِ المُرَسِّخات اللَّونِيَّة من الذَّوَبان.

- مُكَوْفَر - مُكَوْفَر - anphré

نَعت تَعريفيّ يُطلَق على كلّ ما يَتحلّى بخصائص الكافور، أو كلّ ما يحتوي منه. كحول مُكَوفَر. زيت مُكَوفَر. الماء المُكَوفَر هو الماء الذي يحتوي على حوالي واحد بالألف من الكافور.

- گَنَدِیْن – گَنَدِیْن

اسم يُطلَق على مادَّة كيميائيَّة تَركيبُها C₂₀H₂₁O₄N، تُستخرَج من نبات القُبَّرِيَّة البَحوفاء أو الدَّرنِيَّة Corydalis tuberosa ومن نبات هِدْرَسْتِس كَنَدا^(۱) - Hydrastis . canadensis

- گنالِين – گنالِين –

اسم يُطلَق على مادَّة كيميائيَّة تَركيبُها $C_4H_{10}O_3N_2$ ، تُستخرَج من نبات القُنْفُول السَّيْفي Canavalia ensiformis .

- كَرَميلَّة – كَرَميلَّة

اسم يُطلَق على مادَّة بُنيَّة اللَّون، مُميَّزة الرَّائحة، غير قابلة للتَّخَمُّر، يَتمّ الحصول عليها بتسخين الشُّكَروز عند ١٩٠ درجة تقريبًا. الكَرَميلَّة تَحتوي خاصَّة على كَرَميلان عليها بتسخين الشُّكَروز عند ١٩٠ درجة تقريبًا. الكَرَميلَة تَحتوي خاصَّة على كَرَميلان (line) درجة تقريبًا. الكَرَميلَن (C₂₄H₂₆O₁₃ (line) كَرَمَلِيْن (C₃₆H₄₈O₂₄ (lène) مُلبَّس يُصنَع من هذه المادَّة.

34- Carapa (huile) – كَرَبَّة (زيت الـ)

زيت يُستخرَج من بزور عِدَّة أشجار من جنس كَرَبَّة. منها كَرَبَّة الغِيّان (۱) Carapa (۱) كَرَبَّة مُنْتَصِبَة (۱) Carapa (۱) كَرَبَّة مُنْتَصِبَة (۱) guyanensis ، كَرَبَّة مُنْتَصِبَة (۱) procera .

٢٨٤ (١) التَّسمية للمُؤلِّف.

- كَرَبِّيْن – كَرَبِّيْن

اسم يُطلَق على راتنج أصفر اللَّون، يُستخرَج من الكَرَبَّة المُنتصِبة، تركيبه الكيميائي C10H28O4.

- هال صَغير (دُهن) – هال صَغير (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من بزور الحَبْهان أي الهال الصَّغير Elettaria زيت دُهنيّ التي تحتوي منه على ٣,٥ إلى ٤,٥ بالمئة. ويَتألَّف الزَّيت من سِينايُول، تَرپينان، لِيمُونان، تَرْبِينايُول، دِيبَنْتان.

- كَرْدُول – كَرْدُول

مادَّة كيميائيَّة تَركيبُها $C_{15}H_{27}.C_6H_3(OH)_2$ ، تُستخرَج من لَبَن (حِلْباب) الأكاجُو أي البَلاذُر الغَربيّ Anacardium occidentale، وهو زيت مُنَفِّط ومُصفَرّ اللَّون.

- كَرْلِيْن نَجْميّ (۱ دهن) (دهن) - كَرْلِيْن نَجْميّ (۱ دهن)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من جذور الكَرْلين النَّجميّ Carlina acaulis، يحتوي على أوكسيد الكَرْلين، كَرْلينان، حامض نَخليّ. أوكسيد الكَرْلِيْن: مادَّة تركيبُها الكيميائيّ أوكسيد الكَرْلِيْن: مادَّة تركيبُها الكيميائيّ (Cirsium acaulis (۲)، تُستخرَج من زيت جذور القُصْوان النَّجْميّ (۲)،

39- Carmédicine – گَرْمَدِيسِيْن

اسم يُطلَق على جَوهر يُستخرَج من القُرْطُم الصُّوفي Carthamus lanatus وهو على الأرْجَح مُماثِل الكُنيسِين أو السَّنتُورين الموجود في نبات الشَّوكَة المُباركة: Cnicus benedictus.

- نَقُوس (شَمْع الـ) 40- Carnauba (cire de)

كُتلة مُخضَرَّة اللَّون الأصفر يَتم الحصول عليها من نَخْلَة نَقُوس الشَّمع^(۲) . Copernica cerifera . مادَّة أَوَّلِيَّة تُستخدَم لصناعة مَراهِم الأَحْذِيَة .

- گَرْبایِئن – گَرْبایِئن

قِلَوید یُستخرَج من البَباظ الزِّراعيّ Carica papaya، ترکیبُه الکیمیائيّ $C_{14}H_{25}O_{2}N$

(٢) التَّسمية للمُؤلِّف.

440

⁽١) التَّسمية لإدوار غالب.

زيت يُستخرَج من بزور القَرْطَم الصِّباغيّ Carthamus tinctorius. يحتوي على الحوامض التَّالية: مِيرِسْتيك، پُلْمِتيك، ستياريك، أراشيديك، لِينوساريك، أولاييك، لينولانيك. لينولانيك.

- كَراوِيا (دهن) – كَراوِيا (دهن)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من بزور الكَراويا Carum carvi. يحتوي على كَرْڤان، ديهيدروكَرْڤون، ديهيدروكَرْڤايول، د – ليمونان، وعلى ٥٠ إلى ٦٠ بالمئة من الكَرْڤُون.

- كَرِيُوفِيلِّين – كَرِيُوفِيلِّين – كَرِيُوفِيلِّين

اسم يُطلَق على جوهر مُرّ، تَركيبُه الكيميائيّ 3، C₃₀H₄₈O، برائحة المَنْثور السَّنَويّ Quarantaine يُستخرَج من كبش القرنفل.

- كروتُن عَنْبَرِيّ (دُهن) - كروتُن عَنْبَرِيّ (دُهن)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من قُشور الكروتُن العَنْبَريّ Croton eluteria. يحتوي على أوجينول، سيمان، وانيلال، حامض عَنْبريّ.

- دَفْنُوسيد، دَفْنِين - كَفْنُوسيد، دَفْنِين

اسم يُطلَق على هَكْزُوسِيد يُستخرج من الكَرْدَمانَة Garou، تركيبُه الكيميائيّ وو C₁₅H₁₆O₉، يَتْأَلَّف من غلوكُوسيد - ۷ هيدروكُسي - ۸ كُومارِين، يَنْشَطِر بالتَّحليل المائيّ إلى غلوكُوز وإلى دَفْناتِين.

- دَرْمُوس – دَرْمُوس – دَرْمُوس

اسم يُطلَق في المَغرِب على تَسَمَّم تُسبِّبه الأطعِمة الغَنِيَّة بالفلوور. مُرادِفه Fluorose

- دَرْوِیْنِیَة حُزمِیَّة (دهن) (دهن) - دَرْوِیْنِیَة حُزمِیَّة (دهن) (دهن) - دَرْوِیْنِیَة حُزمِیَّة (دهن) (دهن)

اسم يُطلَق على زيت دُهنيّ يُستخرج من الدَّرْوينية المذكورة، يحتوي على أستات الجيرانيل، جيرانيول، حامض أستيك.

- دَرْوِينِيَّة طُقْسُوسِيَّة الوَرَق^(۱) (دهن) 49- Darwinia taxifolia (ess.)

اسم زيت دُهنتي يُستخرج من هذا النَّبات. يحتوي على ل - بينان، لينالول.

- داتِسينُوسيد – داتِسينُوسيد

اسم غلوكوسيد تَركيبُه C₂₁H₂₄O₁₁.2H₂O يُستخرَج من وَرَق دَاتِيسْكَة قُنّابِيَّة Datisca cannabina ويُمكِن انشطاره إلى رامْنُوز وإلى داتِساتِين أو داتِسِين.

51- Décantation – تَصْفِيق

اسم يُطلَق على عَمليَّة سريعة لإجراء تَحليل فَوريِّ يَسمح بفَصْل سائلين غير قابِلَين للمزج، أو لفَصْل مادَّة صُلبة عن سائل ما Décantage.

52- Delphinoïdine – دَلْفِينُويدِيْن

اسم يُطلَق على قِلويد تركيبُه الكيميائيّ C₂₅H₄₂O₄N يُستخرَج من بزور العائق الجَبَليّ Delphinium staphysagria .

- دَلْتَالِيْن – دَلْتَالِيْن – دَلْتَالِيْن

اسم قِلَوید تَرکیبُه الکیمیائیّ $C_{21}H_{33}NO$ یُستخرَج من العائق الغَرْبیّ (۱) . Delphinium occidental

- دَوْرَم^(۲)، أَشْق (دُهن) - دَوْرَم^(۲)، أَشْق (دُهن)

55- Echine – أُخْبِيْن –

قِلَويد يُستخرج من الأَخْيُون المَعروف أي حشيشة الأَفْعَى Echium vulgare.

- أُخِيتامِين – أُخِيتامِين

قِلَوید یُستخرَج من قشور الألْستُونِیَة Alstonia scholaris، تَرکیبُه الکیمیائیّ $C_{22}H_{28}O_4N_2$

57- Echitamidine – أُخِيتَامِيديْن

مادَّة كيميائيَّة تُستخرَج من قشور الألْستُونِيَة الجَميلة (۱) Alstonia spectabilis تَركسُها ، C₂₀H₂₆O₃N₂

(٢) التَّسمية لإدوار غالب.

YAY

⁽١) التَّسِمة للمُؤلِّف.

58- Echitéine – أُخِيتايِيْن –

اسم يُطلَق على إِبَر أو بِلَّور يُستخرَج من قشور الأنْستُونِية Alstonia scholaris، تَركيبُها الكيميائي C42H70O2.

59- Echiténine – أُخِيتَانِيْن –

إسم يُطلَق على قِلَويد تَركيبُه الكيميائيّ C₂₀H₂₇O₄N، يُستخرج من قشور الأنْستُونِيّة Alstonia scholaris.

60- Éléococca (huile d') – أَنْيُوكُوكًا (زيت)

زيت الأليوكوكا يُستخرَج من بزور الأَرْطَس القَلْبِيِّ (١) Aleurites cordata، وهو زيت يُستخدَم كمادَّة حالَّة في صِناعة الوَرنيش. مُرادِفه: زيت الصِّين، خَشَب الزَّيت.

- لُبّ، دَقِيْق – لُبّ، دَقِيْق

اسم جِنسيّ عامّ يُطلَق على مَوادّ مُؤلَّفة من حُبوب نشاء يَتمّ الحصول عليها من الجذور والرِّيزومات أو من دَرَنات نَباتات مُختلِفة، مِثال دقيق الموز أو دقيق البطاطا.

62- Ficaria (ess.) – فِيكاريا (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرَج من عُشبة البَواسير Ficaria ranunculoides، وهو سائل قاتم اللَّون البُنِّيّ برائحة التَّبغ. يحتوي على حامض پَلْمِتيك وفِيكاريك.

63- Franguloside – جَلْهُم (غلوكوسيد)

غلوڭوسىد يُوجَد في قُشور الجَلْهَم Rhamnus frangula، وفي قشور نَبْق پُورشيانا ملوڭوسىد يُوجَد في الكيميائي $C_{21}H_{20}O_9 + 1H_2O$ يَتَحلَّل مائيًّا إلى رَمْنُوز وإلى فرانْغُولا – أمُودِين.

- فَوْقَسِيْن – فَوْقَسِيْن

قِلَويد تركيبُه الكيميائي C15H12O3N2، يُستخرَج من أنواع الفَوْقَس Varechs.

65- Galénique – غالِينُوسيّ

نَعت تَعريفيّ يُطلَق على أَدْوية تُستخرَج من النَّباتات. أو يُقال عن طريقة غالِينُوس في تحضير الأدوية. أو يُطلَق على قسم من الأبحاث الصَّيدلانيَّة التي تَتعلَّق بتحضير الأدوية وطريقة عَرْضِها.

66- Galipine, Galipidine

اسم يُطلَق على قِلَويد يُستخرَج من قشور قُسْبَارِيَّة الحُمَّى Cusparia febrifuga، تركيبُه الكيميائي C₂₁H₂₁O₃N.

- غاليبُول – غاليبُول

اسم يُطلَق على سائل ذَكيّ الرّائحة، تركيبُه الكيميائيّ C₁₅H₂₆O، يُستخرَج من دُهن الثّخُرط المَخْزَنيّ Angusture.

- عَفْصَة، جَوْزَة العَفْص - عَفْصَة، جَوْزَة العَفْص

اسم يَدُلِّ على نتوءات وزَوائد مَرَضِيَّة، دابِغَة، على أوراق السِّنْدِيان عامَّة أو فروعه الفَتِيَّة، يُسبِّها وَخْزُ حشرة من فصيلة الآبِرات Cynips quercus folii (آبِرَة الأوراق)؛ تُستعمَل كمادَّة أوَّلِيَّة لصنع الأغفاص وأنواع الحبر على اختلافها. إنّ عَفْصَة حَلَب، البَصْرَة، الصِّين، اليابان، هَنغاريا، كنوپَرْن، إلخ، هي نتوءات تبرز على أشجار مُختلِفة وتكون غَنيَّة نسبيًّا بالعَفْص.

69- Gardenia – غَرْدِينِيَة

اسم يُطلَق على عِطرِ اصطناعي أساسُه التَّرْبِينايُول. دُهْن ال- هو زيت دُهنيّ سائل، باهت اللَّون الأصفر، يتمّ الحصول عليه من حِلْباب الغردينية الصَّمْغِيَّة (۱) Gardenia lucida ، ومن حِلْباب الغَرْدِينيَة اللَّامِعَة (۱) Gardenia gummifera. يحتوي هذا الزَّيت على لِينالُول، تَرْبِينايُول، أستات الستيرُولِيل، أَثْرَانِيلات المَتيل. زَيتُ الله - زيت يُستخرَج من بزور الغَرْدينية الصَّمغِيَّة والغَرْدينية اللَّامِعة. يحتوي على حوامض: ستياريك، يُلْميتيك، أولايك، دِيهيدروكُسي ستياريك.

- غلُوسِين - غلُوسِين

اسم قِلويد المامِيثا الصَّفراء أو الخَشْخاش المُقَرَّن Glaucium flavum، يحتوي على أثير البُولْدين الدِّيماتيليّ، تركيبُه الكيميائيّ C₂₁H₂₅O₄N.

- جانِين العَشْقَة - T1- Hédéragénine

اسم يُطلَق على تريْتَرْپان تركيبُه الكيميائيّ ،C₃₀H₄₈O، يُعزَل من نبات العَشْقَة المبذولة Hedera helix ومن الرُّيْتَة أي شَجَر الصّابُون Sapindus أي Hedera helix .

⁽١) التَّسمية للمُؤلِّف.

- غلو كوسيد العَشْقَة

72- Hédéraglucoside

اسم يُطلَق على غلوكوسيد يُستخرَج من العَشْقَة المبذولة، تركيبه الكيميائيّ $C_{32}H_{54}O_{11}$.

73- Hedyotine

قِلَوید یُستخرَج من جذور هَدْیُوتِیس سَرَنْدِیب Hedyotis auricularia، ترکیبُه الکیمیائی C16H22O3N2.

- هَلْيانْتِيّ – Al- Hélianthique

نَعْت تَعریفیّ یُطلَق علی حامض تَرکیبُه الکیمیائیّ $C_{14}H_9O_8$ ، یُستخرَج من بزور دَوّار الشَّمس Helianthus annuus .

75- Hendaye (Liqueur)

اسم يُطلَق على مشروب يُعطَّر بزيوت دُهنيَّة عِطريَّة من اليانسون، الكزبرة، اللَّوز المُرّ، الأنجليك، الهال، الحامض، البرتقال، ونُقاعة السَّوْسَن.

76- Henné - چنّة

اسم يُطلَق على مسحوق أوراق مُجَفَّفة من شُجيرة الحِنَّة Lawsonia alba، يُستعمَل في صَبْغ الشَّعْر والحرير والجلود.

- هِيدْرَانْجِين، إِدْرانْجِين - Hydrangine

اسم غلوكوسيد تركيبُه الكيميائيّ $C_{34}H_{25}O_{11}$ ، يُستخرَج من الأيدُرانجِيَة المُتَشَجِّرة (١٠) Hydrangea arborescens (١٠)، أي الأرْطَنْسِيَة .

- باسِيَّة (زُبُدَة ال) 78- Illipé (beurre d')

مادَّة صلبَة صفراء اللَّون برائحة الكاكاو، تُستخرَج من بزور الباسِيَّة الطَّويلة الوَرَق Bassia longifolia . وهي زُبْدة غالبًا ما تُغَشّ بزيتٍ آخر.

- ستارُول الجراد – magostérol – ستارُول الجراد

اسم يُطلَق على ستارول حَيَوانيّ يُستخرَج من الجراد، يُرجَّح أن يكون مُماثلًا إلى لستارول يُوجَد في دودة الحرير، تركيبُه الكيميائيّ ٢₂₇H₄₆O.

اسم يُشار به إلى تحويل مادَّةٍ ما إلى عجينة.

- أَنْكَرْنَاتِينَ – Pitch Incarnatine

Trifolium اسم يُطلَق على غلوكوسيد يُستخرَج من أزهار النَّفَل القِرْمِزيّ $C_{21}H_{20}O_{12}$. $3H_{2}O$ تركيبُه الكيميائيّ $C_{21}H_{20}O_{12}$.

- أَنْداكُونِين - 82- indaconine

اسم يُطلَق على قِلَويد يُستخرَج من الأكُونيت، تَركيبُه وC27H47NO.

- أَنْسُولِيْن – أَنْسُولِيْن – أَنْسُولِيْن

اسم يُطلَق على هُرمون وعلى مُتَعدِّد الأمين Polypeptide مُنْقِص للسُّكَّر، يُوجَد في البنكرياس أي الغُدَّة الحُلْوَة. تَحليل الأنسولين المائتي يُعطي ما يلي: تِيروزين ١٢٪، سِسْتِيْن ١٢٪، أَرْجِينين ٣٪، هِسْتِدين ٨٪، لِوْسِيْن ٣٠٪، أَرْجِينين ٣٪، هِسْتِدين ٨٪، لِيزين ٢٪.

- إيريدِين – إيريدِين –

اسم يُطلَق على عِطر اصطناعيّ (مُسَجَّل) برائحة البَنَفْسَج. ويُطلَق على مادَّة كيميائيَّة تُستخرَج من سَوْسَن فلورَنْسَه أي السَّوْسَن الأبيض Iris florentina، وهي غلوكوسيد السَّوْسَن.

485- Jambosine

قلويد يُستخرَج من قشور تُفّاح الوَرْد أي الجَنْبُوزَة Eugenia jambos تركيبُه الكيميائي C₁₀H₁₅O₃N .

86- Japaconitine – جابا کُونِیتِین

اسم يُطلَق على قِلويدين مُتَجازِئين تركيبهما الكيميائيّ C34H47O11N، يُستخرَجان من أنواع الأكُونيت.

- ياسمينين – S7- Jasminine

اسم يُطلَق على غلوكوسيد يُستخرَج من أوراق الياسمين الأصفر Jasminum . fructicans

- جَتْرُوفِين – جَتْرُوفِين

قلويد تركيبُه الكيميائيّ C₁₄H₂₀O₆N يُستخرَج من قشر الجَتْرُوفَة القُطنيَّة الوَرَق^(۱)

(١) التَّــمية للمُؤلِّف.

. Jatropha gossypifolia

88- Julienne (huile de) – جُوليانا (زيت)

زيت سائل أخضر اللَّون يُستخرج من بزور الجُوليانا النَّسائيَّة أي زهرة المساء الجملة Hesperis matronalis.

- كَرِيْتُه (زُبدة) 89- Karité (beurre)

اسم يُطلَق على مادَّة دَسمة برائحة المَطّاط، تُستخرَج من جَوز الكَرِيْتَه وبزورها . Butyrospermum parkii

- كابُوك، قابُوق - كابُوك، قابُوق

اسم يُطلَق على زَغَبٍ يُشكِّل لِبْدَة تكْسُو ثمار الكابُوك Eryodendron اسم يُطلَق على زَغَبٍ يُشكِّل لِبْدَة تكْسُو ثمار الكابُوك anfractuosum ونباتات أخرى من فصيلة الزَّغَبِيَّات. يُستعمَل هذا الزَّغَب لقابليَّته للعَوم ولكَتامَتِه للحرارة.

- كابُوك، قابُوق (زيت) 91- Kapok, Capock (huile)

اسم يُطلَق على زيت أصفر اللَّون، رائحته مُستحبَّة يُستخرَج من شجرتين: الكابوك المُخْتَلِف السَّطْح (١) Eryodendron anfractucosum وزَغَبِيَّة المالابار (١) Bombax malabarium . استعمال الزَّيتَين ينحصر في صناعة الصّابون.

92- Kawala (huile de) حاوالا (زيت الـ)

زَيت دَسِم مُخضَرَّ اللَّون الأصفر يُستخرَج من بزور الآراك أي الكَباث Salvadora رَيت دَسِم مُخضَرَّ اللَّون الأصفر يُستخرَج من بزور الآراك أي الكَباث persica . يحتوي على حوامض: كَبْرِيليك، كَبْرِيك، لُورِيك، مِيرِيشْتِيك، أولاييك، لينولاييك. مُرادِفه زيت خاكان Khakan .

93- Kaya (huile de) – کایا (زیت ال

اسم يُطلَق على زيت يُستخرَج من بزور طَوْلَق الجَوْز Torreya nucifera. يحتوي على حامِض ستياريك وحامِض لينُولاييك.

- لكْتُوزِينُوز – لكْتُوزِينُوز – لكْتُونِينُوز

اسم يُطلق على هُولُوسِيد يُوجَد في جذور نَباتات مُختلِفة من فصيلة القرنفليّات، تركيبُه الكيميائيّ C36H62O31.H2O.

- لَكْتُوسِيْن – Dُكْتُوسِيْن – كَكْتُوسِيْن

 $C_{11}H_{14}O_4$ تركيبُه الكيميائيّ Lactucarium توهر مُسكِّن يُوجد في عُصارة الخَسّ $C_{22}H_{36}O_7$ أو $C_{22}H_{36}O_7$

96- Ladaniol – لاذنيول

. $C_{17}H_{30}O$ تركيبُه الكيميائي Cistus creticus تركيبُه الكيميائي كحول يُستخرَج من اللّادَن الإكريتي

97- Lallemantia (huile de)

- حُلَيّاء (زيت الـ)

اسم يُطلَق على زيت مُجَفِّف جدًّا، يُستخرَج من بزور الحُلَيَّاء الأيبريَّة . Lallemantia iberica

- لامِيْن - 98- Lamine

اسم يُطلَق على قِلويد يُستخرَج من اللّاميون الأبيض Lamium album.

99- Lathyrine – لاثِيرِين، جُلْبانِين

اسم يُطلق على جوهر مُرّ وسامٌ يُستخرَج من الجُلْبان المُستدق الورق (١) . Lathyrus angustifolius

- لُورُولاييك – لُورُولاييك

نَعت تعریفیّ یُشیر إلی حامض غیر مُشْبَع، ترکیبُه $C_{12}H_{22}O_{2}$ ، یُستخرَج من أبیض البال من الحوت الأبیض.

– مَنْديُومِيين – مَنْديُومِيين – مَنْديُومِيين

اسم يُطلَق على غلوكوسيد بِلَّوريّ أبيض اللَّون، يُستخرَج من أوراق المَنيهوت المُرّ Manihot utilissima.

102- Mangostine – مَنْغُوسْتِين

اسم خضاب أصفر اللَّون، تركيبُه الكيميائيّ C₂₃H₂₄O₆ يُوجَد في جَنْدَم مَنْغُسْتان أو جَوْز الجَنْدَم Garcinia mangostana.

– مانیسُوبا – مانیسُوبا

اسم يُطلَق على مَطّاط خام يُباع على شَكل سُيور، ومُكَتَّل في كُرات رائحتها

(١) التَّسمية للمُؤلِّف.

مُغْثِيَّة، يَتمّ الحصول عليه من مَنيهُوت غلازيوف Manihot Glaziovii.

– مَنْيُوك – مَنْيُوك

اسم يُطلَق على لُبّ دقيق يَحصل من المَنيهُوت المُرّ (أعلاه) ومن المَنيهوت الحُلو Manihot aipi .

- مَنّ ، تَرَنْجَبِيْن – مَنّ ، تَرَنْجَبِيْن

اسم كان الخيميائيّون يُطلقونه على المادَّة الأرضِيَّة. المَنِّ السَّماويِّ كان مادَّة الحجر الفَلْسَفيِّ، ومنَ الزَّئبَق كان المُصَعَّد الذي يَحصل من الرَّاسب (زِئبق مُصَعَّد الذي يَحصل من الرَّاسب (زِئبق مُصَعَّد Sublimé). أمّا اليوم فكلمة مَنْ تُشير إلى نُتُوحات نَباتيَّة مُختلِفة، سُكَّريَّة الطَّعم، تُستعمَل كمواد مُحَلِّية، أو مُسهلة. مَنُّ العبرانِيِّين مرَدُّه إلى حَزاز مأكول Lecanora.

- مارُوتي (زيت الـ) – مارُوتي (زيت الـ)

اسم يُطلَق على مادَّة مُصفرَّة اللَّون الأبيض، برائحة الكاكاو، تُستخرَج من بزور العَصْرَة السامَّة Hydnocarpus venenata. يحتوي على حامِض شُولْمُوغرِيك، وهِبدنُوكَرْببك.

– مَرُّوْبِينِ – مَرُّوْبِينِ

إسم يُطلَق على مادّة كيميائيَّة تركيبُها 630H43O، وهي الجَوهر المُرّ في الفَراسِيون الأبيض Marrubium vulgare .

- بَلْقاء (دُهْن) 108- Melaleuca (ess.de)

زَيت دُهنيّ سائل، مُصفر اللَّون، عِطريّ الرّائحة الخاصَّة، يُستخرَج من البَلْقاء المَعْقُوفَة (١) Melaleuca uncinata . يحتوى على سينايول، د- يينان، أنْسِينَايُول.

- مِلانِين، قُتامِين

اسم جِنسيّ يُطلَق على خضابات سوداء اللَّون تُوجَد في البَشَرة. إن تركيب الميلانين الكيميائي C₈H₅O₃N.

- مَلِيسَّة (دُهن) – مَلِيسَّة (دُهن) – مَلِيسَّة (دُهن)

سائل باهت اللَّون الأصفر، برائحة اللَّيمون الحامض، يُستخرَج من أوراق

المليسَّة Melissa officinalis. وهو مزيج من د- پينان، دِيپَنْتَان، سِتْرال، سيترونيلَّال. مُرادِف: زيت البَلْسَم.

- نَعْنَع (دُهن) – نَعْنَع (دُهن)

زيت دُهنيّ يُستخرج من مُختلِف أنواع النَّعنع، وبخاصَّة من النَّعْنَع المُفَلْفَل Mentha piperita . يحتوي على مَنْتُول (أي كافور النَّعنع) (٤٠ إلى ٤٠٪)، مَنْتُون، أستات المَنْتِل، د- بِينان، فَلَنْدران، إلخ.

- مُورَه (زیت گَبِد الـ) – مُورَه (زیت گَبِد الـ)

اسم يُطلَق على زيت باهت اللَّون الأصفر إلى اللَّون الأصفر البُنِّي، يُستخرج من كَبِد الغادُس أي المُورَة Gadus morrhua. يحتوي على حامِض پَلْميتيك ٤٪، جاكُوريك ٢٠٪، تيراپيك ٢٠٪، پَلْميتُوليك، غادُولاييك، بْتُومايين، تريماتيل أمين، فيتامين «أ» و «D3».

- آس (دُهن) – آس (دُهن)

اسم يُطلَق على سائل عديم اللَّون أو مُصفر اللَّون، رائحته عِطريّة، يُستخرَج من ثمار الفِلْفِل المَخْزَنيِّ (١٠ إلى ٨٠٪)، مَتِيل أوجينُول، سينايُول، ميرتانُول، فَلَّنْدران، كَمْفان، إلخ.

- آس (زیت) – آس (زیت)

زَيت عَذْبِ الرَّائحة، طعمه مُمَيَّز، يُستخرَج من الآس Myrtus communis. يحتوي على حامض مِيرِسْتيك، پُلْميتيك، أولاييك، لِينولاييك.

- نُولِي (صمغ) 115- Nauli (gomme)

صمغ النُّولي هو راتنج زيتيّ (أوليوراتنج) يَسيل من شجرة الكَناريوم الشَّائع^(۱) . يُعطى زيتًا دُهنيًّا برائحة اليانسون.

– نَرْقَال (بَلْسَم) – نَرْقَال (بَلْسَم)

بَلْسَم نرڤال هو مرهم يُوصى به ضدّ الآلام الروماتيزميّة، أساسه نخاع الثَّور، زيت الخَشخاش المُنوِّم وزبدة جوز الطيب.

اسم يُطلَق على سائل مُماثل لدهن الكاجيبُوت، يُستخرَج من أوراق البَلْقاء الخَضراء الزَّهر (١) Melaleuca viridiflora . يحتوي على أَلْفا د - پينان، سينايُول، أَلْفا تَربِينايُول، أَسْتَرأسَتيك، أَسْتَربُوتيريك.

- نِيكُولِين – الله Nicoline

اسم يُطلَق على مادَّة تُستخرَج، في غينيا، من نَبات من القَرنيّات: غُبَيْدَة شَقْراء (١) . Lonchocarpus rufescens

- نيكُوتَلِّين – Nicotelline

اسم يُطلَق على قلويد صلب تركيبه C10H8N2 يُستخرَج من التبغ.

- نیکُوتیامِین – نیکُوتیامِین

اسم يُطلَق على مادَّة صلبة يَتمّ الحصول عليها من جرّاء تقطير أوراق التَّبغ الخضراء في الماء. مُرادِف: كافور التَّبغ.

- نیکُوتین، نیکُوتیمین – کا Nicotime, Nicotimine

اسم يُطلَق على قِلويد سائل تركيبه الكيميائيّ $C_{10}H_{14}N_2$ يُستخرَج من التَّبغ . Nicotiana tabacum

- خُرَّم (دُهن الـ) – الله 122- Nielle (Ess.)

زَيت دُهنيّ رائحته غير مُستحبَّة يُستخرَج من بزور خُرَّم الحنْطَة Agrostemma . githago

- شُوْنِيز دِمشقى (دهن) 123- Nigelle de Damas (Ess.)

زَيت دُهني ذو تَفَلُور (استشعاع) أزرق، يُستخرَج من بزور الشُّونيز الدُّمشقيّ . Nigella damascena . من مُركِّباته الأساسيَّة: دَماسانِين.

124- Nigelle cultivée (huile) – شُوْنيز زراعيّ (زيت)

زيت يُستخرَج من بزور الشُّونيز الزِّراعيِّ Nigella sativa أي حَبَّة البَرَكة أو الحَبَّة السَّوداء.

زيت دُهنيّ سائل، رائحته أفاوِيهيَّة (مُفَوَّهَة)، يُستخرَج من أوراق شجرة البُنْدُق . Corylus avellana . يحتوى على حامض يَلْميتيك وعلى يَرافِين.

- أولايُورَازِين - أولايُورَازِين - أولايُورَازِين

اسم يُطلَق على مادَّة طَبيعيَّة يكون قِوامها رَخُوًا (صمغ الصَّنوبر) أو مائعًا (تَربَنْتين البندقيَّة)، طَبيعتُها راتنجيَّة، تفرزها أنواعٌ نباتيَّة مُختلِفة عند حَزِّ أنسِجتها بشكل عميق نوعًا ما.

- أولاييك – أولاييك

نَعت تَعريفيّ يُطلَق على حامِض تركيبه الكيميائيّ C₁₈H₃₄O₂.

- زَيْتُون (زيت) – زَيْتُون (زيت) – زَيْتُون (زيت) – الله 128- Olive (huile d')

زَيت يُستخرَج من ثمار شجرة الزَّيتون Olea europæa. أصنافُه: صِرْف Vierge رَيت يُستخرَج من ثمار شجرة الزَّيتون Arine. أمتاز، فائق الجودة Surfine، صافِ Fine، جَيِّد، عاديّ Ordinaire، مُوقِد d'infect. . de ressence أو للحَرْق brûler مُنْتِن، عَفِن d'infect، زيت الكُسْب أي «الجفْت»:

الصَّنفان الأَوَّلان يُخَصَّصان للتَّغْذِية. الأصناف الأخرى تذهب إلى مَعامِل الصَّابون. زيت الزَّيتون غير مُجَفِّف. يحتوي على حامض أولاييك ٧٢ إلى ٨٤٪، لِينُولاييك، مِيريسْتيك، پَلْميتيك، ستياريك، أراشيديك. غير مُتَصَبِّن ٠,٨ إلى ١,٤٪.

- زَيتُون (زيت أَنْوِيَة الـ) – رَيتُون (زيت أَنْوِيَة الـ)

زَيت يُستخرَج من اللَّوزات الموجودة داخل أنْوية ثمار الزَّيتون. يحتوي على حامض يَلْميتيك، ستياريك، أولاييك، لينولاييك.

- أوليڤِيل – أوليڤِيل – أوليڤِيل

مادَّة تُستخرَج من راتنج الزَّيتونَة، تركيبها الكيميائيّ C₂₀H₂₄O_{7.}

- أونُوسارِين – أونُوسارِين –

اسم يُطلَق على جَوهر مُتبلِّر تركيبه الكيميائيّ C₁₂H₂₀O، يُستخرَج من جذور الشِّبْرق Ononis spinosa.

- أونُوسارول، أونُوكُول - 132- Onocérol, Onocol

اسم يُطلَق على فيتوستارول يُوجَد في الشِّبْرق، تركيبه C26H44O2.

- أونُونِين – أونُونِين –

اسم يُطلَق على غلوكوسيد تركيبه الكيميائي ،C₂₅H₂₆O₁₁ يُستخرَج من الشَّبْرِق. يُمكِن انشطاره إلى أونُوسْيين وإلى حامِض فُورميك.

- بارابُقْسِیْن – Parabuxine

اسم يُطلَق على قِلُويد يُستخرَج من قشور البَقْس، إلى جانب البُقْسِين.

- پایْتِیْن – 135- Paytine

اسم يُطلق على قِلويد يُستخرَج من قشور الكَنكينا البَيضاء في Payta، تركيبه الكيميائي C21H24N2O.

- ل- بيغانِيْن، ڤازِيِسيْن – ل- بيغانِيْن، ڤازِيسيْن

 $C_{11}H_{12}ON_2$ اسم يُطلَق على قِلويد يُستعمَل في الطِّب، تركيبه الكيميائي $C_{11}H_{12}ON_2$. يُستخرَج من نبات ينتشر في منطقة الهرمل، أي الحِرْمِل

- پيلَرْغُونيدُول – Pélargonidol

أَعْلُوكُونَ يُوجَد في الغُرْنُوق أي الجيرانيوم Pelargonium zonale.

- پَلُوبَيْن – 138- Pellotine

قِلوید نَبات البَیُّوت Echinocactus williamsii، ترکیبُه الکیمیائی C₁₃H₁₉O₃N. نَبات مَکسیکیِّ مُقَدَّس. إنَّ لَوْك قِطع صغیرة منه تُؤدِّي إلى هَلُوساتٍ مَرْئیَّة مُستَغْربَة.

- يُسْئِن –

اسم يُطلَق على أَنْبَخانَة اكتشفها Schwann عام ١٨٣٦، بإمكانها تحليل الهَيُولينات تحليلًا مائيًا إلى زُلالُوز وإلى مُتَعدِّدات الأمين Polypeptides.

- أَهُوكَاتِيَّة أَمْرِيكَيَّة (دهن) - أَهُوكَاتِيَّة أَمْرِيكيَّة (دهن)

دُهن سائل مُصفَرّ اللَّون الأخضر يُستخرَج من أوراق الأبوكادو الأمريكيّ^(۱)، طعمه كطعم الطَّرخون. يحتوي على مَتيل شاڤيكول، أَلْفا د - بِينان، برافين.

- أَهُوكَاتَيَّة زَغَبِيَّة (دهن) (دهن) (دهن) (دهن) المُوكَاتِيَّة زَغَبِيَّة (دهن) (دهن) المُوكَاتِيَّة زَغَبِيَّة (دهن) (دهن) المُوكَاتِيَّة زَغَبِيَّة (دهن) (

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من الأبوكادو الزَّغبيّ (١١)، يحتوي على حامض بُوتيريك،

أستيرات الحوامض التّالية: بُوتيريك، ڤالريك، أونَنْتيك، وعلى د- كافور، سينايُول، بُورنايُول، ألْدَهيد فُورميك.

- بَقْدُونس – بَقْدُونس – عَقْدُونس

(زُبدة الى) راسب جيلاتينيّ يحتوي على أبْيُول، ويحصل من تَبخير مُستَخلصات البقدونس الكُحوليَّة Petroselinum sativum. (كافور الى) هو الأبْيُول. (دُهن ثمار الى) هو زَيت دُهنيّ يحتوي على أبْيُول، حامض پَلْميتيك، مِيريْستِسين. (دُهن عُشبة اله) سائل مُصفَرّ اللَّون الأخضر برائحة البقدونس.

- حَشيشةُ القُرْعان (دهن) - حَشيشةُ القُرْعان (دهن)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من جذور النَّبات Petasites officinalis.

- نارَنْج، أَبُو صفير (دهن) - نارَنْج، أَبُو صفير (دهن)

دُهن أبو صفير سائل مُصفر اللَّون، يُستخرَج من أوراق وفروع اللَّيمون المُرّ، أي أبو صفير Citrus bigaradia. يحتوي على بيرُّول، فُورفُورال، بيتا - بينان، كَمفان، د- دييَنْتان، ليمونان، نارول، جيرانيول، ل- لينالول.

- ليمون حامِض (دُهن) – ليمون حامِض (دُهن)

زَيت دُهنيّ سائل يُستخرَج من فروع وأوراق وثمار اللَّيمون الحامِض الفَجّة غير النّاضجة Citrus medica . يحتوي على كَمْفان، ليمونان، لينالُول، سيترال، جيرانيول.

- بُرْتُقَال، بُرْدُقان (دُهن) 146- Petit grain Portugal (ess.)

زَيت دُهنيّ يُستخرَج من فروع خضراء وثمار شجرة البُرتقال Citrus aurantium.

- پاتُونُوسيد – پاتُونُوسيد

اسم يُطلَق على أنْتُوسيانُوسيد يُستخرَج من أزهار البَتُونيه. تحليلُه المائيّ في مُحيط حامِض يُحرِّر ذَرَّتَي غلوكوز وذَرَّة واحدة باتُونيدول.

بُوسيدانِين پُوسيدانِين

اسم يُطلَق على مادَّة كيميائيَّة سامَّة للأسماك، تركيبها ،C₁₅H₁₄O، تُستخرَج من جذور بَقْلَة الرَّئيس المَخْزَنيَّة Peucedanum officinalis .

149- Peuplier (ess. des bourgeons) (العم الـ) – حَوْر (دهن بَراعم الـ)

زَيت دُهنيّ سائل، باهت اللُّون الأصفر إلى فاتح اللَّون البنِّيّ، رائحته مُستحبَّة. ٢٩٩

يحتوي على ألُّفا - كاريوفيلَّان، بَرافين.

- فَرُبِيتِيْن – فَرُبِيتِيْن –

غلوكوسيد تركيبه الكيميائيّ مي دريه الكيميائيّ مي درور أثمان النّيل أو حَبّ النّيل Ipomea hederacea .

- فَرْماكُوبِيا – فَرْماكُوبِيا

اسم يُشير إلى كتاب رَسْميّ يَذكُر طريقة تحضير الأدوية وتركيبها وخَصائصها والتَّجارِب التي أُجْرِيَت عليها واستعمالاتها المَخْزَنيَّة.

- فازین –

اسم يُطلَق على أغْلُوتينِيْن سامٌ يُوجد في الصُّويا أو الصُّوْجَة.

- فاصُول -

اسم قِلَويد يُستخرَج من حبوب الفاصُوليا Phaseolus vulgaris.

رازِیانَة (دُهن) 154- Phellandre (ess.)

اسم يُطلَق على سائل عديم اللَّون إلى خَمريّ اللَّون الأصفر، يُستخرَج من ثمار الرّازيانَة المائيَّة Enanthe phellandrium .

- فايُوراتِين – béorétine

مسحوق أصفر اللَّون يُستخرَج من جذور الرَّاوَنْد Rheum ، تركيبُه الكيميائيّ . C₁₄H₈O₇

- فِلِّيرُوسيد – فِلِّيرُوسيد

غلوكوسيد تركيبُه الكيميائيّ C₂₇H₃₄O₁₁ يَتمّ الحصول عليه من قشور الشُّخص العريض الوَرَق Phillyrea latifolia . مُرادِف فِلِّيرِين.

- فُقْمَة، عِجْلِ البَحْرِ (زيت) – فُقْمَة، عِجْلِ البَحْرِ (زيت)

زيت مُتفاوِت التَّركيب يُستخرَج من وَدَك أنواع مُختلِفة من الفُقْمَة، مِثال Phoca groenlandica, vitulina

- فِيزالِين – Physaline

اسم مادَّة مُرَّة تُستخرَج من الكاكَنْج Physalis alkekengi، تركيبُها الكيميائيّ . C₇₂H₁₁₆O₄

٣..

- كَتْش –

اسم يُطلَق على ماء حَياة (كونياك) يَحصل من جَرّاء تَخمُّر بعض أنواع الخوخ. (جاء في قاموس المنهل عن كلمة كُتش: إنّه نوع من ثمار الإجّاص).

160- Quillajique, Quillajique

- كِلَّاجِيّ

نعت تَعريفيّ يُطلَق على حامِض يُشكِّل صابُوجانين يُوجَد في قشور الكِلَاجَة أو الكِلَايا، تركيبُه الكيميائيّ ، C30H46O5 .

161- Quillayasapotoxine

- كِلَّاجة (صابُونين - السَّام)

اسم يُطلَق على صابُونُوسيد يُستخرَج من الكِلَّاجَة، تركيبُه C₁₇H₂₆O₁₀.

162- Rancidité

- زَناخَة^(١)

اسم يُطلَق على ظاهِرة فَساد الموادّ الدُّهنيَّة (الشَّحميَّة)، إمَّا عن طريق الجراثيم الموجودة في الهواء، أو عن طريق التَّأْكسُد الذَّاتيّ: تَشكيل مَتيل سَاتُونات، وألْدَهِيد Nonylique.

163- Rasamala (ess.)

- گناريُوم (دُهن)

اسم زَيت دُهنيّ يُستخرَج من بَلْسَم الكَناريُوم الصَّغير النَّمار (١٠) Canarium من تَقطير النَّمار (١٠) بيحتوي على سَسْكي تَرْپانات. دُهن خَشَب الد.: زَيت دُهنيّ يَحصل من تَقطير الرَّازامالا الآتية من الهند، يَقع في كُتَلٍ مُتبلِّرة، بُنيَّة اللَّون، برائحة القرفة والرّاونُد. تَنْصهر عند ٣٠ إلى ٤٠ درجة.

164- Raubaside

- رُوبازِيْد

اسم يُطلَق على قِلَويد حالٌ للأَدْرِينالين، ومُسكِّن للجهاز العَصَبيّ الوُدِّيّ، يُستخرِج من أوراق عُود الحَيَّة المَدّاد^(١) Rauwolfia serpentina.

165- Rauwolsine

- رُوْوُلْسِيْن

قِلَوید ترکیبُه الکیمیائیّ C21H26O3N2، یُستخرَج من أوراق عُود الحَیَّة المَدَّاد، وهو مُتَجازئ الیُوهِمْبین.

⁽١) التَّمية للمؤلِّف.

زَيت دُهنيّ سائل يُستخرَج من أزهار ملكة المُروج Spiræa ulmaria، يحتوي على ألْدَهيدسالِسيليك، سالِسيلات المَتِيل، بَقايا پِئبَّرُونال وبَقايا وانيلّال.

- رَزَرْپِیْن – رَزَرْپِیْن – رَزَرْپِیْن

اسم يُطلَق على قِلويد تركيبُه الكيميائيّ C22H40O9N2، يُستخرَج من عُود الحَيّة المَدّاد؛ وهو مُنْقِص للتَّوتُّر الشِّرْيانيّ ومُسَكِّن.

- خُزام (دُهن) 168- Réséda (ess.)

زَيْت دُهنيّ مُصفَرّ اللَّون البُنِّيّ، مُستَحبّ الرّائحة، يُستخرَج من خُزام الصَّبَّاغِين Reseda luteola . يحتوي على فَنيل أَتِيلامين، فَنيل أَتِيلُوريا، فَرْنَازُول، كَمْفان، د- يينان.

- نَبْق (مُسْهِل الـ)، رَمْنُوكَتَرْتِيْن – نَبْق (مُسْهِل الـ)، رَمْنُوكَتَرْتِيْن

اسم يُطلَق على جَوهر مُرّ ومُسْهِل، يُوجَد في عُنيبات النَّبِق المُسْهِل Rhamnus اسم يُطلَق على حَوهر مُرّ ومُسْهِل، يُوجَد في عُنيبات النَّبِق المُسْهِل C₂₇H₃₀O₁₄.

- سَمْبُو کُوسید – سَمْبُو کُوسید

اسم يُطلَق على أنْتُوسيانُوسيد يُوجد في قشور البَيْلسان Sambucus nigra. تحليله المائيّ الحامِض يُحرِّر ذَرَة من الغلوكوز، ذَرَّة من الرَّمْنُوز، وذَرَّة من السِّيانيدُول.

- سَنْدَرَك – مَنْدَرَك – 171- Sandaraque

هو الاسم الفَرنسيّ القديم الذي كان يُطلَق على الزَّرنيخ الأحمر Réalgar. وكذلك راتنج السَّنْدَرك، أي التُويا العِقْدِيَّة Thuya articulata. دُهن خَشَب ال: سائل بُنِّيّ اللَّون الأحمر، يُستخرَج من خشب السَّنْدَرُوس الرُّباعيّ Callitris quadrivalvis. يحتوي على كَرْقُكْرُول، تِيمُول هيدروكينُون، تِيموكينون. دُهن راتنج الم: سائل ذَهبيّ اللَّون الأصفر، يَتم الحصول عليه من جَرّاء تقطير السَّنْدَروس الرُّباعيّ. يحتوي على اللَّون الأصفر، وعلى ديتَرْبان.

سم يُطلَق على راتنج يُستخرَج من ثمار أنواع مُختلِفة من النَّخُل في الهند وأمريكا الجنوبيَّة وجزر الكناري. أصنافه تقع في شكل قُضبان، أو زَيتونيَّة الشَّكل، أو طُلْمِيَّة، الصَّنف الأخير يُستخرَج بواسطة بخار الماء، ويكون شديد اللَّون الأحمر، سُكّريِّ

الطَّعم. يُستعمَل دم الأخوين في تلوين الدِّهانات والوَرنيش ووَرْنيش الحَفْر الزِّنْكيّ (بالزِّنْكيّ (بالزِّنْكونِ)، إلخ.

- صِنْدَل – 173- Santal

اسم يُطلَق على خشب أحمر اللَّون، شديد الصَّلابَة، يُوجَد في الأسواق إمّا في نُجارة أو مسحوقًا اسمه سَنْتالين Santaline أي صَنْدَل مسحوق. دُهن خَشَب اله: سائل باهت اللَّون الأصفر، رائحته خفيفة ولكنَّها دائمة، يُستخرَج من خَشَب الصَّنْدَل الأبيض Santalum . يحتوي على أكثر من ٩٠٪ سَنْتَالُول، سَنْتان، سَنْتانُون، سَنْتالال، حامِض سَنْتاليك (صَنْدلق)، سَنْتَلان أَلْهَا وبيتا، إلخ.

- سَنتُونِين – سَنتُونِين

اسم يُطلَق على مُشْتَقَين مُتَجازِتَين تركيبهما الكيميائيّ $C_{15}H_{18}O_3$ ، وهما الجوهر الفَعّال في ما يُسمّى سَمَن كُونْترا Semencontra الموجود في الأرطماسيا البَحرِيَّة Artemisia maritima .

- تَتُوب (قشر الم) 175- Sapin (écorce)

قشر التَّنُّوب استُعمِل أحيانًا في دباغة الجلود. زَيت اله: سائل فاتح اللَّون البُنِّيّ الأصفر، يُستخرَج من حبوب التَّنُّوب المُشْطيّ Abies pectinata.

- أبيسَة بَيْضاء (۱۱ (دُهن أكراز) (- أبيسَة بَيْضاء (۱۲ (دُهن أكراز) (دُهن أكراز)

سائل عديم اللَّون، رائحته بلسميَّة تُذكِّر برائحة البرتقال واللَّيمون الحامِض، يُستخرَج من أكراز الأبيسة البيضاء Abies alba. يحتوي على ألْفا ل - بينان، ل- ليمونان، بورنايول.

- أَبِيْسَة حَمراء (١) (دُهن إبر ال) (- أَبِيْسَة حَمراء (١) (دُهن إبر ال)

زيت دهنيّ سائل، عديم اللَّون، مُستحَبّ الرّائحة، يُستخرَج من إبر خضراء من الأبيسة السّامِية (١) Abies excelsa يحتوي على ألفا - ل - بينان، ل- فَلَّنْدران، دينتّان، أستات البورنيل، كادينان.

- نَدْغ بُستانیّ (دُهن) 178- Sariette des jardins (ess.)

زیت دُهنیّ یُستخرَج من النَّدغ Satureia hortensis، یحتوی علی کَرْفَکْرول، پ-سِیمان، تَرْپان واحد. زیت نَدْغ الجَبَل Satureia montana یحتوی علی کَرْفْکْرول، تَرْیانات.

(١) التَّــمــة لإدوار غالب.

٣- الوَصْفات الطِّبِّيَّة

فرنسيّ - إنجليزيّ - عَرَبيّ

1- Métrites (F) Metritis (E)

رُحام، الْتِهابُ الرَّحِم

راجع تَرِيَّة (في هذا المُلحَق) Voir Pertes blanches

2- Métrorragies (F) Metrorrhagia (E)

نَزْفٌ رَحِمِي، ذَنَن الرَّحِم

راجع نَزْف، إدماء وافِر (في المُعجَم السادس، صفحة ٢٨٨) Voir Hémorragies

3- Migraines (F) Migraine, Hemicrania (E)

شَقِيْقَة، أَلَمُ نِصْفِ الرَّأْس

4.8

الاستشارة الطِّبِيَّة ضروريَّة. - شُقَار الفصح، حبق، بابونج، قنّب هِنديّ، خزامی، مردکوش (نقاعة ۲۰ غرامًا فی نصف لیتر ماء غالی)، مَلیسَّة (۱۰ غرامات فی نصف لیتر)، برتقال (أزهار وأوراق، ۱۰ غرامات فی نصف لیتر)، ندی البحر (۱۰ غرامات فی نصف لیتر)، ندی البحر (۱۰ غرامات فی نصف لیتر)، ندی البحر (۱۰ غرامات فی نصف لیتر)، زعتر مَدّاد (٥ غرامات)، زیزفون (٥ غرامات)، زعتر (٥ غرامات)، غرامات)، فیرونیکا، رِعی الحمام.

- ملفوف، فول، بصل، فرفحين، لوز، كرز، درّاق.
- بالإضافة إلى ذلك: حمّامات أرجل بواسطة ١٠٠ غرام طحين الخردل في الماء الساخن. شرائح ليمون حامض على الصّدغين. قهوة باردة. لَصُوقات من أوراق الملفوف على الجبهة أو على الصّدغين. ٥ غرامات من مسحوق الناردين مع بعض العسل.
- وَصْفَاتَ قديمة: إِبريق من الفخّار مملوء بالماء الغالي حتّى ثلثيه. نضيف إليه كوبًا من الخَلّ. نعرِّض الوجه للبخار مدَّة ﴿ إلى ١٥ دقيقة. نُجفِّف الوجه. ننام بمعزل عن أيّ مجرّى هوائيّ.
- تَداوٍ مَعْدِنتِ: Métallothérapie: نضع وعاءً نُحاسيًّا على الجبهة لمدَّة ٥ إلى ١٠ دقائة..

- نلف الرَّأْس بمنشفة إسفنجيَّة مُشرَّبة بماء مالح جدًّا. نترك في قلب المنشفة طرف شريط نحاسيّ طويل نصِل طرفه الثاني في حنفيّة ماء. نَصبُر ١٥ إلى ٢٠ دقيقة. - كلورال، ٢ إلى عزامات في اليوم، في ٢٥٠ إلى ٣٠٠ غرام من الماء

- خليطات لنَوْبات الشَّقيقة

غ	۲		• .	,											 -							,							نو	~	ال	ی	ند	(١
غ	١		• .																												بن	ِدي	نار		
غ	١		• .						. ,	•			,		 ,									 							ىي	زاه	خ		
غ	١		• .				,																 ٠	 		٠.		ر	ما	נ	ر ،	ع.	عر		
غ	١	4	• .			. ,																		 			ē	ر ذ	بط	5	سة	وَي	جُ		
غ	۲	•	• .																					 					نو	_	ال	ی	ند	(۲
غ	١	•	• .																				 	 							ā	يس	مَل		
غ	١	•	• .								. ,													 							ج		بنة		
غ	١	•	• .																				 	 			ć	رز	عط	٠ ،	ــة	ويہ	ج		
غ																																			
غ	١	•									 . ,										٠				 -				ئر	۰.	J١	ی	ند	(۲
غ	١	4	٠.					. ,			 					. ,														Ç	وذ	زف	زي		
غ	١		١.									,				 									 						ر	وم	ش		
غ	١	4			. ,									ņ		 		 							 					ن	يو	طر	قن		
غ	١	4	١.													 									 							نع	نع		
غ	۲	4	٠.						,																 				4	2	نلي	• (٤		
غ	١	•	٠.		 													 							 						ō	غد	زء		
غ	١	•	١.														,			. ,					 						ین	رد	نا		
غ	١	٠	٠.		 																				 		. (۱م	ئم	لہ	١,	عي	ر٠		
غ	۲		٠.																						 					(مح	زا	÷		

يُؤخذ ٥٠ إلى ٦٠ غرامًا من الخليط في ليتر ونصف اللّيتر من الماء، يُغلى حتّى إنقاص نصف الكمّيّة. عِدَّة بَلْعات كلّ ساعة خلال النَّوْبات.

عَقْصُ الحَيَّة، نَكْزُ الحَيَّة 4- Morsures de serpent (F) Snake bites (E) مَصْل مُضادّ للسُّموم، أَرْقِطُبون، خُزامي، لسان الحمل. عَضُّ الحَيوانات 5- Morsures d'animaux (F) Animal bites (E) راجع وَخْزَة، لَدْغَة، لَسْعَة (في المُعجَم الرابع، صفحة ٣٠٦ Voir Piqûre . d'amimaux وَخُهُ الذُّباب 6- Mouches (F) Fly (E) راجع وخز الحشرات (في هذا الملحق) Piqûres d'insects. وَخْز «الذَّباب»، يَعُوض، يَرْغَش 7- Moustiques (F) Mosquito (E) راجع وخز الحشرات (في هذا الملحق) Piqûres d'insects. قُلاع 8- Muguet (F) Thrush (E) نَعْسل الفم، أربع إلى خمس مَرّات في اليوم، بماء مُمَلَّح، بمقدار نصف مِلْعَقة صغيرة من الملح في مقدار مِلْعَقة كبيرة من الماء. - غسل الفَم المُتكرِّر بنقيع أوراق المريمية، السُّرْفِل، القِمام الآسي. - حمّامات للفّم من: بَوْرَق (بوراکس) عَسَل مُورَّد عَسَل مُورَّد عَسَل مُورَّد ١٥... عَ ماءماء ۳۰۰ ملار وَجَع عَضَلَيّ 9- Myalgies (F) Myalgia (E) راجع آلام عَضَليَّة (في المُعجَم الرابع، صفحة ٢٩٥) Douleurs musculaires. قُلاب 10- Myocardites (F) Myocarditis (E) أَدُونِسِ، قمعيَّة أي ديجيتال، دفلي، ستروفَنْتُوسِ، تبڤاتيا دفْليَّة. - علاجات طنيّة. غَثَيان، تَهَوُّع 11- Nausées (F) Nausea (E)

4.1

مَلاكيَّة أي أنجليك، نَعْنَع.

كرفس، غافَث، أدُونيس، ورق بَتُولا، حِمْحِم، غالِيون أَصْفَر، ثَيِّل، أوكالپتوس، وزال (أوروبِّيّ)، ثمار العَرْعَر، غرِنْداليا (٣٠ نقطة من المُستخلَص المائع، ٢ إلى ٣ مَرّات في اليوم)، هَدال، جابُورَنْدِي، خُبّازَة، زنبق الوادي، أنواع القرصعنّة، حشيشة الزُّجاج، درّاق، عَصا الرّاعي، لِسان الحَمل، ذنب الخيل، كَنكينا، مَلكة المُروج، بَراعم الصَّنوبَر، إِشْقيل، قَضيب الذَّهَب، بَيْلسان، عُشبة القوى، أريغارون كندا.

- لوز، شَيْلَك، بندق، تُفّاح.

- خَليطات:

٤٠) عنب الدُّبّ (أوراق)
٠٢٠ غ	ذنب الخيل
٠٢غ	حشيشة الزُّجاج
٠٠٠٠	مُرّان (أوراق)
٠٢غ	كشمش أسود
٠٢٠	سُوس (جذور)
٠٠٠٠	نَعنع (أوراق)
٠١٠	جَلْهَم (قشرة)

نقيع ٣ ملاعق كبيرة من الخليط في نصف ليتر ماء يُغلى دقائق قليلة، يُغطّى عشر دقائق، ويُؤخّذ منه قدر المُراد.

سروج٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢) عراوة ملكة الم
٠٠٠٠ ٢٥	ئيًّل
٠٥٢غ	عنب الدُّبِّ
٥١غ	شِبرِق
٥١غ	كيس الرّاعي .
١٥١غ	شِنداب
٥١غ	خَلَنْج
١٥٠٠غ	و قرًيص

۱۰.	كرز (عروق أي أعناق)
ي ليتر ماء يُغلى ويُغطَّى ويُؤخَذ حسب المُراد.	نَقيع ٣٠ غرامًا من الخليط في
٠٠٠	٣) عِنب الدُّبِّ
٠٠٠	نَجيل، ثَيَّل
٠٠٠	عراوة ملكة المروج
٥٢غ	شِبرِق
٥٢غ	كرز (أعناق)
١٥١غ	
٥١غ	_
١٥١غ	
خليط في ليتر ماء يُغلى عشر دقائق، ويُؤخَذ بكامله	
	خلال النَّهار. يُنصَع به أيضًا ضدّ
	- نَقيع من خَليطَين مُتَناوِبَيْن:
٠٠٠	١) غاليون أصفر١
۱•.	زيزفون
٠٠٠	
٠٠٠	
٠٠٠	
٠٠٠	
٠٠٠٠	٢) أخيليا أمّ ألف ورقة
٠٠٠٠	غاليون أصفر
۱۰	عقًيدة
٠٠٠	نَجيل
١٠	عِنب الدُّبِّ
٠٠٠	داذي مُخَرَّمدا
بتر ماء يُغلى دقيقتين ويُغطّى ١٥ دقيقة. يُؤخَذ منه ٢	نَقيع ٣٠ إلى ٤٠ غرامًا في لب

٣٠٨ إلى ٣ فناجين في اليوم.

	- المُراقَبة الطُّبيَّة ضَروريَّة.
13- Néphrose lipoïdique (F) Lipoidnephrosis (E)	كُلاءٌ شُحاميّ، كُلاءٌ شَحْمانيّ
الكُلاء الشُّحاميّ: أريغارون كندا. علاج طبِّيّ.	اضطرابات بَوليّة ناتجة عن
14- Nerfs (crises de) (F) Attack of nerves, Fit of h	نَوْبات عَصَبيَّة (ysterics (E)
بابونج روماني، هَدال، مَليسَّة، نعنع، زيزفون،	
ـ ورقة، برتقال، ندى البحر.	ناردين، زعرور، خُزامى، أمّ ألف
15- Nerveuses (maladies) (F)	أمراض عصبية
ور)ا	مَلاكيَّة أي أنجليك (بز
١٠	زيتون (ورق)
١٠.	برتقال (ورق)
١٠.	
٩٣غ	
) (۱۶	بَلْسَميتة (رؤوس مُزهِرة
) (۱غ	نرجس الحقول (أزهار
رة)اغ	مردكوش (رؤوس مُزهِر
 ٥ دقائق ويُؤخَذ منها ٣ فناجين يوميًّا بين الوجبات، جان، للبالغ؛ مِلعقة كبيرة لكل فنجان، للأولاد من ٥ كل فنجان لمن هم دون الخامسة. 	كما يلي: ٣ مُلاعق كبيرة لُكلِّ فن
16- Nervosisme (F) Nervosism, Nervosity (E)	عَصَبيَّة، تَوَتُّر الأَعْصاب
ة عطريَّة، زعرور، فَراسيون نَيِن، خَسَّ، مردكوش، والحقول، برتقال، وَدَح، ملكة المروج، مَريميَّة،	
، بَصَل، بَقلة حَمقاء، مشمش، لوز، جوز، درّاق،	- كرفس، فاصوليا، خَسَّ
	تفّاح، عنب.
ر)	
٠٠٠	قَلَمنتق

4.4

نعنع مُفَلْفَل (ورق)٢٠غ	
مَليسَّة (ورق) مَليسَّة (ورق)	
زعتر مَدّاد۲۰	
ناردين (جذور)	
زعرور (أزهار)١٠	
َالامِيَّة (ورق)١٠٠	
نقيع ملعقتين كبيرتين من الخليط لكلّ فنجان ماء يُغلى قليلًا ويُغطَّى	
خمُّس دقائق. فنجانان في اليوم بين الوجبات، وثالث عند النَّوم.	
طوال أسبوع .	
 حَمّامَات: كيلوغرام واحد نُخالة مع ٢٠٠ غرام من ورق الجوز 	
في كيس من المُوصليّ. نَغلي ربع ساعة في مقدار ٥ ليترات ماء.	
نضيف النَّقيع إلى الحمَّام: من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة.	
- حَمّامات:	
زيزفون (أزهار)وغ	
قَلَمَنْتقَلَمَنْت	
نعنع (ورق)هغ	
صعتر، أوريغانُم٠٠٠٠٠	
يُؤخَذ من الخليط خمس قبضات (أي كمشات) في كيس قماش نُغطِّسه في مِقدار	
ليتري ماء. نَغلي ١٥ دقيقة ونُضيف الكلّ إلى الحَمّام.	
أُوراستِنيا، وَهَن عَصَبِيّ، حَرَض (E) Neurasthénie (F) Neurasthénia (E)	
راجع فَقْد الذَّاكرة في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨١، انهيار عَصَبيّ في المُعجَم	
الرابع صفحة ٢٩٣): أَبْسَنْت، أمّ ألف ورقة، حبق، فَراسيون، قِنَّب هنديّ، إيبوغا،	
مردكوش، ماتي، جوز القَيء، آلامِيَّة، مَريميَّة، زعتر مَدَّاد، زعتر، زيزفون، ناردين.	
- - بعض الخليطات الواجب تَناوُبُها :	
١) ناردين١	
رِعْي الحمام المَخْزَنيّ	
مَلِيتَةمَلِيتَة	٣١.

ەغ	4	•																														قة	رر	, ,	ف	ָן וֹנ	-	
ه غ	•	•			 ,					,	٠									,		-													يقا	لمون	بَه	
ەغ		•										 			,			, .		,				- ,		٠.		٠.								ىنع	نه	
١غ	•	•	•	,							,																				(;	,		5)	يّة	باط	رِي	
ەغ	•	١.						,				 			,					,														ں	وش	ٍدک	مر	(۲
ەغ	•	• .										 														 										ىنع	ن	
٥غ	•	٠.								,		 														 							. (رد	ريو	طا	قن	
۳غ	•	• .								•		 																	. ,						ت	<u></u>	أب	
۱غ	•	•	•		,				٠								٠.								-	 					٠.	(يل	بخ	11	ئب	ذ	
۱غ	•	•	•				-							 		-	٠.												٠.						ة	ليــً	مَ	
۱غ	•	•	٠									 	-	 				 			 • 7											ن	نَڌِ	ن	ىيو	راس	فر	
٥غ	•	٠.												 				 														٠.			يَّة	یم	مَو	(٣
ەغ	•	١.										-	-	 				 																	_			
ەغ	•	٠.												 				 											. (ر)	.و					جا		
۱غ	٠	,	٠											 				 														•				نب		
٥غ	٠	٠.												 				 																		ىل		
۱غ	•	,	٠																					٠.								کَة	ار	مُب	ä	ىوك	ند	
۱غ																												٠.			(ē					باط		
٥غ						•																											_				_	({
٥غ																																						
٥غ	٠	,																								 	. ,						٠.		ō	غْدَ	زُ	
۱غ	٠		•						•														•			 									٠.	بكر	إ	
٥غ																																				1		
۳غ																																						
۱غ	٠		•																							 						ن	نَدِ	ن	ىيو	راس	ف	

يُؤخَذ ٥٠ غرامًا من الخليط لمقدار ليتر ونصف من الماء، يُغلى حتّى تُصبح الكمّيَّة ليترًا واحدًا. ثَلاثة فناجين في اليوم.

711

آلام عَصَبِيَّة وأَلَمُ النَّسا، أَلَمُ العَصَبِ الوَركيّ

18- Névralgies et sciatique (F) Neuralgia and sciatica (E)

(راجع كذلك روماتيزم في هذا المُلحَق): أكُونيت، شقار الفصح، بابونج رومانيّ، قِنَّب هنديّ، أَقْتَى عُنْقُوديَّة، ملعى، كَرْدَمانَة، أَرطاة أَنيقة، هوانغ نان، عَشْقَة، نعنع، حندقوق، خردل، صعتر، پاريرا براڤا، خشخاش مُنوِّم، زعتر مَدّاد، داتورة شائكة، تربنتين، عراوة، رعي الحمام المخزنيّ.

- لَزْقات ورق ملفوف.
- مرهم سِتَ الحُسْن: ١٠٠ غرام شحم حيوان، مستخلص ستَ الحُسْن ٥٠ غرامًا.
 - تَمسيد بزيت البابونق أو زيت الداذي.
 - مُعالَجة بوخز الإبَر.

19- Névralgies dentaires (F) Dentalgia, Dental neuralgia (E)

عُصابات سِنْيَة، أَلَم عَصَب السِنّ

راجع إِسْنان، مجموعة الأسنان Dentition في المُعجَم الرابع صفحة ٢٩٢.

20- Névralgies faciales (F) Facial neuralgia (E)

آلام عَصَبيَّة وَجُهِيَّة، عُصابات وَجُهيَّة

أكونيت، بابونَق، نعنع، داتُورة شائكة. إلى عُصابات العَصَب المُثلَّث نضيف: أَرْطاة أنيقة، رعى الحمام المَخْزَنيّ.

21- Névrites (F) Neuritis (E)

النيهاب العصب

أسبيرولة عطرة، نعنع، زعتر، رِعي الحمام المَخزَنيّ.

- علاجات طِبْيّة.

22- Obésité (F) Obesity (E)

بَدانَة، سِمْنَة، ثُلَن

غافَث غُولاني، كمالِيَة، ألْغ بحريّ، كاكَنْج، جَلْهَم، عِنب الدُّبّ، غاليون أصفر، كاراغاهِين، جزر، رُكّة، سُورنجان، فَوْقَس، فَراسيون أبيض، فَقُوس الحَمير، ذَنَب الخَيل، فَوْقَس حُويصلّي، كرمة حمراء.

- الموادّ المُسهلة القَويَّة النَّباتيَّة.
 - ٣١٢ الأنواع النَّباتيَّة المُبوِّلة.

- نُقاعة الماتي تُفَرمِل الشَّهيَّة إذا أُخِذت قبل الوجبات بربع ساعة. خليطات من: ١) عنك الدُّت كمالية تىلسان (جذور) غاليون أصفرفع شِبْرق (جذور)٠٠٠٠غ بَتُولا (ورق)١٠٠٠غ ٢) يُتُلسان (جذور)٢) ذَنَكِ الخَيْلِدنينان الخَيْلِ تُونْشاه (أزهار)ا شَيْلُك (ورق)ا كَمالِيَة بَتُولا (ورق)نبه المانية الماني نقيع ٤٠ غرامًا من الخليط في ليتر ماء يُغلى ويُؤخَذ منه ثلاثة فناجين يوميًّا. - خَليطات أخرى: ١) فَوْقَس حُويْصَلِيّ١) فَوْقَس حُويْصَلِيّ٠١٠ لَكُيَّة أي فيتُولكَّة١٥٠ سَنا (ثمار) شَرونة٥غ

شوس۱۰۰۰ غ

مَويميَّة٥غ

كُرْمَة حمراء٥٤

هَمامَلِيسِ٥غ

لُصِيقِي٥غ

نقيع مِلعقة كبيرة من الخليط في مقدار فنجان ماء يُغلى دقيقتين، يُغطّى ربع ساعة ويُؤخَذ منه فنجانان في اليوم.

٢) فَوْقَس حُويْصَليّ
 ٢٠ نَبْق پُورشيانا
 ١٠ أنيسون أخضر

تُغلى الكمِّية خمس دقائق في ليتر ماء. يُؤخَذ في يَومين. مَرّة كلّ أسبوع.

- لَصُوق ضدّ التهاب النَّسيج الخلويّ: فَوْقَس حُوَيْصليّ مع نُخالة. نطبخ لدقائق قليلة في ماءٍ مُمَلَّح بالملح البَحريّ. نحتفظ باللَّصُوق عِدَّة ساعات.

- حَمّامات من:

خَلَنْج (أزهار)، عَرْعَر (ثمار)، صَفْصاف (قشور)، عَراوة، زعتر مَدّاد. خمسون غرامًا من كلّ نبات. نأخذ من الخليط خمس قبضات (كمشات) في كيس قماش نَغليه في ليتري ماء. نضيفه إلى ماء الحمّام. حَمّامان في الأسبوع.

- حَمَّامات بُخار، رياضة تَنَفُّسيَّة، رياضة جَسديَّة يَوميَّة مُعتدِلة.

23- Œdèmes (F) Œdema, Edema (E)

أُوْدِيْما، أُوْذِيْما

أرضي شَوكي، بِيغينيان، بَتُولا، فاشِرة، كرز، حنظل، قِمعيَّة، وَزّال (أوروبِّيّ)، عرعر، لَبْلاب كبير، جَلَبَة، لُصَيقي، ذرة صفراء، فَقُوس الحمير، نَبْق، بَصَل، شاي جاوا، آذان الفأر، سَقَمونيا، إِشْقيل، ستروفَنْتُوس، بَيْلسان.

- المُراجَعة الطُّبِّيَّة ضروريَّة.

24- Oligurie (F) Oliguria (E)

نزَارَةُ البَوْل، شُعُّ البَوْل

- مُراجَعة الطَّبيب.
- كَرَفْس (أمراض قَلبِيَّة، حالات حُمِّيَّة)، كاكَنْج، هليون (نزارات بَوْل عند مُصابي القَلْب)، بَتُولا، حِمْحِم، شِبرِق، عِنَب الدُّب، خَلَنْج، كشمِش، غاليون أصفر، كرز، شوكة مُباركة، نَجيل، زَهر النَّسْرين، برباريس، شمرة، مُرّان، فُوَّة، وَزَال (أوروبِّيّ)، عرعر، لَبْسانَة، خُزامى، أنْجُذان رُوميّ، ذُرة صفراء، مرغريت، نعنع، بَصَل، شاي جاوا، شُبُهان، أنواع قرصعنَّة، حشيشة الزُّجاج، بنفسج برِّيّ، بقدونس، سَفَنْدَر، آذان الفأر، إتجاص، تقاح، ذنب الخيل، قُوقاع مُستَدير الورق، ملكة المروج، نَدى البَحْر، قَصَب المكانِس، إيكر، مريميَّة، إشْقيل، زعتر مَدّاد، قضيب الذَّهب، بَيْلَسان، عراوة، أريغارون كندا، فيرونيكة.

- لِفْت، كُرَّاث، هِنْدَب، بندورة، كرز، كشمش، درَّاق، إجَّاص، عنب.

- نبيذ تروسُو

قِمعيَّة (أوراق مُجفَّفة) به تعلق (أوراق مُجفَّفة) إشْقيل (حَراشِف) به تعلق الشَّقيل (حَراشِف) به تعلق عراد (ثمار) به تعلق المنابقة المنا

نمرث الكلّ لمدَّة ١٥ يومًا في مزيج من مقدار ليتر نبيذ أبيض مع نصف ليتر من الكحول. نُمرِّر ونعصر. عندها نضيف ٢٠٠ غرام من أستات البوتاس. نُصفيّ. يُؤخَذ مِلعقة إلى ثلاث ملاعق كبيرة في اليوم.

- كمادات ساخنة من:

خُبّازة (ورق)، مريميَّة (ورق)، لَوِيزة، بمقادير مُتساوِية. قبضة (كمشة) من كلّ نبات في ليتر ماء يُغلى ٥ دقائق. كمادات توضع على الأماكن الحَقُويَّة.

- نَزارة البَوْل في حال أمراض الرِّئة، أو في حال الكريب: نَضع فوق الكلى بَصَلتين أو كرائتين نَيئتين ومهروسَتين.

- خليط من:

عِنبِ الدُّبِ (ورق)
ذَنب الخيل
حشيشة الزُّجاج
مُرّان (ورق)
كشمش (ورق)٠٠٠غ
سُوس (جذور)
نعنع (ورق)
جَلْهَم (قشور)١٠

يُؤخَذ ٣ ملاعق كبيرة من الخليط في نصف ليتر ماء يُغلى دقائق ويُغطّى عشر. يُؤخذ منه خلال الوجبات أو قدر المُراد خلال النّهار.

25- Ophtalmie (F) Ophthalmia (E)

الْتِهاب العَيْن، رَمَد

تُرُنْشاه، بُوصير أبيض، بابونج، سرفل، بَقلة الخَطاطيف، عُرْقُون، فرمبواز، عطر، خَسّ، خُبّازة، حندقوق، لُبّين المروج، جوز، بقدونس، لسان الحمل، ورد

أحمر، فرفارة.

- حَمَّامات للعين بماء مُملَّح بمقدار مِلعقة صغيرة في نصف ليتر ماء.

26- Orchite (F) Orchitis (E)

الْتِهاب الخُطْيَة، ذَات الخُطْيَة

الرَّاحَة. علاجات طبيّة.

27- Oreilles (F) Ear (E)

أُذُن، وَجَع الأُذُن

- راجع طنين الأذن Bourdonnements (في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٩).

- وَجَع الأُذُن Ear - ache: ثُوم، بصل، بندق، بقدونس.

28- Otites (F) Otitis (E)

التهاب الأذن

عِلاجات طبيّة.

29- Oxyures (F) Oxyuriasis, Oxyuria (E)

أَقْصُورِيَّة ، داء حادّات الذَّيْل

أَبْسَنت، ثوم، قَيصوم، بَلْسَميَّة، ملفوف، جَنْطيانا، لُصَيقى، بابونج أقرع، غِرْديب، قَيصوم جَبلتي، سَمَن كُونْترا (أي بزور ضدّ الدّود)، حشيشة الشِّفاء.

- نُقاعَة مِلعقة صغيرة من الخليط التالي، في مقدار فنجان ماء غالي يُغطّى عشر دقائق. تُؤخَذ النُّقاعة لثمانية أيّام في بدء الهلال، وثمانية أيّام عند تمام البَدْر، صباحًا ومساءً للبالغ، ومساءً لقط للأولاد:

 طُحُلُب کُورسیکا
 ۱۰

 یانسون
 ۲۰

 نعنع (ورق)
 ۲۰

 زعتر (رؤوس مُزهِرة)
 ۱۰

 حشیشة الدُّود (أزهار)
 ۱۰

 أبسنت (رؤوس مُزهِرة)
 ۱۰

 سَرْخَس ذکر (ریزوم)
 ۱۰

 سَنْتُونین (بزور)
 ۲۰

 مُنْصَح بهذه الوصفة أیضًا ضدّ الصَّفَر.
 ۲۰

- حُقن شَرجيَّة بالماء المُملَّح.

411

تُؤخَذ النَّباتات المُنقِّبة كالأرقطيون وقُرّة العَين. . واليودورات.

31- Palpitation (F) Palpitation (E)

خَفَقان، الْحَيْلاج

إِرْثِد، زعرور، فَراسيون، قنطاريون، كرز، غاركَرزِيّ، نعنع، زنبق الوادي، برتقال (أزهار)، برتقال (ورق)، آلامِيَّة، ناردين (جذور).

- نُقاعَة أسپَرولة، بالتَّناوب مع ٢٠ نقطة من صبغة الزُّعرور الكحوليَّة أو كحولتور النَّاردين المُثبَّتة، أو كحولتور الفَراسيون.

32- Paludisme (F) Paludism, Malaria (E)

بُرَداء، مَلارِيَا

بابونَج، جَنْطيانا، عَبّاد الشَّمس، باذَوَرْد، نرجس، وِنكا، هِنْدَب، كَنكينا (خمر الكنكينا، راجع فَقْر الدَّم في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨١).

- شولفات الكينا ٠,٦٠ إلى ٢ غرامين في اليوم.

- خلال النُّوبات، نَقيع من:

 صَفْصاف (قشور)

 بَتُولا (قشور)

 بَهْشِيَّة (ورق)

الكُلِّ في ليتري ماء يُغْلَيان حتَّى إنقاص النُّصف. فناجين صغيرة كلِّ ساعتين.

- خَليطات من:

سفصاف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	۱) ه
بِنْدَبِاء بَرِّيَّة	•
فَل الماء ٢٠غ	نَا
بْسَنت	i
يُجَن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	فَ
تُولا (قشور)٠٥غ	ڔؘؙ
نطاريون ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	۲) ق
كيس الراعي٠٠٠	5
مُشبة القُوي	•

بَهْشِيَّة (ورق)

ناردين

بَتُولا (قشور)

بَتُولا (قشور)

يُؤخَذ منهما، أو من أي منهما، فنجان أو اثنان في اليوم.

33- Panaris (F) Panaris (E)

داجِس، داخُوْس

جزر، ملفوف، قرّة العين، فول، لفت، بَصَل، كشمش، عنب. راجع خُراج، دُمَّل Abcès في المُعجَم الثالث صفحة ٢٧٩.

34- Papillomes (F) Papilloma (E)

وَرَم حُلَيْمِي، حُلَيْمُوم

بَقْلَة الخطاطيف، عَفْصِيَّة أي تُويا.

35- Paralysies (F) Paralysis (E)

شَلَل، فالِج

(عَواقب الشَّلل): خَلَنْج، مِلْعَقيَّة، فول إنياس، هوانغ نان، جوز القَي، ستركنين، ملفوف. حَمَّامات بَحريَّة. في الشَلَل المُرَعِّش: زَهرة عُطاس، ندى البحر، ناردين (جذور).

36- Paupières (F) Eyelid, Blepharon (E)

جَفْن، جُفُون

التهاب الجُفون: راجع سُلاق Blépharite في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٨.

37- Parkinson (F) Parkinsonism (E)

باركنسون

سِتّ الحُسْن، شَوْكران كبير، بَنْج، ثَلْثان، داتُورة شائكة.

38- Peau (F) Skin (E)

بَشَرة، جِلْد، إِهاب

إصابات جِلديَّة، أَمْراض جِلْديَّة: حَشيشة الثُّوم، أَرْقطيون، بَتُولا، حِمْجِم، بَقْس، مشط الرَّاعي أي شَوْك الدُّرَاج، سُعادى، قنطاريون كبير، هندباء بَرِّيَّة، حامض، مِلْعَقِيَّة، قُرَّة العَيْن، حُلوة مُرَّة، شاهترج، غاياك: (٨٠ غرامًا من الخشب في ليتر ماء يُعلى)، قطران، عُشبة الفُقراء، أنجذان روميّ، خُبازة، نَفَل الماء، أفانِيَة أي مَغْد، دَرْدار، حُمَّيض، بَنَفْسَج الثَّالوث، حَوْر، صنوبر، هِنْدَب، فشاغ، صابُونيّة، جَربيّة، خَنازيريَّة، آذريون، بَيْلسان، فرفارة.

- سِلْق، شیکوریة برِّیَّة، قُرَّة العین، بَصَل، حُمَّاض، هِنْدَب، سَلْسَفیل، فریز، نندق.

- خليط من:

٠٠٠٠	بنفسج الثَّالوث (أزهار)
٤٤٠	شاهترج
٥غ	أسبرولة عطريَّة
٥غ	هِنْدَب (ورق)
٥غ	سَنَى (ثمار)
٥غ	ملكة المروج

نُقاعة مِلعقة كبيرة لكلّ فنجان ماء غالٍ. يُؤخذ ٢ إلى ٣ فناجين في اليوم.

- خليط من:

شراب الشاهترج بيكربونات الصود بيكربونات الصود بيكربونات ألم منه منعقة كبرة، صباحًا ومساءً.

- من الخارج: غَسيل مُتكرِّر بنقيع أوراق المريميَّة، أو قشور السِّنديان، أو قشور البَّنديان، أو قشور البَتُولا. مَسْح بزيت الكاد. بَشَرة مُدهِنة: سرفل، ملفوف، خيار، حامض. بشرة جافَّة: شَمَام.

39- Pédiculose (F) Pediculosis (E) مُمَلُ ، قَمَلُ ، فَعَالَ ، داءُ القَمْلِ ، قَمَلُ ، فَعَالَ ، داءُ القَمْلِ ، قَمَلُ ، قَمْ القَمْلُ ، قَمَلُ ، قَمْلُ ، قُمْلُ ، قُمْلُ

غِرْدِيب، تربَئْتين، زَعْتر.

40- Péricardites (F) Pericarditis (E)

الْتِهابُ التَّأْمُورِ، الشَّغاف

أرضي شوكي، بِيغينيان، بَتُولا، فاشِرة، كرز، حنظل، قمعيَّة، وَزَّال، عرعر، لبلاب كبير، عُشبة الفقراء، جَلَبَة، ذرة صفراء، فَقُوس الحمير، نَبْق، بَصَل، شاي جاوا، آذان الفأر، سَقَمونيا، إشقيل، ستروفَنْتُوس، بَيلسان.

علاجات طبيّة.

41- Péritonite (F) Peritonitis (E)

الْتِهاب الصِّفاق

أو التهاب الخِلْب السُّلِّي يستوجب العِلاج الطُّبِّيِّ. عُشبة الفُقَراء.

42- Pertes blanches (F) Leucorrhea, Leukorrh(o)ea (E)

تَرِيَّة، ثُرٌّ ٱبْيَض، سَيَلان مَهْبِليّ ٱبْيَض

أخيليا أمّ ألف ورقة، غافَث غُولانيّ، كماليّة، عُشبة القوى، أشهيرولة، راسَن، أنجبار، كيس الراعي، سنديان، سرو، بربريس، أوكاليتُوس، حلباء، عرعر، جَنطيانا، طُوقَريون، رمّان، هَدال، همامليس، جُنجُل، هِدْرَسْتِس، كاواكاوا، لاميون أبيض، داذي مُخرَّم، جوز، لسان الحمل، فجل الخيل، عقيدة، نَدى البحر، عوسج، ورد أحمر، فَرَنْدَل، سَكَب، مَريميَّة، جَرَبِيَّة، حشيشة الدود، تربنين، زعتر، عُشبة القوى الزَّاحِفة.

- بقدونس، فريز؛ حُقن من ٤ ملاعق كبيرة من الطّين في ليتر ماء فاتر. مُراجعة الطَّس.

سَيَلان أَحْمَر 43- Pertes rouges (F)

راجع نَزْف، إدماء وافِر (في المُعجَم السادس، صفحة ٢٨٨). التَّشخيص الطَّبِّيّ ضَروريّ. عِنْ الدُّت، سنديان، هَدال، لاميون أبيض، فَرَنْدَل، جَرَبيَّة.

44- Pertes séminales (F)

سِتّ الحُسْن، جيوم مُبارَك، أَرْغُوت الشَّيلَم، فول إِنْياس، جُنْجُل، خَسّ، مردكوش، نُوفَر، ندى البحر، صَفصاف أبيض، مريميَّة.

- برومور البوتاسيوم، من ٢ إلى ٤ غرامات في اليوم.

45- Pharyngite (F) Pharyngitis (E) دُغام، الْتِهابِ البُلْعُوم

غافَث غُولاني، أريسيمُوم، خُبَّيزة، لِسان الحَمل، عَوْسَج، قِمام آسِيّ.

الْتِهابِ الوَرِيْد (F) Phlebitis (E)

يانسون، سَلبين مريم، سَنْفيتُون، سَرو، شاهترج، همامَليس، كستنا الخيل، داذي مُخرَّم، بَنَفْسَج الثالوث، لسان الحَمَل.

- استشارة الطَّبيب ضروريَّة.

قَمَل، نَقَمُّل، داء القَمْل (Phtyriasis (E)

غِرْديب أي حشيشة الحُمّى، تربَنْتين.

48- Pieds sensibles (F) قَدَم حَسّاس

خيار، حامض.

24.

نَحْل، زنابر، قَمْل، بَقّ، بَرْغَش، إلخ. نَفرك بالثّوم، ورق الأرقطيون، الخُزامى، البقدونس، ورق لسان الحمل، الكرّاث، البصل، المليسَّة، النَّعنع، ندى البحر، مريميّة، زعتر.

- لَصُوقات من السَّرفل، أو البقدونس، ورق الكشمش المهروس مع النَّبيذ الأبيض.

- كمادات بواسطة ماء مَغليّ شديد الملوحة (كمشة من الملح البحريّ في مقدار نصف كوب ماء)، أو بواسطة خَلّ أو نُشادِر مُخَفَّف بالماء.

- نَزْع إبرة الحشرة إذا كانت لم تزل عالقة.

50- Piqure d'orties (F) Nettle's bites (E)

وَخْزِ القُرَّيْص

خُمَّيْض: Oseille

51- Pissement de sang (F) Hematuria (E)

بَوْل دَمَوِيّ

راجع بَيْلَة دَمُويَّة Hématurie في المُعجَم السادس صفحة ٢٨٨.

52- Plaies (F) Wound (E)

جُرْح، كُلْم

غافَث غُولانيّ، أرقطيون، بَقْس، سنديان، ملفوف، سَنْفِيتُون، سرو، زَهر ورد السّياج، ورق العطر، خَلُود كبير، زنبق، حَنْدَقوق، نعنع، داذي مُخَرَّم، فَقُوس الحمير، لسان الحَمَل، عقَيدة، ندى البحر، قضيب الذَّهب، آذريون، زعتر، زيزفون، فرفارة.

- ماء الشَّرْتَرِيِّين: نَهرس أزهار البَلْسَميَّة قَليلًا ونَضعها في قَنَينة نقفلها ونتركها في الشَّمس. يَتحوَّل قسمٌ كبير من الأزهار إلى زيت. نستعمله كمادات.

- ماءٌ شافِ للجُرْح: eau vulnéraire

ماء يُستعمَل في لَأُم الجروح والقُرحات، نُحضَّره بأخذ ١٢٠ غرامًا من كلِّ من النَّباتات التَّالية: خُزامي (أزهار)، فَيجن، شومر، أنجليك، حشيشة الشَّفاء، أبْسَنت، زعتر، مردكوش، ندى البحر، زعتر مَدّاد، مَليسَّة، مَريميَّة، حَبَق، نضع الكُلِّ في مقدار ثمانية ليترات ماء. نمرث طوال ٢٤ ساعة، ونُقَطِّر حتى الحصول على ليتر واحد من الماء المُقَطَّر. الهدفُ من هذه الوصفة هي الإشارة إلى التَّذكير بمعارف الأسلاف.

- طين Argile

- جزر، حامض، قمام آسى، تفّاح.

جُروح واهِنَة، أو غَنْغَرينيَّة، أو سَرَطانيَّة

53- Plaies atones, ou gangréneuses, ou cancéreuses (F)

غافَث غُولانيّ، ثُوميَّة، بَطُونيقا، بَقْس، جزر، شوكة مُبارَكة، ملفوف، قارُ الفَحْم coaltar (للقروح المُتَقَيِّحة)، سَنْفيتُون، زهر ورد السِّياج، عَشْقَة، زنبق، حندقوق، أمّ ألف ورقة، داذي مُخرَّم، لُبين المروج، جوز، صعتر، لسان الحمل، ذنب الخيل، عقيدة، نَدى البحر، عوسج، ورد أحمر (أوروبِّيّ)، صابُونيَّة، مريميَّة، زعتر مَدّاد، قضيب الذَّهب، آذريون، بَيلسان، حشيشة الشِّفاء، زعتر، ياسم، فَرفارة.

قروح سَرطانيَّة تنقيع مَغلي من الشَّوكة المُبارَكة أو الآذريون في غسيل مُتكرِّر أو كمادات.

- جزر، حامض، قمام آسيّ، خوخ.

54- Pléthore (F) Plethora (E)

كَظَّة الدَّم، كَظاظُ الدَّم، تَكَظِّ

كمالية، رِجْل الأوز، أرضي شوكي، جَيوم مُبارَك، كشمش، ثَلثان ثلثلان، شاهترج، زيزفون، عشبة القوى، زعرور.

ذَاتُ الجَنْب، الْتِهَابُ الجَنَبة، جُناب، برْسام 55- Pleurésies (F) Pleurisy (E)

أرضي شوكي، بيغينيان، بَتُولا، فاشِرة، بَقْس (خشب)، كرز، شوكة مُبارَكة، حنظل، خشخاش منثور، ديجيتال، ثلثان ثلثلان، وزال أوروبًا، عرعر، لبلاب كبير، عُشبة الفقراء، لُصَيقى، زوفا، جَلَبَة، ذرة صفراء، فَقُوس الحمير، نبق، بَصَل، شاي جاوا، بليس، آذان الفأر، سَقَمونيا، إشْقيل، ستروفَنْتُوس، بيلسان، حشيشة الشَّفاء، زيزفون.

- ملفوف، كرّاث. علاجات طبّيَّة.

56- Pleurite (F) Pleuritis, Pleurisy (E)

برسام ناشِف

فَرْبيون، كَرْدَمانَة، خردل، فجل الخيل.

- عِلاجات طبيَّة.

57- Pneumonie (F) Pneumonia (E)

ذاتُ الرُّئة، الْتِهاب الرُّئة

بُوصير أبيض، حِمْحِم، شوكة مُبارَكة، ثلثان ثلثلان، وزال أوروبًا، عَيْنُون، بَهْشِيَّة (ورق يُغلى)، خردل، ذنب الخيل، زُغْدَة، فجل الخيل، زهرة الجَرَب، بنفسج.

مُوٰثَةً، بروستات 58- Prostate (F) Prostateria (E) تَضَخُّم أو احتقان المُؤثَة. تَشخيص طبِّق. - خَلَنْج، عِنَب الدُّبّ، كشمش، سرو، هَدال، همامَليس، هِدْرَسْتُس، كاواكاوا، قَسْطل الخَيْل، خُبّازة مَرجانيَّة، ياريرا براڤا، عَفْصيَّة. - في حال الخَمَج والنَّتانَة: عرعر (ثمار)، آس، صنوبر، عنب الدُّبّ. - مُناوَية نَقيعات الخَليطات التّالية: ١) عِنْ الدُّت، بَتُولًا (قشور)، كستنا الخيل، جوز (ورق). ٢) فُول (زهر)، كُنْباث، عُشبة القوى، سرو، خَلَنْج. ٣) بَرْبُريس، كيس الراعي، كُنباث، ذرة (سمات)، صابونيّة. ٤) عُشبة القوى، بُوشو Barosma، بنفسج، هِدْراسْتِس، فلفل الماء. الأعشاب بكَمِّيّات مُتساوية. يُؤخّذ من كلّ مجموعة مقدار ٣٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى دقيقَتين، ويُغطَّى عشرًا، ويُؤخذ ٣ إلى ٤ فناجين في اليوم. حُكاك، أكال، تَهَرُّش 59- Prurigo (F) Prurigo (E) راجع بَشَرة، جِلد Peau في هذا المُلحَق. حكَّة، هُراش، حكَّة شَديدة 60- Prurits (F) Pruritus (E) مرهم من: شمع أبيضشمع شحم حيوان٠٠٠٠ - حكَّة شَرجيَّة وفَرْجيَّة : Ani, vulvae كَمالية، يُوصِير أبيض، مَغْد، فَرَنْدَل، بايُونَق. صُداف، صَدَفيَّة، داءُ الصَّدَف 61- Psoriasis (F) Psoriasis (E) بَتُولاً، قطران نَباتتي، بنفسج الثَّالوث، صابُونيَّة. - مرهم من: قط ان مُنَقِّرقط ان مُنَقِّر

277

- المُعَرِّقات كما في الجُناب. عِلاجات طبِّيَّة.

شحم حيوان

62- Psychasthénie (F) Psychasthenia (E) نَفْه، وَهَن نَفْسيّ، نَهَك نَفْسانيّ

أبسنت، أمّ ألف ورقة، فَراسيون، حبق، قِنَّب هِنْديّ، إِيبوغا، مردكوش، ماتي، جوز القَيء، مَريميَّة، زعتر مَدّاد، زعتر، زيزفون، ناردين.

63- Puces, Punaises (F) Flea, Bug (E) قَمْل، بَنِّ بُرْغُوث

راجع حَشَرات insectes في المُعجَم السادس صفحة ٢٩٦.

النهاب الحُوَيْضَة والكِلْيَة (E) Pyelonephritis (E)

قطلب، راسَن، بيغينيان، خَلَنْج، دِيُوسْمَه الشَّبَق، شِبْرق، عِنب الدُّبّ، كرز، نَجيل، شومر، فول، قطران نَباتتِ، ذرة صفراء، خبّازة أرجوانيَّة، قِمام آسيّ، حور، إجّاص، قضيب الذَّهب، تربنتين.

- عِلاجات طبّية.

65- Pyrosis (F) Pyrosis, Hearthurn (E)

حِرَّة، خُرْقة المَعِدة

فحم نباتيّ، طبشور، مغنازيا محروقة.

66- Rachitisme (F) Rachitis, Rickets (E)

فُوَّة، نَفَل الماء، جوز، ذنب الخيل، نَدى البحر، زعتر.

- شراب لسان الحَمَل.
- حَمّامات مُملَّحة، حَمّامات إيكر كلّ يومين أو ثلاث، حَمّامات من إبر الصَّنوبر التي تُغلى ساعتين. تُكرَّر الحمّامات، التي تدوم ١٥ دقيقة، طوال شهرين.
- حَمَّامات من ٥٠٠ غرام مريميَّة في ليتري ماء يُغليان ربع ساعة، ونضيف الماء إلى ماء الحَمَّام.
- حَمَّامات من ٣٠٠ غرام أوراق جوز، تُغلى ربع ساعة في ليتري ماء نضيفهما إلى الحَمَّام مع كيلوغرام واحد من الملح البحريّ.
- حمّامات من ٥٠٠ غرام من الفَوْقَس الحُوَيصليّ في ثلاثة أو أربعة ليترات ماء
 ٣٢٤ ساخن. نضيفها إلى ماء الحَمّام مع مقدار ٥٠٠ غرام من الملح البحريّ.

67- Règles insuffisantes (F) Insufficient periods, Scanty menses (E)

طَمْتْ غَير كاف، حَيْض غير كافٍ

ثوم، أَبْسَنت، أمّ ألف ورقة، ألْوَة، شيح، راسَن، بابونج رومانيّ، كَبُوسين، جزر، كَراويا، خَرْبَق أسود، شومر، شاهترج، خُزامى، أنجذان روميّ، باذَوَرْد، مَليسّة، ثَفَل الماء، بقدونس، ندى البحر، فَيْجَن، زعفران، مَريميَّة، أَرْغُوت الشَّيْلَم، سَنَى مَكِّيّ، شَرونة يَعْقُوبِيَّة، زعتر مَدّاد، آذريون، سَطاقِس، حشيشة الشَّفاء، زعتر، يُوهِمْب.

- حَمَّامات أَرْجُل مُخَرِّدَلَة.

68- Règles irrégulières (F) مُنْتُظَم، حَيْض غير مُنْتُظَم، حَيْض غير مُنْتُظَم،

خليط من:

 لاميون أبيض
 ٠ ٤٤

 جيوم مُبارَك
 ٠ ٢٤

 عشبة القوى
 ٠ ٢٤

 كمالية
 ٠ ٢٤

 نعنع
 ٠ ٢٤

مِلعقة كبيرة من الخليط في فنجان ماء غالٍ يُغطّي، ويُؤخذ ٣ أو ٤ فناجين يوميًّا.

طَنْتُ مُوْلِم، حَيْض مُوْلِم، وَيُض مُوْلِم، حَيْض مُوْلِم، السَّالِية (F) Painful menses (E)

أَبْسَنْت، شقّار الفصح، أنجليك، يانسون، شيح، قيصوم، بابونج، أَقْتَى عُنقُوديّة، نبات القُطن، كَمّون، بربريس، شاهترج، أخيليا عطرة، عرعر، هَمامَليس، أنجذان روميّ، يَبْرُوح، فَراسيون، بابونق، نعنع، نَفَل الماء، أمّ ألف ورقة، أفيون، صعتر، عُشبة القوى، پاريرا براڤا، بقدونس، ندى البحر، فيجن، زعفران، مريميَّة، صفصاف أبيض، شرونة يَعقوبيَّة، زعتر مَدّاد، آذريون، سَطاقِس، أريغارون كندا، رِباطيَّة، كرمة حمراء، يُوهِمْب.

كِلَى، كُلْوَة، كُلْيَة كِلَى، كُلُوة، كُلْيَة

- راجع إلتهاب الكُلْيَة Néphrites في هذا المُلحَق.
- بَتُولا، حِمْحِم، خَلَنْج، شِبْرِق، عِنب الدُّبّ، كرز، نَجيل، مُرّان، عرعر، خُزامى، ذرة صفراء، داذي مُخَرَّم، بَيْلَسان، زيزفون (الشَّكير).

- كرفس، بَصَل، كُرّاث، سَلْسَفيل، بندورة، كرز، فريز، أكي دنيا.

71- Rétention d'urines (F) Retention of urine (E)

اختِقان البَوْل، أَسْر، اختِباس البَوْل

- عِنَبِ الدُّبِّ، فُوَّة، عقَّيدة أي بَطْباط الطُّيور.
- لَصُوقات من الملفوف على أَسْفَل البَطن وعلى العِجَان Périnée.
 - استشارة الطَّبيب ضروريَّة ومُستعجِلة.

72- Rhumatismes (F) Rheumatism (E) لمَفاصِل داءُ المَفاصِل

كاكَنْج، أرضي شوكي، أرْقِطيون، تُرُنْشاه، بَتُولا، حِمْجِم، خَلَنْج، شِبْرِق، بَقْس، غاليون أَصفر، كشمش، شوكة مُباركة، هِندباء بَرِّيَّة، نَجيل، سُعادَى، حلوة مُرَّة، مُرّان، شاهترج، غايّاك، وزال أوروبًا، عرعر، بَهْشِيَّة، ذرة صفراء، مردكوش، كستناء الخيل، خبّازة، حندقوق، داذي مُخَرَّم، نَفَل الماء، صعتر، دردار، قُرَّيص، حُمَّيْض، بنفسج بَرِّي، حور، صنوبر، هِنْدَب، تفّاح، ذنب الخيل، فجل الخيل، ملكة المروج، ندى البحر، عوسَج، فشاغ، صابُونيَّة، مريميَّة، سَرْخَس مَخْزَنيّ، شرونة، بَيْلَسان، زعتر.

- ثوم، جزر، ملفوف، طَرخون، شومر، فول، بَصَل، بقدونس، کراث، تفّاح، بطاطا، فجل، سَلْسَفیل، بندورة، قلقاس، کرز، حامض، شَیْلَك، فرمبواز، کشمش، إجاص، خوخ، عِنَب.

- خَليطات من:

ہ غ	•	١) شِبْرِق (جذور)
۲غ	•	قرَّيص (جذور)
۲غ	•	بَتُولًا (ورق)
٥غ	•	عنب الدُّبِ
۱غ	• •	ورد السّياج (ثمار)
۲غ	4.,	٢) أمّ ألف ورقة
٥غ	•,	إيكر
۲غ	•	بَتُولًا (ورق)
٥غ	•	ع ع (ثمار)

۱غ	٠	*				 							 					(ر.	-و	حذ	-)) (زن	بتو	نْفِ	ũ		
ه غ	•					 		. ,					 		 		 									س	بَهُ	(٢
ه غ	•					 											 								ز	عتر	ز		
ەغ	•					 	 								 						(ق	ر.	(و	ن	زاد	e A		
ہ غ	•			 											 					((ر	ت	ما	مِب	(،	رة	ذ		

الخَليطان الأَوَّلان في نقيع من ٤٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى ويُؤخذ منه ٣ أو ٤ فناجين في اليوم، بين الوجبات.

الخَليط الثالث يُؤخَذ منه ٤٠ غرامًا في ليتر ماء يُغلى ويُسكَب ساخنًا على ٢٠ غرامًا من ملكة المروج، تُغطّى ١٥ دقيقة. ثلاثة فناجين في اليوم.

تَتناوَب الخليطات.

- ضدّ آلام الرُّماتيزم: جذور السَّرخس الطازجة المُقطَّعة جَيِّدًا، تُوضَع في كيس صغير من القماش، يُوضع على الأماكن المُؤلِمة، أو نضع عليها لَصوقات من الملفوف. أو نضع الثوم أو البصل المهروس.

رُكام، بَرْد، نَزْلة 73- Rhume (toux) (F) Cold (E)

غَافَت غُولاني، حِمْحِم، عُرْقُون، خُبَّيزة، خُبَّازة، حشيشة الرِّئة، بيلسان، فرفارة، زيوت دُهنيَّة عِطريَّة.

74- Rhume de cerveau (F) Head cold (E)

أكونيت، كمالية، سِتّ الحُسْن، حامض، عُرْقُون، مردكوش، نعنع، لسان الحَمَل، زُغْدَة الرَّبيع، بيلسان، زعتر.

- من الخارج: بَلْسَم الپيرو، بنجوان، أوكالِپْتُوس، خُزامى، نعنع، نِياوْلي، زعتر. بعض المُستحضَرات الصَّيدليّة تُسْتَنْشَق.

رَبُو، زُكام الجَفِيف 75- Rhume des foins (F) Hay fever (E)

راجع رَبُو Asthme في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٦.

76- Rides (F) Wrinkles (E) تَجاعِيد، غَضْن، غَضَن

سرفل (لُوسيونات)، نضع شرائح من الخيار على التَّجاعيد، ومن الشَّيْلَك، والمشمش، وعصير العنب.

	١٥١غ	فُوَّة (جذور)
	٥١غ	شُوس (جذور)
	١٠	نُش اغ
	١٠	ذنّب الخيل
	١غ	زعتر مَدّاد (رؤوس)
	١٠٤	سَنى مَكِّيّ (ورق)
	١٠٤	حِمْحِم (ورق)
	في مِقدار فنجان ماء يُغلى = دقائق ويُغطّى ربع	نقيع مِلْعقَة كبيرة من الخليط
	باعة .	ساعة. فنجان قبل الوجبات بربع س
	82- Scarlatine (F) Scarlatina, Scarlet fever (E)	حُمَّى قِرْمِزيَّة، القِرْمِزيَّة
	جَم الخامس صفحة ٣٠٦: حِمْحِم. بَعد القرمزيَّة:	راجع حُمَّيَات طَفْحِيَّة في المُع قَضيب الذَّهَب.
	83- Sciatique (F) Sciatica (E)	عِرْقُ النَّسا، النَّسا، عَصَب وَرْكيّ
	في هذا المُلحَق.	راجع أَلَم عَصَبيّ névralgies
	84- Scorbut (F) Scorbutus, Scurvy (E)	حَفَر، داءُ الحَفَر
	، كيس الرّاعي، كَيُّوسين، حشيشة الملاعق، قرّة ء، حُمَّيض، فجل الخيل، نَفَل الماء، ڤيرونيكا.	,
	والمحميطي فجل الحيل الفاء الفرادا فيروليك	العين، خلود، فراسيون، نقل الما
		- جزر، لفت، بصل، بطاطا
	، بندورة.	- جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في ا
	، بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) لمُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرْفارة.	- جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في ا
	، بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) دُمُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرْفارة. دُرفس، زعتر، جوز (ثمرة).	- جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في ال جُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، - هليون، باذنجان، جزر، ك
	، بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) لمُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرُفارة. كرفس، زعتر، جوز (ثمرة).	- جزر، لفت، بصل، بطاطا خَنازِيرِيَّة، خِنَّوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في ال جُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، - هليون، باذنجان، جزر، ك - شراب من: نبيذ مالاغ شراب رَوَانْد
***4	، بندورة. 85- Scrofule (F) Scrofula (E) دُمُعجَم الثالث صفحة ۲۸۱. قنطاريون، جَنطيانا، صنوبر، بنفسج بَرِّي، صابُونيّة، فَرْفارة. دُرفس، زعتر، جوز (ثمرة).	- جزر، لفت، بصل، بطاطا خنازيريَّة، خِنَوْصِيَّة راجع فقر الدَّمّ anémie في الجُنْجُل، نَفَل الماء، جوز (ورق)، - هليون، باذنجان، جزر، كالماء، من: نبيذ مالاغ شراب رَوَانْد

يُؤخَذ من هذا الشَّراب مِلعقة صغيرة في اليوم من عمر ستَّة أشهر إلى سنة، مِلعقتان صغيرتان من سنة إلى ستّ سنوات، ثلاث ملاعق صغيرة لمن هم فوق الستّ سنوات، مع الوجبات.

86- Séborrhée (F) Seborrhea (E) تَقَشُّريّ تَقَشُّريّ وَعُمْ مَتْ، سَيَلان دُهنيّ تَقَشُّريّ

راجع شَعْر Cheveux في المُعجَم الثاني صفحة ٣٠٧.

87- Serpent (morsure) (F) Snake (bite) (E) (لَدْغَة) هُبَان، حَيَّة (لَدْغَة)

أرقطيون، خُزامي، لسان الحَمَل.

- مَصْل مُضادّ للسَّمّ.

- طبيب.

TT.

88- Sialorrhée (F) Sialorrhea, Salivation, Ptyalism (E) إِلْعَاب، رَوَالِيَّة، ثَرُّ اللَّعَاب اللَّعَاب، رَوَالِيَّة، ثَرُّ اللَّعَاب اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

89- Sinusite (F) Sinusitis (E) الْتِهَابُ الجَيْب

راجع نُوَاط، خَبْطَة في هذا المُلحَق. أوكالِيتُوس، خُزَامَي، صنوبر، زعتر.

عَطَشُ المَرْضَى، ظَمَأُ المَرْضَى، ظَمَأُ المَرْضَى، ظَمَأُ المَرْضَى، ظَمَأُ المَرْضَى

حامض، فريز، فرمبواز، برتقال.

أنعاس، وَسَن 91- Somnolence (F) Somnolentia (E)

راجع كَبِد، مَعِدة، وغالبًا مُراجَعة الطَّبيب.

تَشَنُّج، شَنَج، تَقَلُّص 92- Spasmes (F) Spasm (E)

شُقّار، أنجليك، أنيسون، أسپرولة عطرة، زعرور، حبق، بابونج، جُنْجُل، خُزامى، مردكوش، حندقوق، مَليسَّة، أمّ ألف ورقة، برتقال (زهر)، صعتر، زُغدة الرَّبيع، ملكة المروج، ندى البحر، مَريميَّة، صفصاف، زعتر مَدّاد، زيزفون، ناردين.

- تَشَنُّج المَعِدة والأَمْعاء: إِرْثِد، فَراسيون، سِتّ الحُسْن، قطرم، شَوكران، بنج، غاركرزيّ، حُضَض أي عُرْقُد، يَبروح، مردكوش، خشخاش مُنوِّم، سُوس.

- تَشَنُّج الأعضاء التَّناسُلِيَّة: أخيليا أمّ ألف ورقة.

سَيَلان مَنُوي، ثُرٌ مَنَوي Spermatorrhée (F) Spermatorrhea (E)

كا، خبَّيزة، صابُونيَّة، ياسَم.	غافَث غُولانتي، أنجبار، كو
، الخبَّيزة، الزَّعفران، المريميَّة.	- حَمّامات للفَم من العرعر
١٠ غرامات لكلّ ١٠٠ غرام من الماء الفاتر.	– بُورات الصوديوم بمقدار
::	- غسيل مُتكرِّر للفَم بواسطة
يوم)هغ	بَوْرَق (أو بُوراتُ الصود
٥١غ	عَسَل مُتَورَّد
	sla
95- Stomatites ulcéro- membraneuses (F) Stomatit	tis ulceromembraous (E)
القَرْحيّ غِشائيّ	حُناك قَرْحِيّ غِشائيّ، الْتِهابُ الفَم
مَغْليّ ومُصَفَّى من فروع العُلَّيق أو الفرمبواز، أو من ك، أو الخُبّازة. بالإمكان أيضًا لَوْك هذه الأوراق	•
	الرورون بوطنه ما يرطيعي، الروا السيد. اللهدف عينه .
ظ به في الفَم.	– لَوْك وَرْد طازج والاحتفاء
96- Sueurs profuses (F) Profuse sweating (E)	عَرَق غَزير، رَشْح وافِر، تَعَرُّق
سِتّ الحُسْن، سِنديان (ورق)، أرْغُوت الشَّيْلَم،	•
رِف المسلم المنابع المعلم المريميّة، داتورة شائكة. أيض، صنوبر، ذنب الخيل، مريميّّة، داتورة شائكة.	
 ريميَّة، يُؤخذ مساءً.	- تَعَرُّق المسلولين: نقيع م
خيل، يُؤخذ مساءً.	- تَعَرُّق لَيليّ: نقيع ذنب ال
نرمبواز، لِفْت.	۔ - تَعَرُّق قليل، غير كافٍ: ف
97- Surdité et Hypoacousie (F) Surditas, Surdity;	Hypoacousia, Hypoacusia (E)
	طَرَش، صَمَم وضعف السَّمَع
	- بَلْسَم يُحضَّر من:
۴غ	زيت زيتون ساخِن

- راجع سَيَلان مَنويّ Perte séminale في هذا المُلحَق.

94- Stomatites (F) Stomatitis (E)

الْتِهاب الفّم، حُناك

بابُونَج أو بابونَقبابُونَج أو بابونَق

ننقع في الزَّيت عِدَّة أيام. نُصفِّي. عِدَّة نِقاط في الأذن، صباحًا ومساءً. وضع قطنة صغيرة في الأذن.

- عصير ملفوف مع عصير حامض، بمقادير مُتساوِية، في الأذن، صباحًا ومساءً، كما ورد أعلاه.
- خَليط من عصير الخَلُّود مع زيت اللَّوز الحلو، مقادير مُتساوِية. عِدَّة نقاط في الأذن صباحًا ومساءً.

- وَصْفَات قَديمة:

- ١) نَسْلُق الفاصولياء في قِدر (كسرولة)، ونَجعل البُخار يَدخل إلى المجرى السَّمعيّ في الأذن بواسطة قمع. نُداوم على ذلك ١٥ يومًا على الأكثر.
 - ٢) نَسْلُق نَبات الكَفْنَة في النَّبيذ. نُكَرِّر العَمَليَّة أعلاه.
- ٣) نَسْلُق المردكوش، أو الزَّعتر، أو الأبْسنت، أو النَّعنع في الخَلِّ. نُكَرِّر العَمَليَّة المذكورة أعلاه.
 - نَضَع أوراق سَرْخَس خضراء في الأذن.

89- Surmenage (F) Surmenage (E)

إرهاق، إغياء، إجهاد

نَبيذ المريميَّة، نُحضِّره بمرث ١٠٠ غرام من ورق المريميَّة في ليتر نَبيذ لمدَّة ثمانية أيّام. يُؤخذ منه كأس أو كأسين بُوردو (٧٥ غرامًا) في اليوم. راجع وَهْن Asthénie في المُعجَم الثالث صفحة ٢٨٦. كأس بوردو توازي ٧٥ غرامًا.

مسارد/ Glossaries /مسارد

TT0	١- مَسرد عربيّ
408	٢- مَسرد إنجليزيّ
T04	٣- مَسرد فرنسيّ
TVT	٤- مَسرد ألمانيّ
TV A	٥- مَسرد لاتيني

۱ - مسرد عربيّ

آیاواشکا
أَيُوزام مُضادّ للإسهال ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أپُوزام مُضادّ لليرَقان
أَتْرُوبِيْن وقَلْوِيدات الباذِنْجانِيّات١
أَتُم َأَنَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
أَثيراْمِيْل نَتْرُونيّ١٢
أثيل هيدروكُوپْراپيْن٢
أَثِيْنَة الحِيْطان
أخيليا أجِيراتُم
أُخِيلِيا بَقْلَةُ العُطَاسِ
أخِيليا دِمَشْق
أخِيْليا دُوْلابِيَّة
أخيليا صُونِيَّة
أَخِيْلِيا فَتِيَّة
أُخِيلِيا مِنْجَلِيَّة
أخيليا نانا
أُخِيليا نَانًا
أَدَيْتِنول
أَذُونِيس الپيرينيه
أَذُونِيس صَيْفِيّ
أراك
أَرِسْتُولُوخِيَة ثُعْبانِيَّة

أَنِيْسُونَ نَجْمِيّ صَغِيرِ الزَّهْرِ٣١	شْنَة الجمجمة
أَنِيْسُونَ نَجْمِيّ مُوَقّر٣١	طْماطُ الكاشُو٢١٧.
أَنِيْسُونَ نَجْمِيّ يَابانِيّ٣١	فْلُوس خَوْخِيّ الوَرَق١٨
أنيلين (ألوان ال)	فْلُوْس لانْتَانا١٩
أُورِيْغَانُم أَرَنْبَرْغ١٥٢	فْيُون مخزنيّ (مُركّباته الكيميائيَّة) ٢٠
إِدْرِياس٩٤	قاسِيا زَرْقاءقاسِيا زَرْقاء
إِذْ خِر	قْراص عِلاجِيَّة
إِشْقِيْل بَحْرِيّ١٦	قُراص فَحْمقراص فَحْم
إكسير فجل الخيل المُركَّب ٢٠٨	قْسُون حَرْشَفيّ الشَّكل١٨٢
إكسير كلُوروفورْميّ٢٢	قْسُون خُرْشُوفَيّ الرّأس١٨٣
إكسير مُضاد لالْتِهاب المَفْصِل ٢٢	قْسُون نَدِيفيّقُسُون نَدِيفيّ
إكسير مُضاد للرَّثْيَة٢٢	لْبِيْزِيَةَ أَبُو سِنَّ٢٢
إنحسيرات ٢٢	لْبِيْزِيَة طارِدة للدُّود٢٢
إِلْقِس كَبِيْرِ٥٨	لْغُ بَحْرِيّ (الخصائص والاستعمال) ٢٢.
إِمْرُوْس أَغْبَر	لْوَةلاهَ
ایپاسِیْن (کلورهیدرات ال) ۲۷	لْوَة پارِّيلوّة
بَابَاوْ	لْوَة البَحْر الأَحْمَر٢٧
بَابُوني	مّ كُلْب
باجِيَتُنَا شَمْعِيَّة	
باذَق	ملاح صَفراوِيّة
پاریرا برافا۳٤	ناسِيْكُلُوس ڤَالَنْسِيا
بَتْجَنْجُور	ناغُوْرُس طبِّي
بَتْياتُور٣٥	نْجَالِيْمنْجَالِيْم
بَدْيان صَغِير الزَّهْر٣١	نْجَالِيْن٧١
بِرازِيَّة التَّمْبايَنْغ٥٨	نُدِيرا٧٠
بَرْسِيم أَحْمَر	ُنديرا سُورِينام٧٠
بَرْشَامُ خُبْرْ فَطِيْرِ٢١	نديرا طاردة الدود٧١-٧١
بُرْشانَ عِلاجِتِي ٢١	نديرا ملساء٧٠
بَرْنُوف٣٥	نْغُسْتُورَة كاذِبَة

بَناقَنْتُه هَنْرِي٤٣	سكويت طارد للديدان بالسَّنْتُونِيْن ٣٦٠٠
بَناكْس شاًنك	بِسَيْدِيَا مُسْكِرَة٣٦
بناكس لاسع ٤٣	صَل الذُّنْبِ
بَناكس لاطَّئ الزَّهْر ٤٣	صل الزِّيْز٨٣
بَناكُس هَنْرِي	بَصَل الفار
بَنْج أَبِيَض ً	بَصَل المِسْك
بَنْزُوات الصوديوم	قُلَة العُطَاسقُلة العُطَاس
بَنْكِرِيَاتِيْن٥٤	بَقْلَة العَوْففَلَة العَوْف
بَهَا بَرِّيَّةً	بِقَم أَسْودب٣٧، ٩٠
پُودُوفِلُّون دَرَقتي	بِقَنْقُومُون٣٧
بُوْصِيْر مُسْكِر٤٧	بلادون
بُوْط أَسْتَراليّ٤٧	البَلاسِم
بُوْط رَفِيْع٧٤	بُلْبُوس أَشْعَربُلْبُوس أَشْعَر
پُولِّينيا رِيشيَّة٩٥	بُلْبُوس الكَلْب
بيرة مُضادَّة للحَفَر	بَلْخبالْخ
بِيْكُولُورِيْن١٥	بَلَخِيَّة يُونَانِيَّة
بَيْلَسان أَحْمَر	بَلْسَم جَنَفْيَف
پیْلُوکَرْبِیْن وأملاحه ٤٩	بَلْسَم دُوْرِيْهبعم
بَيلولات٠٥	بَلْسَم سَانشيز المضاد لداء المفصل ٣٩٠٠
بيلولات بالكربونات الحديدتي	بلسم الصابون
المنغنازيّ٠٠٠٠	بلسم عالميّ
بيلولات بالكربونات الحديدية والمنغانيّة	
(حَنُّون)٠٠٠	
بيلولات أو بلعات قلبيَّة ومبوِّلة٧٥	
بيلولات أو بلعات مُسهِّلة قويَّة٧٥	
بيلولات برومور الرَّصاص ٥	
بيلولات بُونتيوس	
بيلولات حديدية (أنْدرال)١٥	
بيلُولات حديديَّة (بلود)١٥	بَناقَنْتُهُ لاطئة الزَّهْرِ٤٣

بيلولات المَرُوخ الزِّئبقيّ٥٢	بيلولات (بلعات) دافعة السُّعال ٢٠٠٠٠
بيلولات مُسهِّلة قويَّة (للكلاب)٧٥	بيلولات دوپُويتْرَن١٥
بيلولات مُضادَّة للسَّفلس٥١	بيلولات زبدةً الكاكاو اليوديَّة
بيلولات مُضادَّة للصَّرع٥٥	الحديديَّة١٥
بيلولات مُقرِّية٧٥	بيلولات زرنيخيَّة آسيويَّة١٥
بيلولات المُقيِّعُ المُسهِّلِ٥٥	بيلولات زرنيخيَّة (بُودَان)٧٥
بيلُولات النُّحاس النُّشادريَّة٥٥	بيلولات زئبقيَّة (لانْيِو)٥٢
بيلولات نحاسيَّة٥٥	بيلولات زئبقيَّة (مُوسكاتي)٥٢
بيلولات هُولُووَاي٥٥	بيلولات زئبقيَّة (هانمان)٥٢
بيلولات وبَلْعات بيطريَّة٥٦	بيلولات زيت الزَّعتر الدُّهنيّ٥٢
بيلُولات يودور الحديد والكينا٥٥-٥٦	بيلولات ضدّ الإمساك (مكاريو) ٣٠٠٠٠
بيلولات يودور الكبريت٥٦	بيلولات ضدّ النَّزلة المثانِيَّة٥٣
بيلولات يودور المنغانيز (حَنّون) ٢٠٠٠	بیلولات ضدّ النقرس (بیکرال)۵۳
بيلولة أو بلعة ألويَّة للحصان٧٥	بیلولات ضدّ النقرس (سکودامور) ۳۳۰
تَارُو القُدامَىَ٨٥	بيلولات ضدّ النّقرس (هَلْفُورد) ٣٠٠٠٠٠
تانُبُول۲۱۷	بيلولات ضدّ النِّقرس (هَنْروتاي) ٢٠٠٠٠
تَايُوف كَبِيْرِ٨٥	بيلولات ضدّ اليرقان٥٣
يَبْنِ الجَمَلِ٧	بيلولات ضدّ اليَرَقان (شُومَل)٥٥
تِبْن مَكَّة٧	بيلولات عرق الذَّهب المُركَّبة٥
تصنيف المُسْتَخْلَصات ٢٤١	بيلولات عرق الذَّهب والأفيون٥٥
تَمْبايَنْغ٨٥	بيلولات العنصل وعرق الذَّهب ٤٠٠٠٠٠
تِمْبو ٥٥	بيلولات الكريوزوت(دستور ١٩٣٧) . ٤٥
تُؤت أَحْمَر٩٥	بيلولات كلورور زئبقيّ مُؤَفّين ٥
تُوْيا غَرْبِيَّة	بيلولات الكُوباهو (رِيْغَيْنِي)٥
ثابْسِيا غَرْغانُو٩٤	بيلولات الكودايين٥٤
ثِمار بَيْضاء	بيلولات لَبَنات الحديد ٥٤
ثِمار السُّنَى	بيلولات مبولة (كروڤاييه) ٥٤
جامورة	بيلولات مُدرَّة للسَّوائل٥٥
جُدْجُدٌ حَقْلِيّ	سلولات مُدرَّة للسَّوائل (يُونتيوس) ٥٥

	جَرُوْمَة غُدِّيَّة١٥٢	جَدُوار
		جَرُّوْد
	جُعْدَة١٧	جروع الأكونيت
	جَعْدَة٧٢	-
	جُلَّابٍ مُزَجَّجِ	الپرافين
	جُلَّابِ مُضادًّ للنَّزيف	جروع برُوميّ أو برمودِيّ٦٤
	جُمَّار	جروع بلسميّ قلويّ أثيريّ ٦٤
	جُمّارَة	جروع بنزوات الأمونيوم٦٤
	جِنّ ووِيسْكي	جَرُوع حامض
	جِنْسَن شائك	-
	جِنْسَن لاسع	جروع زُلالتي
	جِنْسَن لاطئلاطئ	جروع ضدّ اختفاء الصُّوت ٦٥
	جِنْسَن هَنْرِي	جَروع ضدّ الإسهال٢٢٥
	جَوْزَة العَفْصَة	جروع ضدّ التَّشنُّج مُؤَفْيَن ٦٥
	جُوفْرِيَة٧٠	جروع ضدّ التَّشنُّج نَتِن ٦٥
	جُوفْرِيَة سَرْحَة٧٠	
	جوفرية سُورِينام٧٠	الأذن)٥٢
	جوفرية طاردة الدود٧٠-٧١	
	جِيْدار١٣٢.	
	جَيْفَلة	
	حامِض پروسًيك٧٢	جروع ضدّ السّفلس٢٦
	•	جروع ضدّ الشُّهاق (لوڤرات)٦٦
		جروع ضدّ الكزاز
	_	جروع الكوباهو القلويّ الأثيريّ٦٤
	حامِض سِيانْهيدْرِيك٧٢	جروع مُضادّ خُناقِيّ (بريمن)٦٦
	· -	جروع مُضادّ للإسهال
	حامِض شِيازِيك	<u> </u>
	حامِض لَبَنيك مَخْزَنِيّ٧٤	
٣٣٩	حامِض لَبَنيك مُرازَم٧٤	جَرُوْمَة بَيْضاء١٥٢

حقنة زيت الخروع٨٢	حْبَاق (تونس)٧٦
حقنة زيتيَّة٨٢	حَبَق أَخْضَر
	حَبَق البَرْغَش٧٥
حقنة مُغَلْسَرَة٨٢	حَبَق بَنَفْسَجِيّ الوَرَق٧٥
حقنة مُيَوَّدَة٨٢	حَبَق جِعْدِيّ الوَرَق٧٥
حَلْحَل أَزَبّ٨٣	حَبَق خَسِّيِّ الوَرَق٧٥
	حَبَق سُمَيْسِمَة (لبنان)٧٦
	حَبَق صَغِيْر٧٦
حمّام حالّ	حَبَق كَرْمانِيّ٧٦
حمّام زیزفون۸۳	- حَبْل مِسْكِيّ
حَمَّام ضدَّ الجَرَب (بيطريّ) ٢٣٠٠٠٠٠٠	حُبِيبًات
·	حُبِيبَة ٧٧
حَمَّام مُضادٌّ للطُّفَيْليّات بالنيكوتين ٨٤	حُرْف الحَقْل
حَمَّام مُنَشْدَر حَدِيدِيّ٨٤	حزاز۷۸
حمّام مُنشَط	حَزاز بَياض الثُّلْج٧٨
حَمّامات ۸۳	حَزاز الحيطان٧٨
حُمَّيْض مُنفرِج الوَرَق٨٤	حَزاز الرَّنَات٧٨
حَوْدَان شِرّير٨٥.	حَزاز صِباغِيّ٧٩
حَوْذَانَ شَقِيّ٨٥	حزاز الكَلَبُ
حَيّ العالَم المِكْرار٨٦	حَزاز مُتَحابِك
حَيِّ العالَم الوَرْدِيِّ٨٧	
حَيُّون مِكْرار٨٦	حَشِيْشَة البَرَص١٢٧
حَيُّون وَرْدِيّ٨٧	حَثِيْشَة الرِّيْع
خُبًّازَة خُطْمِيَّة٨٨	حَشِيْشَة عَقْرَبِ ٤٤
خثیرات	حَشِيْشَة اللَّيْمُون٨٠
خَرْبَق أَخْضَر٨٨	حَشِيشَة النَّتَاق
خَرْبَق أَمْرَط٨٩	حَفَا
خَرْبَق الشَّرْق٨٩	حُقَن ٨٢
خَرْبَق مَخْزَنِيّ٨٩	حقنة جيلاتينيَّة

دَنْتَارِيا رِيْشِيَّة٩٨	خَوْبَق مُنَفِّط
دِهان۲۳۸	خَوْشُوف بَرِّيِّخُوشُوف بَرِیِّ
دِهان جَنَفْيَيْڤ	
دُهْن تِيْكُوتِيْس أَجُوان٩٨	خَشُبُ
دُهْن الخُزامي الهَجِيْنَة٩٩	خَشَب الأَلْوَة
دُهْن كانَنْغا	خَشَب الحَفِث أو الحِفْث
دُمْن يَلانِج٩٩	نَحْشَب رُودِسنخشَب رُودِس
دُهْن يَنُونَ٩٩	خَشَب الطَّبْر
دُهْنِين	خَشَب الكَلْب
دُهُون مُهَدْرَجَة٩٦	
دواء	خَشْخَاش لُبْنَان
دواء الاشْقِيْل العسلتي١٠٠	خَلُّوْد عَنْكَبُوْتِيخَلُوْد عَنْكَبُوْتِي
دواء الإشقيل العسليّ المُركّب١٠٠	خَمان عُنْقُودِيّخمان عُنْقُودِيّ
دواء البنفسج العَسَليّ١٠٠	خُوْكانخوْكا
دواء الزَّعفران العسليّ١٠١	خِيار الأُنْتِيلخِيار الأَنْتِيل
ديجيتال أُرْجُوانِيَّة١٠١	خِيار الكُورْنِيشُون
رَأْس الدُّوري٢٠١	دُخْنَة ٢٦٧
راتافيا الكارابيب	دَرْسَتدرُسَت
راتِنْج	دَرَقَة مُقَلْنَسَة٢٦٧
راتِنْج أَصْفَر	دَرُوْسدُرُوْس
راتِنْجات	دِرْياسدِرْياس
رَاسَن البَراغِيْث٣٥	
راك	دَزَرْ پِيدِيْن
راوَنْد	دُسُوم مُهَذْرَجَة
راوَنْد رِیْباسِتی۱۰۸	دَفْنَهُ سامَّة
راوَنْد صِیْنی	دْقَفْتد
راوَنْد مَخْزَنِيّ	دَم الأُخَوَيْن٩٧
رِباص	دَم التِّنيِّن
رَبَاطِيَّة خَوْخِيَّة الوَرَق١٨	دَم الثُّعْبان٩٧

زَيْت صمغ الدَّوْرَم المخزنيّ المُحترّ ١٢٣٠٠	رَزِّيْن١٢٨.
زَيْت الكَتَّان	رَطْبَة
زَيْت الكَرْدَمَانة	رُغْل طارِد للدُّود
زَيْت مُسهِّل قَوِيّ١٢١	رَمْراَم
زَيْت مُفَنَّكَ أُو مُفَنَّل١٢١	رَمْرَم ٰ
زَيْت مُكَوْفَر	رُوحٌ إِفْرازِ القُنْدُسِ٢٠٧
زَيْت مُكَوْفَر مُركَّز١٢٢	روح فجل الخيل المُركَّب٢٠٨
زَيْت مُكَوفر يُزْرَق١٢٢	روح الفرمبواز۲۰۸
زَيْت مُورَّد	روح قشرة الحامض٢٠٨
زَيْت مُيَوَّد١٢٢	رَوَنْد
زَيْت النَّضِيْد	رِيْباس١٠٨
زَيْت الورد الباهت	رَيْحَانَ صَعْتَرِيّ٧٦
زَيْت الورد الجوريّ١٢٢	زبدة السَّكْبِ٢٣٩
زَيْتُوْنَ الأَرْضِ٢٢٩	زَدُوار
زَيْتُونَ بَرِّيِّ١١٨	زَراوَنْد ثُعْبانِيّ
زَيْتُوْن عِطْرِيّ١١٩	زَراوَنْد ثُلاثِتِّ الفُصوص١١٢
زَيْزَفُونَ أَنْشَى١١٩	زَراوَنْد كبير ۗ الزَّهْر
زَيْزَفُون شَحِيْح الزَّهْر١١٩.	زَعْتَر إِسْبانِيّ
زَيْزَفُون صيفيّ١١٩	زَعْتَر مُنتَفِعُ الرّاس١١٣
زَيْزَفُون عَرِيْضِ الوَرَقِ١١٩	زُعْرُور شائِكا۱۱٤
زَيْزَفُون كَبِيْرِ الزَّهْرِ١١٩	زِغْلِيلِ الْفِسْقِ
	ِ زُ فت أسود
زيوت مُخْتَرَّة١٢٣	زفْت راتِنْجنبت
ساغُو١٢٤	زَيْت اللَّٰرّاح١٢١
	زَيْت رَمادِيّ١٢١
سامَّة (دستور ۱۹۰۸)	_
سَبَدِيْل مَخْزَنِيّ	' A
سبيجالِيَة طاردة للدود١٢٤	
سبيجاليَة طبيَّة	

سِنْدِيان البُّرْتُغال١٣٢	ستروفَنتُوس أمْرَط١٢٥
سِنْدِيان بُلاخ١٣٢	ستروفَنْتُوس الغابُون١٢٥
سِنْدِيان العَفْص١٣٢	ستريڭنُوس إِيْنِياس١٨٥
سِنْدِيان عُنْقُودِيّ١٣٢	ستريڭئوس غُلْطَارِي٢٦٨
سِنْدِيان كَسْتَنِيّ الوَرَق١٣٣	سِتيارِيْن٧٢
سَنْط أَبْيَض١٣٣	سجائر بودان الزَّرْنيخيَّة١٢٦
سَنْط أَزْرَق١٣٣	سجائر ديوسقوريدس١٢٦
سَنَّى الإسْكَنْدَرِيَّة	سجائر زَرْنیخیّة١٢٦
سَنَّى بَيْضي الشَّكل المنقلب ٢٢	سجائر وسيجارات طبّيّة١٢٦
سَنَى شُودانتي	سَحْلَب
سَنَى ضيَّق الوَرَق٦١	شخام٧٦٧
سَنَى مُسْتَدِق الطَّرف	سِدْر بَرّي١٥٥
سَنَى هِنْدِيّ	سَرَنْتَة صَغِيْرة١٢٧
سُوْرَنْجانُ الخَرِيْفِ١٣٣	سَرَنْتَة كَبِيْرة١٢٧
سُوْرَنْجان دُوكاًين١٣٥	سَطُوال َ
سُوْس (تَركيب السُّوس الكيميائيّ) . ١٣٥.	سَطورِيُون١٢٦
سُوس شائِك١٣٨	سُعْد الحَمِيْر
سَوْقَم الجِبال١٣٨	سُغد شَرْقِيّ١٢٨
سَوْلَع (عُصَارة اله)	شُعْد مُسْتَدِيْر
سُولُفُوغَيّاكُول١٧٧	سَعُوط
سُولْفُوكَزْبُول١٨٩	سَفَدِيْل مَخْزَني١٢٩
	سكابيُوزة أُوْكُرانِيَة١٣٠
سِیْسَارُون	سكابيُوزَة فِضَّيَّة١٣٠.
سِیْسَبان کَبِیْر الزَّهْر۱٤٠	سِلَيْتَة
سَيْكُران أَسَانِكُران أَسَانِكُران أَسَانِكُران أَسَانِكُران أَسَانِكُران أَسَانِكُران أَسَانِكُمُ	
سِيُوْم	سِمامَة الحامِض السِّيانهيدريّ٧٣
سِيُومْ ضَيِّق الوَرَق٢١٠	
شَاهْبَانَج	سِنْدِيان أَبْيَض
شاهِسْفَرَم٧٦	
	- ·

صابونولة الكافور٢٣٨	شِبتٌ بَرِّيِّ
	شُبَيْط شائِكشبيْط شائِك
صَبْر	•
صبغة الصابون المُكوفَرة٢٣٨	شَجَرَةُ الْحَياة الغَرْبِيَّة
صبغة طاردة الحمّى٢٤٠	شَجَرَة الزَّنْبَقَ
صِبغة مِلْح الدُّرْدِيِّ٢٥٤	شَجَرَة الشَّمْع١٤٢
صِبْغة النَّفْتالين٢٥٥	شَجَرَة القَشّ١٩٠
صَرّارُ اللَّيْلِ الحَقْلِيّ٦٣	شَجَرَة القَياثِيرِ
صَعْتَر أَرَنْبَرُغ١٥٢	شُخْص شرقي١٤٣
صَفْراء الثَّوْر٢٣٢	شُخْص عَرِيْض الوَرَق١٤٣
صُقْرابِ أبيض١٥٢	شُحْص مُتَوَسِّط الورق١٤٣
صُقْرابِ غُدِّي١٥٢	شراب ليمون
صُمُوغ رَاتنْجِيَّة١٥٣	شراب ليمون سيترو – مَغْنازِيّ١٤٤
صِناب الماء٧٨	شراب ليمون مُسهِّل قويِّ بسيترات
ضال٥٥١	المَغْنازيومالمَغْنازيوم
طباق البَرَاغِيْث	شَرَعْطَط مَنْقِعتي١٤٥
طَحِيْنِ السَّنْفِيّاتِ	شْعَال
طَحِيْنِ القَرْنِيَّاتِ١٥٦	شُقّار المروج١٤٦
طَحِيْن القَطانِيّات١٥٦	شَمار الماء
طُوْقَرِيُون١٥٦	شَمْعٌ نَباتِيّ
طُوْقَرْيُون أَصْفَر١٥٧ ، ١٥٧	شَمْعَة طبيَّة١٤٨
طُوْقَرْيُونَ إِكْرِيتِيِّ١٥٧، ١٥٩	شُمُوْع طِلِيَّة١٤٨
طُوْقَريُون بَحْرِيّ١٥٧	شَوْكَة حادَّة١١٤
طُوقَريُون جَبَلِيّ١٥٨	شَوْكَران (أنواع)١٤٩
طوقَرْيون جَعْدِيّ	شياف
طُوْقَرِيُون كَمافِيطُوس١٥٨	شِيْح أراغُوْن١٥١
طُوْقَريُون كَوْرَبِيّ١٥٨	شِيْح حَقْلِي١٥١
طُوْقَوْيُون لَبِد	شِيْح المَغْرِب١٥١
طِيْب العَرَب	صابون للحمّى القويَّة ومُصرِّف ٢٣٩

عِرْق الذَّهَبِ النَّشَوِيِّ اللَّونِ الأبيض ١٦٥	لْمُوقَرِيُونِلامَاءِ اللهِ
عُرُوقِ الذَّهَبِ١٦٥	لَمْيُونَ الذُّبَابِ٣٥
عَسَل إشْقِيليّ	غُثُم
عَسَل بنفسجتي	عجائن للاستعمال البيطري١٦٠
عَسَم سَنْدَاييق	عجينة أو لَبَن كلس سميك ضدّ مرض
عُشْبَةُ الشَّاي عُشْبَةُ الشَّاي	لظُلفلظُلف
عُشبة الطِّحال ١٥٧، ١٥٧	عجينة أو مُجَمَّدة الثُمار الصَّدريَّة ١٦١
عُشْبَة مار الياس	عجينة بالريزورسِين١٦٠
عُشْبَة مُقَدَّسة	عجينة بُلَاسُ الكاوية١٦٠
عُشْبَة الهند	عجينة حشيشة السُّعال باليانسون ١٦٢
عُصَارَة الخَسِّ	عجينة سُوْسَان
عُصَيْفِيرَة بَرِيَّة	عجينة السولفاميد
عَفْص ١٣٢	عجينة الصَّمغ العربيّ المُسمَّاة عجينة ' ً
عَفْصَة	الخُبَيْزةالخُبَيْزة
عَفْصَة السِّنْدِيَانِ	عجينة ضدّ الْتِهابِ الرُّجلِ١٦١
عقاقير للتَّدخين١٦٨	عجينة ضدّ مرض الظُّلف (تَعَفَّن الظُّلف)الظُّلف)
عقاقير مُبَخِّرة١٦٨	عجينة كانكوان الكاوية
عقاقير مُخدِّرة١٦٨	عجينة كاوية ضدّ الْتِهاب رجل
عقاقير مُدَخِّنة١٦٨	الحصاناليهاب رجن الحصان
عقاقير مُنَوِّمة١٦٨	عجينة ليانو الكاوية١٦١
عقاقير نباتيَّة١٦٨	عجينة مخزنيَّة بالحزاز١٦٣
عَقِيد هِنْدِيّ	عَراوَة مَلَكَة المُرُوجِ١٦٣
عَقَّيْدَة مُدَبَّبَة١٩٣	عَرْصَف جَعْدِيّ
عَمِيْر عَنْكَبُوْتِيّ٩٢	عَرْضَف صَنَوْبَرِيّ١٥٨
عُنَّابِ بَرِّيِّ٥٥١	عِرْق إنجبار
عِناقِيَّة عُشْبِيَّة٢٧١	عِرْق ذَهَب القدِّيسة مَرْتا١٦٥
	عِرْق الذَّهَب المُتَمَوِّج
	عِرْق الذَّهَب المُخَطَّط الصَّغير١٦٥
عُنْصُل بَحْرِيّ١٦	عِرْق الذَّهَبِ المُخَطَّطِ الكبيرِ١٦٥

غَيّاكُول سولفُونات البوتاسيوم١٧٧	عَوْف عَطِر119
فاقُوع فِضَّيِّ١٣٠	عَيْنُ التَّدْرُجِ
فَحْمَ حَيُوانِيَ مُنَقًى١٧٩	عَيْنُ الحَجَلِ
فِرْصاد أَحْمَر٩٥	غافَث عَطِر
فَرْق٢٠٦	غُبارُ الطُّلْعِ١٧٠
قُرْنُونِيَة طارِدَة للدُّود١٨٠	غُبَيْراء مَبْذُوْلَة١٧٢
فِساء الكَلْبَ	غَرورغرور
فُشّاغ	غرور ألومينيّ رَقوء١٧٢
فُشاغ صِيْنِيا١٨١	غَرور بِنَّاتِي الْعَقُولِ١٧٢
فَص الحِمار	غرور خمريّ عَقول١٧٣
فَص الحِمار الحَرْشَفي١٨٢	غرور زئبقتی۱۷۳
فَصّ الحِمار الخُرْشُوفيّ١٨٣	غرور مُلَيِّن١٧٣
فَص الحِمار المُغايِر الشَّوْك١٨٣	غرور مُهَيِّج
فوافُوتْسِي	غرور مُيَوَّد١٧٣
فواكَنْغا أَفْرِيقيا	غُرَيّاء باليودوفورم١٧٣
فواكَنْغا ثواُرسي١٨٥	غُرَيّاء مُصَفْصَف أَلَا اللَّهُ
فُوفَل	غَسُول١٧٤.
فُوْل إِيْنِياس١٨٥	غسول أستات الرَّصاص القاعديّ١٧٤
فُوْل كالابّار	غسول غليشرين
فينول سُولْفُورِيسينتي١٨٨	غسول غلیشرین مُذَرَّح١٧٤
قانَة بُرْتُقالِيَّة	غَسُول غُولاند١٧٤
قاۇون ھِنْدِي	غسول قلويّ١٧٥
قُبَّرِيَّة جَمِيْلَة١٩٠	غسول مُهيِّج إنكليزيِّ١٧٥.
قُبَّرِيَّة جَوْفاء١٩١	غسول مُهيِّج (مُستَشفى مار لويس) ١٧٥
قُرّاص غِشائيّ١٩٢	غَفَث مَثْقُوب الوَرَق١٧٥
قُرَّاص كَاوِ١٩٢	غَفَث نَدْغِيِّ الوَرَق١٧٦
قُرّاص مُذَنَّب	غلوكوز سأئل١٧٧
قُرّاص مُرِيب	غواڭو
قَرانيا حَرِيرِيَّة١٩٤	غُوالات

قَنْبُر جَمِيْل١٩٠	قَرانِيا لَوْلَبِيَّة١٩٤
قَنْدَرِيْس خُرْشُوفيّ الرّأس١٨٣	قَرْدَبِ حُلو١٩٣
قَنْدَرِيس لُبْنانيّ١٨٢	قَرْدَب سيبُولْدِي١٩٣
قَنْدَرَيس مُغايِر الشَّوْك١٨٣	قَرْن الأَيِّل٢٢٣
قِنْدِیْد	قَرْن اصطناعتي (بيطريّ)٢٥٥
قَنْطُرِيُون أَسْمَر ٢٠١	
قُنيَطَسَة قَالَنْسِيا	
قُويْسَة الجَبَل ٢٠٢	قُرَّيْص رُوْمانِيقُرَّيْص
قُوَيْسَة الغاب ٢٠٢	قُرَيْطَفَةقُرَيْطَفَة
قَيْسُون	قِشْطَة شَريمُوْلِيا١٩٥
قَيْصُوم أُنْثَى	قِشْطَة مَنْقِعِيَّة١٩٥
کاپي	قَضاب مُسَطّح
كافُور طَبِيعتي ٢٠٤	قَضِيْبِ الرَّيِّ
كاوٍ نشادَريّ	قَطْرَة١٩٥
كَايَا پُوْنِيا كُرَوِيَّة٢٠٦	قَطْرة (تركيبات)١٩٦
كَتَان مُسْهِل	قَطْرة ألومينيَّة أو عَقُولة١٩٦
كحول مُفَسْفَر	قطرة ألومينيَّة - رصاصِيَّة١٩٦
كُحولات	قطرة أمونياكيَّة١٩٦
كُحولة إفْراز القُنْدُس٢٠٧	قُطْن مَعْدِنتي١٩٧
كُحُولَة التَّرَبَنْتِيْن المُركَّبَة٢٠٧	قِلْوانِيّات َ١٩٨
گُحولة الفرمبواز	قِلَویْدات
كحولَة فِيُوراقُنْتي٢٠٧	قَلْوِيْدات الخَرْبَق والخُرْبُوق١٩٧
كُحولة اللَّيمون الحامض ٢٠٨	
كحولة مُضادَّة لداء الحَفَر٢٠٨	قِلْی١٩٨
كحولة المَليسَّة المُركَّبة٢٠٨	- قِمام تُرْبِيّ
كُخُولَة نَمْل مُركَّبة	قِمامُ جَبَلِيّ
كحولتور	قِمام عُنْبُوبِي
كُحُولَتُور البُرْتُقال الحُلُو٢٠٩	قِمامُ المَوْحِلِ١٩٩
كُخُولَتُور الحامض	

گونياككونياك	كَرَفْس الجَبَل
كيرْش	كَرَفْس الماء٢١٠
كِيْنُو أَسْتَرَالْيَا٢٢١	كَرَفْس الماء الضَّيِّق الوَرَق٢١٠
كِيْنُو (أَصْنَاف منه)	كَرَفْس الماء المُنتَصِب ٢١٠
كِيْنُو أَفْرِيْقِيا	كُرْكُم صِباغِيّ ٢١١
كِيْنُو البَنْغال	كَرْلِيْن ذَهَبِيّ
كِيْنُو بُوْتاني بايْ	كَوْلين شائِع
كِيْنُو البُوْنِيَّة	كُرْيَنْتِس يُوْهِمْب
كينو الجَمايِيْك	كلُورُودِيْن٢١٢
كِيْنُو غَمْبِيا	كلُورُور حديديك
لاذَن تُوَيَّسِيّ الوَرَق٢٢٢	كلورور حديديك محلول۲۱۳
لاصِف٧٢٣	كِمادات مِن وَرَق
لاصُوْق مُصَفْصَف ٢٧٣	كَمافِيْطُوس١٥٨
لَخْلاح دُوْكاين١٣٥	كَمالِيَّة البَرِّ٢١٤
لزقة۲۲۲	كَمَالِيَّة الحُقُولِ
لزقة بالكالومِل (زئبق حُلُو)٢٢٢	كَمالِيَّة مُتَوَّجَة٢١٥
لزقة حجر التوتيا	كَمالِيَّة مُكَلَّلَة٢١٥
لزقةِ حجر سُلَماني (سيليكات الزَّنك	كَمَالِيَّة مُكَلَّلَة
الطَّبيعيّ)	كَنْكِيْنَا كُولُومْبِيا الصَّفْراء٢١٦
لزقة كلورو – زئبقيَّة٢٢٢	الكَنْكِيْنا وتَركيبها الكيميائي٢١٥
لِسان الحَمَل القَرْنِيّ٢٢٣	كَوْثَلُ الكاشُو
	كُورْنِيشُون٩٢
لَصُوْقات مِن وَرَق٢٢٥	كُورُونيلًا غَبْراء٢٩
لُعاب	كُوْكاً
لُعابِ الحلزون	كَوْكَبِيَّة كَبِيْرَة٢٢٠
	كُوْكَهُ
لُعاب صمغ الكثيراء	
لُعاب عربتي	
-	كُونْدُودَنْدَرون لِبْدِيّ

ماء غرِنْدَل الأكّال٢٥٨	لَقاح
ماء غُولارد٢٥٨	لَقَح ٢٧٠
ماء الكُرّة٢٥٨	لُوسِيُونلا
ماء كَلِّيدُور١٧٥.	لُوْف عِطْرِيّا
ماء مُبارَك	ليكور أ
ماء مُبارَك (شَاريتيه)۲٥٩	ليكور بُورتَرلكور بُورتَر
ماء مُتَأْكُسِج مُبَوْرَق٢٥٩	ليكور زئبقتي مُكوفَر٢٥٨
ماء مُخَبَّز	ليكور غُولاند١٧٤
ماء مُسَكِّن	ليكور كُوشْلَن
ماء مُنظِّف أسنان	ليكور هُوْلتُن
ماء نباتيّ معدنيّ	ليكور وقائتي ضدّ السّفلس٢٢٧
ماء نشادريّ مُكَوْفَر٢٥٩	لَيْمُوناضة غَازِيَّة٢٦١
ماتِیْکا	ماء أبيض ٢٥٨،١٧٤
ماتِیْکُو۲۲۸	ماء الأَرْيَحِيَّة
ماراشکِي زارا۲۵۰	ماء أكّال
مَارُوممارُوم	ماء برومُوفُورمتي٢٥٧
مازَرْيُوْن	ماء بنِّي اللَّون (وَرْلُومُونْت) ٢٥٧
مِجْزاعَة بَرِّيَّة١٦٧	ماءُ الحَياة
مُجمَّدات۲۳۰	ماء خُزامَى سميث
مُجمَّدة الخبر ٢٣٠	ماء داردَل
	ماء دوقة لَمْبال١٩٦
مُحفوظات٢٥٢.	ماء رابَل
مُحَلِّيات٢٣١.	ماء رَماديّ اللُّون٢٥٨
مُذابة البوتاس الكُحوليَّة٢٥٤	ماء زُحَل
مُذَابَة كربونات البوتاسيوم الكُحوليّة ٢٥٤.	ماء الشَّهامَة
مُذابَة الكلورور الزَّئبقيّ المُغَلْسَرة ٢٥٣	ماء غازيّ بـ پـروتوكسيد الأزوت ٢٦١
مِرّة النَّوْر٢٣٢	ماء غازيّ بسيط
مَرْعان	
مَرَق عجل	ماء غازيّ مُنتَرَج٢٦١

مَرْمَاخُور١٥٨
مَرْهَم
مرهم أُثْرُجِيّ٢٣٣
مرهم أصفر (الأخ قُوْوم) ٢٣٤
مَرْهَم بُوتَ الشَّمْعِيِّ٢٣٤
مرهم بوري اليوديّ٢٣٤
مرهم الخلُّود أو المُخلَّدة٢٣٤
مرهم دوتوكسيد الزِّئبق المُكوفَر٢٣٤
مرهم سيترات الكينا
مَرْهَم شَمْعِي بالمُؤرفِين٢٣٥
مَرْهَم شَمْعِي مُؤَفْيَن٢٣٥
مرهم صاقِل٢٣٥
مرهم ضد حبّ الشباب
مرهم ضدّ الشُّرَث (بروك)٢٣٥
مرهم ضد الشَّرَث (كنُولْزَر)٢٣٥
مرهم ضدّ الشَّرَث (مايَت) ٢٣٥
مرهم ضدّ القَرَع (بورياس)٢٣٥
مرهم ضدّ القرع (بِيْنَل)٢٣٦
مرهم ضدّ القرع (ماهون)٢٣٦
مرهم ضد المَرَط
مرهم غُونْدريت٢٣٦
مرهم قطران (غیلیوت)
مرهم کاو ۲۳۷
مرهم كربونات الرَّصاص ٢٣٧
مرهم منغانيز
مرهم نشادري۲۳٦
مرهم هيدروسولفوريّ٢٣٨
مرهم اليود
مرهم يودور الرَّصاص۲۳۷

مسحوق لِيسون١٩٦	تُستحضَرات مُختلِفة من الكلورور
مِسْك الجنّ	لحديديككالم
مُسَهِّلات٢٤٧	مُستحلَب بالكلوروفورم۲٤١
مَشْرُوبات كُحوليَّة٢٤٩	مُستحلَب دونكان الزِّئبقي١٧٥
مَصًّاصَة صَغِيْرة ٢٢٣	مُستحلّب صمغ نشادريّ۲٤١
مَعاجِينِ الأَفيونِ٢٥١	مُستحلَب غولاند التَّجميليّ١٧٤
معجون أفيون طارد للحمّى (بورجوا) ٢٥١	مُسْتَحلَبات٢٤١
معجون أفيون مُضادّ للتَّعقيبة (بايْران) ٢٥١	مُستخرَج۲٤١
معجون أفيون مُضادّ للتَّعقيبة	مُستخلَص۲٤١
(دِیْدای)۲۵۱.	مُستخلَص الآلاميَّة المائع٢٤٦
معجون أفيون مُضادّ للديسنتيريا ٢٥١	مُستخلَص أفيون عامّ٢٤٦
معجون أفيون مُنظِّف أسنان بالفحم	مُستخلَص الجنطيانا٢٤٢
(بَرْييه)	مُستخلَص الجنطيانا المُثَبَّتَة٢٤٢
معجون أفيون مُنظِّف أسنان بقرن الأيِّل	مُستخلَص الخشخاش المُنوِّم٢٤٧
المحروق٢٥١	مستخلَص زهرة العُطاس٢٤٢
معجون عَسَلتي٢٥٢	مُستخلَص السوس الخام٢٤٧
معجون عَسَليّ طاردللدودة الوحيدة ٢٥٢.	مُستخلَص صفراء الثَّور٢٣٣
معجون عَسَلتي مُضادّ للبواسير ٢٥٢	مُستخِلَص صفراء الثُّور المُنَقَّى
معجون عَسَلتي مُضادّ للتَّعقيبة ٢٥٢	المُجَفَّف ٢٣٣
معجون عَسَلتي مُضادّ للقوباء٢٥٢	مُستخلَص الغرنداليا المائع٢٤٥
مُعَلَّب الكرز الغاريّ٢٥٢	مُستخلَص الفَرَنْدَل المائع٢٤٦
مُعلّب مُضادّ لداء الحَفَر٥٠	مُستخلَص الفشّاغ المائع٢٤٦
J 33 -	مُستخلَص القنَّب الهنديّ٢٤٣
	مُستخلَص الكَبابَة
•	مُستخلَص الكولا٢٤٤
مُعلَّبات النَّباتات الغضَّة مُعَلِّب	مستخلص الكينا الصفراء
الْمِلْعَقِيَّة ٢٠٠٠	مُستَخلَصات كحوليَّة أو هيدروكحوليَّة ٢٤٢
	مُستخلصات مائعة
مُنْ أَنْهُ	مُستخلَصات مائيَّة

مَياسِم	مُغَلْسَرَة بالكلورور الزُّئبقتي٢٥٣
مياه عِلاجيَّة مُختلِفة٢٥٧	مُغَلْسَرَة بكلورور الزَّنك٢٥٣
مياه معدنيَّة اصطناعيَّة	مُغَلْسَرَة الغُرَيّاء٢٥٣
مَيْسَم	مُغَلِّسَرَة الكلوروفورم٢٥٣
مِيكَانْيا غواكُو١٧٦	مَغْنُولِية بَحْريَّة اللَّون٢٥٤
مِيمُوزا بَيْضاء١٣٣	مُغَوَّل البوتاُس٢٥٤
نَبات النارا۱۹۲	مُغَوَّل البوتاس الكَربُوناتِيّ٢٥٤
نَخْلٌ مَلَكِيّ٢٦٤	مُغَوِّل الحامض السُولُفُوريك٢٥٥
نشاء البطاطا	مُغَوَّل الفوسفور٥٥٢
نَشَاءُ الرُّزِّ٢٦٤	مُغَوّل النَّفْتالين
نَفَل بَنَفْسَجِيّ٢٦٥	مُغوَّلات
نَفَلُ المُرُوجِ	مَقْرمَقْر
نقاط	مَكْلُورَة بُزْتُقالِيَّة١٩٠
نِقاط حامضة مُقَوِّية	مِلاط الطَّبَرُخَى٢٥٥
نقاط روسِيَّة مُضادَّة للكوليرا٢٦٥	ملح لامائتي
نقاط طاردة الحمّى	مَلْعَى عَنَمِيّ
نقاط طاردة للدود٢٦٥	مَلُولمَلُول
نقاط مُضادَّة لاعتلال المفصل ٢٦٦	مُلَيِّنات البَطْن
نيتريت الأمِيْل١٢٠	مَلِيْنَةَ صَغِيْرة
مُباب	مَلِيْنَةَ كَبِيْرَة
هَرَاسهَرَاس عَمْرَاس اللهِ	مُنفِّط نشادريّ
الهُرْبُون الجانبيّ الوَرَق٢٦٧	مُومُو
هُرْبُون مُقَلْنَس٢٦٧	مَوْز باشجُو
الهُرْبُون الهِنْدِي٢٦٧	مَوْز السَّعْد٠٠٠٠
مُرْدمُرْد	مَوْز الصِّيْن
هَرْقَل	مَوْز الفَأَل٢٥٦
هِنْدَب	
هِنْدَبِ أَسْمَانِي٢٦٨	•
هواگو	مُوْممُوْم
	•

وِنْكَا عُشْبِيَّة٢٧١	هُوَانْغ نَانهُوَانْغ نَان
ياَجَه	هُوْرا البرازيلهُوْرا البرازيل
يافُرْخ	هيدرولة زئبقيَّة كلسيَّة٢٥٧
يَعْمِيْصا	هِيلُونيا صَفْراء٢٦٩
يَنْبُوت نَتِن٣٠	هِيلُونيا كارُولينا٢٦٩
يُؤهِمْب مُعايِش	هيُوسِيامِين (سولفات)۲۷۰
•	ودْنَة مِكْرارَة٨٦

٧- مسرد إنجليزي

Black-horn
Black centaury Y.
Blister hellebore
Bloody finger \ \ \ \ \
Blue acacia 177
Bogberry \76
Bow-wood tree
Brandy Yo
Break stone Y18
Bresilian sandbox Y7
Brown rayed knapweed Y.
Buck's-horn plantain YYY
Bush basil Y
Cabbage treeV
Calabar bean \A
Camel's hay
Campeachy wood
Canoe cedar
Cardoon's shape donkey-fart \A
Cardoon's shape onopordon \^\
Carline thistle Y \ Y
Cathartic flax Y•7
Cat thyme

Caudate nettle 197	Derris 90
Cautery Y7Y	Devil's-bit scabious ٣٧
Celery leaved crowfoot	Diadem lady's mantle Y \ o
Cevadilla\\Y4	Donkey-fart ۱۸۲
Chestnut foliate oak	Donkey fart's artichoke ۱۸۳
China smilax	Doubtful nettle 197
Chinese banana	Downy bachelor's buttons A
Chinese root	Dragon's-blood 9V
Chirimoyas 190	Drias plant 98
Circinate corneltree\98	Dwarf laurel YY9
Circinate dogberry	Dyer's oak\
Circinate dogwood 198	Ehrenberg organy
Coca Y19	Elixir YY
Coffee-beans	Europeanfield cricket
Colic wort Y18	Evergreen clematis ۲07
Common carline Y \ Y	Evergreen coronilla Y 9
Common service tree	Fair-haired hyacinth
Conserve YoY	Falcate milfoil
Cork wood 190	Fetish banana You
Corydalis ۱۹۱	Feuberry 174
Cranberry 1996179	Field worm wood
Cretan germander	Finger flower
Crowned lady's mantle Y\o	Flea-bane ٢0
Cuckoo flower	Flea-wort ٣٥
Curcuma	Gall
Currant fruited rhubarb \.\	Gall oak \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Damascus milfoil	Geant birthwort١١٣
Danchi plant \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Germander \\ \\ \o \
Decaisne colchicum ۱۳٥	Glabrous strophanthus\\Yo
Decaisne meadow saffron	Glass-wool

Glaucous coronilla ۲۹	Lebanese donkey fart\
Gooseberry currant\•A	Lebanon poppy
Great flowered sesban \ \ \ •	Lemon grass A
Green hellebore AA	Little leafed star anis
Ground cypress 7 • Y	Livelong
Ground pine \oA	Log wood
Guaco\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Long rooted curcuma Y1
Hawthorn	Lotus jujub
Headed thyme \\\	Lotus tree\o
Helmet orchid YYY	Lucky banana Yo
Herbaceous periwinkle YV\	Lyre tree
Herb ivy ١٥٨	Major honey-wort ۱۲۱
Heterospiny donkey's fart \AT	Major wax flower \ Y
Heterospiny onopordum\\Y	Mandrake
Hoary plantain ۲۲۳	Marsh Crowfoot
Huaco 1٧٦	Marum germander
Hulwort	Master wort YY
Indian banana ۲۰٦	Matico plants YY/
Indian pink ۱۲٤	May bush
Jamaica dogwood٣٦	Meadow-sweet \ \\
Japanese banana YoV	Meadow bitter-cress V/
Japanese star anis tree٣١	Meadow clover
Jelly ۲۳•	Meadow saffron 177
Jupiter's beard 9Y	Medical cigarettes and cigars \ \ \ \
Kermes oak	Medicinal candles 18/
Ladie's smock VA	Medicinal squill
ladies' gloves ٢٥	Medium plantain YYY
Lamb's tongue YYY	Membranaceous nettle 191
Larger astrantia YY•	Meu 1 & 1
Lavender cotton Y•Y	Mezereon YY

Midsummer men A7	Purging flax Y • 7
Mixture YT9	Purple-apple
Mock privet 127	Purple clover ٢٦٥
Mossberry 199	Queen of meadows \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Mothmulleine	Quick \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Mountain laburnum ۱۳۸	Racemose elder \$ A
Mountain parsley Y • 9	Red clover ٢٦٥
Musky bugle \ \ \ \ \ \ \ \ \	Red mulberry tree
Nettle leaved goose-foot 1 • 9	Red sea aloeYV
Nut-grass	Reed-mace
Nut gall oak\	Resin
Odoriferous agrimony \V•	Rhubarb
Odoriferous olive tree \\9	Roman nettle 197
Odoriferous osmanthus 119	Royal wine palm ٢٦٤
Opiate Yol	Saddle tree\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Oriental hellebore	Sage-leaved rockrose YYY
Oriental whortle-berry \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Sago 17 8
Orpine	Salep\\Y7
Osage orange \\ \\ \\ \\ \\	Sarsaparilla
Palm-marrow	scarlet oak
Papaw	Scenanth V
Para cress	Scorpion astragal \ \ \ \ \ \
Pareira brava ٣٤	Sea lavender \ \
Perry's aloe YV	Sea oignon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Persley piert Y\ &	Setwall\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Pointed persicaria ۱۹۳	Silk vine ٣٨
Poisonus sumach ۱۳۰	Silky corneltree 198
Pollen VV•	Silky dogberry\9 &
Prickly water celery Y1.	Silky dogwood\98
Pubescent bachelor's buttons A	Silver scabious\\T•

Skirret\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ukranian scabious ١٣٠
Skull cap YTV	Vegetable wax \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
small bulrush £V	Venerate star anis tree٣
Small honey-wort\\YV	Vermifuge albizzia Y
Small leaved basil	Vernonia vermifuge ۱۸
Smooth thapsia 9 8	vesicatory hellebore
Sneezewort ٣	Virginia snake-root 111
Spadic busch	Voa-Fotsy\
Spanish red thyme ۱۱۳	Wall goose-foot
Spignel \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Water celery Y1. 4A4
Spilanthes	Water drop-wort\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Spiny burdock \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Water hemlock \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Spiny burrweed \ \ \ \	Wax flower ١٢١
Spurge olive YY9	Wax tree 183
St. Ignatus bean	Wayfaring-tree
Star of earth YYY	West indian gherkin 43
Stinking wood	White acacia
Summer adonis	White cedar
Summer pheasant's eye 7	White henbane £ 5
Sweet maudlin \$	White oak
Sylvan-cricket	White thorn
Talladonis	Wild balsam ١٦١
Tambayang stinking tree oA	Wild jujub
Taro plant oA	Wild marsh beet
Tassel hyacinth	Wild may apple ٤
Thouarsi's voacanga	Wild olive tree \ \ /
Trebizond tea\\9A	Wood 9
Trilobate birth wort ۱۱۲	Worm grass\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Trilobate worm-killer\\Y	Yellow bugle
Tulip tree \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Yellow germander ۱۵۷, ٦١
Turmeric Y\\	Zedoary

۳- مسرد فرنسي

Acacia à musenna	Adonis des Pyrénées
Acacia blanc \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Agati \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Acacia bleu ١٣٣	Aigremoine odorante
Achillée agérate {	Ail à toupet
Achillée de Damas 0	Airelle à maurets ١٦٩
Achillée falciforme 0	Airelle de Cappadoce
Achillée falquée	Airelle des fanges
Achillée herbe roue	Airelle des marais
Achillée laineuse	Alavert 187
Achillée nain {	Albizzie anthelminthique YY
Achillée sternutatoire	Alcalis et Alcaloïdes
Achillée visqueuse {	Alcaloïdes d'helleborus et du
Acide chyazique VY	veratrum\
Acide cyanhydrique VY-V۳	Alcée
Acide hydrocyanique VY	Alchémille à diadème Y \ o
Acide lactique racémique V 8	Alchémille couronnée Y \ 0
Acide lactique officinal V \$	Alchémille des champs Y \ &
Acide prussique VY	Alcoolat antiscorbutique Y • A
Acide stéarique VY	Alcoolat de castoréum Y•V
Acide sulfurique dulcifié Yoo	Alcoolat de citron Y • A
Adaptinol	Alcoolat de fourmis composé Y • A
Adonide estivale	Alcoolat de framboise Y•A
Adonis d'été	Alcoolat de mélisse composé Y • A

Alcoolat de térébenthine composé Y • V	AngélineV\
Alcoolats Y•V	Anguria 9 Y
Alcoolature d'orange douce Y • 9	Angurie 97
Alcoolature de citron Y•9	Angusture fausse
Alcoolatures Y•9	Aniline (Couleurs d')
Alcoolé d'acide sulfurique Yoo	Anone des marais
Alcoolé de naphtaline	Anone trilobée
Alcoolé de phosphore Yoo	Ansérine des murs
Alcoolé de potasse Yo &	Aouret \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Alcoolé de potasse carbonatée Yo &	Apozème antidiarrhéique
Alcoolés Yo &	Apozème antiictérique
Algues marines YY	Arach 7 8 9
Alisier \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Arbre à chou V•
Alocasie macrorhize ٥٨	Arbre à cire\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Aloès Yo	Arbre de paresse\\oY
Aloès de Perry YV	Arbre de vie
Ambaiva	Arbre du poison ١٣٠
Amer de bœuf	Arec ou Aréquier Y \V
Amidon de riz ٢٦٤	Aristoloche à grandes fleurs \ \\T
Anacycle de Valence Y 9	Aristoloche géante \ \\T
Anagyre fétide	Aristoloche serpentaire \ \ \ Y
Anagyris ٣•	Aristoloche trilobée ۱۱۲
AndireV•	Armoise champêtre \0\
Andire de Surinam V •	Armoise de Barbarie
Andire inerme V•	Arrow-root du Brésil
Andire vermifuge V \	Asiminier\\Y
Anémone des prés ١٤٦	Astragale à gousses velues
Aneth sauvage \ \ \	Astragale mareotique\ \ \ \ \ \ \
Angélim V1	Astrance majeure YY.
AngélinV \	Athamante Selin persillée Y•9

Atropine et Alcaloïdes des solanées . \	Basilic à moustiques Vo
Aubépine ۱۱٤	Basilic fin
Aubépine épineuse۱۱٤	Basilic fin vert V7
Aubour de montagne ۱۳۸	Basilic vert
Aunée conyze	Batiator (Racine de) ٣0
Aurone des Champs ١٥١	Batjenjor ٣0
Aurone femelle Y•Y	Baume antiarthritique ٣٩
Ayahuasca YVY	Baume aromatique ٤ •
Badianier à petites fleurs ٣١	Baume de Fioravanti Y•V
Badianier du Japon ٣١	Baume de Geneviève ۲۹
Badianier vénéré ٣١	Baume du Chevalier Laborde 8 •
Bain ammoniaté ferrugineux A &	Baume Duret ٣٩
Bain antigaleux (Vétérinaire) AT	Baumes ٣٩
Bain antiparasitaire à la nicotine A &	Béhen astringent\\\
Bain de tilleul	Béhen rouge \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Bain résolutif A &	Benzoate de sodium
Bains	Berle Y 1 •
Bain stimulant A &	Berle à feuilles étroites Y 1 •
Balsamine sauvage \ \\	Berle dressée Y1.
Bananier basjoo YoV	Bicolorine
Bananier d'Inde	Bière antiscorbutique
Bananier de Chine ٢٥٦	Bile de bœuf Y٣٢
Bananier fétiche Yol	Biscuits vermifuges à la santonine. ٣٦
Bananier japonais YoV	Bois
Barbe-de-chêne \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Bois d'aloès 9 •
Barbeau Y•1	Bois d'arc\
Bardane pubérulente	Bois d'oreilles YY9
Basilic à feuilles de laitue Vo	Bois de campêche 9 •
Basilic à feuilles frisées Vo	Bois de chien ٣٦
Basilic à feuilles violettes Vo	Bois de couleuvre 9 •

Bois de garou YY9	Cérat de Pott YY
Bois de mai\\\	Cérat morphiné ۲۳
Bois de Rhodes 41	Cérat opiacé ۲۳
Bois de rose	Cérinthe majeure ١٢١
Bois gentil YY9	Cérinthe petite ۱۲۱
Bois joli YY9	Cévadille 176
Bois puant	Chamépitys
Boissons spiritueuses Y & 9	Chanvre (Mode d'usage) 196
Bougies médicinales \ \ \ \ \ \ \	Charbon animal purifié \V
Bouillon de veau	Chardon doré Y 1
Bouton d'argent ٣	Charpentaire
Brimble \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Chêne à feuilles de châtaigner \\Y\
Brinvillière \ Y &	Chêne à galles \\Y\
Caapi YVY	Chêne à grappes 177
Cachets médicamenteux Y \	Chêne blanc 17
Cactus à grandes fleurs 179	Chêne cocciné
Café vert ٤١	Chêne d'Amérique ۱۳
Campêche٣٧	Chêne des teinturiers ۱۳۱
Camphre naturel Y • §	Chêne du Portugal \\Y\
Canneberge 199	Chêne garouille ١٣١
Canneberge des marais 179	Chêne kermès ۱۳۱
Capsules de pain azyme Y \	Chérimolier 196
Cardamine des prés VA	Cherouis 176
Carline vulgaire Y \ Y	Chervis 176
Cataplasme en feuilles YYo	Chevalon Y.
Cautère ۲٦٢	Chigommier\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cayapona Y•٦	Chirimoyer 196
Cécropie glanduleuse \\o Y	Chlorodyne Y 11
Cécropie toute blanche	Chlorure de fer hémostatique Y \Y
Centaurée jacée Y•1	Chlorure ferrique Y \ Y

Cigarettes arsenicales ۱۲٦	Coquelicot du Liban 91
Cigarettes arsenicales de Boudin. 177	Cormier 1VY
Cigarettes et cigares médicaux \ \ \ \ \ \ \	Corne artificielle
Ciguë aquatique \ \ \ \ o	Cornichon 9 Y
Ciguës (Espèces) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Cornouiller circiné
Cires végétales 127	Cornouiller soyeux 198
Ciste à feuilles de sauge YYY	Coronille glauque ٢٩
Citronnelle Y•Y	Coronille toujours verte ۲۹
Classification des extractions Y & \	Coronope
Clématite à vrilles ٢٥٦	Corossol d'Asie
Clématite toujours verte ۲۰٦	Corossol des marais
Clystères	Corossolier des marais \ 90
Coca YIA	Corydalle belle ۱۹۰
Cognac Yo.	Corydalle creuse \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Colchique d'automne \\TT	Coton de verre ۱۹۷
Colchique de Decaisne ۱۳٥	Coton minéral ۱۹۷
Colequim	Couleuvrée de Virginie \ \ \ Y
Collodion salicylé	Coussinet
Collyre	Cresson de Para ^\
Collyre (Formules)	Cresson des prés VA
Combretum\177	Cresson du Brésil A
Composition chimique de l'opium of-	Cresson élégant VA
ficinal Y•	Cressonnette VA
Concombre-cornichon 47	Cricri
Concombre des Antilles 47	Curcuma
Concombre marron 97	Curcuma long ۲۱۱
Conserves YoY	Curcuma zédoaire ۱۱۱
Conyse ٣٥	Cytise de montagne ۱۳۸
Conyze	Daphné joli bois YY9
Conyze vermifuge \\ \A.	Daphné mézéréon YY9

Deguélie	Enègmes
Dentaire 4A	Épine blanche١١٤
Derris 4 o	Esculoside \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Déserpidine 97	Espèces١٦٨
Digitale pourprée \ \ \	Esprit d'écorce de citron Y • A
Dwarfmilfoil	Esprit de Castoréum Y • V
Eau-de-vie Yo.	Esprit de framboise Y • A
Eau de Dardel Y • A	Esprit de raifort composé Y • A
Eau de magnanimité Y • A	Esquine \A\
Eau de Rabel Yoo	Essence d'ylang-ylang 44
Eau gazeuse au protoxyde d'azote. ۲71	Essence de lavande bâtarde 44
Eau gazeuse azotée ۲٦١	Essence de lavandin 9
Eau gazeuse édulcorée ۲٦١	Essence de Ptychotis ajowan 4
Eau gazeuse simple Y7.	Ester amylnitreux
Eaux minérales Yov	Ester benzylsalicylique \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
Eaux minérales artificielles Y7.	Ether amylazoteux \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Eccalochrome \\ \\ \o	Ether amylnitreux
Édulcorants ۲۳۱	Éthylhydrocupréine
Eléctuaires YoY	Eupatoire à seuilles de sarriette \V7
Electuaires simples	Eupatoire de Mésué
Elixir de raifort composé Y • A	Extait alcoolique de quinquina Y &
Elixirs	Extait de quinquina jaune Y &
Ellébore à fleures vertes	Extrait Y & \
Ellébore d'Orient	Extrait brut de réglisse Y & V
Ellébore officinal	Extrait d'arnica Y & Y
Ellébore vert	Extrait de bile de bœuf YYY
Ellébore vésicant	Extrait de bile de bœuf purisié et
Émétine (Chlorhydrate d')	desséché YYY
Emplâtre YYY	Extrait de chanvre indien Y & Y
Emulsions Y & \	Extrait de cubèbe Y & Y

	Extrait de gentiane Y & Y	Galle de chêne
	Extrait de gentiane stabilisée Y & Y	Garde-robe Y.Y
	Extrait de kola Y & &	Gargarismes \V\
	Extrait de pavot Y & V	Gelées YT
	Extrait fluide de grindelia Y & o	Génépi bâtard
	Extrait fluide de passiflore Y & 7	Génépi femelle
	Extrait fluide de salicaire Y & 7	Génépi noir
	Extrait fluide de salseparelle Y & 7	Geoffrée V
	Extraits alcooliques ou hydro-alco-oli-	Geoffrée de Surinam V
	ques 7 £ 7	Geoffrée inerme V
	Extraits aqueux Y & 7	Géoffrée vermifuge V
	Extraits fluides Y & o	Germandrée à fleurs en tête ۱٥٧
	Extrait total d'opium Y & 7	Germandrée ambrée ۱ ٥ ٨
	Farines de légumineuses\o٦	Germandrée crétoise 109
	Faux cyprès Y•Y	Germandrée de Crète 109, 10V
	Faux fenouil	Germandrée des montagnes 10A
	Faux turbith	Germandrée flavescente ۱۵۷, ٦٧
	Fécule de pomme de terre ۲٦٤	Germandrée ivette \ o A
	Fenouil d'eau \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Germandrée jaune ۱۵۷، ٦٧
	Fenouil d'ours \ \ \ \	Germandrée maritime \ 0 A
	Fève de Calabar \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Germandrées
	Fève de Saint Ignace \\ \\ \	Germandrée tomenteuse ٦٧
	Fiel de bœuf YTY	Gin at Whisky Yo.
	Filaria à larges feuilles \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Gingembre bâtard ۱۱۱
	Foin de chameau V	Glucose liquide \VV
	Fontanelles Y77	Glycérés You
	Fonticules Y7Y	Gommes-résines ١٥٢
	Fruits du séné ٦١	Gouttes Y70
	Gaïacol sulfonate de potassium. VVV	Gouttes acides toniques You
* ~ _	Galle	Graisses hydrogénées 97

Grande astrance YY•	Huile camphrée concentrée \ Y
Grande cérinthe\YV	Huile camphrée injectable \ Y
Grande digitale \•\	Huile d'olive neutralisée et stérilisée \
Grand mélinet \YV	Huile de cantharides\
Grand orpin	Huile de cire\Y
Grand Tayove oA	Huile de fougère mâle\Y
Granules VV	Huile de garou\
Grillon champêtre 37	Huile de gomme ammoniaque pyrogé
Grillon des champs	née \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Guaco\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Huile de lin
Hachich des mexicains ۲۱۹	Huile de roses pâles
Hachich des péruviens Y19	Huile de schistes \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Hellébore vésicant	Huile grise
Hélonias Jaune ۲٦٩	Huile iodée\
Hématoxyle TV	Huile phéniquée ou phénolée \ Y
Herbe à éternuer 🏋	Huile philocome \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Herbe à la coupure Λ 7	Huile purgative \ Y
Herbe à la fièvre \vo	Huile rosat\\Y\
Herbe à oignons ١٢٨	Huiles médicinales \ Y
Herbe à scorpion \ {	Huiles pyrogénées\
Herbe aux abeilles \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Hure du Brésil Y7
Herbe aux chats	Hyoscyamine (sulfate d') YV
Herbe aux mouches ٣٥	Imbahyba 101
Herbe aux puces ٣٥	Ipécacuanha blanc amylacé \ \ \
Herbe judaïque ۲٦٧	Ipécacuanha ondulé \ 74
Herbe parfaite \vo	Ipécacuanhas
Herbe sarrazine ٣	Ipécacuanha strié majeur \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Hoang-Nan YJA	Ipécacuanha strié mineur \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Huaco\V7	Ipéca glycyphloea
Huile camphrée ۱۲۱	Ipéca gris cendré glycyrrhizé \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Ipéca Sainte-Marthe \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Lavande triste
Ipéca strié noir	Lavements
Ipéca violet	Laxatifs Y & V
Ive \oA	Lichen
Ivette\ \oA	Lichen blanc de neige VA
Ivette musquée ۱٥٨	Lichen contre la rage VA
Jacée Y•\	Lichen des murs VA
Jacée des prés Y•1	Lichen des rennes VA
Jacinth à toupet AT	Lichen entrelacé VA
Jone odorant V	Lichens tinctoriaux V
Joubarbe des vignes A7	Lilas de terre
Joubarbe rose	Limonades
Joubarbe Toile d'Araignée 4Y	Limonade gazeuse ۲٦١
Jujubier des lotophages \ o o	Liniment
Jujubier sauvage	Liniment camphré ۱۲۱
Jusquiame blanche £ £	Lin purgatif Y•7
Katran \\	Lin sauvage
Khoka Y\A	Liqueur
Kino d'Australie YY \	Liqueur du Dr Pravaz Y \Y
Kino de Gambie YY \	Liriodendron \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Kino de la Jamaïque YY \	Lok 37
Kino du Bengale YY	Looch
Kinos (sortes de) YY \	Lotions \V &
Kirsch Yo.	lotus des anciens
Kirsch-wasser Yo.	Lucotte ٢٦٥
Lactucarium 177	Maclure
Laine de verre \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Magnolier de Virginie You
Lampourde épineuse \ \ \	Magnolier glauque Yog
Langue d'agneau YYT	Malon Y•1
Lavande de mer \ \	Marasquin de Zara Yo.

Marum	Olivier sauvage\\\
Massette des étangs	Onguent
Mastic à la Gutta percha Yoo	Onopordon à épines variées \AY
Matico YYA	Onopordon à tête d'artichaut ۱۸۲
Mauvealcée	Onopordon carduiforme\\
Médicament	Onopordon du Liban ۱۸۲
Mélinet minor ۱۲۷	Onopordon floconneux ۱۸۲
Meum	Opiats
Mikanie Guaco ۱۷٦	Oranger des Osages
Millefeuille aquatique \ \ \ \ o	Oréodoxe royal Y78
Mimosa blanc\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Origan d'Ehrenberg
Mimosa bleu 177	Origan d'Espagne 117
Mixture YT9	Ormière 177
Molène sinueuse £V	Orpin reprise
Mors de diable ٣٧	Orpin rose
Mucilage YYo	Ortie à pilules ۱۹۲
Muriate de fer Y \ Y	Ortie à queue
Mûrier rouge oq	Ortie douteuse 197
Muscari à toupet	Ortie membraneuse 197
Muscari chevelu	Ortic romaine 197
Nitrite d'amyle\	Osmanthe odorant
Noble épine \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pagianthe cérifère \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Noir animal purifié ۱۷۹	Palmier royal ٢٦٤
Noir de fumée Y7V	Palmite
Noisette d'Inde Y \ V	Panacée d'Esculape 4
Noix de galle	Panax à fleurs sessiles £7
Oeil de perdrix	Panax de Henri £7
Oignon marin	Panax épineux ٤٢
Oléastre ۱۱۸	Panax piquant
Olivier odorant \\9	Pancréatine £ 0

Pareira brava	Pied de canard £3
Parelle A §	Pilingre 197
Pâte de gomme arabique dite pâte de	Pilules 0 •
guimauve 177	Pilules et Bols 07
Pâte dite Tussilage à l'anis de Lille \\\	Piscidie ٣٦
Pâte officinale au lichen \ 74	Pissenlit assemani Y7A
Pâte ou gelée pectorale de fruits. \\\	Pissenlit bessarabique Y TV
Pâtes pour usage vétérinaire \ 7.	PistouV7
Patience sauvage	Plantain bâtard YYY
Patte d'oie vraie \ • ٩	Plantain corne de cerf YYY
Patte de loup ١٢٦	Plantain moyen YYY
Perce-pierre des champs Y\ \ \ \ \ \	Plante à moustiques Vo
Perchlorure de fer ۲۱۲	Podophylle £٦
Périploque grec ٣٨	Podophylle en bouclier £ ٦
Persicaire douce ۱۹۳	Podophylle pelté £ 7
Persicaire pointue ۱۹۳	Poix noire
Persil de montagne Y•9	Poix résine
Pervenche herbacée YV1	Polium Nov. TV
Pet d'âne\	Polium à feuilles de lavande \ OA
Pet d'âne à épines variées ۱۸۳	Polium blanc 109,10V
Pet d'âne à tête d'artichaut ۱۸۳	Polium maritime\ov
Petit basilic ٧٦	Pollen \\V•
Petit mélinet \YV	Pommade
Phellandrie\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pouliot de Crète \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Phénol sulforiciné \AA	Pouliot de montagne \ O A
Phillyrée à larges feuilles \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pouliot jaune ۱۵۷, ٦٧
Phillyrée intermédiaire \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Ptarmique٣
Phillyrée Orientale \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pudis
Physostigma vénéneux \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Quenouille {V
Pied de boue	Ouinquina Pitavo ۲۱٦

Quinquinas et leur composition chimi-	Salsepareille
que	Salsepareille squine
Quinquinas jaunes de Colombie Y \ 7	Sang-de-dragon 9V
Racine de Chine ۱۸۱	Sang-dragon 9V
Racine de safran ۲۱۱	Sanicle de montagne ۲۲.
Rack 7	Sanicle femelle ۲۲۰
Radiaire YY•	Santoline Y•Y
Réglisse (composition chimique). 140	Santoline blanche Y•Y
Réglisse hérissée	Santoline petit cyprès Y•Y
Reine-des-prés	Santonique Y•Y
Renoncule scélérate	Sapinette £ A
Renouée de Sieboldi ۱۹۳	Satyrion ١٢٦
Renouée persicaire\19٣	Sauge des bois Y•Y
Résine jaune ۱۱٦	Scabieuse
Résines ۱ • ٤	Scabieuse argentée ۱۳۰
Rhodiole	Scabieuse d'Ukranie \\ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Rhubarbes	Schænanthe
Rhubarbe-groseille	Scille
Rhubarbe officinale ۱ • ۸	Scrotum de chien ١٢٦
Rhubarbe sauvage	Scutellaire galériculée Y 7 V
Romarin des marais \\	Sébadille 179
Sabadille 179	Sédum reprise A7
Sablier du Brésil ٢٦٩	Sédum télèphe
Saccharolés mous	Sel anhydre Y \ Y
Safran des Indes ۲۱۱	Senelle
Sagou 17 &	Senellier ۱۱٤
Saladelle	Serpentaire de Virginie ۱۱۲
Salap 177	Sesbanie à grandes fleurs \ \ \ \ \ \
Salep ۱۲٦	Sinapismes en feuilles YYO
Salicylate de benzyle\ \ \ \	Smilax de Chine ۱۸۱

	Soie de verre ۱۹۷	Thapsie 9 8
	Soluté officinal de chlorure ferrique Y \ Y	Thé de Trébizonde ۱۹۸
	Solution aqueuse de gaz carboni-	Thuya du Canada 7.
	que	Typha d'Australie ٤٧
	Sorbier 1VY	Typhace
	Souchet des Indes Y 1 1	Thym blanc
	Souchet rond ۱۲۸	Thym capité ۱۱۳
	Spigélie anthelminthique ۱۲٤	Thym rouge d'Espagne \\\
	Spilanthe	Thym rouge de Tunisie ۱۱۳
	Spirée filipendule \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Tilleul à grandes feuilles \ \ \ \
	Spirée ulmaire \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Tilleul d'été١١٩
	Squille 17	Tilleul femelle ۱۱۹
	Squine ۱۸۱	Timbo 0 9
	Statice	Tontaque £V
	Statice maritime \\	Toque
	Stéarine VY	Tramène Y70
	Sterculier scaphigère	Trèfle commun ۲٦٥
	Sterculier tambayang OA	Trèfle des prés ۲٦٥
	Strophanthe agréable ۱۲٥	Trèfle rouge ۲٦٥
	Strophanthe glabre ۱۲0	Trèfle violet ۲٦٥
	Strychnos ignatier ۱۸٥	Triolet ٢٦٥
	Sulfocarbol ۱۸۹	Tulipier
	Sulfogaïacol \VV	Tulipier de Virginie \ \ \ \ \ \ \
	Sumac vénéneux ۱۳۰	Typhace
	Sureau à grappes	Typha d'Australie £V
	Tambayang OA	Ulmaire ١٦٣
	Taro des anciens • ^ ^	Usage vétérinaire 07
	Terra merita Y \ \	Vaciet AT
	Tête de loup	Vernonie vermifuge\
.	Tête de moineau	Verveine indienne A.

Vétiver V	Voacanga de Thouarsi	140
Vignette \ \\T	Vomiquier amer	140
Viorne à feuilles de prunier \A	Xanthium épineux	181
Viorne mancienne	Yagé	777
Vipérine de Virginie ۱۱۲	Yohimbe	777
Voa-Fotsy\	Yumbehoa	777
Voacanga d'Afrique ۱۸۵	Zédoaire	111

٤- مسرد ألماني

Ackergamander \\ \\ \	Blaugrünkronwicke Y
Afrikanischer voacanga ۱۸٥	Blütenstaub \V
Alkali \ ٩٨	Branntwein Yo
Alligatorapfel \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Brasilianisch Sandbücksenbaum 774
Aloe ۲0	Brennung Y71
Amerikanischer eiche ۱۳۱	Broussatee ۱۹/
Anguriengurke	Cameleshov
Arekapalme Y \ V	Campechebaum
Astragal	Campecheholz ٣٧
Ätzmittel	Chinastechwinde\
Augentropfen \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Chinawurzel ۱۸۱
Augen wurz Y•9	Chinesischbanane
Balsam	Chirimoya
Balsamgarbe §	Citronengras
Barbarei Beifuss	Citrongrass A.
Berggoldregen ۱۳۸	Cocastrauch Y 1 9
Betramgarbe٣	Cretischer berglavendel ۱٥٩ ، ١٥٧
Beumkränzensinau Y \ o	Damaszengarbe
Birngurke 4 Y	Decaisne lichtblume \\Y'
Bittere ignatie	Decaisne zeitlose
Blasenziehend nieswurz A9	Diademfrauenmantel Y \ 0
Blattkastanie eiche ۱۳۳	Diademsinau. Y 10
Blaue akazie\\YY	Drachenblut 9V

Dreilappigosterluzei\\\Y	Gelber gamander ۱۵۷، ٦١
Dreilappighohlwurz\\\Y	Gelber günsel
Dürrwurz ٣٥	Gelbe wachsblume \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Echeter tulpenbaum \ \ \ \ \ \ \	Gelee YT
Echte galleiche ۱۳۲	Gemeiner dorn\\\
Echte hundsschlinge	Gewürzgarbe
Echte meerzwiebel	Gifthahnenfuss
Echter rhabarber\ \•A	Giftigesumach
Echter seidelbast YY4	Gilberingwer Y \ '
Echter speierling	Gilbwurzel Y 1
Echter widerstoss	Glücksbringerbanane Yo
Echtes mädesüss \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Grasartig sinngrün
Ehrenbergdost \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Groberblüte osterluzei \ \ \ Y
Einfachblättrige waldrebe Yon	Grossblüte sesbanie \ \ \ \
Eselfurz ۱۸۲	Grosse Fetthenne
Eselfurz artischoke	Grosser Tayove
Falsche turbith٩٤	Grosser wachsblume \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Feine Bärwurz \ \ \ \ \ \	Grosses flöhkraut
Feinfilzige lorbeerlinde \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Grosse sterndolde YY
Feldbeifuss \ 0 \	Grüner Kronwicke Y
Feldfrauenmantel Y 1 &	Grüner nieswurz
Feldgrille	Hagedorn \\ {
Feldsinau Y\ \$	Harz \ • 8
Fetischbanane You	Hauswurz 4 Y
Fingerhut \•\	Heilstearinkerze \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Flockig eselfurz\\\Y	Heiltrank YY
Galläpfel eiche\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Helmblume YVY
Galle YTY	Herbstzeitlose \\YY
Gamander\ 107	Hirschorn wegerich YYY
Gänsefussmelde \ • 9	Holz٩•

	Husarenknopf A	Mittlerer wegerich YYY
	Ignatienbaum \Ao	Mixtur Y٣٩
	Indianisches wurmkraut ۱۲٤	Moosebeere 174
	Indischbanane You	Moosheldelbeere
	Ivygünsel ١٥٨	Niesgarbe *
	Japanisch badianenbaum ٣١	Orientalische nieswurz A9
	Japanisch banane Yov	Osagedorn ۱۹۰
	Kaffee ٤١	Osagen apfel\
	Kalabarbohne ۱۸٦	Pappawbaum \ Y
	Katzengamander \oA	Parakresse A1
	Katzenkraut	Persischer rhabarber \ \ \ \ \ \
	Kellerhals YY9	Pflaumenblatt schlinge \A
	kermesbaum 177	Pillennessel\ \ \ \ \ \ \ \
	Kermes eiche	Pinangpalme Y \ V
	Klee	Poleigamander
	Kleine blütbadianenbaum ٣١	Purgier-léin Y•٦
	Kleine blütsternanis ٣١	Purgier-Flachs Y•7
	Kleine eberwurz Y \ Y	Purpurapfel \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Kleines basilienkraut V7	Rhabarber \ \ • o
	Kletternder ۱۹۱	Riechölbaum
	Königspalme ٢٦٤	Riesenhohlwurz
	Konserve YoY	Rohrkolben £V
	Kukucksblume VA	Rollenkornelbaum \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	Lebensbaum	Rollenkorneliuskirschbaum \ 9 &
	Libanesisch eselfurz \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Rote bergfetthenne
	Libanon mohn	Roteklee Y70
	Lotosbaum	Rote maulbeerbaum 0 9
	Mauergansefuss	Rotodkopfklee ٢٦٥
	Mauszwiebel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Runde zyperwurzel ۱۲۸
٥	Meisterwurzel YY•	Sago 17 8

Salbeiblatt cistrose YYY	Wachs baum \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Salepwurzel 177	Waldbalsamine\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Schlinge	Wälzenhornstrauch ۱۹٤
Schmaler £ V	Wasserapfel \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Schnurfrechme \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Wasser filipendel \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Schöne kletternder \4.	Wasser pfersaat \ \ \ 0
Schopfmusk	Wasser sellerie Y \ •
Schwanznessel 197	Weicherkleinklette
Seidenhornstrauch	Weicherklette
Silberskabiose \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Weichkornelbaum\ \ 9.8
Skorpion astragel \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Weisenkönigin \ 7 T
Sommeradonisblume	WeisenschaumkrautVA
Spanisch Dost	Weissdorn١١٤
Spanisch thymian ۱۱۲	Weisse akazie ۱۳۳
Spitzig Knöterich 197	Weissenflockenblume Y• \
Stachelspitzklette. \\ \\ \\ \\ \\	Weisser bilsenkraut £ £
Stechwinde \\ \\ \	Weisser eiche\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Steifwassersellerie Y1.	Wiesenklee Y70
Steinbrech	Wilder dillen \ \ \ \ \
Stinkbaum T•	Wilder Ölbaum ۱۱۸
Stinkholz	Wolliges agremonen \V•
Tambayangstinkbaum OA	Wollkraut £V
Tenfelsabbiss Tv	Wurmabführend albizzia ۲۲
Thouarsische voacanga	Wurmabführendvernonia ۱۸ •
Tropenworz	ysop gamander \oq .\oV
Unechter kohlbaum V•	Zedoarwurzel ۱۱۱
Verehren sternanisbaum ٣١	Zittwer Kurkume \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Virginischer Hohlwurz\	Zuckermerk \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Virginischer osterluzei	Zweifelhaftnessel 197
Voa-Fotsy\\A&	Zwerggarbe {

٥- مسرد لاتيني

Acacia albida ۱۳۳	Alocasia macrorrhiza 0/
Acacia cyanophylla ۱۳۳	Aloe
Acanthopanax ٤٣	Aloë perryi
Acanthopanax Henryi & T	Amomum curcuma Y\\
Acanthopanax senticosus ٤٣	Amylum oryzae Y78
Acanthopanax sessiliflorum 27	Amylum solani Y78
Achillea ageratum \$	Anacyclus velentinus Y
Achillea damascena	Anagyris fœtida
Achillea falcata 0	Andira V•
Achillea herba-rotas	Andira inermis V
Achillea macrocephala ٣	Andira surinamensis V
Achillea nana	Andira vermifuga V
Achillea ptarmica ٣	Andropogon citratus A.
Achillea sulphurea	Andropogon schænanthus V
Achillea viscosa	Anemone pratensis 187
Adonis æstivalis	Anona asiatica
Adonis Pyrenaica	Anona cherimolia
Agrimonia odorata ۱۷۰	Anona palustris
Ajuga chamæpitys	Anona triloba\
Ajuga iva	Aphanes arvensis Y \ &
Albizzia anthelminthica YY	Aphloia sp \A8
Alchemilla arvensis Y\ \ \ \	Arctium minus pubescens
Alchemilla diademata Y \ o	Areca catechu ۲۱۷

Areca faufel Y \V	Cerinthe minor
Aristolochia gigas \ \\\	Chamælirium carolinianum ۲٦٩
Aristolochia grandiflora ۱۱۳	Chenopodium murale ۱ • ۹
Aristolochia serpentaria\\\\	Chondodendron tomentosum ٣٤
Aristolochia trilobata ۱۱۲	Cinchona pitayensis ٢١٦
Artemisia aragonensis ١٥١	Cistus salviifolius YYY
Artemisia campestris ١٥١	Cladonia rangiferina VA
Artemisia Cina	Clematis cirrhosa
Artemisia spicata JacqV	Cocculus chondodendron ٣٤
Asiminia triloba	Cocculus plathyphylla ٣٤
Astragalus mareoticus \ \ \ \	Coffea £ \
Astrantia major YY•	Colchicum autumnale ۱۳۳
Athamanta oreoselinum Y•9	Colchicum decaisnei ۱۳٥
Atragalus exscapus	Colocasia odora
Baccharoides ascaricida \A•	Combretum sundaicum \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Banisteria caapi YYY	Conyza anthelminthica \ A •
Berula angustifolia Y 1 •	Conyza squarrosa ۲٥
Berula erecta Y 1 •	Coridothymus capitatus \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Cactus grandiflorus 189	Cornus circinatus 198
Caladium odorum • A	Cornus sericea
Calamus draco 4V	Coronilla glauca ۲۹
Cardamine pratensis. VA	Coronilla sempervirens ۲۹
Carlina vulgaris Y \ Y	Cortex pseudo-angusturae T.
Cayaponia globosa Y•7	Corydalis cava
Cecropia adenopus 107	Corydalis formosa ۱۹۰
Cecropia hololeuca	Corynanthe Yohimbe YVY
Centaurea jacea Y•1	Cratægus oxyacantha\\\ \\ \\ \\ \\
Cereus grandiflorus 149	Cucumis anguria 47
Cerinthe aspera\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Curcuma longa Y 1 1
Cerinthe major \YV	Curcuma zedoaria rosc\\\\

Cymbopogon citratus	Helonia dioica Y7
Cyperus rotundus\\\\	Hura brasiliensis Y7
Daphne mezereum ۲۲۹	Hyacinthus comosus
Deguelia	Hyoscyamus albus ٤
Dentaria pinnata٩٨	Ignatia amara\
Derris 90	Illicium parviflorum ٣
Digitalis purpurea	Illicium religiosum
Dracæna draco 9V	Imbricaria parietina V
Eleutherococcus Henryi १٣	Impatiens nolitangere \ \ \
Eleutherococcus senticosus ٤٣	Inula conyza To
Erythroxylum coca Y 1 9	Inula vulgaris To
Eupatorium perfoliatum ۱۷٥	Jacea communis Y • '
Eupatorium satureiæfolium \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Laburnum alpinum ۱۳/
Extractum fellis bovis YTT	Lactuca sativa
Fellis bovis YTY	lactuca virosa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Filipendula Ulmaria ١٦٣	Lappa minor pubescens
Galla quercina	Ligusticum meum \ \ \ \ \
Galla tinctoria	Linum catharticum Y.
Galla turcica	Liriodendron tulipifera \ \ \ \ \ \
GeoffræaV•	Maclura aurantiaca Nutt 19
Geoffrœa inermis V•	Maclura pomifera schneid \ 9
Geoffrœa surinamensis V•	Magnolia glauca
Geoffræa vermifuga V \	Magnolia Virginiana ۲0
Glycyrrhiza echinata ۱۳۸	Malva alcea
Gryllus campestris ٦٣	Manettia ignita 170
Hæmatoxylon campechianum TV	Marum verum \ 0/
Helleborus officinalis A9	Mespilus oxyacantha \\ \
Helleborus orientalis	Meum athamanticum 18
Helleborus vesicarius	Mezereum officinal YY
Helleborus viridis	Morus rubra06

Musa basjoo YoV	Pausinystalia Yohimba YV
Musa japonica	Peltigera canina V/
Musa religiosa Yol	Periploca græca
Musa sinensis	Phellandrium aquaticum L \ \ \ \ \ \
Muscari comosum	Phillyrea latifolia \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Muscari longissimum	Phillyrea media\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Ocimum minimum V7	Physica nivalis V/
Ocimum viride ٧٥	Physostigma venenosum\A
Olea fragrans ۱۱۹	Pimpinella sisarum ١٣٥
Olea oleaster\\A	Pipper angustifolium YYV
Olea sylvestris ۱۱۸	Pipper camphoriferum YY/
Enanthe phellandrium \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pipper elongatum ۲۲۱
Onopordum \\\\\\\\\\\	Piscidia erythrina
Onopordum carduiforme \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Plantago coronopus YYY
Onopordum cynarocephalum ۱۸۳	Plantago media ۲۲۲
Onopordum floccosum \AY	Podophyllum peltatum §
Onopordum heteracantha ۱۸۳	Polygonum cuspidatum 197
Onopordum libanoticum ۱۸۲	Polygonum persicaria
Onopordum telavivense ۱۸۲	Polygonum sieboldii
Orchis 177	Psychotria emetica
Oreodoxa regia ٢٦٤	Ptarmica vulgaris
Origanum Ehrenbergii \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Pterocarpus draco 4V
Osmanthus fragrans 119	Quercus aesculus
Oxycoccos palustris 179	Quercus alba
Oxycoccos quadripetala	Quercus castaneifolia
Pagiantha cerifera ١٤٢	Quercus coccifera
Panax sessiliflorum	Quercus infectoria
Papaver libanoticum 4 \	Quercus lusitanica \YYY
Parmelia parietina VA	Quercus lusitanica var. infectoria 79
Paullinia pinnata 0 9	Quercus racemosa \\"\"

Ranunculus sceleratus Ao	Sedum vulgare
Réglisse (composition chimique) . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Sempervivum arachnoideum 4
Resina. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Serjania curassavica 06
Rhamnus lotus	Sesbania grandiflora \ \ \ \
Rheum \ \ • o	Sium ۲۱
Rheum officinale ۱۰۸	Sium angustifolium Y \
Rheum ribes \ \ \ \ \ \ \	Sium berula
Rhodiola rosea	Sium erectum
Rhus toxicodendron ١٣٠	Sium sisarum 175
Richardia	Smilax
Richardsonia brasiliensis \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Smilax china ١٨١
Rumex obtusifolius A &	Sorbus domestica \V\
Sabadilla officinarum	Spigelia anthelmia
Salvia nemorosa Y•Y	Spilanthes oleracea
Salvia silvestris Y•Y	Spiraea Ulmaria ١٦٢
Salvia sylvestris Hort Y•Y	Spiritus vini
Sambucus racemosa £ A	Statice limonium
Santolina chamæcyparissus Y•Y	Sterculia staphigera
Santolina incana Y•Y	Strophanthus gratus 170
Satureia capitata ۱۱۳	Strychnos Gaultheriana ۲٦٨
Scabiosa argentea	Strychnos ignatii \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Scabiosa ucranica	Succisa pratensis ٣٧
Scaphium scaphigerum o A	Taraxacum assemanii Y77
Schœnocaulon officinalis ۱۲۹	Taraxacum bessarabicum Y TV
Scilla maritima L	Teucrium
Scutellaria galericulata Y 7 V	Teucrium aureum\ov.\\
Sedum purpureum A7	Teucrium capitatum ١٥٧
Sedum rhodiola	Teucrium chamæpitys ١٥٨
Sedum roseum	Teucrium creticum \oq.\ov
Sedum telephium A7	Teucrium flavum ١٥٧،٦٧

Teucrium iva	Urginea maritima (L.) Baker \ \
Teucrium marum	Urginea scilla steinh
Teucrium montanum ١٥٨	Urtica caudata
Teucrium polium ۱۵۷٬ ٦٧	Urtica dubia 197
Teucrium rosmarinifolium . 104.10V	Urtica membranacea
Thapsia garganica 9 8	Urtica pilulifera 197
Thuya occidentalis 7.	Usnea plicataVA
Thymbra capitata ۱۱۳	Vaccinium arctostaphylos
Thymelæa mezereum YY9	Vaccinium oxycoccos
Thymelæa præcox YY9	Vaccinium uliginosum
Thymus capitatus١١٣	Verbascum gileadense
Thymus creticus ۱۱۳	Verbascum sinuatum
Tilia europaea var. platyphyllos . 119	Vernonia anthelminthica \ \ .
Tilia grandiflora	Vernonia nigritiana
Tilia pauciflora	Viburnum lantana 1 4
Tilia platyphyllos	Viburnum prunifolium ۱۸
Toxylon pomifera Rafin ۱۹.	Vinca herbacea YV1
Trifolium pratense Y70	Voacanga africana\
Typha angustata	Voacanga thouarsii\
Typha angustifolia	Xanthium spinosum \ \ \ \
Typha australis ٤٧	Zizyphus jujuba \ 0 0
Ulmaria palustris ١٦٣	Zizyphus lotus

مسارد الملاحق

٣٨	ىرىيّ٧٧	مسرد ء	-1
49	رنسيّ	مسرد ف	-4
٤٠	نجليزيّ	مسرد إ	-4
٤٠	اتيني	مسرد لا	- {

۱ - مسرد عربي

أشر	آجِيسارِيْن
أشق (دُهن)	آس (دُهن)
أغُونِيادِيْن	آس (زیت)
أَقْصُورِيَّة٣١٦	آلام عَصَبِيَّة وأَلَمُ النَّسا٣١٢
أكارُويد	آلام عَصَبيَّة وَجْهِيَّة
أُكال	أَبُو صَفَيْر (دهن)
أَكْرُوْيِد	أبِيسَة بَيْضاء (دُهن أكراز)٣٠٣
أَكْرِيفُولِين	أَبِيْسَة حَمراء (دُهن إبر ال) ٣٠٣
أَكُوشي ٢٨٠	أَجَاسِين
التهاب الأُذُن	أَجَاكُونين
الْتِهاب البُلْعُوم٣٢٠	أخِيتامِيديْن
الْتِهَابُ التَّأْمُور٣١٩	أخِيتامِين
الْتِهاابُ الجَنبَة	أخِيتَانِيْن
الْتِهَابُ الجَيْبِ	أخِيتايِيْنأخِيتايِيْن
التهاب الحُوَيْضَة والكِلْيَة٣٢٤	أُخْيِيْن
الْتِهابِ الخُصْيَةِ٣١٦	أَذْلُمِيدِيْن٢٨١
الْتِهابُ الرَّحِم٣٠٤	أَذْلُويْن
الْتِهاب الرُّنَّة٣٢٢	أَدْها تُودِيّ
الْتِهابِ الصِّفاقِ٣١٩	أَذُن
الْتِهَابُ الْعَصَبِ٣١٢	أرَالِيًّات
الْتِهابِ العَيْنِ٣١٥	أسارِيْن
الْتِهاب الفّم	أَسَتِيلَ فَانِيلُون٢٨٠

741	www
إيريدين	الْتِهَابُ الفَّم القَرْحِيّ غِشائيّ٣٣١
الحتياس البَوْل	الْتِهاب الوَرِيْد
احْتِقان البَوْل	أَلَم عَصَب السِنّ٣١٢
الحيرار الأنّف	أَلَمُ العَصَبِ الوَركيِّ٣١٢
الحميرار الوجه	أَلَمُ نِصْفِ الرَّأْسِ٣٠٤
الختِلاج٣١٧	أَلْيُوكوكًا (زيت)
پاتُرنُوسيد۲۹۹	أَمْرَاض عَصَبِيَّة
باذِنْجانِيَّات	أَنْجُرِيَّات٢٧٧.
بارابُقْسِیْن۲۹۸	أنْداكُونِين۲۹۱
باركِنْسُون	أنْسُولِيْن
بَارُوسْمَة أَنيقة٢٨٢	أَنْكَرْناتِين
بارُوسْمَة جَميلة	أَهُوكَاتِيَّة أَمْرِيكَيَّة (دهن)٢٩٨
باسِيَّة (زُبْدَة ال)	أَهُوكَاتَيَّةَ زُغَبيَّةَ (دهن)
باننان	أُوْدِيْما
پائِتِیْن	أُوْذِيْما ٣١٤
يَسِين	أولايُورَازِين٢٩٧
بَتُولا٣٨٣	أولاييك ً ٢٩٧
بَتُولَة	أوليفيل
	A
بِرازِيًّات۲۷۷	
بَرْبَرِيسِيًّات٢٧٧	
بُرْتُقَال٢٩٩	
.ر بَرُدب٣٢٧	
بُرَداء	
.ر بُرُدُقان (دُهن)۲۹۹	- /
پڑسام	
برُسام ناشِف٣٢٢	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
بِرْسِيم (صابُونين ال)۲۸۲	
بِرْغِيم رَعْد بُولِينَ أَنَّ الْمُحْدِينَ مِنْ عَلَى الْمُحْدِينَ مِنْ الْمُحْدِينَ مِنْ الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُحْدِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِينِ الْمُعِينِي الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُ	_
برعس	إهبياجيات

تَقَلُّصقُلُص	بُرْغُوثبرغُوث
تَقَمُّل ٣٢٠	
تَكُظُّتُكُطُّ	
تَنْبُل (دُهن)	بَطْباطِيًّات
	بُطْمِيًّات
تَهَرُّشت٢٣٠	بَعُوضبنائر
تَهَوَّعت٠٦٠	بَقّ
تَوَتُّرُ الأغصاب٣٠٩	بَقْدُونسب٩٩٠
تُوْتِيًّات٢٧٧	بَلْسَمِيْنِيًّات
ئَدَنئَدُن	بَلْقاء (دُهْن) ٢٩٤
ئَرُّ أَبِيَضَ	پَلُّوتِيْن۲۹۸
ثَرُّ اللَّعابِ٣٣٠	البَلُّوْطِيَّات٢٧٨
ثُرٌّ مَنَوِيِّ٣٣١	بُنْدُق (دُهن ورق شجرة الـ)٢٩٧
تُعْبان	پُوسيدانِين
ثُوْم (دُهن)	بُوْطِيًّات٢٧٧
ثُوم (صبغة)	بَوْل دَمَوِيّ
جاباكُونِيتِين	بِيقُوسِيْن٢٨٣
جانيين العَشْقَة	بِيكُوكُولِّين٢٨٣
جَثْرُوفِين۲۹۱	پيلَرْغُونيدُول٢٩٨
جُزْح	تامُول٢٨٣
جُروح واهِنَة	تَجاعِيد ٢٢٧
جَفْن	تَرَنْجَبِيْن ٢٩٤
جُفُون	تَرْوِيْث٢٨٣
جُلْبانِين ج٩٣	تَرِيَّةت
جِلْد	تَوْبِيْل
جَلْهَم (غلوكوسيد)	تَشَنُّج
جُناب ۴۲۲	تَصْفِيق ٢٨٧.
جَنْبُوزِين	•
جَوْزَة العَفْص٢٨٩	تَعَرُّقتَعَرُّق

خُرَّم (دُهن ال)۲۹٦	مجُوليانا (زيت)
خُزام (دُهن)	حِرَّة
خَشْخاشِيًّات٢٧٧	حَرَض
خَفْقان	خُرْقة الْمَعِدة٣٢٤
خَلَنْجِيًّات ٢٧٧	حَشْيشةُ القُرْعان (دهن) ٢٩٩
خَليطات	خَصْبَة
خَمانِيًّات	حَفَر
خَنازيْريَّات٢٧٧	حُکاك ځ
خَنازِيرِيَّة٣٢٩	حِكَّة
خِنَّوْصِيَّة٣٢٩	حكَّة شَديدة
خَيْمِيَّات	حُلَيّاء (زيت الـ)
داء حادّات الذَّيْل	حُلَيْمُوم
داءُ الحَفَر	حِمْحِمِيًّات ٢٧٧
داءُ الصَّدَف ٢٢٣	حُمْرَةُ الوَجْه
داءُ القَمْل	حَمَلِيًّات
داءُ المَفاصِل	حُمَّى قِرْمِزيَّة٣٢٩
داتِسينُوسيد	حُمَيْراء
داحِسداحِس	خُناك
داخُوْسداخُوْس	خُناك قَرْحِيّ غِشائيّ
دِبْساسِيًّات	
	حَوْذَانِيًّات
دَرْوِيْنِيَةَ حُزمِيَّة (دهن) ٢٨٦	
دَرُوَينِيَّة طُقْسُوسِيَّة الْوَرَق (دهن) ٢٨٦	,
دُغاًم	حَيْض غير كافٍ
دِفْلِيًّات٢٧٨	
دَفْنُوسيد	<u>, </u>
دَفْنِين	· ·
دَقِيْق	,
دَلْتالِيْن	_

زَنْبَقِيًّات	دَلْفِينُويدِيْن٢٨٧
زَنْجَبِيْلِيًّات٢٧٨	دَم
زُهامَنُهامَ	
· _	دَوْرَم ٢٨٧
	ذَاتُ الجَنْبِ
	ذَات الخُصْيَة
	ذاتُ الرِّئة
	ذَنَن الرَّحِمذَنَن الرَّحِم
	رازِيانَة (دُهن)
	رَبُو ً
	رَثْيَةرَثْيَة
	رُحام
سَرْوِيَّات: سبط صَنَوْبَرِيَّات٢٧٨	
سُعْدِيًّات	
سَمْبُوكُوسيد	_
سِمْنَة ٣١٢	_
سَنتُونِين	
سَنْدُر۲۸۳	رَمَد٥١٠
سَنْدَرَك كَنْدُرَك اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى	رَمْنُوكَتَرْتِيْن
سِنْدِيانِيًّات	
سُوْرَنْجانِيَّات٢٧٨	
سِيْزالْبِيْنِيَّات	
سَيَلانَ أَخْمَر	روماتيزم
سَيَلان دُهنيّ تَقَشُّريّ	رُوْوُلْسِيْن
سَيَلان مَنُوتِي٣٢٠ ٣٣١، ٣٣١	زِبْلزِبْل
سَيَلان مَهْبِليّ أَبْيَض ٢٢٠	زَراوَنْدِيًّات٢٧٨
شاهَتْرَجِيًّاتَ٢٧٨	_
شُحُّ البَوْل	زُكام الجَفِيف
الشِّغاف ٣١٩	زَناخَة

عَفْصُ الحَيَّة	شَفَوِيَّات٢٧٨
غارْغاجِيَّات: هي الأَنْجُرِيَّات ٢٧٨	شُقَّارِيَّات: سبط شَقِيْقِيَّات٢٧٨
	شَقِيْقَةشَقِيْقَة
	شَلَلشَلَل شَكْل
	شَنَجشَنَج
	شُوْنِيز دِمشقيّ (دهن)۲۹٦
غَشَيانغَشَيان	_
	صَبّارِيَّات٢٧٨
	صُداف
غَضْنغُضْن	
_	صُفْلابِيًّات
	صَلِيْبِيَّات٢٧٨
	صَمَمُ وضعف السَّمَع٣٣١
قازیِسیْن۲۹۸	_
فَازِیْن	طَرَشطَرَش
	طَمْث غَير كاف
فالِجفالِج	طَمْت غير مُنتَظَمظمُت غير مُنتَظَم
	طَنْتُ مُؤْلِم
	ظَمَأُ المَرْضَٰيظَمَأُ المَرْضَٰي
	عِجْل البَحْر (زيت)
فَرْمَاكُوبِيا	
نِصَّة	
نُقْمَة	
فِلِّيرُوسيد	عُصابات وَجُهِيَّة
فَوْقَسِیْن	
فيزالين	-
فِيكاريا (دُهن)	
قابُوق	
قابُوق (زیت) ۲۹۲	عَفْصَة ٢٨٩
•	

كَرْدُول٥٨٦	قُتَامِين۲۹٤
كَرْلِيْن نَجْميّ٢٨٥	قَدَم حَسّاس٣٢٠
كَرْمَدِيسِيْن ٢٨٥	قُرًّا صِيًّات٢٧٨
كَرَميلَّة	قَرْطَم (زَيْت ال)
كروتُن عَنْبَريّ (دُهن)٢٨٦	قَرْعِيَّات٢٧٨
كَرِيْتُه (زُبدة)	قِرْمِزِيَّة٣٢٩، ٣٢٩
كَرِيُوفِيلِين	قُرْنُوْسِيَّات٢٧٨
کُساح	قَرْنِيًّات
كَظَاظُ الدَّم	قِشْطِيًّات
كَظَّة الدَّم	قَطانِيًّات
كُلاءٌ شُحامي	قُلابقُلاب
كُلاءٌ شَحْماني	قُلاعت٠٦
كِلَّاجة (صابُونين-السَّامّ) ٣٠١	قِلْفِلِيًّات ٢٧٨
كِلَّاجِي	قُلْقاسِيَّات
كَلْم َ عَلْم َ عَل	قِلَوِيْد
كُلْوَة	قُمال ت
کِلَی ۔۔۔۔۔۔۔۔	قَمَريًّات
كُلْيَة كُلْيَة	قَمَلُّت٢١٩. ٣٢٠، ٣٢٠
كَناريُوم (دُهن)	قَمْلَقُمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْ
كَنالِين ُ ٢٨٤	
كَنَدِيْن	كابُوك ٢٩٢
كُوْكِيًّات	كاوالا (زيت الـ)
ل-بيغانين	كايا (زيت الـ)
لاثيرين٧	كَتْش
لادَنيُول٢٩٣	كُرّاتُ الدُّبِ (دُهْن) ٢٨٢
لاذَنِيًّات	
لامِیْن ۲۹۳	كَرْباً بِيْن
لُبّ	
	كَرَيُّيْن ٢٨٥

	40 "
نَبْق (مُسْهِل ال)	لَكْتُوسِيْنلَكْتُوسِيْنلَكُتُوسِيْن
نَبْقِيًّات	لُورُولاييك٢٩٣
نبیذ تروشُو۳۱۰	لُوْغانِيًّاتلا۲۷۸، ۲۷۹
نَتَانَةُ الأنْف٣١٧	ليمون حامِض (دُهن)۲۹۹
نَجِيْلِيًّات٢٧٩	
نَخْلِيًّات	مازَرْيُونِيَّات٢٧٩
نَدْغ بُستاني (دُهن)٣٠٣	مانیسُوبا
نَرْقَال (بَلْسَم) ٢٩٥٠	مَتْمَتْ
نزَارَةُ البَوْل أ٣١٤	مُخَلَّدات
	مَرَض بْرايْت٣٠٧
نَزْفٌ رَحِمِيّ	
نَزْلةنَّالة	مَرُوبِين٢٩٤
النَّسا	مُسْتَقِيْماتُ الأَجْنِحَة
نُعاس	
نُعْضِيَّات	
نَعْنَع (دُهن)	
نَفُه	مَلارِيا
نَقُوس (شَمْع الـ)	•
نَكُزُ الحَيَّة	
نَلْهَة	-
نَهَك نَفْساني	
نُواط	مَنِّ
نَوْبات عَصَبيَّة	مَنْديُوسِين٢٩٣
نُوراستِنيا	
نُولِي (صمغ)	مَنْيُوك
نِياؤُلِي (دُهن)	
نيكُوتَلِّين	
نیکُوتیامِین۲۹٦	
نيكُوتيمين	
	<u> </u>

وَخْزِ الحَشَراتِ٣٢١	نيكُوتين۲۹٦
وَخْزُ الذُّبابِ٣٠٦	نِيكُولِينَ
	هال صَغير (دُهن)
	هَدْيُوتِيْن٩٩
	هُراشهُراش
	هَلْيانْتِيّ
	هَنْدايّ (ليكور)
	هِيدْرَانْجِين٢٩٠
ياسمينين ً۲۹۱	وَجَع الأُذُن ٣١٦
يُسْر (زيت)	وَجَع عَضَليّ
	وَخْزِ «الذُّبابِ» ٣٠٦

۲- مسرد فرنسي

Acaroïde YA•	Anonacées	449
Acérine YA•	Apocynacées	277
Acer saccharinum (Sirop) YA.	Aracées	779
Acétylvanillone YA•	Araliacées	T V V
Acouchi YA•	Aristolochiacées	TV A
Acrifoline YA.	Artocarpées	TVV
Acroïde YA•	Asclépiadacées	7 V A
Adhatodique YA1	Atriplicées	7 V A
Adlumidine YAN	Balsaminacées	T V V
Adlumine YA1	Barosma pulchella (ess.)	777
Aegicérine	Barosma venusta (ess.)	۲۸۳
Ageratum (ess.) TAN	Béhen (huile)	۲۸۳
Agoniadine	Ben	۲۸۳
Ail (ess.) YAN	Bérbéridacées	7 V V
Ail (teinture) YAN	Bétel (ess.)	۲۸۳
Ail des ours (ess.)	Bicucine	۲۸۳
Ajacine	Bicuculline	۲۸۳
Ajaconine YAY	Borraginacées	Y Y Y
Alcaloïde	Bouleau	۲۸۳
Alfalfa (saponine) YAY	Bousage	۲۸۳
Alkermès	Bouse	3 1 7
Anacardiacées YVV	Cactacées	Y Y A
Anemonées. YVA	Camphré	3 1.7

	Canadine	3 8 7	Darmous	777
	Canaline	347	Darwinia fascicularis (ess.)	7.4.7
	Capock (huile)	797	Darwinia taxifolia (ess.)	7.4.7
	Caprifoliacées	YVV	Datiscinoside	YAY
	Caramel	3.47	Décantation	YAY
	Carapa (huile)	3.47	Delphinoïdine	YAY
	Carapine	710	Deltaline	YAY
	Cardamome (ess.)	440	Dipsacées	***
	Cardol	440	Dormea (ess.)	YAY
	Carline (ess.)	440	Echiine	YAY
	Carmédicine	440	Echitamidine	Y A Y
	Carnauba (cire de)	440	Echitamine	YAY
	Carpaine	440	Echitéine	***
	Carthame (huile de)	7.47	Echiténine	***
	Carvi (ess.)	7.47	Éléococca (huile d')	***
	Caryophylline	7.4.7	Ericacées	***
	Cascarille (ess.)	7.4.7	Erythroxylacées	444
	Césalpinacées	***	Euphorbiacées	YY A
	Cistacées	779	Fécule	***
	Colchicacées	YV A	Ficaria (ess.)	***
	Combrétacées	***	Flacourtiacées	444
	Composées	444	Franguloside	Y A A
	Cornacées	YVA	Fucusine	***
	Crassulacées	444	Fumariacées	TV A
	Crucifères	YV A	Galénique	7
	Cucurbitacées	YVA	Galipidine	PAY
	Cupressinées	YV A	Galipine	PAY
	Cupulifères	***	Galipol	PAY
	Cypéracées	***	Galle	PAY
۳۹۷	Daphnoside	7.7.7	Gardenia	PAY

Glaucine YA9	Ladaniol Y 9Y
Graminées YV9	Lallemantia (huile de) Y 97
Hédéragénine YA9	Lamine Y 97
Hédéraglucoside Y9.	Lathyrine Y 97
Hedyotine ۲۹۰	Lauroléique Y 97
Hélianthique ۲۹.	Légumineuses YV
Hendaye (Liqueur) ۲۹.	Liliacées YV/
Henné ۲۹.	Loganiacées YVA (YV
Hydrangine Y4.	Magnoliacées YV
Hyménoptéroïdes YVA	Malpighiacées YV
Illipé (beurre d') Y 9 •	Malvacées YVV
Imagostérol Y9.	Mandiocine Y97
Impastation Y9.	Mangostine Y97
Incarnatine Y91	Maniçoba Y 97
indaconine Y¶1	Manioc Y48
Insuline Y 9 \	Manne Y 4 8
Iridine Y 4 1	Marotty (huile de) ٢٩٤
Jambosine ۲۹۱	Marrubine Y48
Japaconitine Y 4 \	Melaleuca (ess.de) Y 4 8
Jasminine Y91	Mélanine Y 9 8
Jatrophine YAN	Mélisse (ess.)
Julienne (huile de) Y 9 Y	Ménispermacées YV
Kapok Y9Y	Menthe (ess.)
Karité (beurre) Y۹۲	Métrites ٣٠٤
Kawala (huile de) Y۹Y	Métrorragies ٣٠٤
Kaya (huile de) Y۹۲	Migraines ٣٠٤
L-péganine ۲۹۸	Moracées YVV
Labiées YVA	Morsures d'animaux ٢٠٦
Lactosinose Y97	Morsures de serpent ٣٠٦
Lactucine	Morue (huile de foie de) Y 9 0

Mouches ٢٠٦	Noisetier (ess. de feuilles)	447
Moustiques $r \cdot 7$	Obésité	717
Muguet ٣٠٦	Œdèmes	317
Musacées YV9	Oléacées	Y Y A
Myalgies ٣٠٦	Oléique	Y 9 V
Myocardites ٣٠٦	Oléorésine	444
Myrte (ess.)	Oligurie	418
Myrte (huile) Y90	Olive (huile d')	797
Nauli (gomme) Y90	Olive (huile de moyau 'd)	444
Nausées ٣٠٦	Olivile	T 9 V
Néphrites chroniques $\Upsilon \cdot V$	Ombellifères	Y V V
Néphrose lipoïdique ٣٠٩	Onocérine	79
Nerfs (crises de) ٣•٩	Onocérol	444
Nerval (baume) Y90	Onocol	790
Nerveuses (maladies) ٣•٩	Ononine	791
Nervosisme $\Upsilon \cdot 9$	Ophtalmie	٣١٥
Neurasthénie	Orchidacées	***
Névralgies et sciatique ٣١٢	Orchite	۲۱٦
Névralgies dentaires ٣١٢	Oreilles	۲۱٦
Névalgies faciales	Orthoptères	779
Névrites T1Y	Otites	۲۱٦
Niaouli (ess.) Y97	Oxyures	۲۱۶
Nicoline	Ozène	414
Nicotelline Y97	Palmacées	779
Nicotiamine Y97	Palpitation	۲۱۷
Nicotimine ۲۹٦	Paludisme	۲۱۷
Nicotine Y97	Panaris	۲۱۸
Nielle (Ess.) Y97	Papavéracées	**
Nigelle cultivée (huile) Y97	Papillomes	۳۱۸
Nigelle de Damas (Ess.) Y97	Parabuxine	494

Paralysies ٣١/	Phéorétine ٣••
Parkinson ٣١/	Phillyroside ٣٠٠
Paupières ٣١/	Phlébites ٣٢.
Paytine Y 4/	Phoque (huile) " "
Peau	Phtyriase ٣٢•
Pédiculose ٣١٥	Physaline
Pélargonidol Y 4/	Pieds sensibles ٣٢•
Pellotine Y 4/	Pipéracées YVA
Pepsine Y 4/	Piqûre d'orties ٣٢١
Péricardites ٣١٩	Piqûres d'insectes ٣٢١
Péritonite ٣١٩	Pissement de sang ٣٢١
Persea gratissima (ess.) Y 4	Plaies ٣٢١
Persea pubescens (ess.) YAA	Plaies atones TYY
Persil Y44	Plantaginacées YVV
Pertes blanches ٣٢٠	Pléthore ٣٢٢
Pertes rouges ٣٢٠	Pleurésies ٣٢٢
Pertes séminales ٣٢	Pleurite ٣٢٢
Pétasites (ess.)	Plombaginacées YVA
Petit-grain (ess.)	Pneumonie ٣٣٢
Petit grain citronnier Y 9	Polygonacées YVV
Petit grain Portugal (ess.) Y 9	Prostate YYY
Pétunoside Y 9 9	Prurigo ٣٢٣
Peucédanine Y 9 9	Prurits ٣٢٣
Peuplier (ess. des bourgeons) Y99	Psoriasis ٣٢٣
Pharbitine ٣••	Psychasthénie ٣٢٤
Pharmacopée Y.	Puces ٣٢٤
Pharyngite ٣٢•	Punaises ٣٢٤
Phasine T.	Pyélonéphrites ٣٢٤
Phasol T.	Pyrosis YY &
Phellandre (ess.) Y.	Quetsh ٣٠١

Quillaīque ٣•١	Sandaraque Y	۲۰۲
Quillajique ٣٠١	Sang Y	۲۲۸
Quillayasapotoxine ٣٠١	Sang-dragon Y	۲۰٦
Rachitisme TY &	Santal Y	۳۰۳
Rancidité ٣٠١	Santonine	۲۰۳
Rasamala (ess.)	Sapin (écorce)	۲۰۳
Raubaside ٣٠١	Sapin blanc (ess. de cônes) Y	۲۰۳
Rauwolsine ٣٠١	Sapindacées	7 V A
Règles douloureuses ٣٢٥	Sapin rouge (ess. d'aiguilles) Y	۲۰۳
Régles insuffisantes ٣٢٥	Sariette des jardins (ess.)	۲۰۳
Règles irrégulières ٣٢٥	Scarlatine Y	779
Reine-des-prés (ess.) T.Y	Sciatique Y	24
Reins	Scorbut Y	۴۲۹
Renonculacées YVV-YVA	Scrofulariacées	1 V V
Réséda (ess.) T.Y	Scrofule	7.79
Résérpine Y•Y	Séborrhée Y	۲۳.
Rétentions d'urines ٣٢٦	Serpent (morsure) Y	۲۳.
Rhamnacées YV9	Sialorrhée Y	۳.
Rhamnocathartine ٣٠٢	Sinusite Y	۳.
Rhumatismes ٣٢٦	Soif (des malades)	٠٣٠
Rhume (toux) TYV	Solanacées Y	144
Rhume de cerveau ٣٢٧	Somnolence Y	٠٣٠
Rhume des foins TYV	Spasmes Y	٠٣٠
Rides TTV	Spermatorrhée Y	۳۱
Rosacées YV9	Sterculiacées	144
Rougeole ٣٢٨	Stomatites Y	۲۲۱
Rougeur du nez ٣٢٨	Stomatites ulcéro-membraneuses. Y	۲۳۱
Rougeur du visage TYA	Sueurs profuses Y	۱ ۳۲
Saignement de nez ٣٢٨	Surdité et Hypoacousie Y	۲۳۱
Sambucoside ٣٠٢	Surmenage	۲۳

Thyméléacées YV9	Ulmacées YVV-YVA
Tiliacées YVA	Urticacées YVA
Typhacées	Zingibéracées

٣- مسرد إنجليزي

Anacardiaceæ	Cold ٣٢٧
Animal bites ٣٠٦	Combretaceæ YVV
Anonaceæ YV9	Compositæ YV9
Apocynaceæ YVA	Cornaceæ YVA
Araceæ YV9	Crassulaceæ
Araliaceæ YVV	Cruciferæ YVA
Aristolochiaceæ	Cucurbitaceæ YVA
Artocarpæ YVV	Cyperaceæ YVA
Asclepiadaceæ YVA	Dentalgia T17
Atripliceæ	Dental neuralgia ٣١٢
Attack of nerves ٣•٩	Dipsaceæ YVV
Balsaminaceæ YVV	Ear ٣١٦
Berberidaceæ YVV	Edema ٣١٤
Blepharon. TIA	Ericacæ YVV
Blood	Erythroxylaceæ YV9
Borraginaceæ YVV	Euphorbiaceæ ۲۷۸
Bright's disease \mathcal{r.V}	Eyelid ٣١٨
Bug ٣Υ ξ	Facial neuralgia ٣١٢
Cactaceæ	Fit of hysterics ٣•٩
Caprifoliaceæ YVV	Flacourtiaceæ YV9
Cesalpineæ YVA	Flea ٣٢٤
Cistaceæ YV٩	Flush
Colchicaceæ	Fly ٣•٦

Fumariaceæ YVA	Myalgia	4.7
Graminaceæ	Myocarditis	۳.٦
Hay fever ٣٢٧	Nausea	۳.٦
Head cold	Nervosism	4.9
Hearthurn ٣٢ ξ	Nervosity	۳ • 9
Hematuria ٣٢١	Nettle's bites	441
Hemicrania ٣٠٤	Neuralgia and sciatica	۲۱۳
Hypoacousia ٣٣١	Neurasthenia	۲۱.
Hypoacusia TT1	Neuritis	٣١٢
Insect's bites ٣٢١	Nosebleed	417
Insufficient periods ٣٢٥	Nose flush	۲۲۸
Kidney TYo	Obesity	۲۱۳
Labiatæ YVA	Œdema	418
Leguminosæ YV¶	Oleaceæ	YY A
Leucorrhea ٣٢٠	Oliguria	۲۱٤
Leukorrh(o)ea ٣٢.	Ophthalmia	٣١٥
Liliaceæ YVA	Orchidaceæ	**
Lipoidnephrosis ٣٠٩	Orchitis	۲۱٦
Loganiaceæ YVA . YV9	Orthoptera	444
MagnoliaceæYV9	Otitis	۲۱۳
Malaria TIV	Oxyuria	۲۱٦
Malpighiaceæ YV9	Oxyuriasis	417
Malvaceæ YVV	Ozaena	414
Menispermaceæ YV9	Ozena	۳۱۷
Metritis ٣٠٤	Painful menses	440
Metrorrhagia ٣٠٤	Palmaceæ	449
Migraine ٣٠٤	Palpitation	۳۱۷
Moraceæ YVV	Paludism	٣١٧
Mosquito ٣٠٦	Panaris	۲۱۸
Musaceæ YV9	Papaveraceæ	**


Papilloma ٣١٨	Rhamnaceæ YV
Paralysis TIA	Rheumatism ٣٢
Parkinsonism ٣١٨	Rickets ٣٢
Pediculosis ٣١٩	Rosaceæ
Pericarditis ٣١٩	Rubella ٣٢٨
Peritonitis	Rubeola
Pharyngitis ٣٢.	Salivation TT
Phlebitis ٣٢.	Sapindaceæ YV
Phtyriasis ٣٢•	Scanty menses ٣٢
Piperacæ YVA	Scarlatina ٣٢٠
Plantaginaceæ YVV	Scarlet fever ٣٢
Plethora TYY	Sciatica ٣٢٠
Pleurisy TYY	Scorbutus ٣٢٠
Plombaginaceæ YVA	Scrofula
Pneumonia ٣٢٢	Scrofulariaceæ YVV
Pleuritis TYY	Scurvy ٣٢٠
Polygonaceæ YVV	Seborrhea ٣٣
Profuse sweating ٣٣١	Sialorrhea٣٣
Prostateria ٣٢٣	Sinusitis
Prurigo ٣٢٣	Skin ٣١/
Pruritus 474	Snake (bite) ٣٠٦ ، ٣٣٠
Psoriasis ٣٢٣	SolanaceæYVV
Psychasthenia ٣٢٤	Somnolentia TT
Ptyalism TT.	Spasm TT
Pyelonephritis ٣٢ ٤	Spermatorrhea TT
Pyrosis ٣٢٤	SterculiaceæYVV
Rachitis ٣٢٤	Stomatitis TT
Ranunculaceæ YVV	Stomatitis ulceromembraous ****
Ren ٣٢٥	Surditas TT
Petention of urine WY7	Sundity


Surmenage TTT	Ulmaceæ YVV-YVA
Thirst ٣٣•	Umbelliferæ ۲۷۷
Thrush ٣.٦	Urticaceæ YVA
Thymeleaceæ YV9	Wound TY
Tiliaceæ YVA	Wrinkles ٣٢٧
Typhaceæ YVV	Zingiberaceæ YVA

٤- مسرد لاتيني

Anacardiaceæ	VV	Cyperaceæ	244
Anonaceæ	٧٩	Dipsaceæ	200
Apocynaceæ Y	٧٨	Ericacæ	***
Araceæ	٧٩	Erythroxylaceæ	444
Araliaceæ	VV .	Euphorbiaceæ	277
Aristolochiaceæ	٧٨	Flacourtiaceæ	444
Artocarpæ Y	VV	Fumariaceæ	277
Asclepiadaceæ ٢١	٧٨	Graminaceæ	779
Atripliceæ	۷۸	Labiatæ	277
Balsaminaceæ Y	VV :	Leguminosæ	7 V 9
Berberidaceæ Y	VV :	Liliaceæ	277
Borraginaceæ Y	VV :	Loganiaceæ YVA-	779
Cactaceæ Yv	٧٨]	Magnoliaceæ	449
Caprifoliaceæ ۲۱	VV]	Malpighiaceæ	201
Cesalpineæ ٢٧	٧٨]	Malvaceæ	**
Cistaceæ Y	v 9	Menispermaceæ	444
Colchicaceæ	٧٨]	MoraϾ	***
Combretaceæ ٢١	VV]	Musaceæ	444
Compositæ	V9 (Oleaceæ	244
Cornaceæ ۲۱	٧٨	Orchidaceæ	244
Crassulaceæ	٧٩ (Orthoptera	274
Cruciferæ Y	٧٨]	Palmaceæ	277
Cucurbitaceæ YV	٧٨]	Papaveraceæ	TVV

Piperacæ YVA	Solanaceæ
Plantaginaceæ YVV	Sterculiaceæ YVV
Plombaginaceæ YVA	Thymeleaceæ. YV9
Polygonaceæ YVV	Tiliaceæ YVA
Ranunculaceæ YVV	Typhaceæ YVV
Rhamnaceæ YV9	Ulmaceæ YVV-YVA
RosaceæYV٩	Umbelliferæ YVV
Sapindaceæ YVA	Urticaceæ YVA
Scrofulariaceæ YVV	Zingiberaceæ YVA









أدونيس صيفي





















































































مسرو عربي عام

مسرد عربي عام

ے	<u>ص</u>	مدخل آم	3	<u>ص</u> ۱۳۹	مدخل
Υ .	**	أثؤس	١ ١		اء .
١	13	إِثْرَارَة	•	۲۵۰	ا بَ *
٥	45	إِثْرارَة لُبْنان	۲	1	أَبْجَدِيَّة
7	1	أثل	۲	١	إِبْرَةُ الرَّاهِبْ
7	٤٥	أثمان تُرْبُد	٣	٥٤	إبْرَة العَجوز
٥	۲	أثينة بيضاء	٥	104	إِبْرَة العَجُوز
٧	1.9	أثينة الجيطان	١	4.5	أبرُوْتَانُم
٤	٥	أثينة دُوْدِيَّة	۲	*	أَبْرِيْن أَبْسَنْت
۲	٥	أثينة عِطْرِيَّة	١	1	ابسنت
*	٥	أيْنَة عُنْقُزُدِيَّة	۲	184	أبْسَنْت أرْمَنيّ
1	**	أثينة هنري الطَّيْب	١	7	ابْسَنْت بَحْريّة
0	۲	أثئوريزا دَرَنِيّة	۲	٣	أَبْسَنْت بَخْرِيَّة شَحِيْحَة الزَّهْر
١	٥	إبجاص	٤	1	أبْنُوس كاذِب
١	٥	إجحاص شائع	٤	1	أبهَل
*	7	إنجاصة	٤	1	أبهُل
7	, X	أجِيْرَاتُوم كُوْشَانِيّ	١	717	أبُو خَنْجَر
1	٦	الخدرية	٣	777	أبُو صُفَيْر
٥	٣	أخِلَّى	٤	777	أبُو صُفَيْر
٥	٣	اَخْدَرِيَّة اَخِلِّي اَخِلِيَّة اَخِيْضَر اَخْيْضَر	١	٣	أبُو غُلام الرَّمال
٣	41	أخيضر	١	٥	أبُو فَايِسَ
٥	٣	أخِيْلِيا	1	7.47	أبُو فَرْوَة الحِصَان
٧	٤	أخيليا أجِيراتُم	٦	١٥	أبُو قابس
١	٧	اخِيْلِيا أُمَّ أَلْفُ وَرَقَة	1	٤٠	أبُوْكَاتِيَّة
٦	٣	أخِيليا أَيْقَة	١	٤٠	أبُوْكادُو
٧	٣	أخيليا بَقْلَةُ العُطَاس	١	٤٠	أبُوْكَة
٥	*	أخيليا بِيْبَرشْتَايْن	٣	40	أَبْوْ.
٧	٥	أخِيليا دِمَشْق	۲	٤	أبيننة سامِيّة
٧	٤	اَخِيْلِيا دُوْلابِيَّة	۲	٤	أَبِيْسَة شامِّخَة
٦	٣	اخِيليا سَوْداء	٤	٤	أُبْيُض البال
a	٤	أخبليا صغيرة الزّهر	٧	779	أثم

			Ī			HILLINGIA
<u>c</u>	<u>ص</u> ۲	مدخل ئنسم	ح	<u>من</u>	مدخل	
٣		أَذُن يَهُوَذَا	٦	٤	أخِيلياً صُوفِيَة	
٤	٥	أرارُوْيا	٧	٤	أخيليا صُوفِيَّة	
۲	7.	أراليا خُماسيَّة الوَرَق		0	أخِيليا ظَرِيْفَة	
0	17	ا اُرْبِيَان		*	أخِيلِيا ظَرَيْفَة	
۲	114	֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	٦	۳	أخِيليا عَذْبَة	
1	140	أرْدَسِيمُن	۲	V	أخِيْلِيا عَطِرَة أَنْ نَا الْمُ	
۲	*	ا اُرْزَ اعْدَامُ الْمُعَامِّدِ مِنْ مِنْ الْمِنْ	0	•	أخِيليا عِطْرِيَة	
٧	117	اَرِسْتُولُوخِيَة ثُعْبانِيَّة دُورُ أُرْدِية تُعْبانِيَّة	٧	£	ا أُخِيْلِيا فَيَّةً أمار الشائد	
V	117	أرِسْتُولُوخِيّة ثُلاثيّة الفُصوص	•		أخِيليا كُوتْشِي	
v	117	أَرْسُتُولُوخِيَة جَبَّارَة	٦	ξ	أخِيليا مُلَوَّرَة	THAMANAMA
7	41	أَرِسْتُولُوخِيّة زَوْرَقِيّة		•	أخِبليا مِنْجَلِيَّة	
•	44	أرِسْتُولُوخِيَة طَوِيْلَة	7	۴	أخِليا مُنْعِشَة	
1	17.	ارشتُولُوخِيَة الكُرُوم	Y	£	أخيليا نانا	
4	4	أرشتُولُوخِيَة مُشتَدِيْرَة		٣	أخِيلِيا نَيِئلَة المرادات أوا	
٥	44	ا أرِسْتُولُوخِيَة مُفَرَّخَة	7	ŧ	أخِبليا وِيلْهَلْم أَدْمِونَ مَوْمِنَ	
7	47	ارِسْتُولُوخِيَة نَتِنَة أَنْ ذَهِ مِ	7	£	أُخْيُوْن مَعْرُوف أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ا	
Υ	١٠	أَرْضِي شَوْكِي	£	48	أدامِيا مِلْوانَة . •	
٣	۴	اًرْضِي شَوْكِي آورو		48	اِدْرِياس گَـُنْهِ .	
۳	£	أَرْطَاة كوري كيت	۲	۳۱	اُحَنَّسُوني ۶۰ مص	
٤	7	أرْطاة أَيْثِقَة	۴	Υ	اً دُها تُوْدا ا	
ŧ	٦	أرطاة الصِيْن	£	771	أدوكُسا كام ، ،،	
*	17	اُرْطَس اِن اِن اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِ	٧	7	أَدُونِيس البيرينيه أمره مراه	
٤	٧	ازطَماسِيا الْبِيَّةِ ادْمَام مِنْهُ	۲ .	٧	أَدُوْنِيْس حَوْلِيّ أَمُ	
٧	v	ازطماسيا أتثى	1	4	أُدُونِيْس رَبِيعيّ أَدُّ بِي رَبِيعيّ	
٤	٧	أرْطَماسِيا بَيْضاء	٧	7	أُدُونِيس صَيْفِيّ آذان الدُّبّ	
•	•	أَرْطَمَاسِيَا بَيْضاء	١	75	ادان الدب آذان الدُّب	
۳	1	أَرْطُماسِيا ثَلْجِيَّةً	٧	£ £		
1	101	أرْطَماسِيا جَبَلِيَّة أرْطَماسِيا الحُقُول	•	777	آذان المَنْز آذَان الفَأْر المَنْقِعِيّ	
٧	101	ارطماسِیا الحفول أَرْطَماسِیا سَوْداء	1	1. 484	ادان الفار المنفِعِيِّ آذان الفَّار النَّعِلِيَّ	
٧	•			181	ادان الفار النبطييّ آذان القِسّيس	
٤	109	ا أَرْطُمَامِيا مِينِيَّةً أَرِمَا إِنْ مِنْ يَتَ	7	147	ادان المِسْيس آذان الكَبْش	
¥	101	ارطماسيا عِطريَّة ارْطَمَاسِيا مَغْرِبيَّة	٠ ٧	14V V	•	
			١	11	إِذْخِر آذَرْيُون الحَداثق	
٥	•	أرْخَمُون المَكْسِيك أَرْخُوت		۸		
	7	ارغوت اُرْغُوت		11	آفَرْيُوْن الماء آفَرُهُ وَ يَــُوْنِهِ	
٦,		ارغوت ِ أَرْغُوْت أَرْجُوانِيّ	٥		آذَرْيُون مَخْزَنِيٌ أُذُن الأَرْنَب	
``	18			14	• -	
``	\r **	ً أَرْغُوت الدَّيْس أَرْغُوت الشُّوْفَان		٧	أَذْن الراهِب أَذْنُ الفَار	
١	۱۳	ا ارغوت الشوفان	1	797	ادل العار	

	~	. •	مدخل	-	<u>م</u>	مدخار
أص ط	<u>ح</u> ۳	<u>مس</u> ۱۵۹	<u>ازولة</u> المَناقِع	<u>ح</u> ۱	<u>صن</u> ۱٤	مدخل أَرْغُوْت الشَّيْلَم
	٥	١٣	ازُولَة مَنْقِعيّة	١	١٥	أَرْغُوت القَمْح
	٧	١٣	أزيمينة مُفَطَّعة		17	اًر ْ قِطْ یُون اَرْ قِطْیُو ن
	١	٧.	آسٌ أَبْيَض		11	اً أَرْقِطُيُون رَأْسُ الحَمامَة
	١	*1	أسارُوْن		4	أرْقِطْيُون صَغِير
	٧	774	أشَّاكُو	٧	٨	أرْقِطْيُون صَغِيْر مُزَغْبَر
	٣	١.	إشبانَخ	٤	٧	أرْقِطْيُون لِبْدِيّ
	١	**	اِسبَانَخ بَرِّي	٧	A	أرْقِطْيُون مُزَغْبَر
	۲	٥١	إشبائخ زِيْلَنْدَة	٥	4	أزقِطْيُون مُنَمْنَم
	٤	11	الشبرُوْلَة خانِقَةُ الكَلْب	٤	٨	أرْمادِيلًا
	٤	11	اَسْبِرُوْلَة ساجُورِيَّة	١	700	أرْمَن
	١	**	أَشْبَرُوْلَة عِطْرِيَّة	١	١٦	ٲڒؙؽێؙػٵ
	٣	١٢	إِلْسَبَغُولَة	١	17	أرنيكا الجِبَال
	١	***	إُسْبِيْدار	٣	٦	اًرُورُوت ۘ
	٤	777	أَشْطَر أَرْغُوفِيلُوس	٤	9	أرُورُوت الأُنْتِيْل
	٧	1 £	أشطراغالس العَقْرَب	£	9	أرُورُوت الجَماييك
	٧	10	أشطراغالس نخيي	٥	11	أزُورُوت الهِند
	٦	11	أشطراغالُوس إكْرِيتي	۲	۸ ،۷	أرُوْم
	۲	١٣	أُسْطُراغالُوس دَبِقَ	٣	٨	أرُومُ الأنْتيل
	٦	17	أشطراغالُوس كُثَيْراء	٤	٩	أرُوم إِيْطالِي
	٥	٧٤	أشطُوخُودُس	٣	Y	الأرُومُ الشَّانعِ أو الرَّسَّة
	۲	V9	أشفئد	٤	١.	أريتْروفْلايُوم
	٣	140	أشفئدان	٤	11	أريثرينا أميركا
	٤	17	أشقُوْرديُوْن مائيّ	٣	4	أريثرينا مرجانية
	٦	124	أشفُوردِيُون مائيّ	1	140	أريسيئموم
	٥	14	أسِيْنُوس مُسْتَدِيْرُ الوَرَق	1	19	أُرِيْغَارُونَ كَنَدا
	7	14	أشرَان	٧	11	أرْيَل أَحْمَر
	٦	14	أشرَان أَصْفَر	٣	1.	أُدْيَل بَوازِيليّ
	۲	10	أشرانُ السَّحَر	1	177	أزَاد
	٦	١٣	أشرَان سُرِّي		1 • ٣	إزْدَرَخْت
	1	۲۳	اشْقِيْل بَحْرِي	٥	14	أزُوْلَة
	٧	71	إشْقِيْل بَحْرِيَّ أَشْنان داوُود أَشْنان داوُود	٣	109	أزُوْلَة صغيرة
	٣	١	أشنان داۇود	٥	14	أزُولَة صغيرة
	ŧ	1.7	أشْنان داوُوْد	٣	109	أزُولة كبيرة
	٦	10	إشنان القلي	٥	17	أزْولَة كبيرة
	٧	٧A	أثنة الجمجمة	٣	109	أزولة الكروم
	٣	144	أضبان	٥	14	أزُولَة الكروم
	1	187	أُشْنَة الجمجمة أَصْبان إِصْبَع العَذْرَاء أَصْطَرَك	٣	104	أزولة مُستَديرة
۲۱3	٣	4.1	ا أضطُرَك	0	١٢	أزُولَة مستديرة

		1			la s.
ے	<u>صن</u> ١٦	مدخل الخران أضفَر	<u> </u>	<u>صن</u> ٤٥	منع <u>ن</u> إضطَفَلِيْن
٨	17	العقوان اصفر أَقْحُوان خَمِين	1	70	المستعملين أُخْوَاس الكَلْب
`	YOA	العقوان حين الفحوان شَرُونِيَ	*	78	اعراض المعلب أطد شائع
,	77	العوان شرويي أَقْحُوان شَريْف	1	41	جب منابع أطَد يَاسَمِيْنق
,	17	العوان مريف أَقْحُوان الصِّبَاغِيْن	٥	47	٠ صـ ياسييي أطراونيي
٦	ŧ	افحوان الصباطين إفريطَشِيّة	١	۲۸۳	بطريقي إطريْفَل
,	71	امريعتي <u>.</u> ا أقشون	٠	17	ا أطريلال قُبُطِيّ
٧	147	الحقون أقْسُون حَرْشَفيَ الشَّكل	,	7.AT	جوييرن مبيي ا أطريُون
v	144	اقشون خُرْشُوفي الرّأس	v	* 1 V	عربيون أطماطُ الكاشو
· v	141	اقْسُون نَدِيفيّ الراسَ	٤	198	الخاتِس العالم
Ì	1.1	المشوق توپيمي المُقْمَلِيْس صَغِيْر	٣	170	- اغار – أغار سيلان - أغار – أغار سيلان
۲	19	اً أَفَتُهُ رَهِلَة	۲	١٥	أغار-أغار
۲	71	اقُونيطُن	۳	15	أغُرُوَان
٥	71	ا ا أكاجُو	,	101	افانيّة
٦	77	أكاجُو	١	T EA	- افتينمُؤن
٥	74	أكاجُو أسود	١	787	أَفَلْرَا ۚ هَنَّة
٥	**	بر أكاجو الخشب	٣	٨٢٨	إفراز القُنْدُس
٥	**	أكاجو السِّنغال	١	١	افْسَنْتِين
٥	77	أكاجو طارِدَة للحُمّى	١	۲	ا أَفْسَنْتِينَ بَحْرِيْ
٥	74	أكاجُو الفِيجي	٥	18	اَفْعَى نَمِرَة
٣	789	إكرار أورويًي	۲	14	أَفْلُوْسَ ثَلْجِي
٤	107	إُكْشُور بَنْدُوقا	٧	14	أُفْلُوسَ خَوْجِيّ الوَرَق
۲	777	إِكْلِيْلُ الجَبَل	٦	١٥	أُفْلُوس غارِي
٣	757	إِكْلِيلَ الجَبَلَ	٧	19	أفلؤس لانتانا
١	1.0	إِكْلِيلُ المَلِكُ	٣	١٥	افيُون
٣	144	إِكْلِيْلَ المَلَك	٣	10	أفيون خام
۲	1	أُكْمِلَة	٤	17	أثيُون مَخْزَنِيّ
4	*1	أگونیت	٣	10	أفيون نَيْء
*	*1	أكونيت أنتورا	7	178	أقاسيا دمّاعة
*	**	أكُونيت بَرَّاق	٥	114	أقاسِيا رَخْوَة
*	**	أكونيت بَلْفُور	٥	114	أقاسِيا رَهْلَة
۲	**	أكُوْنِيْت خانِقُ الذُّنْب	٧	188	أقاسِيا زَرْقاء
*	**	أكونيت دِيْنُوريزُن	٥	119	أقاسيا السنغال
*	**	أكُونيت سَخَالِيْن	7	371	أقاسيا عَسَلِيَّة
*	71	أكونيت سرطاني	7	37/	أقاسيا الغنبر
*	**	أگونیت سننور	٥	- 114	أقاسيا مُجَنَّحة
*	*1	اْكُونىت غُنْكُولى		14	أَثْمَى سُنْبُلِيَّة
*	77	أَكُوْنِيْت قَاتِلُ النُّئب		77	أَفْتَى عُنْقُرِيبَة
۲	*1	ا أكُونيت كبير الزَّهر	۲	١٨	أثنى نمنثودية

			ı		
٥	<u>ص</u>	مدخل نيئ	<u>5</u>	<u>ص</u>	مدخل آگونیت گرگول
٧	۳۰	أَمْ كُلُّب	۲	**	اکونیت کرگول
۲	40	ٳ ؙؖڡؗٵۯٮؙ۫ڡڴؙؙؙٷڹ	٦	17	اکُونیْت مُبَرْقَش
*	40	أمتين	7	17	اڭونىئت مُوَشَّم
٣	17	أمَلْرَيان	١	**	أڭۇنىيت ھَرَمِيّ
٥	YA	إِمْرُوْس أَرْقَش	۲	**	اِکُونیت مَلْهَلَ
٧	74	إِمْرُوْس أَغْبَر	۲	3.7	أكِيْلاجِيا حَمْراء
٦	71	إِمْرُوس عَفْرَبِيّ	١ ١	77	أكيبلاجيا شائعة
١	***	أمشزخ	۲	740	أكينُوسِ ٱلْبِيّ
٣	17	المشوخ عد	١ ١	٣٠	آلامِيَّة أَرْجُوانِيَة
٤	٧٠	أمشوخ أفرع	٥	3.4	آلامِيّة زَرْقامٍ
٣	19	أمشوخ شَتَوِيّ	٦	17	آلاية مُضَلَّعَة
٤	*1	أمشوخ مُسْتَنْقَعِيّ	V	**	اَلْمِيْزِيَة أَبُو سِنَّ
٣	19	أمشوخ منقعي	Ł	147	ألبيزيّة أبُوسنّ
٣	٧.	أمشوخ المَوْجِل أمْلُج أمْلُج أمْلُيس آمْلِيْس	v	**	أَلْبِيْزِيَة طارِدة للدُّود
٣	**	أغلُج	٦	۱۷	ٱلْبِيزَيَة غِدِّيَة
٤	175	أغلُج	•	70	ألْبِيْزِيَة اللَّبَخ
٥	1.5	آ <u>مُلِی</u> ْس	٥	40	الْبِيْزِيَة لَبُكُ
٥	1.5	أمُلِيْلِس	٦	17	أَلْبِيْزِيَة مُتَشَبَّكَة الثِّمار
0	177	أمُوْمِن	٦	14	أأيغ ألحمَر
٤	7 £	أناباز مَعْدُوْمُ الوَرَق	٦	17	أأنغ ألحضر
١	77	أنارف	٦	١٨	أَلْغَ أَزْرَق
٧	79	أناسِيْكُلُوس ڤالَنْسِيا	٦	١٨	اَلْغ بُنِّيَ إِلْمَيْس كَبِيْر الكُرْنُك
٧	٣٠	أناغَوْرُس طبِّي	٧	٥٨	إلْقِس كَبِيْر
1	**	أناناس	٣	17	الكُزنُك
1	13	أنب	٣	17	الْكُورنُوك
٤	70	أنيج	٣	117	ألوة
١	11	ائبرْبار <u>ئ</u> س	٧	40	ألوة
٥	72	ٱنْبَرْبارِيْسَ لُبْنان	١	71	ألْوَة الأَنْتِيْل
١	YA	أنظه	٦	٧٠	ألوة أنيقة
1	37	أنتينارية شائعة	٧	TV	ألوة البّخر الأخمَر
٤	7.7	أنثيليس الجبال	١	71	ألوة البرياد
7	7 • 7	أنثيليس الجُرْح	٧	**	ألْوَة بارِّي
٤	77	أنينارية شايعة أنيليس الجِبال أنيليس الجُرْح إنجا عَقُولَة	٦	۲.	ألوة الحبشة
1	٥	أُنْجَاص أُنْجُبا	١	71	ألْوَة مَخْزَنِيَّة
1	711	أنجبا	٣	17	ا لُوريت
1	**	ریب اُنْجَدَان انْجُدَان	۳	17	الأَلُوريت القَلْبِيِّ أو الْكُوريت اليابان
۲	77	أنْجُذَان	١	44	الْيَارِيا مَخْزَنِيَّة
۲	701	أنجذان حَرَمُون	١ ،	Y	أمّ ألْف وَرَقَة
١	72	أَنْجُذَان رُوْمِيّ	۱٦	371	أمَّ غِيلان

<u>ح</u> ۳	<u>صن</u> ۲۲	ملخل انان داده د	ي ۔	<u>ص</u> ۱۵۵	ملخ <u>ل</u> آنجُذان عَجَمِي <i>ي</i>
		إَمْلِيْلُج مِنْدِي شعيري أَدُورَيْنِ	_		
1	٤٠	أَهُوْكَاتِيَّةً	\	3AY	انْجُرَه كَبِيْرَه انْجَلِيْك مَلائِكيَّة
`	707	أويَاتُوريا القُدَامَى	'	47	
٦	۲۳ ۳.	أوراشِيْت مُث <i>َيِّعِب</i> د و د د د	7	71	انْدرويُوغُن أَهْلَبِ
•	۳۰	َ أُورْتُوسِيْفُون أَنَّهُ مِن يُ	٦.	۸۳	أَنْدُرُوسَامُن ئ
۳	179	ا أوْرِيْغَانُم	٧	٧٠	انديرا
v	107	أوريْغانُم أرَنُبُرْغ أُونِيُغانُم مِن	V	٧٠	أنديرا شورينام
٦	144	أورِيْغَانُم سُؤريَا و مندُ أوريا	V	۷۱	أنديرا طاردة الدود
4	144	أوريْغَانُم لُبْنَارِيَا	Y	٧٠	أنديرا ملساء ائيسين
	140	أوريغانُم لُبنان	٦	141	أنس النَّفْس
1	178	ٲۅ۠ڡؘٚٳڔؽۣؿؙۅڹ ٷڡ؞؞؞ڡ	٥	717	أَنْشُوْزَة لازَوَرْدِيَّة
٣	3.7	أُوْكالِينِتُوس أُوسية م	٥	Y 1 Y	أَنْشُوزَة هَجِيْنَة
Υ	**	أوْكاليْبِتُوْس عَرِيْضِ الْوَرَق	0	*	أنْصَرِيْن بَيْضاء
٣	71	أوكُوتيا بيشُورِيْم	٥	44	إِنْفَا أَفَرْتِيمُو
٤	**	أيابانا	٤	77	إنْغا بَرْباتيماو
٧	777	آباواشکا	٥	79	أَنْغُسْتُورَة حَقيقيّة
٣	40	ايثوغا	٧	۴٠	أَنْغُسْتُورَهُ كَاذِبَة
٣	40	إيثوغَه	٤	14.	أنف النَّوْر
۲	40	إيْهامِينْن	١	70	أَنْكُوْزَة مَخْزَنِيّة
١	190	إيريسا	1	۲٦	أنكزلية شابغة
١	780	اینگر	١	۳۷	أنناس
4	187	إِيْلَنْطُس	۲	***	ا نیشون
١	100	إيْهَان	۲	**	أيشئون تئييي
٧	17	بَابَاوْ	٣	71	أنبشؤن تييي
٤	۴.	بابُوْرُس	٣	*1	أينشؤن صَغِيْر
٥	17	بَابُوْنَج أَصْفَر	٦	**	أينشون فلوريدا النَّجْمِيّ
۲	74	بابُوْنَجُ الْمانِيّ	۲	**	انششؤن گبیر
1	77	بَابُوْنَج رُوْمانِيّ	١	47	ا َیْشُون نَجُمیّ
٢	77	بابُوْنَج السُّطُوح	٧	71	أُنِيْسُون نَجْمِيّ صَفِير الزَّهْر
١	3 • 7	بائونئج الطَّيْر بابُوْنَق أَسْطُوانيٌ بابُوْنَق أَسْطُوانيٌ	٧	٣١	أَنْيُسُونَ نَجْمِيٌّ مُوَقِّر
۲	79	بابُوْنَق أَسْطُوانيّ	Y	٣١	اُنِيْسُ ون نَجْمِيّ يَابانِيّ
۲	79	بابُوْنَق أَقْرَع	٤	177	أنيمُون ِ
Y	79	بابُوْنَقُ ٱلْمانِيّ		44	إغلال قشطا
٣	77	بابُوْنَق ذَهَبِيّ	*	٧٠	إهلال قسطا
٧	7 • 7	بَابُوني	٣	**	إمْلِيْلج
ŧ	7.	بابِیْر	٣	**	إلهليلج أضفر
٤	۲.	باپیر باییرُوس باتانا	٣	**	إهْلِيْلج بَلْيَلُه
٥	*	نائانا	۴	**	إغلينلج كابلي
٣	17.	ا باتُور	7	14	إهْلِيْلَج لَوْذِي

ب ر ش	<u>ح</u> ۲	<u>ص</u> ۳٦	مدخل کینهٔ	ج	<u>ص</u> ١٦٠	<u>مدخل</u> باتور الپارا
,	1		بثينه			
	١	3.27	َيَجٌ بِحْ مُثْكُولي بَخُور الأكْراد	7	177	باتُور الجَمايِيْك باتور المَكسِيك
	۰	17.	بج عنكوني		171 171	باتور المحبيك باتُور هُنْدُوراس
	٣	73	י אפני וע בנוג היילי וו ו	٤		باتور ممىدوراس بَاثُور شائِك
	7	1.4	بَخُور الماء	1	***	بانور سايك باجِيَنتَا شَمْعِيَّة
	٦	77	بَخُور مَرْيَم	٧	731	باجِيت سمعِيه بَاذْرَنْجُبُوْيَه
	٥	177	بَخُور مَرْيَم البُسْتَانِيَ	١	777 70	
	٤	171	بَخُوْر مَرْيَم لُبْنانِيَ يَزَ مَرَيْهُ الْقُرَ	٥	141	بَادَرُوج باذاوَرْد صوف <i>يّ</i>
	۴	177	بَدَح صَغِيْر الثَّمَرِ	۲ ٤	101	باداورد صوفي باذاوَرْد عِطْرِيّ
		17	بَدْرانج مَدْ ان مَدْ الدَّهُ	٧	40.	باداورد عِطرِي باذَق
	٧ -	٣١	بَدْیان صَغِیر الزَّهْرِ			بادى باذنجان بَرِّي
	7	**	بَدْیان فلُورِیدا	١	179 13	بادنجان بري باذِنْجان مَعْروف
	1	۴۸	بَدْیان نَجْمَيّ دی دائد دائد	1	771	بادِنجان معروف باذَوَرْد أَبْيَض
	٧ -	٥٨	بِرازِيَّة التَّمْبايَنْغ		**	بادورد ابیص بارْذَد
	۲	***	بِرازِيَّة لِيُكَنُّوفُورا	۴ ,		
	1	440	بِرَازِيَّة مُسْتَدِقَّة الطَّرَف		108	بَارِسْطارِيُون بَارُوْمَثْر الخِرَق
	٤	190	براتيرا مواد النود ا	١	***	باروممتر الحِرق بازیْلَّة بَیْضاء
	7	* V	بَرْباتیماو أَنَرْتِیمُو	٤	79	27
	٦	**	بَرْبَاتيماو البرازيل	1	Y & V	بَاطُس باطُود
	١	VV	بَرْبَارَه مَوْدِه	۲	17.	باطور بَاطُوْر أَصْلِيّ
	١	£ £	بَرْبَارِیْس بَرْبارِیْس لُبْنان	١	***	
	٥	**		٤	Y £	باقِل مَعْدُومُ الوَرَق
	۳	73	بَرْباطُوْدَة	4	۳۱	بان
	1	££	بَوْبَرِيْس شائع	۳.	**	بان دُهْنِيّ ان تريي الريا
	•	48	بَوْبَوِيْس لَبْنان مُويْدٍ،	¥	۳۱	بان عَدِيم الجَناح بان مُجَنَّع
	,	£ 0	بُرْتُقال مورد م	۳	**	بان مجنح باهِرَة أَمْرِيْكِيَّة
	۳	777	بُرْتُقال مُرّ	۴	٧٧	
	۲ .	**	بُرْتُقَالَة مُونِد .	۲	۴1	باۇباب ئانىڭ ئىرىنى
	١	80	بُرْتُقان مومین	۳	١٠	بَایْکُورُو (جذر)
	١	£ 0	بُرْدُقان مومین	1	٤١	بَباظ زِراعِيّ
	۲	77	بُرْدُقانَة 	۲ -	77	بَباظ زِرا عِي
	٤	۳.	بَرْدِي ٓ ،		Y0	بَبَاظ زراع ي مَدَرُهُ
	٤	17.	ۇرىس ئىرىدىن	٤	79	بَبَيارُو بَيَيارُو رُودِي
	٤	707	بَرَسْکان تو گ	Ł	79	
	٧	770	بَرْسِيم أَحْمَر بَرْسِيْم جَشْوِيّ	٤	۳۰	بَتِير بَنْجُنْجُور بَتْشُولي عَذْب
	1	787	بَرْسِيْم جَسُوِيَ	٧	۲٥	ېئجنجور روي ري
	٣	177	برسِيم حِجازيّ بَرْسِيْم المَاء	٣	YA	بتشولي عدب
	1	7 A 7	ا بُرْسِيْم المّاء	1	£ Y	بَتُولا بَيْضاء مِنْ يُ
£1V	1	441	ا بَرْشَاوْشَان	٧	40	بَتْياتُور

			ı			
<u>ح</u>	ص	مدخل بَصَل الذَّئب	<u>ح</u>	<u>ص</u> ۱۹۷	مدخل بُرْعُون	ب رع
<u>ح</u> ۱	<u>صن</u> ۱۹۱	بَصَل الذِّئب	٣	194	بُرْعُون	ر ح
٧	۸۳	بَصَلُ الذِّئْب		73	بَرْغُمُوت بَرْغُوْثِيَّة	
٧	۸۳	بَصل الزُّيْز		337	بَرْغُوْثِيَّة	
١	44	بَصَل الفار	Į.	171	بَرْقُوق شائِك	
٧	17	بَصَل الفار		13	ؠؚڒڮؿ	
٧	۸۴	بَصَلِ المِسْك	۲	4.5	بَرْناسِيا المَناقِع	
١	44	بِصَّيْلَة	٣	79	َرُنْج بَرِنْج بَرْبَيَان بَرِنْج بَرْبَيَان	
٣	۲1	بَطاطا	l	٥٤	بَرِنْج بَرْبَيَان	
٣	۲۱	بَطاطِس	١	719	بَرَنْجَاسَف	
١	٤ ٧	بَطْباط الدَّواجن	٣	79	ؠۜۯ۫ڹؘق	
٣	**	بَطْباط الرِّمال		٤٥	بَرْيَق بَرْبَيَان	
١	377	بَطِّبَاط مُفَلَّفَل	l	44	بَرْنَق قَوِيّ	
٢	٣٢	بَطِّباط نِيْليّ	٣	44	بَرْنَق كِشْمِشيّ	
١	٤٨	بَطُونِيْقًا طِبَيَّة	٧	۳٥	بَرْنُوف	
٤	٣١	بَعُونِيْقَا طِبِيَّة بِطِّيْخ بَعْشَرَان بَعْشُران بَقْدُونِس	٦	YV	بَرْنَقَ كِشَّمِشيّ بَرْنُوف بَرُواق أَبْيَض بَرُواق صَغير الثَّمَر	
7	٣	بَعَيْثُران	٤	٣٠	بَرُواق صَغير الثَّمَر	
۲	**	<u>بَقْدُوْنِس</u>	٤	٣.	بَرُواق مُتَفَرَّع	
٤	77	بَقْدُوْنِس	٦	44	بَرُواق ناسُورِيّ بُرُوْسِيَّة سُومَطْرَة	
7	117	بَقْدُونس بَرِّيّ	٥	7 • 7	بُرُوْسِيَّة سُومَطْرَة	
٤	171	بقدونس كاذب بَقْس دَائِم الخُشْرَة	٤	71	بُرُوْسِيَّة مُضادَّة للدُّيْسَشِيريا	
١	۰۰	بَقْس دَائِم الخُضْرَة	٣	7 • 9	برُونْفَلْمِيا هُوْبيانا	
7	77	بُقْلامُس بُقْلامُس الرَّبيع بَقْلَة الإمْبَراطُور بَقْلَة الإمْبَراطُور	٦	44	بِزْر قَطُونا	
7	14.	بُقُلامُس الرَّبيع	7	41	بَزر قَطُونا الرَّمَال	
١	٥١	بَقْلَة الإمْبَراطُور	١	337	بَزْر قَطونَاء	
٤	104	ا يَقْلَةُ الْأَمُّهَاتِ	٥	V *	بَزْرَةُ التَّبَشُع	
٤	٣٣	بَقْلَة الأوْجاع	٥	٧٣	بِزْرَةُ الخِرْوَع	
1	1 • 1	بَقْلَة حَامِضَة	۲	۳٥	بَزِلْه	
۲	٣٨	بَقْلَة حَمْقاء	۲	٣٥	برے بَرِیْلَا	
١	777	بَقْلَة الخَطَاطِيْف	۲	71	بَشَّامَة الطَّيْب بَسْبَايج بِسْسِس بَرِّي	
۲	V 9	بَقْلَة الرَّماح بَقْلَة الرَّئِس بَقْلَة المُطَاس بَقْلَة العَوْف بَقْلَة العَوْف	١	40	بَسْبَايج	
١	٥١	بَقْلَة الرَّئيس	١	717	بِسْبِس بَرِّي	
٧	٣	بَقُلَة العُطَاس	٥	7.7	بَسْتَج	
٧	109 . 104	بَقْلَة العَوْف	٥	Y•Y	بَسْتَج حَبَثِي	
۲	79	بَقْلَةُ الغَزال	٥	Y•7	بَسْتَج هِنْدِي	
١	441	بَقْلَة القِطّ	٦	141	بِسِلَّةِ الكُوْنُفُو	
۲	1 V E	ُ بَقُلَةُ اللَّبَن بَقْلَة المُلُوك	7	141	بَسْتَج بَسْتَج حَبَيْق بَسْتَج هِنْدِيّ بَسِلَّة الكُوْنْفُر بِسِلَّة هِنْدِيَّة بِسِلَّة هِنْدِيَّة	
١	197	بَقُلَة المُلُوك	١	٣٨٥	بشنين أضفر	
٧	۳۷	بَقَمِ أَسُود		٣٦	بَصَل	
٧	**	ا بَقَنْقُومُون	٣	٣٠	بَصَل	٤١٨

				ı		
ب ن د	<u>ح</u> ٤	<u>ص</u> ۳۷	مدخل بَلْقاء خَضْراء الأزْهار	<u> </u>	<u>ص</u>	مدخل
•	ŧ		بَلْقاء خَضْراء الأزْهار	١	114	بَكْبَر هِنْدِيْ
	٥	٣٩	بَلْقاء كاجِيْبُوت	٣	89	<u>ﺳﺘﺎﺻﻦ</u> ﺑﺘﮑﻨﺒﺮ ﻣِﻨﺪﯨﻲ ﺑﮑﺌﺴﺎ ﺑﮑﺌﺴﺎ ﺑﯩﮕﻠﺪﯗﻥ ﺑﯩﮕﻼﺩﯗﻥ ﺗﯩﻜﺪﯗﻥ
	1	Y \ 9	بَلَنْجَاشَفَ	٤	78	بِکْسا
	١	777	بَلُّوْتَة شَائِعَة	٤	78	بِكْسَة
	١	777	بَلُّوْنَة مُكَلَّبَة		01	بِلَّادُوْن
	١	777	بَلُّوْتَة نَتِنَة	٣	37	بِلَّادُون
	7	175	بَلُّوط أَخْضَر		44	باو در عربي
	١	144	بَلُّوطُ أَسْوَد إنجليزيّ	٣	77	بِلَّان
	۲	7 3	بلُومارِيَة	٣	٣٧	بَلِّان
	٤	۳۸	بلومارية بَيْضاء	٤	4.5	بِلَّان بِلَّان
	٤	٣٨	بلُومارِيَة حَمْراء '	٤	4.5	بِلْان
	٣	٤٠	بُلومارِيَة صَفْراء بِلُومارِيَة مُسْتَدِقَّة	٥	**	بَلَّان شَوْكيّ
	۲	23	بلوماريّة مُسْتَدِقّة	1	٥٣	بَلَّانَ صَغِيْر
	٥	٤٠	بلُومِيَة بَلْسَمِيّة		79	بَلَّان ضُرِّيّ
	٥	13	بلُومِيَة مُمَزَّقَة	٦	۲۲	بَلَّان غَيَّارِدُوت
	٤	۸۱	بُکری بُلَیْس مُعمَّر بَلَیْس مُعمَّر	٥	44	بَلَّان مُثَأَلَل
	1	٥٥	بَلَّيْس مُعمَّر	١	٣٥	بَلَّان مِحْجَام
	٣	**	رُدُونَ بُنْ الْخَضَرِ بُنْ (أَنْواعِ البُنِّ)	۲	٤١	بَلَّان مَخْزَنِيّ
	٧	٤١	بُنّ أَخْضَر	٦	٣٣	بَلَّان مُنْدَمِج بَلَّان مُنْدَمِج
	٥	٤١	بُنّ (أَنْواع البُنّ)		۸۴	بُلْبُوس أَشْعَر
	١	٥٥	بُنّ عَرَبيّ	V	۸۳	بُلْبُوس الكَلْب
	٧	٤٣	بَناقَئْنَة	7	717	بَلَح الصَّحْراء
	٧	٤٣	بناقنثة لاسِعة	٧	177	بُلخ
	٧	24	بَناقَئْتُة لاطئة الزَّهْر	٧	44	بَلَخِيَّة يُونَانِيَّة
	٧	73	بَناقَتُنَة هَنْرِي	١	7 • 7	بُلْدُس الشَّيلِي
	٧	23	بَناكْس شَائلُك	1	79	بَلَس
	٧	73	بناكس لاسع	٣	77.	بَلَسان أَغَلُّوشا
	٧	23	بَناكس لاطئ الزَّهْر	*	***	بَلَسان أفريقيا
	٧	73	بَناكْس هَنْرِي	1	700	بَلَسْكَى
	٣	٤٠	ا بَنْج	*	*7.	بَلْسَم أفريقيا
	٧	£ £	بَنْج أَبْيَض	٤	٣٥	بَلْسَم البِيْرُو
	١	٥٦	بَنْج أَشْوَد	• •	***	بَلْسَم رُوَكُسبُورغ
		٤١	بَنْجَ أَصْفَر	٣	٣٨	بَلْسَم غُرْجُوْن
	٥	٤١	بَنْج ذَهَبِيّ	٥	POT	بَلْسَم الماء
	٤	44	بناگس مَنْرِي بَنْج أَبْيَض بَنْج أَبْيَض بَنْج أَشِوَد بَنْج أَشَوَد بَنْج أَضْفَر بَنْج سَرْح بَنْج المَغْرِب بَنْجُوان بَنْجُوان	٣	44	بَلْسَمُ مَكَّة
	٦	۳٦	بُنْجَ المَغْرِب	۲	177	بُلْسُن
	١	*1.	بَنْجَر	1	140	بَلْغ الرَّنِيْس
		13	بَنْجُوان	١	٥٤	بَلْقَاء بَيْضاء
119	١	٥٨	ا بُنْدُق مَعْروف	٣	44	بَلْسَان أفريقيا بَلْسَم أفريقيا بَلْسَم البِيْرُو بَلْسَم مُورُحُسبُورغ بَلْسَم خُرْجُوْن بَلْسَم مَكَّة بَلْسَم مَكَّة بَلْمَن بَلْفَن بَلْفاء بَيْضاء بَلْقاء خَضْراء الأزهار بَلْقاء خَضْراء الأزهار

		11.4			le i	
<u>ح</u> ٤	صن ٤١	مدخل بُوْصِيْر فلوميْسانِيّ 	۲	صن 4۳	مدخل بُنْدُق مَعْرُوف	ب ن د
٣	££	بوچيو تتوبيدي بُؤْمِيْر كَتْيْف الزَّهْر	٣	٤١	بندق هِنْدِيّ بُنْدق هِنْدِيّ	
V	٤٧	بوچیر مشکِر بوْصِیر مُشکِر		41	بىدى بَنَدُوْرَة	
١	74	بر چیر سے پر انامہ ا	1	٥٨	بشرو بَنْطافِلُن	
۲	٤٤	بۇمپىرا بۇمپىرا	١	799		
٧	٤٧	بروير بُؤط أشترالي	٤	۲۵	بَثْغ بَنْغُوار جَمْیِي	
٧	٤٧	بُوط رَفِيْع بُؤط رَفِيْع	٦	۳۸	، روب بي بَنَفْسَج آذار	
٦	٤١	بر رئي ا بُوْط عَريْض الوَرَق	Ý	٥٩	بَنَفْسَج آذار بَنَفْسَج الثَّالوث	
٥	717	بُوْط عَرِيْض الوَرَق بُوْغُلْصُن سَمَنْجُوْنِيّ	٤	٤٠	بَنَفْسَجُ الثَّالُوْث المِهْمازِيِّ	
١	T0	بُوْغُلْصُن مَخْزَنِيّ	٦	٣٨	بَنَفْسَج عَطِر	
٥	*1*	بُوْغُلْصُنِ هَجِيْن		٤٤	بَهَا	
٣	٤٥	بُوْقِيَّة أَرْجُوانِيَّة	٧	177	بَها بَرِّيَّة	
١	171	بُوْقِيْصا حَفْلِيَّة	٥	17	بَهَاد حَقُٰلِيّ	
١	١٣٨	بُوْقِيْصا حَمْراء		۱۷	بَهَار الصُّبَّاغِيْن	
۲	٤٣	ا بُؤكْشُو	1	77	بَهَاد نَبِيْل	
١	7.4	ا بُولْدُو عَذْبِ	7	79	بَهْرَمانَةُ مارِدَة	
٥	٤٦	بُولُوغَالِن بَقْسِيّ	٥	117	بَهْش	
١	78	بُولُوغَالِن شائِع	1	7.	بَهْشِيَّة الدُّبْق	
٦	٤١	بُوْلُوغَالِن ڤيرجِينيا بُولُوغالِن مُرّ	١	71	بَهْشِيَّة الشَّاي	
٤	£ Y	بُولُوغالِن مُرّ	٦	707	بَهْشِيَّة كاشَيْن	
٦	٤١	بُوْلِيْغَالا سَنِيْغَا	١	٣٠٢	بُو نَقّار	
١	٦٤	بُولِيْغالا شائعة	٣	23	بُوْتالِيا مُرَّة	
٥	Y 1 V	بُوْمَرِي	١	٥٨	بُوتَنْتِلًا مَدَّادة	
٥	90	ا بُوهْمِيْريَا	١	777	بُوتَنْتِيلا الوَزْ	
٥	47	بُوهْمِیْریَا بُوهْمِیرِیَا فِضْیَة بُوهْمِیرِیَا نافِعَة بُوهْمِیرِیَا نافِعَة	١	3 P 7	بُو جْ بِيبَة	
٥	47	أبولهميريا نافعة	7	71	بُوركيبَة	
ŧ	73	بينتاره دافعة للحمّى	۴	24	بُوْسِيْدان مَخْزَنيّ	
۲	**	ابينخ	٤	٤١	بُوسِّينا	
۲	AFI	بَيْدُسْتِر بيرة طبيّة	۲	27	بُوْشُو بُوْص بُوْصِيْر بُوْصِيْر بُوْصِيْر أَبْيَض بُوْصِيْر تَبْيِيّ الشَّكل بُوْصِيْر تَبْيِيّ الشَّكل	
٥	٤٦	بيرة طبية	١	197	بُوْص	
۲	**	بيش	١	75	بُوْمِيْر	
١	**	بِیْش البَیْر	۲	8.8	بُوْمِيْر	
١	**	بِیْش مُوْش بِیْشا	۲	٤٥	بُوْصِيْرِ أَبْيَض	
۲	٤٦	يَيْضُة	٣	8.8	بُوْصِيْر ثَبْيِيِ الشَّكُلُ	
٤	43	بيكرينا شامِخَة	٥	٤٥	بؤمِيْر السّمك	
٦	73	بيره طبيه بيش البَبْر بِيْش مُؤش بِيْشا بَيْضَة بيكرينا شامِخَة بيُلا بيلسان أخمَر	٥	٤٤	بُوْصِير سِيْنائي <u>ّ</u>	
٧	٤٨	ا بيْلِسان أخمَر	٥	٤٤	بُوْصِير صُوْماليّ	
١	3.7	ا بَيْلُسَانَ أَشُوَد	٥	\$ 0	بُوْصِيْر طَرابُلُسَ	
1	771	ا بَیْلَسان صَغِیر	٤	٤١	بُوْصِيْر عَيْزارانِيّ	٤٢٠

ت و ز	<u>ح</u> ۱	<u>ص</u> ٣٦٦	مدخ <u>ل</u> تُومِجَان	2	من • ه	مدخل بئوت بئوت
	1	148	تُرْسِيَّة إسْلَنْدَة		44	 پاریبرا برا ق ا
	۲	٥١	تَرْغُوْن	٤	177	پاریُرا برا هٔا پالیکُوریا
	۲	٥١	تُزْمُس زِراعِيّ	۲	٦.	پاناڭس خُماستي الوَرَق
	١	*77	تُرُنْجان َ	٦	40	پَاوْپيرِيْرَا
	٣	٤٩	تُرُنْجان	۲	377	پرُوتُوكْسِيْد الهيدروجين
	*	777	تَرَنْجُبِيْن	V	41	پشیْدِیَا مُشْکِرَة
	1	77	ئر نُشَان تَرْنُشَان مُدور	٤	140	پِکْرِیْنا شامِخَة
	1	٦٧	تُرُنْشَاه	v	73	پُودُوفِلُون دَرَقيّ
	٣	٨	تِرْياق أَبْيض	٦	171	پُولِّينِيا
	٤	٤٩	تِرْياقِيَّة	v	٥٩	پُولِينيا رِيشيَّة
	٥	10+	تُسَلِّغَة	٥	AFY	بُولِينِيا قِرمِزيّة
	١	40	تَشْتِيوَان	٦	171	پُولِّینِیا گُوپانا
	٦	•	تَفْمِيْزَج	٣	٤٥	پيتُوْدِي
	۲	YAA	تُفّاح الجِنّ	٣	100	پِيْشِي پيڭرُوتوڭسِين
	٤	٥٠	تُفَّاح شائِع	٣	23	پیکُرُوتوکُسِین
	٤	17.	يّم السَّمَكَة	٤	٥٥	بيلوقربوس خَشِن القُنْزُعة
	٧	٥٨	تَمْبايَنْغ	۲	٥٧	بيْلُوقَرْبُوس ريشتي الوَرَق
	٧	٥٩	تِمْبو	£	٥٥	يبلوقرئوس سُنبُليّ
	٥	117	تِمْبو تَمْتَم تَمْر المَطْي	٤	٥٤	پيلُوقَرْبُوس صغير الوَرَق
	٥	۲	تَمْر المَطِّي	٤	٥٥	بيلوقربوس ئمنقُوديّ
	٦	00	تَمْر هِنْديّ	٣	40	تابَرنَنْت
	٣	19	تَمْرة		140	تَارُو
	٥	٤٥	تُثْتِيراكالا		٥٨	تَارُّو القُدامَى
	٥	00	تَنُّوْب فِضِّيّ	٧	717	تانْبُول
	٥	• •	تَنُوْب مُشْطِيّ	٧	٥٨	تَايُوف كَبِيْر
	١	۸۶	تُوْت أبيض	٦	۲٥	تَايُوْيا
	٧	٥٩	أتُوْت أَخْمَر		114	تُبَشُع تُبشُع تَبُغ تَباكُم تَبُغ الحُرّاس
	١	777	تُؤت الأرْض	٤	٧٩	تُبشُع
	1	۸۶	تُؤْت أَسْوَد		٥٢	تَبْغ تَبَاكُم
	1	۳۰	تُؤت الثَّعْلَب		٤A	تبنغ الحرّاس
	١	٦٨	تُؤت شَامِي	١	P37	تبغ هِندِي
	١	787	تُؤت شَوْكِيْ		٧	يبنن الجَمَل
	١	۸۶	تُوْت القَزّ		Y	ئِيْن مَكَّة
	٤	777	ْ تُوْت هِنْدِيّ		44	تَحْلاذَن
	۲	٥٢	تُوْتَة سَوداء	٦	٥٤	تُرْبُد
	١	١٨٥	تُودْزِيجْ تُورْنَسُول	٥	10.	تُرْبِد أَبْيَض
	٤	١٨٥	تُورْنَسُول			تَرْبَتْتِيْن (أي المادة تستخرج من كافة هذه الأنواع)
173	٣	٥١	أ تُوْز مَخْزَنِيّ	۲	٥٠	من كافة هذه الأنواع)

			1				
گرم ٥٥ ٧ ١٤٠ ١٩٠ ١٤٠ ١٩٠	ح	ص	مدخل	٥	من	مدخل	ث ه ه
الفرائي الفرائي الفرائي الفرائي المنافع		141		1	V T	تُؤم	73
الفرائي الفرائي الفرائي الفرائي المنافع	٤	AV	جَنْرُوفَه	۲	٥٥	تُؤم	
الفرائي الفرائي الفرائي الفرائي المنافع	٧	77	جُدْجُدٌ حَفْلِي	7	177	تُؤيا عِقْدِيّة	
الفرائي الفرائي الفرائي الفرائي المنافع	٤	٦٨	جُدَرِيَّة أَسْطُوانِيَّة	٧	٦٠	تُوْيا غَرْبِيَّة	
الله الله الله الله الله الله الله الله	٤	٦٨	جُدَرِيَّة مُرَّة	٦	177	تُؤيّا مَفْصِلِيّة	
الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله المعادل الله الله الله الله الله الله الله ا	٥	14.	جَدْع	۲	٥٢	تِيڤاتِيا دِفْلِيَّة	
ين مقروف \$ 0 ٢ جذر الليثونال 18 ٢ ٢ ١ <th>٧</th> <th>111</th> <th>جَدُّوار</th> <th>٦</th> <th>777</th> <th>تِین آدم</th> <th></th>	٧	111	جَدُّوار	٦	777	تِین آدم	
بگوابروق الكاكاو ۱ جغر البشك ۱۱۲ ٥ تابيب غزغائو ۹٤ بغر البشك ۱۱ ۲۰۰ ۱۱ ۲۰۰ بغر المشك ۱۱ ۲۰۰	٦	٤١	جَذر ذات الأجراس	١	79		
بگورترو العاكاو ۱ جگور البشك ۱۱۲ ٥ تاب الورق ۱۹ ۱۹ ۱۳۰ <th>٦</th> <th>٤١</th> <th>جَذر الكُروتال</th> <th>۲</th> <th>٥٤</th> <th>تِیْن مَفْروف</th> <th></th>	٦	٤١	جَذر الكُروتال	۲	٥٤	تِیْن مَفْروف	
الفي الوَرَق ١٩ ٥ اجدور الطُلقاس ٨ ١	٥	117	جَذْر المِسْك	١	4.4		
١ ١٠ ١ ١٠<	1	700	جَذْر وِنْدُوْك	٧	9.8	ثابْسِيا غَرْغانُو	
الله الله الله الله الله الله الله الله	٣	٨	جذور القُلْقاس	٥	79	ثاقِب الوَرَق	
نَّلْنَان لَلْنَلان ۱ ۲ جَرْجِيْر أَرْضِيْ ۱	4	01	چۇچو چۇچو	٤	٥٢	ثُبُوت بارُومَتز	
١ ١٠٠ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٠	١	100	چرچ <u>ی</u> ر	١	٧٢		
١ ١٠٠ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٠	1	VV	جِرْجِيْرِ أَرْضَيَ	٣	٥٣	ثليثب أضفر	
شهار بینضاء ۱۸۲ جرچبر تغلیق ۱۸۲ ۲ ۹۰ برجبر العاء ۱۸۲ برجبر العاء ۱۸۲ برجبر العاء ۱۸۰ برخوشنی المناب ۱۱۰ برخوشنی المناب ۱۱۰ برخوشنی المناب ۱۱۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۳۱ ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ ۱۲۰ برخوشنی المناب ۱۲۰ ۱۲۰ برخوشنی المیاب ۱۲	1	VV			• •	ثَلِيْب أَكِيْلاجِيّ الوَرَق	
١٠٥ ١٠٥ ٢ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٠ ١٠	4	٥٨			148	يْمار بَيْضاء	
١٠٥ ١٠٥ ٢ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٠ ١٠	٦	141	جرجير الماء	*	٩.	ثُمام	
استاج ۱۱۱۰ استاج ۱۱۲۰ اشترة وَرْدُ السّتاج ۱۱۲۰ استاد السّتاء	٣	140	جَرْمَشْق	۲	1.4	ثُمَرَةُ الزَّان	
استاج ۱۱۱۰ استاج ۱۱۲۰ اشترة وَرْدُ السّتاج ۱۱۲۰ استاد السّتاء	٧	٣٠	جَرُّوْد	١	18.	ثَمَرَة النُّسْرِيْن	
١ ١٥٢ ٤ ٢١٩ ٢١٩ ١٠ ١٠٠ </th <th>٤</th> <th>١٣٦</th> <th>جَرُوْمَة</th> <th>١</th> <th>18.</th> <th>تُمَرَة وَرْد السِّيَاج</th> <th></th>	٤	١٣٦	جَرُوْمَة	١	18.	تُمَرَة وَرْد السِّيَاج	
افرم الحَبَّة ۱ الله جُرُومَة عُلَيْلَة ۱ الله جُرُومَة عُلَيْلَة ۱ الله جُرُومَة عُلِيْلَة ۱ الله جُرَومَة عُلِيْلَة ۱ الله جُرَومَة عُلِيْلَة ۱ الله جُرَومَة عُلِيْلَة ۱ الله جُرَومَة عُلِيْلِة ۱ الله جُرَومَة عُلِيْلِة الله جُرَومَة عُلِيْلِة الله جُرَومَة عُلِيْلِة الله جُرَومَة عُلِيْلِة الله جُرومَة عُلِيْلِة الله جُرومَة عُلِيْلِة الله إلى الله الله الله الله الله الله الله ال	٧	107	جَرُوْمَة بَيْضاء	٤	719	ثَوْر الماء المَخْزَنِيّ	
اسم	٤	140	جَرُوْمَة دَرَقِيّة	٤	17		
المرافع المراف	٧	107	جَرُوْمَة غُدِّيَّة	7	188	ثمزم الحَيَّة	
السُّرْق الشُّرْق الشُّرْق السُّرْق السُّرْق السُّرْق السُّرْق السُّرْق السُّرْق السُّرْق السَّمِ السَ	٥	١٣٨	جَرُومَة كَلِيْلَة	1	٧٣	ثُوْم زِرَاعِي	
اوم	١	174	جُرَيْسَة الغَاب	*	٥٥	ثُوْم زِراعِي	
النظال ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	٣	٥٤	جِزاب شَوْكَراني	٤	141	ثُوْم الشَّرْق	
النظال ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	٥	107	جِزَابِ مِسْكِيّ	٤	70	ثُوْم قَصَبِيّ	
النظال ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	٣	٥٤	جَزَد	٦	1 • 4	تُؤم مُعَمَّر	
ثَلِل أَحْمَر مُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل	*	09	جَزَد بَرِّي	١	۲۷۸	فيل	
ثَلِل أَحْمَر مُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل	١	PAT	جَزَر البَقَر	٣	٥٢	ييْل	
جابُورَنَدي الپاراغواي ۲ م٠ ١	٤	00	جَزَر الرُّعاة	٣	٥٣	ثیّل	
جابُورَنَدي الپاراغواي ۲ م٠ ١	1	177	جَزَر شَيْطانِيّ	١	14.	ثَيَّل أَحْمَر	
جابُورَنْدي الرِّيُو ۷ ۲ ۷ جابُورَنْدِي مارَنْهام ٤٥ ٤٠ ١ ۲ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	1	177	جُسَاد	۲	٥٧	جابُورَنَدي الپاراغواي	
جابُورَنْدي الرِّيُو ۷ ۲ ۷ جابُورَنْدِي مارَنْهام ٤٥ ٤٠ ١ ۲ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	٥	۲3	جِعَة طبية	١	٧٦	جَابُوْرَنْدِي پَرْنَمْبُوكُو	
جَادِي	٧	٦٧	جُعْدَة	۲	٥٧		
4 Am 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	٧	77	جَعْدَة	٤	٥٤		
4 Am 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	۴	00	جَعْفِيْل كَبِيْر	1	177	جَادِي	
	٤	٥٦			٩٠	جاؤرس	277

ج ي ل	<u>ح</u> ٤	ص ۹ ه	مدخل جَنْطِيانا أَرْجُوانِيَّة	<u>ج</u> د	<u>ص</u> ٥٦	مدخل جَكَرُنْدَة جَذَّابَة
	٤	٥٩	جنعیان ارجوایی جَنْطیانا شِیْرایْتا	1	VV	جدرنده جدابه جَلَاب حَقِيقي
	١	٧٩	جنوبيانا صَفْراء جَنْطِيَانَا صَفْراء		vv	جورب مخزن <u>ي</u> جَلاب مَخْزَنِي
	٦	78	جنیطیّانا صَفْراء (جَذْر)		7	بارب تعربي جَلَب أبيض
	۲	٦.	جَنْطِيانا مَقِرَة		70	جَلَب أوريزابا جَلَب أوريزابا
	٤	٥٩	جَنْطِيَانا مُنَقَّطَة	٦	77	جَلَب تَمْهِيْكُو جَلَب تَمْهِيْكُو
	١	٤٥	جَنّه	٦	77	جَلَب مُتَصَبِّع
	1	11	جَهُوان	١,	VV	جَلَب مَخْزَنتي
	7	۲۰۳	جَوْز أَرْمَانِيُوس	٤	70	جَلَب مِغْزَلِيِّ الشَّكْل
	7	729	جُوْز الجَماييك	٦	117	جَلَبة أُوْرِيْزَابا
	*	71	جَوْز الطُّيْب	١	YY	جَلَبَة مَخُزَنِيَّة
	1	۸١	جَوْز عادِيّ	٦	119	جَلْجان
	۲	7.4	جَوْز عادِيّ	٦	119	جُلْجُلان
	٤	٥٩	جَوْز عادِي	١	441	جُلْنِسْرِیْن جَلْهَم جَلْهَم جِلُّوز عاديّ -
	٦	١٣٢	جَوْز القَيْء	١	۳۷۲	جَلْهَم
	۲	YZA	جَوْز الهِنْد	۲	AFY	جَلْهَم
	٦	747	جَوْز الهِنْد	١	٥٨	جِلُوز عاديّ
	٤	٥٩	جَوْزَة		70	جِمْلاج دُوْبِيا
	٦	408	جَوْزَة الشَّرْك		٥٦	جِمْلاج زِبْدِي
	٧	79	جَوْزَة العَفْصَة		٥٨	جَمْلَج صُحْيَ
	٧	٧٠	جُوفْرِيَة		٥٨	جَمْلَج مُصْفَرً اللَّون الأخضر جُمَّى
	٧	٧٠	جُوفْرِيَة سَرْحَة		111	و <u>،</u> جمعی
	٧	٧٠	جوفرية سُورِينام		٧٨	جِنْ - سَنْ
	٧	V1	جوفرية طاردة الدود		3 P Y	جِناء أَحْمَر
	٥	140	جُوْكَلَانَة صَغِيْرَة	١	184	جِنَاح رُوْمِي
	1	414	جُوْكَلانَه	٤	٥٩	جَنْثيانا
	1	AY	3-7-37.	1	V9	جَنْثِيانا صَفْراء
	١	**	جُوَيْسَة عَطِرَة		٤٧	جُنْجُر جُنْجُل شَائِع جِنْسَن جِنْسَن أَبْيَض (جذر)
	٧	127	جِيْدار	1	41	جُنْجُل شَائِع
	٥	107	جِّيْرَانِيُوم جِيْرانْيوم دَمَوِيّ جيرانيوم مَرْجِيّ	1	٧A	جِئْسَن
	۲	371	جِيْرانْيوم دَمَوِيْ	٦	75	جِنْسَن أَبْيُض (جذر)
	٥	107	جيرانيوم مَرْجِيّ	۲	٦٠	جِنْسَن أميركيّ
	٥	105	جِيْرَانِيُوم مُسْتَدير الوَرَق	٧	73	جِنْسَن شائك
	٥	104	جيرانيوم مُلطخ	1	٧٨	جِئْسَن کوریا
	٤	111	جَيْفِلة	٧	24	جِئْسَن لاسع
	٧	170	جيرابيوم مرجي جيرانيوم مُسْتَدير الوَرَق جيرانيوم مُلَطَّخ جَيْفَلَة جينفَلة جيلاتين مُثَلَثَة الأوراق	٧	73	جِئْسَن لاطئ
	٣	٥٧	جيلاتين .	٧	23	جِئْسَن مَنْرِي
	٤	77	جِبْلَانِيا مُثْلَثُةِ الأوراق	٤	٥٨	جِئْسَن يابانيّ جَنْطِيانا
274	٥	٥٩	جِيْلَانِيَا مُؤَذَّنَة	٤	٥٩	جَنْطِيانا

			I			
<u> </u>	ص ۲٦	مدخل حَبَق شُمَيْسِمَة (لبنان)	<u>ح</u>	<u>ص</u> ۹ ه	مدخل جيلينية أذِنَة	ج ي ل
٧	٧٦	حَبَق سُمَيْسِمَة (لِنان)	٥	09	جيلينية أذِنَة	. 4 6
٧	77	حَبَق صَغِيْر	٤	77	جِبْلَینَة طبیَّة جِینکُو	
٥	3.5	حَبَق ظُريْف	١	۸۳	جِينُكُو	
٦	79	حَبَق عَذَّبِ الرّائِحة		177	جَيْهُمَان	
7	79	حَبَق عَذْب مُتَشَجِّر	l	75	جَيُوْم جَبَلِيّ	
٥	7.8	حَبَق قُرّاصِيّ الوَرَق		٥٢	جَيُوم كَنَدِيّ	
٦	79	حَبَق قَرَنْفُلِيّ	١	٨٥	جَيُوم مُبارَك	
٧	7.7	عَبَق كَرْمانِيِّ حَبَق كَرْمانِيِّ	٦	٦٥	خيُوم مُنتَصِب	
٥	٦٤	حَبَق لِيفِيّ	٣	٥٨	جيوم ٺَهْرِيِّ	
٦	757	حَبَق الماء		171	حافِرِيَّة حَالُوم	
٥	78	حَبَق مُتَشَجِّر	١	711	حَالُوم	
٥	۵F	حَبَق مُتَقَبِّض		78	حايض	
٥	٦٥	حَبَق مَعْرُوف		F3	حامض پيڭرُوتوڭسيني	
٥	٥٢	حَبَق نَبَطِيّ		דד	حامض خَلِّي مُركَّز	
٥	٦٥	حَبَق هِنْدِي	٤	٦٥	حامِض كلورهيدريك	
7	79	حَبَق وَبِر		70	حامِض هيدروكلوريك	
1	747	حَبْل المَسَاكِيْن	٣	٥٥	حامُول گَبِيْر	
٧	Y07	حَبْل مِسْكِي		111	حَبّ الزُّلَم	
١	144	حَبْن	٦	١٨٧	حَبّ السُّلاطِين	
۲	YAY	حَبْهان		144	حَبّ العَرُوس	
١	٣1٠	حَبْوَة الكاكَنْج	٦	117	حَبّ العَزِيز	
1	144	حَبِيْن	١	711	حَبُّ القَلْب	
١	1.7	حَبِيْن حَدَج	٤	77	حَبُّ العِسْك	
٥	175	حِرَابِيَّة مَاْكُولَة	٣	104	حَبّ الملوك	
١	1	حِرْبق حَوْلِيَ	٤	AV	حَبّ المُلوك	
٤	77	حِوْجِل حَوْشَف بَرُيّ	7	777	حَبّ المُلُوك	
١	377	حَرْشُف بَرِّيّ	٥	198	حَبَاحِب أَحْرَش	
*	۸۶	حَرْشُف مَبْذُول	١	AV	حَباحِبُ الشُّقُوق	
٤	1.4	خُرْف	٦	7.7	حَبَاحِب مَبْٰذُول	
1	78.	حُرَّف أَبْيَض حُرَّف الحَقْل	٥	**	حُبَّار	
٥	17	حُرْف الحَقْل	٧	٧٦	حُبَاق (تونس)	
٧	٧٨	حُرْف الحَقْل	١	٨٨	حَبَق	
٤	٦٨	خُرِّف الماء	٧	۷٥	حَبَق أَخْضَر	
٣	71	حَوْمَل	٧	٧٥	حَبَق البَرْغَش	
١	TAE	حُرَّيْقُ شائع حَزَازِ إِسْلَنْدَة	١	411	حَبَق تُونْجَانِيّ	
١	148	حَزَاز إِسْلَنْدَة	٦	787	حَبَق التَّمْساح	
٧	٧٨	حَزاز بَياض الثَّلْج	١	719	حَبَقُ الرّاعي	
ŧ	٨٦	حَزاز جُدَرِي		78	حَبَق الرُّهْبان	
۲	19	ا حَزاز حُقَيْقِي		7.5	حَبَق زُغْتَرِيّ الرّائِحَة	373

				,			
ح ش ي	<u>ح</u>	من		مدخل	ح	<u>ص</u>	مدخل
ے س پ	7	Y • Y	ة الدُّبَ		v	<u>صن</u> ۷۸	مدخل حَزاز الحيطان
	١	٩.	ةُ الدُّهُن		٧	٧A	حَزاز الرَّنَّات
	1	9.8	ةُ الدُّوْد		۲	79	حَزاز رِئوِي
	١	174	شَهَ الدُّوْدِيَّة		٤	٦٨	حَزاز الزَّان
	١	41	ةُ الدِّيْنار		વં	٧١	خزاز عِطْرِي
	١	174	ة الدِّهَب		Ţ	14	حَزاز عُلَيْبِي
	٣	119	ة الذِّهَب		Ÿ	٧٨	حزاز الكلب
	١	98	ةُ الرَّئَةِ المَخْزَنِيَّة		٦	٧١	حَزاز مَأْكُول
	٧	YF	ة الرَّيْح		٧	٧٨	خزاز مُتَحابِك
	١	١	ةُ الزُّلْبَق		7	٧١	خزاز المَنّ
	١	98	لهُ الزُّجَاجِ المَخْزَنِيَّة		١	14.	خشن المراه
	١	470	ة الشُّعَال		٣	77	خُسَيْكَة
	١	9.8	ةُ الشِّفَاء			75	حُسَيْكَة ثُلاَثِيَّة التَّشْرِيْم
	١	444	ة الصَّفْر		٣	75	خُسَيْكَة شُغْراء
	٣	19	له الطُّوخ		٣	77	حُسَيْكَة مُشِعَّة
	٧	1 8	ية عَقْرَب		٣	75	حُمَيْكَة مُنْحَنِيَة
	٥	ŧo		حَثِيثَ	٣	75	حُسَيْكَة مُؤرِقَة
	١	441	له الغُرَاب		٦	777	چ ٺ رِج
	٥	77.	بة الفَتْق المَرْدَاء		٤	79	حَشَفَةً البرازيل
	٤	787	لة الفَنْق الهُلْبِيَّة		٣	٥ŧ	خشيشة الإبرة
	١	TO 7	لة الفُقَراء		١	۸۸	حَشيشةُ الأَشِنان
	١	444	لة القِزَاز		١	400	حَيْثُمَة الأَفَاعِي
	١	371	بة القَلْب • -		٦	٤	خشيشة الأنغى
	١	771	لة الكُلّاب	• • •	٤	74	حشيشة آلاغ الرَّمْداء
	١	444	بة الكَيْف		١	108	خشيشة الأرجاع
	0	171	بة الكِيْف	**	١	777	خَشِيْشَة الإوَزّ
	١	78	بة اللَّبَن الشَّائِعة		7	79	خَشِيْشَة البَراغِيْث
	٤	2.4	بة اللَّبَنِ المُرَّة		٧	177	حَثِيْشَة البَرَص
	٧	۸٠	له اللَّيْمُون		7	731	خشيشة البِلَوْر
	١	٨٥	بة مُبارَكَة		٣	74	حَثِيثَة التِّنِّينِ التَّيْنَة
	١	144	بة المَكْنَــَة		١	٨٩	حَشْيْشَة الثُّوم
	١	4.14	بةُ المَلاعِق		١	178	خشيشة الجرح
	١	47	لةُ المَلاك		٦	7 • 7	خشيشة الجرح
	١	79	لة المَلِكَة		١	148	حَثِيْثَة الحُرِوق
	۲	٧٠	مَة المَلِكَة أُمّ أُمّ	-	١	737	حَثِيْثَة الحَلَمَة
	١	4 £	لَهُ المُلُوك	- 1	1	X O Y	حَثِينَتُهُ الحُمِّي الشُّرُوْنِيَّة
	٥	Y • A	لَهُ مَهْبُولَة		1	777	حَشِيْشَة الخَطَّاف
	٧	۸١	لَهُ التَّاق		1	179	حَشِيْشَة الخِنازِيْر
670	1	4.	مةُ النَّجَارِيْن	ا خشيث	٦	۸۲	خشيشة الخَنازِير

			1			
ح	مس	<u>مدخل</u> حُمَّيض	٥	<u>صن</u> 79	مدخل	ح ش ي
٣	<u>صن</u> ۲۸، ۲۹		٤	74	حسيسه النجم الرمداء	ع س پ
٤	٧٢	محميض الحمر		411	حَشِيْشَة النَّحٰل	
٤	٧٣	حُمَّيْض جَعْدِيِّ	١	797	خَشِيْشَةُ الهِرّ	
٣	79	حُمَّيْض حادً		771	خشِيْشَة الهِرَرَة	
١	1 • \$	خُمَّيْض الحَفْل		4.4	حَضَض بَرْبَرِيّ	
7	٧٤	حُمَّيض الحَفْل الشَّرقيّ		7.8	خُضَض شائع	
٤	**	حُمَّيْض دَم النَّنين		٤٧	خَفَا	
۲	٧٢	حُمَّيْض زِراعِيّ		707	حَقْٰلِيَّة مِيْثُرِيْدَات	
٣	74	حُمَّيْض سُوريِّ	٦	179	حِكْمَة الجَرَّاحِيْن	
٦	٧٤	حُمَّيْض شَرِّقيِّ		44	حُلْبَة رَوْمِيَّة	
۲	79	حُمَّيْض شَلَبِي		41	حُلْبَة مَزْرُوعَة	
١	١٠٤	حُمَّيْض الصَّبْر		79	حَلِّبُلاب مُسْتَدِير الوَرَق	
٣	٧٠	محُمَّيْض صَغِير الوَرَق		797	حُلْبُوْب	
٣	٧٠	حُمَّيْض ضَيِّق الوَرَق		1	حَلْبُوب حَوْلِيَ	
٦	٧٦	حُمَّيْض ظَرِيْف		٦٥	جِلْنِ ت ِ	
٣	٧٠	حُمَّيْضِ الغَنَم		۸۳	حَلْحَل أَزَبَ	
٥	٧٠	حُمَّيْض كبير الثَّمَر		٨٣	حَلْحَل أَشْعَر	
٣	٧٠	حُمَّيْض لُِبناني		٧١	حَلَزُون كَرْمِي	
0	٧٠	حُمَّيْض لُحْمِيّ الوَرَق		٧٢	ځلو مُر ّ	
٤	٧٤	حُمَّيض الماء		٧٢	حُلْوَة مُرَّة	
٣	٧١	حُمَّيْض مائي	٦	17	خلُّومِيا	
٣	٧١	خُمَّيْض مُتَكَثِّل	٣	٥٦	حِلْيْت	
٥	٧٠	لحُمَّيْض مُسْتَثِر		79	خماجم	
٤	٧٤	حمَّيْض مُسَنَّن		٨	حِمار أرْمادِيْلًا	
٤	٧٤	حُمَّيْض المَناقِع		77	حِمار البَيْت	
٧	٨٤	حُمَّيْض مُنفرِجُ الوَرَق	٣	77	حِمار قَبَّان م	
٤	٧٤	حُمَّيْض النيال	٤	197	حُمّاض أَرْجُوانِيّ	
1	1.1	ٔ حُمَّيْضَة حُمَّيْضَة	١	78 A	حُمَّاض الأَرْنَب	
۲	٧٢	خميضة	١	١٠٤	حُمَّاض إِسْبَانَخِيَ	
٣	٧٢	حِنَّاء مَنْزُخَة	١	1 • 8	حُمَّاضِ الطَّبْرِ	
١	1 • 0	حُنْتُم حَنْدَقُوْق أَبْيَض	١	1.1	حُمّاضُ العِيْد	
4	٧٣	خَنْدَقُوْقَ ابْيَض	٥	177	حَمَامًا	
1	1 • 0	حَنْدَقُوْق حَقْلِيَ	1		حَمْبَلاس أَبْيَض	
٣	337	ُ جِنْطَة تَتَوِيَّة جِنْطَة سَوْداء	١	1 • ٢	جِمْجِمٌ مَخْزَنِيَّ جِمْجِمَةً مَخْزَنِيَّة	
ξ	• 37	حِنْطة سَوْداء	\	1.4	جمجمة مخزية	
١	1.7	حَنْظُل حَنْظُل مَخْزَنِيٌ خنيځنه حَنْيځنه حَوْجَم	٦.	88	خُمَر حَمَرايَة حِمَّص	
١	1 • 7	حَنْظُلُ مَخْزَنِيّ مُ	1	۳٦٠	خمراية	
٥	7.7	خييخنة	۳	٦٧	ج مص ۔ .	
۲	7.47	ا خوجم	۲	3.5	خُمْض	573

خ ر ط	ح	ص	مدخل	_ج	ص	مدخل
_ , _	<u>ح</u> ۱	صن ۱۱۰	خُبَّازَة بَرُيّة	ج	من ۷۴	حَوْدَان
	٧	٨٨	خُبَّازَة خُطْمِيَّة	٤	٧٥	حَوْدَان
	٤	YY	خُبَّازَة مُسْتَدِيْرَة الوَرَق	٦	77	حَوْدَان آسْبَوِيّ
	٤	771	خُبّازة مِسْكِيّة	۲	¥ ¥	حَوْدَان حِرِّيْف
	٥	**	خُبَّازَة مِسْكِيَّة	٧	٨٥	حَوْدَان شِرْير
	*	77	خُبّازَة مَغْرِبِيَّة	٧	٨٥	حَوْذان شَقِيّ
	١	11.	خُبَّازَى الغاب	٥	٧١	حَوْذان كُرَوِيّ البزرة
	٣	٧٥	خُبْز خُبْز الغُراب	٥	٧١	حَوْدَانِ مائيّ كرويّ البزرة
	٦	177	خُبْز الغُراب	٤	٧٥	حَوْر أَبْيَضَ
	7	15	خُبْز القَاق	١	1.4	حَوْر أَسْوَد
	٦	77	خُبْز المَشايخ	١	1.4	حَوْر بَلَدِيّ
	١	111	خُبَيْزَة مَخْزَنِيَّة	٦	VV	خَوْر بَلْسَمِيّ
	٣	٧٥	خُبَيِّزَة وَرْدِيَّة	۲	٧٥	حَوْر رَجُراج
	١	1	خُنْرُق	1	١٠٨	حور رُومِي
	1	117	خَدُّ البِنْت	٦	VV	حَوْر كارولينا
	۲	VV	خُذْرِيَّة سَبِيْنيَّة	1	٣٦٠	حَوْرَة رُوْمِيَّة
	١	114	خُدْرِيَّة هِرَاوِيَّة	٥	٦٥	حَوْك
	٥	* *	خَذَّاق	٤	٧٦	حَوْمان زِفْتِيّ
	٣	77	خِذْراف أَمْرَط	٣	٧٤	حَوْمان غُدِّتي
	۲	٧٦	خِذْراف مُبَقَّع	٣	٧٤	حَوْمان مَغْضِنيّ
	١	444	لخُرَاشَة ِ	7	٥٥	خؤمر
	٧	٨٨	خَرْبَق أَخْضَر	٦	VV	حَيّ العالِّم الحِرّيْف
	۲	٧٨	خَرْبَق أَشْوَد	7	VV	حَيّ العالَم الصَّغِيْر
	٧	۸٩	خَوْبَق أَمْرَط	٧	7.4	حَيّ العالِّم المِكْوار
	٧	۸٩	خَرْبَق الشَّرْق	٧	AV	حَيّ العالَم الوَرْدِيّ
	٧	A4	خَوْبَق مَخْزَنِيّ	7	VV	حَيُّوْن حِرِّيْف
	٧	۸۹	خَوْبَق مُنَقَّط	٧	7.4	حَيُّون مِكْرار
	٣	VV	خَرْبُق نَجِس خُرْبُوق أَبْيض	٧	AV	حَيْون وَرْدِي
	۲	٧٩	خُرْبُوْق أَبْيُض	١	78	خَابُور
	١	۱۳۸	خَرْخَفْتِي خَرْدَل أَبْيَض	Y	٧٦	خاتم سُلَيْمان المَخْزَنيّ
	۲	V9	خَرْدَل أَبْيَض	۲	40	خالِدَةُ الجُزُر
	1	118	خَرْدَل أَسْوَد		184	خالِف وَالِدَيْه
	1	የ ፖኒ	خَرْدَل مِيثْرِيْدَات	١	171	خاما أقطي
	۲	٨٥	خَرَز الخَوْخِ خَرَز الصَّخُور	٦	331	خامادَرِيُوس
	١	148	خَرَز الصَّخَور	٣	114	خامِشة
	٣	١٠	خُرْشُوف	١	17	خَانِقِ الفَهْدِ
	٣	٣	خُرْشُوْف	٤	۸۳	خانِقُ الكَلْبِ القُنَّبِيِّ خانِق النَّمِر
	٧	YIY	خَرْشُوف بَرْيّ	۲	48	خانق النَّمِر
¥ Y Y	1	110	خوطال زراعي	٥	77	خايا السنغال

ح	<u>ص</u> ه	مدخل خَشْخاشِبَّة	<u>ح</u> ه	من	ملخل خُرُمُ الجِنْطَة خُرَّمُ الجِنْطَة خُرْنُوب خُرْنُوب خُرْنُوب خَرُوب خَرُوب المِخْنْزِير خَرُوب المِخْنْزِير	خ ر م
٦	0	خَفْخاشِيَّة		٧٤	نخوم	130
١	177	خُشَيْزَك خُصَى النَّمْلَب	٤	V 4	خَرَّمُ الجِنْطَة	
۲	177	خَصَى الثَّعْلَب	٥	٧٣	خَرَّم الحِنْطَة	
١	1	خصى يرمس	١	117	خَرْنُوب	
١	111	خِطَمِي	١	114	خَرْنُوب هِنْدِي	
٤	١٨٣	خِطْمِي سَبْدارِيْفا	١	117	خُرُوب	
٤	٦٧	خِطْمِيّ مِسْكيّ	٧	۳.	خَرُّوْب الخِنْزِير	
٣	۸٠	خَفَّان	٣	VV	حروبه اليهوديه	
٣	۸۰	خَفَج مَبْذُوْل	1	114	خِرُوَع	
۲	77	خَلِّ أَساسيّ	٤	V 4	خِوْوَع	
۲	77	خَلَّ أَصْلِيّ	٥	٧٣	خُرُوَع	
۲	77	خلِّ جَنْريّ	٦	10	خُوَيْس	
١	177	خِلِّة	٤	۸۱	خُزامُ الصَّبَّاغِيْن	
۲	۸۳	خِلْة شَيْطانِيَّة	٥	٧٤	یوی خُرْوَع خُرَیْس خُرامُ الصَّبَّاغِیْن خُرَامَی بَعْرِیَّة	
۲	۸۳	خِلْة كَبِيْرَة	٤	AY	خزامی ذکریّه	
١	175	خَلَنْج أَشُوَد	۲	۸۰	جُزامی مَخْزَنِیَّة	
*	۸۳	خُصَى هِرُمِسُ خِطْمِي خِطْمِي سَبْدارِيْهَا خِطْمِي سَبْدارِيْهَا خِطْمِي مِسْكِي حِطْمِي مِسْكِي حَفَّان خَفِّ أَساسِيْ خَلْ أَساسِيْ خِلَّة شَيْطانِيَّة خِلْة كَبِيْرَة خِلَنْج أَسْوَد خِلَنْج أَسْوَد خِلَنْج أَسْوَد خِلَنْج أَسْوَد خَلَنْج أَسْوَد خَلَنْج مَسْتَحَرِّك الزَّهْر خَلَنْج مَسْتَحَرِّك الزَّهْر خَلَنْج مُسْتَحَرِّك الزَّهْر خَلُود عَنكَبُوْتي خَلُود عَنكَبُوْتي خَلُود عَنكَبُوْتي خَلَاد مَشْعِور خَلُود عَنكَبُوْتي خَمَان صَغِير خَمان عَنْسُون خَمان صَغِير خَمان صَغِير خَمان عَنْسُ	٣	٧٨	خُزامَى مَخْزَنِيَّة	
١	177	خَلَنْج رَماديّ	٣	770	خَــنّ (عصير)	
١	١٨٧	خَلَنْج شَائِع	١	774	خَــنّ البَحْو	
٥	٧٥	خَلَنْج مُتَحَرِّكُ الزَّهْر	۲	۸۱	خَـــنّ بَرِّيّ	
١	371	خَلُود السُّطوح	٣	٧٩	خَس بُسْتانِيّ	
٧	47	خَلُوْد عَنْكَبُوْتي	٥	۲.,	خَسَ الحِمَار	
۲	٨٤	خَلُوْد كَبِيْرِ الزَّهْرِ	۲	۸۱	خَــنَ الزَّيْت	
١	177	خمان صَغِير	٤	AY	خَسُّ السَّمَّ	
٧	٤٨	خَمان عُنْقُودِيّ	٣	111	خَسَّ النَّعْجَة	
١	7.8	خَمان كَبِيْر	١	7.67	خَشَب الأنْتِيْل الأبْيَض	
٥	٧٦	خَمْر خَمَل	٦	144	خَشَب الأنْتِيْل الأَبْيَض خشب بَرْنُود	
١	141	خَمَل	١	۲٠۸	خحشب شؤرينام	
7	170	خَمَل خَمِيْرُ آذار خَمِيْرِ الخَوْخ	٧	77	خَشْب الكَلْب	
٥	٧٩	خَمِیْرُ آذار	١	۲۰۸	خَشَب مُرّ	
۲	٨٥	خَمِيْر الخَوْخ	٣	3.7	خَشَب اليانِسون	
١	144	خَمِيْرَة البِيْرَة	١	119	خَشْخَاش أَبْيَض	
١	144	خَمِيْرَة الجِعَة		۸۰	خَشْخَاش أَرْغَمُونِيّ	
7	۸۱	خَميرة الدار	١	171	خَشْخاش أَعْمَى	
١	179	خَنازِيْرِيَّة عَقْداء	١	171	خَشْخَاش بُسْتانيّ	
7	٨٢	خَنَازِيرِيَّة المَنافِع خنشار أُنْثَى	١	119	خَشْخَاش زَبَدِي	
٥	۸٠	خنشار أنثى	٧	91	خَشْخَاش لُبْنَان	
٣	٨٨	خنشار کبیر	۲	AY	خَشْخاش مُقَنَّب	
۲	٨٥	ا خَوْخ	١	171	خَشْخَاش مَنْثُور	473

د ل ب	<u>ج</u> ۱	<u>ص</u>	مدخل	ح	ص	مدخل
• • •	1	177	دُرَّاق	ī	171	<u>مدخل</u> خَوْخ بَرِّيّ
	۲	97	دُر َاقَة	١	171	خَوْخَ شائِك
	١	140	دُ رَاقِن	٣	AY	خَوْخ مُجَفَّف
	١	140	دُ رَّاقِن	٤	۸۴	خَوْشَان قُنَّبِيّ
	۲	97	دُرّافِنَة	٧	719	نُحُوْكا
	٦	۱۲۴	دَرّام	٤	Αŧ	خُوْلَنْجان مَخْزَنِيّ
	٤	89	دُ رْتينيا تِرْياقِيّة	۲	۸٦	خِيار م
	١	١٣٨	دَرْدار إنْكُلِيزِيّ	٧	47	خِيار الأُنْتِيل
	١	١٣٨	دَرْدَار حَقْلِيّ	١	114	خِيَاد شَنْبُر
	١	۲.۲	ۮڒڎڔؽؖ	٧	44	خِيار الكُورْنِيشُون
	٧	9.8	دَرْسَت مرده		787	خَيْربُوَا
	٧	Y 7 V	دَرَقَة مُقَلْنَسَة	١	የ ፕለ	خِيْرِيّ أَصْفَر
	۲	9.8	دُرْنُوْق خانِق النَّمِر	٥	V	دَابِرَة
	۲	9.8	دُرْنُوق مِزْمارِيّ	7	7	دابِرَة داتُورَة شائكة
	٧	9.8	دَرُوْس دَرُوْس	١	122	
	٥	۸۱	دِرْوِيْلَةِ ثُلَاثِيَّةِ التَّفْلِيْقِ دِرْوِيْلَةِ ثُلَاثِيَّةِ التَّفْلِيْق	۲	۸۸	دائورة شائِكَة
	٥	۸۱	دِرْوِيْلَة كَنْدِيّة		٤١	دَادي
	٧	9.8	<u>ڍڙي</u> اس		148	دَاذِي
	٧	90	دِرِیْس درِیْمِس مَجِلّان	١	148	دَاذِي رُوْمِيّ
	٥	۸۱	دريْمِس مَجِلّان	۲	۸۹	داذِي زَعْتَرِيّ الورق
	٥	۸۱	دريْمِس وِنْثَر	١	148	دَاذي مُخَرَّم
	٦	90	دَسَم الكَريتَه		۸۴	داذِي مَخْزَنِيّ
	۲	۲٥	دِفْلِي صَفْراء		170	دَارْصُوْص -
	١	129	دِفْلَى مَبْذُوْلَة		٤١	دبّاء الهِنْد
	٥	AY	ا دَفْتَهُ	٦	70	دَبّاء الهند
	٥	۸۳	دَفْنَة تِيْمِيْلِيَا	١	۳۸۲	دَبَّاب
	٥	٨٥	دَفْنَهَ زَيْتُونِيَّة	۲	44	دَبَح زِراعِيِّ
	٥	٨٥	دَفْتَهَ زَيْتُونِيَّة الوَرَق	١	***	ڍ بُق
	٥	٨٢	دَفْنَهَ سامَّة		444	دِبْق دِبْق ابْیَض دَبُوْن
	٧	779	دَفْنَهُ سامَّة		40	دَبُوْن
	٥	ΑY	دَفْنَة عُوْد الغار	١	444	دِثَار النِّــاء دُخّان الفُوْج
	٥	A£	دَفْنَهَ قَاتِلَة		17	دُخَّان الفؤج
	٥	٨٢	دَفْنَة لاحِفَة		454	دُخّان هِنْدِيّ
	٥	٨٥	دَفْتَهُ لُبُنَان		٩.	دُخْن
	٦	٨٤	دِقْتَمُونَ أَبْيَض		٩١	دُخُن أَصْفَر
	٧	101	دُفَفَت	۲	91	دُخْن إِيْطالِيّ
	٥	181	دَقِيْق	4	91	دُخُن شائِع
	٦	7 2 7	ُ دَقِيْق دَقِيْق دُن	۲	91	دُخْنُ العَصافِيْرِ
244	٣	117	كُلُبُوت شائع	۲	47	دُخُن مُنْبَسِط

		ı				
<u>c</u>	من ٩٤	مدخل دِیْجِیْنال صُوْفِیٰ	<u> </u>	<u>من</u>	مدخل دَلْهَفَان	د ل ه
٤	9.8	دِيْجِيْنَال صُوْفِيّ	١	177		
٥	۸۹	دِيجيتالين مُتَبَلِّر	١	18.	دَلِيْك	
٥	49	ديجيتو كسوسيد	٣	10, 451	دَمَّ الأَخَوَيْن	
٥	٨٩	ديجيتوكسين	٧	9٧	دَمُ الْأَخَوَيْن	
٥	٩	دَيْس العَرَب	٧	9٧	دَم التِّئيِّن	
٣	AV	دِيْش أَصْفَر دِيْش أَمْرِيْكِيّ	٧	9∨	دَم الثُّعْبان	
٣	۸V	دِیْش أَمْرِیْکِيّ	٤	198	دَمَّارَة	
٣	AV	دِيْش مُرَّانِيَ		70.	دَمانيُوم	
٣	**	دِیْشار	١	18	دَمْدَمُوْن	
٤	9.8	ديڭۇروا الحُمَّى	١	1	دَمْسِیْسَة دَمْع أَيُوب دَمَوِيَّة دَمْیانا	
٣	41	ذُرّاح ناعِظ	٣	14	دَمْع أَيُوب	
٤	97	ذرّاح ناعِظ	٣	144	دَمَوِيَّة	
١	184	ٰ ذُرَة شامِيَّة	٤	٨٦	دَمْیانا	
١	184	ذُرَة صَفْراء	ŧ	٨٦	دَمْيانَه	
١	AF/	ِ ذُرْفَة	ŧ	٨٦	دُمَيْصٌ ثُمانِيُّ البَتَلات	
۴	91	ذُرْنُو ح	٧	4.8	دَنْتَارِيا رِيْشِيَّة	
٣	91	ذُرْفَة دُرْنُوح دُرُوح ذُرَيْرَة ذَعْلُوْق	٤	۸V	دَنْد المُلُوك	
٤	٩	ۮؙۯڽ۫ۯؚۘۊٙ	٤	777	دُنْدُل مِسْكِيّ	
٣	97	ذَعْلُوٰق	٣	٥٤	دَهامِين شَوْكَرانيّ	
٥	70	﴿ ذَقْنِ الباشا	٥	107	دَهَامِين مِسْكيّ	
١	***	ٰ ذَنَب الخَيْل	١	198	دَهَق	
٣	14	ذَنَب الخَيْل	1	11.	الدَّهْماء	
1	***	ذَنَب الفَرَس		47	دُهُون	
٣	١٩	ذَّنَب الفَرَس	1	V 4	دَوَاء الحَيَّة	
٤	4∨	ذُنْیان جَبَلِ <i>يّ</i>	٤	97	دواء عَسَلِيّ	
٦	٨٩	ذُؤنُون خَفِيّ	1	181	دَوَّار الشَّمْس	
٤	9.4	رَاتَانِيا البرازيل	۲	דדו	دَوَّارِ الشَّمِس	
٤	٩٨	رَاتَانِيا الْبَارِا	٣	7.	دُوبُوازِي ا	
٣	97	راتانِيا ساڤانِيْلَة	٣	٤٥	دُوبُوازِيا هُوپُؤُود	
٣	94	راتانيا غرناطة الجديدة		94	دُ وبُوازِی ْن	
٧	1 + 8	راينْج رَايَنْج المُصْطَكَاء	١	977	دَوْسَة الحِمَار	
٦	377	رَاتِنْج المُصْطَكَاء	٤	٥٥	دُوْقُس	
٧	3 • 1	راتِنْجات راحَة الأسَد	٣	AY	دیائتیرا صَدْرِیّة	
٦	۸١	راححة الأسد	٥	177	دِيانْتِيرا صَدْرِيَّة	
1	178	رَادِن	١	187	دِيْجِيتال أُرْجُوانِيّ	
١	771	رَاذِقِي رَأْس الثَّوْر	٥	٨٨	دِيْجِيتال أَرْجُوانِيَّة	
٣	79	رَأْسِ الثَّوْر	٦	۸V	دِيجِيْتَال أَرْجُوَانِيّة	
٥	90	رَأْس جِنْجِم مُزْهِر	٧	1 • 1	ديجيتال أرْجُوانِيَّة	
٧	7 • 1	رأس الدُّوري	۲	1.7	دِيْجِيْتال أَصْفَر	٤٣٠
						• '

				ı		
ر و ب	<u>ح</u> ٦	<u>ص</u> ۱٤٧	مدخل رِجُل القُبَّرَة	ح	<u>من</u> ۲۱	مدخل
-, -, -,	7	184	رِجُل الفُبَّرَة	۰	71	مدخل رأس الشَّيْخ رَأس العُصْفُور
	١	37	رِجْل القِطِّ الشَّائِع		194	رأس العُصْفُور
	١	777	رِجُل اللَّبُوَة	٧	70	رَاسَن البَراغِيْث
	١	37	رِجُل الهِرَ الشَّائِع	7	1.4	راسَن الجِبال
	٣	۴	رُزِ	١ ١	189	رَاسَن طِبِّي
	٧	144	<i>د</i> َزُيْن	١	189	رَاسَنِ هِيلانَة
	٤	1 • ٢	رَشاد	٤	1.5	رافانالّة
	٤	AF	رَشاد برُّيِّ	٥	40	رَامَه
	1	۸۸	رُصَاصِيَّة أُورُوبِيَّة	٥	97	رَامَه بيضاء
	١	117	رَصَنٌ هِرَاوِيّ 	٥	47	رَامَه خضراء
	٣	89	رُ مُلْبَة	٥	90	رَا مِي
	٧	977	َ رَطْبَة	٥	47	رَامِي بيضاء
	٤	1.5	رُعامَة	٥	97	رامي خضراء
	٤	1.4	رُعامَی	٤	99	رامِیْجِیا بُوْرْدِي
	1	777	رَغْبَل	٤	44	رَامِيْجِيا تريانا المُزَنَّدة
	۲	1.4	رَعْراع أَيُوْب رِعْي الحَمَام اللَّيْمُونِيَ	٦	747	رَانِج راوَنْد
	1	404			99	راوَنْد •
	1	301	رِغْيُ الحَمامِ المَخْزَنِيّ	٦	۹.	راوَنْد
	٧	١٨٠	رُغْل طارِد للدُّود		1.0	را وَنْد •
	٦	۸١	ُ رَقَف	٥	4٧	رَاوَنْد ذَكُر
	۲	7 2 9	رَقِيبِ الشَّمْسِ الأوروبِّيّ	٦	44	راوَنْد راحِي
	٥	۲	رُكَب الجَمَل رُكَّة	٧	۱۰۸	راوَنْد رِيْباسِيّ
	١	100	ا رُکَّة	٧	١٠٨	راوَنْد صِیْنِيّ
	7	7.7	ِرِکْفَة	٥	4.8	راوَنْد فلسطين
	٣	47	رُکُو	7	91	راوَنْد القُضْبان
	١	٤٠٠	رُمَّادَه أو رُمَّدَه	7	97	رَاوَنْد كَفِّيّ
	١	107	رُمَّان	٧	١٠٨	راوَنْد مَخْزَنِيّ
	۲	3 • 1	رُمَّان	۲	74	رِئُوِيَّة السُّنديان
	7	74	رُمَّان الأنْهار	٧	1 • ٨	رِباص رَبَاطِيّة خَوْخِيَّة الوَرَق
	Ĵ	119	رُمَّان السَّعَالَى	٧	1.4	
	۲	١٠٤	رُمّانة	7	10	رَبَاطِيَّة غارِيَّة
	٧	١٠٩	۔ وَمُوام	1	101	رَبُرَق رَتَانِيا مَخْزَنِيَّة
	٧	١٠٩	رَمْوَم		107	رَتَانِيا مَخْزَنِيَّة
	٤	777	رَمْغِيُوس (الخشب)	٣	9.8	رَتَم رَتَمِي
	١	٣	رَمْلِيَّة حَمْرًاء	7	737	رُتَّم رُتَّمِي رِجْل الأَرْنَب رِجْل الأَسْد رِجْلِ الإَوْزِ البَيْضاء
	٤	3 • 1	رَمَهُ رَنْد شَائِع رَنْد الشُّعَرَاء رُوْبِيْنِيَة سَنْطِيَّة	١	777	رِجُل الأَسَد
	١	701	رَنْد شَائِع	٥	*	رِجُلِ الإوَزُ البَيْضاء
	١	401	رَنْد الشَّعَرَاء	١	301	رِجُلُ الحَمَام رِجْلُ الذَّنْب
173	۲	1.0	ا رُوْبِيْنِيَة سَنْطِيَّة	١	114	رِجْلَ الذُّنْب

			ı			
<u>ح</u>	ص	مدخل	ع	مس	مدخل	رور
٥	<u>ص</u> ۴٤	مدخل زَرَّشَك لُبُنان	١,	من ۱۸۹	مدخل رُوْر	
۲	175	زُرْنَب زَرَنْبُوك فِيرجِينية زَرَنْبُوك فِيرجِينية	٣	47	رُوکُو	
٣	99	زَرَنبُوك فِيرجِينية	٤	44	رَوَنْد	
٦	97	دَرْنَیْنغ زرْنِیْقَة زَمْنَر	٦	٩.	رَوَيْد	
٥	10.	ٔ زُ رِیْقَة	٧	1.0	رَوَنْد	
7	97	ا زُعْتَر	۲	1.4	رُوْوُلْفيا الأَفاعي	
٧	117	زَعْتَر إسْبانِيّ	۲	1.4	رُوْوُلْفِيا مَدّادَة	
٦	4٧	زَغْتَر رَسْمِيّ		1 • A	رِیْباس	
٧	114	زَعْتَر مُنتَفِخ الرّأس	٥	٦٥	رَيْحَان	
٥	99	زُغْرُور زُغْرُور أُحَادِيّ المِدَقَّة	١	۲.	رَيْحَان أَبْيَض	
١	171	زُغُرُور أَحَادِيّ الْمِدَقَّة	١	3.7	رَيْحَان الأرْض	
1	171	زُعْرُوْر الأَوْدِيَّة زُعْرُور سِيناء	۲	44	رَيْحان الأَرْض	
٥	1	زُغُرُور سِيناء	٥	71	رِیْحان سُلَیْمان	
٧	118	زُغْرُور شائِك		٧٦	رَيْحَان صَعْتَرِيّ 	
7	1	زُغْرُور عادِي		19	رَيْحَان قَرَنْفُلَيّ	
٦	1.1	زُغُرُور مالِس	٣	V	ريزوم لُوْف الحَيَّة	
1	171	زُغْرُوْر وَحِيْد البِزْرَة	١	197	رِيكْلِيس مَخْزَنِيّ	
١	177	زَعْفَرَان مَخْزَنِيّ		177	رَيْهُفَان	
٥	1.1	زَعْفَران مَخْزَنيّ	٥	1 • 1	رَيُهُمَّان	
١	177	زَعْفَرَان مَغْرُوْف		109	زان شائ ع	
٥	1.1	زُعْفَران مَعْروف		109	زان مَعْرُوف	
١	170	زُغْدَة مَخْزَنِيَّة		۱۰۸	زانّة	
١	171	ز غٰلِیْل .	٣	99	زَبادَة أَفْرِيْقِيَّة زَبادَة الهِنْد	
٧	٨٥	وحییں زغیلیل الفشق زغیلیکة ذفوین زفیر	٤	١٠٦	زَبادَة الهِنْد	
١	787	ا زِغلِيْلة	٦	90	زُبْدَة البَاسِيَّة الطَّويْلة الوَرَق	
٥	1.4	ا ذفرین *:	٦	90	زُبْدَة الكَريتَه	
	1.4	َ زِفَيْرِ ا	٤	181	زَبِيْب بَرِّي <u>ٓ</u> مُسَمَّ	
1	777	ٙ زِکْبَا ا مَعْ ا مَهُ	1	11	زُبيَّدَة	
٦	7 2 7	زِّگُون / زَكُون زَلائِف المُلُوك	٤	۸٦	زِداع شابِق ۔ • .	
7	17	زلائِف الملوك	٧	111	زَ دُوا ر تَهِيَّ بِهِ سِي	
٦ -	117	ا زلم تُأْم يره	٦ ٧	47	زَرَاوَنْد البرازيل مَارِيْ مُورِد	
٦	147	ِ زَلُوْعِ صَغِيْر مِنْ	V	117	زَراوَنْد ثُعْبانِيَّ زَراوَنْد ثُلاثِيِّ النُصوص	
1	110	ا زمیر تاب کامر	٧	117	زراؤند تلاتي الفصوص	
١	177	زُلُم زَلُوع صَغِيْر زُمُّيْر زَنْبَق أَبْيَض زَنْبَق أَجْمَر	٥	99	زَرَاوَنْد دَقِیْق زَرَاوَنْد طَوِیْل	
۲ ,	۱۰۸	ا زنبق اخمر ایمار ایمار	0	99	زراوند طویل دراین سرویل	
1	190	زَّنُبَق أَزْرَقَ زَنْبَق أَيَّار	۷ ,	117	زَراوَنْد كبير الزَّهْر زَراوَنْد مَلْمَوِيَّة	
,	174	زنبق آیار زَنْبَق مار یُوسُف	`	17.	زراوند ملعویه کارٹ ک	
١	177	ſ		٩٦	زَرَاوَنْد نَتِن تَعْمَاء	
۲	1.4	ا زَنْبَق مَرْتَغُوْن	١	£ £	زَرْشَك	247

				ı		
س ت ر	<u> </u>	ص	مدخل	ح	<u>ص</u> ۱۶۸	مدخل
J - U	1	ص ۱۷۱	زَيْزُمُوْن صَغِيْر الوَرَق	١ ١	171	زَنْبَق الوَادِي
	٥	1.0	زَيْزَفُون صَغِيْر الوَرَق	1	189	زَنْجَبِيل شاميّ
	٧	119	زَيْزَفُون صيفيّ		374	زَنْجَبِيْل الكِلاب
	٧	119	زَيْزَفُون عَرِيْض الوَرَق	۲	1 • 4	زَنْجَبِيْل مَخْزَنِي
	١	171	زَيْزَفُون الغَاب	٦	1.4	زِنْزَلَخْتِ
	٥	1.0	زَيْزَفُوْن الغَاب		99	زَهْرِ النَّلْجِ
	١	171	زَيْزَهُون قَلْبِيّ الوَرَق	١	170	زَهْرِ الرَّبِيْعِ العِطْرِيِّ
	٥	1.0	زَيْزَفُون قَلْبِيّ الوَرَق	١	٥٥	زَهْرِ الفِصْحِ المُعشَّر
	٧	119	زَيْزَفُون كَبِيْر الزَّهْر	١	187	زَهْرِ الكَشَاثْبِيْن
	۲	47	زُيوت دُهْنِيَّة		77	زَهْر المَييح
	۲	47	زُيوت طَيّارَة	١	٣٠	زَهْرَة الآلام الحَمْراء
	٤	1	سابينا	٥	3.7	زَهْرَة الآلام الزَّرْقاء
	1	197	سَاتَرَ اج	٦	14	زَهْرَة الآلام المُرَبُّعَة
	į	٤	ساتين	١	٥٩	زَهْرَة الثَّالوث
	٥	371	سادِج	٥	1.4	زَهْرَة حِنْجِم
	۲	14.	سامتفواس	١	١٦٥	زَهْرَة الرَّبِيْع المَخْزَنِيَّة
	۲	17.	ساصفرا	٥	4.8	زَهْرَة الساعَة
	7	١٠٩	سالينُم المَناقِع	١	17	زَهْرَة العُطَاس
	٥	140	سَبّاتِيا مُقَرَّنَة	١	7.4	زَهْرَة الفِصْح
	١	۱۷۲	سَبَال مَكْسِيكِي	١	٨٢	زَهْرَة المَسَاء الجَمِيْلَة
	١	177	سَبَال مِنْشارِي	٣	1	زُوْفا
	٣	١.	سَبانَخ	٤	1.7	زُوْفا
	٧	179	سَبَدِيْل مَخْزَنِي	٣	17	زيت الأرطس
	٤	777	سِيِسْتان أو مِقْساس (الخشب)	٦	90	زَيْت البَاسِيّة الطُّويْلة الوَرَق
	٣	٥٥	َ سَبْع كَبِيْر سَبُّوفَة	٣	1 • 4	زينت المخزوع
	١	7.8		٤	179	زيت الكاد
	٤	94	سَبُوْل	٤	1 • 9	زَيْت كَبِد المُورَة
	٦	1 • 9	سَبُوْلِ صَغِيْر	١	14.	زَيْتُون
	٦	1 • 9	سَبُوْلَة		110	زَيْتُوْن
	٧	178	سبيجاليّة طاردة للدود	٧	779	زَيْتُوْن الأَرْض
	٧	178	سيجالية طبية		٨٥	زَيْتُون البَرّ
	٤	111	سبيجالية ماريلاند		114	زَيْتُون بَرِّيِّ
	٥	٧٢	سَبُّيدَج		119	زَيْتُوْن عِطْرِيّ
	١	01	سِتَ الحُسْن	٧	119	زَيْزَفُون أَنْش
	٣	37	سِت الحُسْنِ	1	171	زَيْزَفُوْن بَرِّيْ
	1	178	مِشْرَارِيَة إِشْلَنْدَة ستروفَنْتُوس أَمْرَط	٥	1 . 0	زَيْزَفُون ذَكَر
	٧	170	ستروفنتوس أمرط	٥	1.0	زَيْزَفُون الشَّتاء
	۲	14.	ستروفنتوس ألهلب	1	171	زَيْزَفُون شَتَوِي
277	٧	170	ا ستروفَنتُوس الغابُون	٧	119	زَيْزَفُون شَجِيْح الزَّهْر

			1			
<u> </u>	<u>صن</u> ۱۲۵	مدخل سَرْخَس مَلَكِيّ	<u>ح</u> ٤	<u>ص</u> ۱۱۱	مدخل سنروفَنْتُوس گُمْب	س ت ر
۲	170			111		, ,
٦	118	سِرْفِل سِرْفِل بَرِّيّ	V	140	سترِيكُنُوس إِيْنياس	
٦	114			144	ستريڭئوس جَوْزِ القَيْء	
٤	114	سِرْفِل بَقْلِيِّ		Y 7A	ستريڭنُوس غُلْطَادِيّ	
7	118	سِرْفِل عَسْقَلِيْ		177	سَخُلَب سَخْلَب أَبْقَع سَخْلِب ذَكُر	
٣	1 • ٨	سِرْفِل عَطِر		11.	سخلب أبقع	
٦	115	سِرْفِل الغاب		174	سَخُلُب ذَكُر	
۲	14	يبرُفِل مُبْطِي	۲	371	سَخْلَبُ مُورِيُو	
٥	1 • ٨	سَرْفِل لُبُنانَ	۲	371	سَحْلِبُ مُوْرِيُو كُبْنَانِيّ	
١	۱۸۰	سَرْمَق أَبْيَض	٣	7	سخلب الهند الغربية	
V	177	سَرَّنْتَة صَغِيْرة		۸۳	شدا	
٧	174	سَرَنْتَة كَبِيْرة	٣	140	ميدر	
*	177	سَرُّو شائِع	٦	111	بيڈر	
٦	**	سَرِيْش أَبْيَض	٧	100	سِڈر بَرِّي	
٦	7.4	ر سَرِيْش أَبْيَض سَرِيْش ناسوريّ سَرِيْش ناسوريّ	٣	117	سَدْرُون	
۲	177	سَطاخِيْسُ الغاب		111	ئ ذاب	
٦	110	سطاخيس الغاب	١	7 • 1	مَذَابِ البَرِّ	
£	118	سطاخيس المناقع	٤	111	سَذاب شَلَبِي سَذاب قُنَيِي	
٦	118	سَطاقِس دَرَنِيّ	٤,	114		
٥	١٠٩	سَطاقِس سُنْبُلِيّ		411	سَذَاب الماعِز	
7	177	سطاقِسُ الغاب	l	140	سُٰذَاب مَخْزَنِيّ	
٦	110	سطاقس الغاب	l	111	سُذاب مَخْزَنِيّ	
٤	311	سطاقس المناقع		177	سَرَّابيه	
٥	1 • 4	سطاقس متتصب		140	سِرَاجِ الغُوْلَةِ الخَرِيْفِيّ	
٦	118	سطاقس اليابان	٤	V 4	سِراجُ القُطُوُب	
۲	119	ميطرك	٤	۲.٧	سرَاج الغُوْلَة الخَوِيْفِيّ سِراجُ القُطْرُب سِراجِيَّة سَرَّازان تَتَوِيَّ	
٧	111	ستطوال	٣	337	سَرَّازان تَتَرِيّ	
٧	177	<u>سَعلورِيُ</u> ون	٤	78.	سَرَّازان شافِع	
١	۱۸۰	شعّادَی الرَّمْل شعّالی	7	17	سُرَّة	
١	770	شعَالَى	7	17	سُرَّة الأرْض	
۲	144	مُنغَثَرُ البَرّ		337	سُرَّة البَحْرِ الأسيويَّة	
7	4٧	سَغْنَر شَائِع		17	سُرَّة البُرْتُغال	
7	117	شغد الحُصْر	۲	10	سُرَّةُ السَّحَر	
٧	174	شغد الخيير شغد شرقي	٣	۲	سُرَّة النَّجَفِ	
Y	174	شغد شَرْقِي	٥	۱۰۸	مترُخِس البَلُوط	
٥	1 • 4	شغد طَويل		77/	سَرْخَس ذُكُر	
٥	١٠٩	شغد عطير		174	سَوْخَسَ عِشْ التُّرّ	
٦	711	سُعْد مَاكُول		1.4	سَرْخَس لِحاء الغُوْل	
V	144	أ شُغْد مُسْتَدِيْر	١	174	سَوْخَس مَخْزَنيّ	373

	<u>5</u>	<u>صق</u> ۱۳٤	ملخل سَلْسَفِيْل المَرْج الله أنّد الماري	٥	<u>من</u> ١٠٠	مدخل سَفْدَه
	,	777	ستسويل العرج شُلُطَان الجَبَل		٣.	اسفله
iki (20 qirilda Mhadara 120)	,	10.	ر شنگان الجبل	v	179	المنطوط الكفّارا الكفّازة
	٦	114	-i.	۲	174	سعيل محربي
	٤	V£	سَلْغَة سِلْق سِلْق بَرِّيَّ سِلْق بَرِّيَّ		177	ستعد سَفْدِيْل مَخْزَني سَفَرْجَل سَفَرْجَل هِنْدِي
	7	114	َ صِنْقُ کبیرِ الثَّمَرِ اَ سَلْقُ کبیرِ الثَّمَرِ		110	حرب يبيي سَفَرْجَلَة
	١	148	يلق مُفلِم	7	£ Y	حربــــ سَفَرْجَلَةُ البَنْغال
	1	148	سلقة	1	141	سَفْرَس الحَصَى
	٧	۸۲	سِلْفِيَّة سِلْبُنَّة	۲	14.	سَفْرَس الحَصَى
	٥	071	مَلِيْخَة نَجْب	۲	171	حَفْرَس ميبيريا
	1	17.	سَمَّ الأَرْض		1.4.1	ئىقى ئىللى شفْرَس الظُّلِّل
	1	179	سَمُّ الحمار		171	سَفْرَس قاس
	٥	117	سُم الصّل الهِنْدي		۱۳۱	سَفْرَس قَلْبِيّ الوَرَق
	0	115	سُمُّ الكُوْبِرا		1.4	سَفْرَسَ مُثْلَثُ
	٥	117	شتم فَاغِران	۲	144	مَنْوَس مُسْتَدِيْرُ الوَرَق
	٥	114	شم نَجا الهِنْدِيَّة	١	141	سَفَنْكُر لاسِع
	7	111	سَمَار حُلُو	Ì	PAT	مَنَفُنْدَلْيُوْن مَنَفَنْدَلْيُوْن
	٦	179	سَمَّارَة الحِكْمَة	Υ,	141	سَقَمُوْنِيا
	,	١٨٥	سَمَارَة مَخْزَنِيَّة		1.4	<i>سَقَمُ</i> ونيا
	٦	114	سُمَّاق ثُلاثِيِّ الوَرَق	٦	114	سَقَمُونيا المَكْسِيك
	Y	14.	سُمَّاق جُحالِيّ	1	PAY	سَكَ الحَمام
	•	117	سُمَّاق الدَّبَّاغِيْن	٤	117	سَكَابِيُوْزا مِنْوْتْحِينْزا
	٦	119	شقاق سام	Y	14.	سكابيُوزة أُوْكُرانِيَة
	7	114	شتاق شايك	٣	11.	سَكابِيُوزَة حَقْلِيَّة
	۲	140	سُمَّاق الصُّبَّاغِين	٧	14.	سكايبُوزَة فِضَّيَّة
	7	114	سُمَّاق مُتَجَلِّر السَّاق	٦	117	سكابيُوزَه فِلَــْطِينِيَّة
	٥	117	شنبل يشكي	٤	117	سَكَبُ الغَرُب
	٤	747	مُشْبُول مِسْكِيّ	١	70	ش ِخُوان
	٥	٤٠	مُمْبُونَغ بَلْسَمِيّ	٦	77	شکع
	,	7.67	شَمْرُوْيَةً مَرَّةً	Υ	177	شکع ازجُوانِيِّ ويَّ مُوهِ
大文学	1	114	شنستن	Υ	177	شکع اوروزی
	7	119	بينسم	1	14.	سُكُع جَزِيْرَةُ القصَّ . : هم أَنَّ
	•	1 • 4	ا شخشیقا	٠	140	شلبون قزِم . أم
	,	444	سَمِفِيطن مخزني	1	717	مَنْلَبُوْتُ كَبِيْرِ مَا يَعِيْمُ مِنْ مِنْهِمِ
H *	4	۲.	ا شمن کونترا ء کے گئی		140	متلبية صغيرة
	7	111	ا شمن دونترا ا دوی	1	717	سَلبِیه کبِیرهٔ داد دد
	٥	14.	س نه د ۱۰) **	377 771	سلبِين مريم مُأْدِ
	١	144	منویرنوم و رو	1	178	سخران شكع أدجُواني شكع أددُونين شكع جزيرة القص سنابُوت قرِم سنابُوت كبير سنابية كبيرة سنابين مَرْيَم سنابين مَرْيَم سنابين مَرْيَم
	,	1/14	شنبول مشكيّ شنبونغ بَلْسَييّ سنبروية مُرَّة سنست سنسية سنسية سنمن كونترا سمن كونترا شمن كونترا شمن خونترا شمن خونترا شمن شهني	•	11 6	مىلسىپيل

_		مدخا	_ ا		مدخل
<u>ح</u> ٤	<u>من</u> ۱۱۸	مدخل سِنْدِیْل (ثمرة ال)	2 4	<u>من</u> ۱۱۲	<u>سا</u>
v	177	سنط أبيض	٠	118	ئنا
v	177	حند الميس منط أزرق	,	۳.,	ست سَنَا بَرِّي
٥	114	سَنْط أَطْحَل	,	۳.,	ے بری سَنَا گاذِب
٥	114	منظ أفتف	,		ت دیب سَنْدَر أَیْیَض
٦	371	سنط دَمّاع	۳	117	سَنْدَرُك
٥	114	سنط رنحو	۳	115	سِنْدَرُوس
٥	114	سَنْط السَّنغال	0	110	سَنْدَرُوس
٥	111	سَنْط شائع	٥	117	رو ن سَنْدَروس استوائيّ
٦	178	سنط صَمْنِي	٥	117	سَنْدَروس بَحْريّ اللّون سَنْدَروس بَحْريّ اللّون
٥	17.	سنط عَرَبِيّ	٥	117	سننگروس تَشمانیا
7	371	ريي منط عَسَليّ	٥	117	رو ن سَنْدَروس درومّون
٦	178	سنط العنبر	٦	177	سَنْدَرُوْس رُباعِيِّ المَصارِيْع
٥	119	سَنْط عَنْبَرِيّ	٥	110	سَنْدَروس رَمْليَ
*	147	سنط كاشو	٥	117	سَنْدَروس سَرْوِيٌ
٣	110	سَنْكُوفُوْلا س	٥	117	سَنْدَرُوس قَرِي
١	TYA	مينتوت	٥	117	سَنْدَروس مُتَطَاوِل
١	414	<i>س</i> َنُوْت	•	117	سَنْدَروسَ مُتَعَارِب
٣	117	متنتى	0	117	سَنْدَروسَ مُثَالَلُ
٥	118	ا متنی متنی	0	117	سَنْدَروس مُعَيَّنيِّ
1	777	مَوْحَر أَيْيُض	٥	111	سَنْدَروس مكلايان
4	107	متؤخر ألحمر	٥	117	سَنْدَروس مِهْمازِيّ
١	141	شؤرَنْجَان الخَرِيْف	٥	117	سَنْدَروس هَزِيْل
٦	140	شؤرَنْجان الخَرِيْف	٦	177	سنيي
٧	177	سُوْرَنْجان الخَرِيْف	٧	171	سِنْدِيان أَبْيَض
V	140	شُوْرَنْجان دُوكاًين	1	174	سِنْدِيان أَخْضَر
١	147	شؤس أمرَط	7	177	مينئييان إشباني
٥	14.	شؤس بيتا بَنَفْسَجِيّ	Y	171	سِنْدِيان أَمْرِيكِيّ
Y	۱۳۸	شوس شائيك	1	774	مينليهان البخر
7	177	سُوْس غُدَّي	V	144	سِنْلِيان البُرْتُغال
١	147	شؤس مَخْزَنِيّ	1	144	سِنْدِيان بَريطانيّ
٤	114	سُوْس مَخْزَنيْ	V	177	سِنْدِيان بُلاخ
٣	110	سَوْمَن ِ	٥	114	سِنْدِيَان شُوْيَر
1	148	سَوْسَن أَبْيَض	7	177	مينييان صِباغِيّ
٣	117	مؤمن باهِت	٧	177	سِنْدِيان العَفْس
١	190	سَوْسَن جِرْمانِيّ	٧	177	سِنْدِيان عُنْقُودِيِّ
١	190	سوسن الحدايق	٥	117	سِنْدِيان الفِلَيْن
١	148	مَوْمَن شَاحِب	٧	177	سِنْدِيان كَسْتَنِيّ الوَرَق
٣	117	ا مَوْمَن شَائِب	1	144	مِنْدِيَان مُزَنْد

ش ب ط	ج	ص	مدخل	<u> </u>	ص	مدخل
- - - -	5	صن ۱۸۹	مدخل سِیْنکُوْنَه	١	<u>ص</u> ۱۹۵	<u>مدخل</u> سَوْسَن شائِع
	1	777	سِیْنکُوْنَه حَمْراء	١	198	سَوْسَن فلُورَنْسَة
	٧	*1.	بيئؤم	٧	١٣٨	شؤشن المناقع
	٧	٧1٠	سِيُوم ضَيِّق الوَرَق	٣	117	سَوْسَن مُثْیِن
	7	7.67	سِيُوم عَرِيْض الوَرَق	v	١٣٨	سَوْقَم الجِبال
	1	٣١٠	شاش القَاضِي	٣	117	سَوْلَع
	١	43	شاطوا	٧	Y 0	سَوْلُعُ (عُصَارة الـ)
	7	744	شاطرية	٦	177	سَوْلَع خَيْلِي
	٣	۱۷۳	شافية	٤	14.	سَوْلَع سُوكُوتُورا
	۲	199	شافيتة مَخْزَنِيَّة	۲	144	مَىوْلَعَ شائِك
	*	7 • •	شافية المُروج	۲	12.	سَوْلُع شَمعدانيّ
	٥	140	شافية هُرُمِينيّة		144	سَوْلُع الكاب
	٧	20	شَاهْبَانَج شاهْبَلُوط	١	٣١	سَوْلُع مَخْزَنِيّ
	٦	144	شالهَبَلُوط	Ϋ.	18.	سَوْلَع النّاتال
	٦	14.	شَاهَتُرَج بَصَليَ صُلْب	۲	١٣٨	مَــــّاف
	1	147	ا شَاهَتُوج مَخْوَنَة	٦	178	سَيال
	١	799	شَاهْدَانِج	١	٣٨٠	مييْرَاس
	٧	77	شاهِشفَرَم	ŧ	180	٠٠ سِيروس
	٤	190	شاوا	٧	189	سِيْروس كَبير الزَّهْر
	1	197	شاي أخْضَر	٤	140	مِسِيريُوس
	1	197	شاي أشوَد	1	7 • 4	سيريُوس كَبِيْر الزَّهْر
	١	TAI	شَاي أورُوبًا	٧	189	سِیٹُسَارُون
	١	71	شَاي البَرَاذِيْل	٣	141	سِيْسارُون بَرِّي
	١	71	شَاي الْپَارَاغْوَاي	4	18.	سَيْسارون كَبِيْر
	٥	۳.	شاي جاوا	٣	114	مَيْسَبان
	٥	175	شاي الحَبَثَة	٧	18.	سِیْسَبان کَبِیْر الزَّهْر
	1	197	شاي صِيْني	٦	174	مَيْمَم أَرُنْمِيُوم
	٥	175	شَاي العَرَب	٤	14.	سَيْسَم ماجُوس
	٦	Y 0 V	شاي كارولينا	٦	174	
	ŧ	177	شاي المُروج	7	144	سَيْسَم هَجِيْن سِيْسَنْبُرْيُوْن الحِكْمَة
	٤	177	شاي المُروج العريض الوَرَق	١	140	سِّيْسَتُبْرَئُوُّن مَخْزَنيّ سَيْكَران سِيكُلامَن البُّشتانيّ
	٤	177	شاي المروج المنقعي	V	££	- مَیْکَران
	1	31	شاي النه عند	٥	177	سِيكُلامَن البُسْتانيّ
	1	Y • 1	ا شِبِتّ	٦	41	سِيكلامَن فَارِسي
	1	7 - 1	شيت شيت شيت شِيت شِيت بَرِّي	7	14.	سِّيكلامَن فَارِسيٍّ سِيكلامَن القُص سِيْكُلامَن لُبُنانِيٍّ سِيْكُلامَن لُبُنانِيٍّ
	١	7 • 1	شِبتَ	٤	171	سِيُكُلامَن لُبُنانِيّ
	٧	181	شِبَتْ بَرِّي	٣	114	سِیْمابا سَدْرُون
	0	*1.	شِبْرق شائِك	1	TA1	سِيْمارُوْبَة مَخْزَنِيَّة
£44	١	٤٧	شِبْرِق شائِك شَبَط الغُول شَبَط الغُول	٣	114	سِيمُولُو

			ì			
<u>ح</u>	<u>ص</u> ۱۱۱	مدخل شُجَرَة النَّبق شُخص شرقي شُخص عَرِيْض الوَرَق	ح	<u>ص</u> ۳۲	مدخ <u>ل</u> شَبَطباط	ش ب ط
٦	111	شَجَرَة النَّبق	٦	44		. 0
٧	731	شُخص شرقي	٦	171	شَبَه شائِك	
٧	731	شُخْص عَرِيْض الوَرَق	٦	141	شُبُهان شَائِك شُبَيْرِقَة شُبَيْط مِلَعِيّ شُبَيْط شائِك شُبَيْط شائِك	
٧	731	شخص عريض الورق شخص مُتَوَسَط الورق شخم الأمعاء شَذُو شُرَاجة الرَّاعي شَرَاج شَرَاج شَرَاخاتُ اللَّيْل	•	۲۱۰	مُ بَيِّرِقَة	
٤	701	شَجْم الأَمْعاء	۲	731	شُبَيَّط سِلَعِي	
٣	779	شُذُو	٧	181	شُبيَّط شائِك	
١	٦٠	شُرَّابَة الرَّاعي	٣	119	شِتْراق مُخزَني	
١	411	شَرَاج	١ ١	94	شَئْلَةُ الرِّئَة	
١	799	شَرَانِق	٦	Y•V	شَجَر أُدْرِيْس شَجَر البَّخُوْر	
٤	371	شِرْخاتُ اللَّيْل	٥	7.7	شَجَر البَخْوْر	
١	١٧٦	شبو د	, ,	400	شَجَر البَقّ	
٣	107	ر شِرْش الزَّنْوع	١	۲۸۸	شَجَر الدُّبْق	
٦	141	شِيْرْش ناعِظ	٣	119	شَجَرَةُ إِبْراهِيْم شَجَرَة الأَبْسَنْت	
٧	120	شَرَعْطَط مَنْقِعيّ	٦	144	شَجَرَة الأَبْسَنْت	
٣	171	شِرْش ناعِظ شَرَعْطَط مَنْقِعيّ شَرُوْنَة دُوْرِيا شَرُوْنَة شَائِعَة	٧	731	شَجَرَة التُّولِيْب	
١	3 + 7	شَرُوْنَة شَائِعَة	٦	188	شَجَرَة جَوْز القَيْء	
٣	171	شَرُوْنَة مُذْهَبَة	١	777	شَجَرَة حَبُّ الشُّوم	
ŧ	١٢٥	شَرُونَة يَعْقُوب		77	شَجَرَة الحِلْتِيْت	
7	١٣٥	شَشَع شعّال	۲	77	شَجَرَةُ الحُمَّى	
٧	101	شعَال	٣	3.7	شَجَرَةُ الحُمَّى	
1	441	شَغْر الأرْض	٧	٦.	شَجَرَةُ الْحَياةَ الغَرْبِيَّة	
١	177, 137	شَعْر الجِنّ شَعْر الغُوْل	١	۲۷۲	شَجَرَة الدُّكْن	
١	441	شغر الغُوْل	٧	731	شَجَرَة الزُّنْبَق	
٥	191	شَعْرِيَّة الْثَرِيا شَعْرِيَّة بَيْضَاء شَعْرِيَّة سَوْداء	,7	731	شَجَرَة السَّماء	
٥	191	شُغْرِيَّة بَيْضَاء	٤	10.	شَجَرَة السُّمَّن	
٥	١٠٨	شغريّة سَوْداء	١	197	شَجَرَة الشُّوْس شَجَرَة الشَّمْع	
٥	191	ا شغرِيّة كندا	٧	731	شَجَرَة الشُّمْع	
٥	197	شغريّة المَكْسِيْك	٦	P37	شَجَرَة الشَّيْطَان	
7	777	شُعْصُور شَعِیْر مَعْرُوف شَعِیْر مَعْرُوف	٦	19.	شَجَرة الصَّابُون	
7	170	شَعِيْر مَعْرُوف	٤	37	شجرة صبغ أثاثو	
١	171	شَقَاثِق حُمْر	٤	37	شجرة صِبْغ الرّوكُو	
1	171	شَعَّا ثِقُ حُمْر شَعَائِقُ النُّعْمَان	٣	140	شَجَرَة العَرَب	
٦	۲٧	شَقائِق النُّعْمان شَقَائِق النُّعْمان الكَبِدِيِّ	٧	19.	شَجَرَة القَشّ	
1	7 • 7	شَقَائِق النُّعْمان الكَبِدِيِّ	٧	731	شَجَرَة القَياثِير	
٤	177	شُقّار	١	7.7	شَجَرَة الكَبِد	
۲	188	شُقَّار الغاب	٣	7.67	شَجَرَة الكَرْنِيْب	
١	***	شُقَّار الفِضح	٣	٩	شَجَرَة المَرْجان	
١	7.7	شُقَّار الكَبِد	٤	1.5	شَجَرَة المُسافِر	
٧	187	شُقَّارُ الفِضح شُقَّار الكَبِد أُشُقَار المروج	١	۸۳	شَجَرَة المَعْبَد	247

ش ي ح	<u>ح</u> ۱	<u>من</u>	مدخل شُوفان زراعِيّ مُ ماه مادُّ تا	<u>ح</u>	من	مدخل
290	١	<u>من</u>	شُوْفان زِراعِيّ	١	من ۲۰۶	مدخل شُفَّارَی الٹَّالُوْث
	۲	307	سوت الدراج	١	717	شقاری النانوت شقر، هوایه شقر، هوایه شقیت النّعمان المَبْدُوْل شَقِیْق النّعْمَان المَبْدُوْل
	١	377	شَوْك الدِّمَن		7.4	شَقَر، هَوايَه
	٤	177	شَوْك عَقْرَبانِيْ		3 • 7	شُقُواص
	١	٥	شؤك القصار		Y•V	شَقِيْق النُّعْمَان المَبْذُوْل
	٦	1 1 1	شَوْك مُبَارَك		*1	شُکاعَی
	١	377	شَوْك النَّصاري	١ ١	78 A	شُكَاعَى شَكُونًا شُلُطَة الحَرَمُون
	۲	19	شَوْكُ اليَهُود	7	127	شُلْطَة الحَرَمُوْن
	٧	118	شُوْكَة حادَّة	١	***	شُلَيْك
	٥	1	شَوْكَة سِيناء	١	۲۰۸	شَمار بَحْرِي
	٥	14.	شَزَكَة قِبْطِيّة	۲	120	شُلَيْك شَمار بَحْرِيّ شَمار بَرِّيّ شَمارٌ بَرِّيٌّ مُفَلْفَل شَمارٌ بَرِّيٌّ مُفَلْفَل
	١	317	شَوْكَة مُبَارَكَة		171	شَمارٌ بَرِّيٍّ مُفَلِّفُل
	1	717	شُوْكَرَان		177	شَمار خُلُو
	١	414	1 ,	٧	180	شمار الماء
	١	717	شَوْكَرَان سُقْراط	*	187	فيتمام
	٤	144	شؤكران صغير	٣	27	شَمَّامُ شُمُرَه الخَنازِيْر شُمُرَة بَخْرِيَّة شُمُرَة مَخْزَيَة
	١	717	شَوْکَرَان کَبِیْر شَوْکَرَان مُبَقَّع	١	Y • A	شُمْرَة بَحْرِيَّة
	١	717			177	شمرة مخزنية
	١	717	شَوْكَرَان مَخْزَنتي	١	444	شِمِرْضَاض الكُنْدُور
	١	714	شُوْكَرَان المَنَاقِع	١	٥٠	شمشاد أخضر
	١	*14	شَوْكَرَان مُثْتِن	١	٥٠	شَمْثِيْر شَمْع العَثْبَر شَمْعَة قَمَرِيَّة كَبِيْرَة الزَّهْر
	١	714	شَوْكِل	٤	ŧ	شُمْع العَنْبَر
	۲	141	شَوْلَة بَيْضاء	١	4 • 4	شَمْعَة قَمَرِيَّة كَبِيْرَة الزَّهْر
	١	Y • A	شُوْمار قَرْن الأَيْل	١	۲۱.	شَمَنْدَر أَخْمَر
	۲	180	شُوْمَر بَرَّيِّ شُوْمَرٌ بَرَّيٍّ مُفَلْفَل	1	7 • 1	سمندر الحمر شمئلدر بقلي
	٣	171	شُوْمَرٌ بَرِّيٍّ مُفَلَفَل	۲	۲٥	شمول أشود
	٤	177	شُوْمَر مُحلُو	٥	۳.	شَنَب الهِرّ
	٣	140	شُونِيْز الحَقْل		٧	شِنْجَارِ البَرِّ
	٤	171	مُونِيْز دِمَشْقِيْ	١	* 1 1	شِنْجِبَار مَخْزَنِيٍّ شِنْداب
	۲	184	شُونِيْز زِراعِي	٣	174	شِنْداب
	١	719	شَوَيْلاء	٤	174	شِنْداب إكْرِيتيّ
	ŧ	109	شُوَيْلاء عطريَّة	٣	177	شِنْداب بَحْرِي
	١	714	شَوَيْلَة	1	717	شِنْدَابِ الحُقُول
	١	**.	شُونِيْز ذِراعِيْ شُونِيْلاء شُونِيلاء عطريَّة شُونِيلاء عطريَّة شُونِيلَة شَيَّالَة	١	717	شِنْدَاب رَحَّال
	۴	14	شيَّالة	٥	117	شِنْدَاب سُمْبُل
	٥	٥	شيع أبيض	٥	141	شِنْدَاب مِنْجَلِيّ
	٧	101	شييح أراغؤن	٥	٧٥	شَنْطَف دَوّارِيْ
	۲	184	شيع أليف شيع أراغون شيع أرمني	١	١٢٣	شَنْطَف رَماديّ
279	٧	101	ا شِيْح حَقْلِي	٦	177	شُوارِب عَثْثَر

_		ملخاء	_		اخله
₽	<u>ص</u> ۱۰۳	مُنت	٦	<u>من</u> ۱	<u>شیخ</u> دُوميَ
· V	78	صَيِّرِ صَرَّارُ اللَّيْلِ الحَقْلِيَ	٦	٥	بيا روي بينع مِيني
١	777	صُرَّة يَهُوَذا	٤	109	بِي عِطْرِي
١	144	مِيزُم الدَّيْك	٧	101	شِيْح الْمَفْرِب
٦	177	صُرَيْمة الجَدِي الجَبَلِيّة	١	Y•£	َ مُنْخِ الرَّبِيْعِ مُنْخِ الرَّبِيْعِ
٥	177	صَرِيْمَة الجَدِي الحُرْجِيَّة	٣	177	شَيْخَة البَحْر الرَّمادِيَّة
۲	108	صَرِيْمَة الجَدِي الدَّفْلِيَّة	٥	178	شِيْرُوْنِيا الشَّيلي
١	777	صَرِيْمَة الجَدِي الشَّائِعَة	٥	140	شِيرُونِيا مُزَوّاة
٣	174	مغتر	١	7.1	شِيرُوْنِيَة
٧	107	صَعْتُر أرَنْبَرْغ	٣	16.	خَيْطُرَج
۲	174	صَفْتَر بَرُايْ	٣	181	شَيْطَرَج الرُّدُوم
7	۱۳۸	صَعْتَر شُوْرِيا	١	*14	شَيْكَرَان مَانِي
۲	100	صَغْتَر شائعً	۲	YAE	شِبْكُوْرِيَة
٦	4٧	صُغْتَر شَائِع	ŧ	171	شِبْكُورِيَة
0	144	صَعْتَر كُبْنَادِيَا	٥	777	شِيْكُوْرِيَة مَرْطاء
٤	140	صَعْتَر لُبُنانَ	١	***	شَيْلَك مَبْذُوْل
٥	70	صَغْتَر هِنْدِي	۲	184	شَيْلَك مَبْذُوْل
Y	777	صَفْراء الثَّوْر	١	777	شَيْلَك مَعْرُوف
١	177	حَفَرَان	٣	177	شَيْلَم
١	***	صَفْصاف أَيْيُض	٣	170	شينينز الخفل
۲	107	صَفْصاف أَدْجُوانِيّ	ŧ	171	مِبْيَنِيْرُ دِمَشْقِي
۲	104	صُفَيْراءُ اليابان	٣	١٢٨	صابُون
٤	1	صَفِينَة	١	377	صَابُوٰنِيَّة مَخْزَنِيَّة
٤	141	صُفْراب	٦	171	صائمور شائِك
٧	107	مُشقِّراب أَبْيَض	٧	144	صباح الخير
٤	127	صُفُواب تُزْمِينِ	٤	140	صَبَّاد
٧	107	صُغْراب خُدِّي	ŧ	140	صَبّار قُنْفُدْي
0	۱۳۸	صُفْرَاب كَلِيْل	۲	101	صَبَّار مَقْروف
4	104	صُفْلاب مَخْزَنِيّ	٤	371	صَبَّاد الهِنْد
١	144	صَفْلِيْن	٦	٥٠	متبار وليتنز
٣	170	صَلْصال أَمْغَر	٣	77, 711	صَبَّارة
١	177	مِسلُقِيْن	١	71	صَبَّارَة شافِعَة
٥	13	صَمْغ جاوَة	۲	117	صَبْر
٣	171	صَمْع جَنْدَم	٧	70	مَنبُ ر
۳	171	صَمْع غَرْسِيْنِيا	٦	177	صَبُر الخَيْل
*	109	صَمْغ الكُثَيْراء	1	71	صَبْر كُوْرَاسَاوَه
٣	141	صغراب وليل مشغلاب مخزني مشغيان مشغين مشغ جارة مشغ غزسينيا مشغ الكثيراء مشغ اللك	٤	170	صَبَّاد الهِنْد صَبَّادة صَبَّارة صَبُّر صَبْر صَبْر صَبْر المَخَيْل صَبْر كُوْدَاسَاوَة صَبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْر المَخَيْل صَبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْر المَخِيْل صَبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْر المَخِيْل صَبْرة صُبْر المَخِيْل صَبْرة صُبْرة صُبْرة صُبْر المَخِيْل
٣	۱۳۱	متشغ نقطة	4	101	مري
٥	17	ميناب الماء	٤	178	صبير الهند

			ı			
ظفر	<u>ट</u>	<u>ص</u> ۱۳۳	مدخل	<u> </u>	ص	مدخل
	۲	175	<u>طَرْ</u> خُؤن	٧	٧٨	صِناب الماء
	١	711	طَرْطُوْر الباشا	۲	109	صَنْدَل أَبْيَض
	٦	1	طَرُفاء	٤	144	صَنْدَل أَسْتِواليّ
	١	٤v	طُرْنَة	۲	17.	صَنَوْبَر بَحْرِيّ
	١	181	طُرُنْشُول سَنَوِيّ	٤	179	صَنُوْبَر بَرِّيِّ
	7	١٨٨	مُرُنْشُول الصّبّاغين	7	17.	صَنَوْبَر الكُثبان
	٦	17	طُغْلُق	٣	144	صَنَوْبَر مُثْمِر
	٦	17	طُغْلُق مُنْتَصِب	۲	171	صُوْجَه
	١	444	طَفْرَة	١	۲1.	صَوْطَلَة
	۲	۱٦۴	طُقْسُوْس عَادِيّ	۲	171	صُوفان
	7	371	طُلُح	٥	124	صُولائُم
	٦	77	طماطم	۲	171	صُوْيَه
	٦	144	صره طُفْسُوْس عَاديّ طَماطم طَمْخَة ذَهَبِيَّة الوَرَق طَهْف طُوْبه طُوْس طُوْس طُوْس عُلُوس عُلُوس مِزْهَار	٤	119	صينُومانيُوم حادً
	۲	178 .9.	ا طُهَف	٧	100	ضال
	٥	71	طُوْبَه	1	٣٠٣	ضُرْضَر
	٥	7.٧	طُوْس	۲	٨	ضُرْغُوْس
	٥	T • V	طُوْس مِزْهَار	1	PVY	ضَرِيْع
	٤	١٧٠	ٔ طُوْط طُوْقَرِيُون	1	44.	ضَرِيْع ضُفْبُوس ضِفْدَع ضِفْدَع أَخْضَر دَادُمَانِ
	٧	107	طُوْقَرِيُون	٣	371	خِيفْدَع
	٧	104 .74	طُوْقَرَيُون أَصْفَر	٣	178	ضِفْدَع أُخْضَر
	٧	vo1, Po1	طُوْقَريُون إكْريتي	٦	737	صيمران
	٧	100	طُوْقِريُون بَحْرِي	1	977	طارِدَة السُّعَال
	٦	184	طُوْقَرْيُون نُوميّ	٦	177	طارْطَقَة
	٧	101	طُوقَريُون جَبَلِيّ	٧	70	طباق البَرَاغِيْث
	٧	101	طوقريون جَعْدِي	٥	104	طَبَرُ خَى
	٧	104	طُوْقَريُون كَمافِيطُوس	٦	181	طخلب بخري
	٧	104	طُوْقِرِيُون كُوْرَبِي	٣	140	طُخلُب سِيْلان
	٧	٦٧	طُوْقَرْيُون لَبِد	7	181	طُخُلُب كُوْرسِيكا
	7	731	طُوْقَرْيُون الَماء طُوْقَرِيُون مَخْزَنِيّ طُوْقَرْيُون مَنْقِعِيّ	١	717	طَحْمَاء طَحِيْن طَحِيْن البُرّ
	٦	188	طُوْقِرِيُون مَخْزَنِي	٥	181	طِجِيْن
	٤	١٢	طُوْقُرْيُون مَنْقِعِيّ	٥	131	طُحِيْن البُرّ
	٧	V	طِیْب العَرَب			طَحِيْن الحِنْطَة (دستور
	١	7.	ا طَيِّم	٥	181	أدرية ١٩٣٧)
	٣	140	طِیْن أَحْمَر	٥	181	طُجِيْن القَبْح
	٣	140	طِيْنِ أَرْمينيا	۲	377	طَحِیْن القَمْح طُرْبوش الغُراب طُرْنُوْن حُلُو
	٧	107	طَيُومَريُونِ	١	707	طُرْثُوْث حُلُو
	٧	٣٥	طُيُّون الذَّبَاب	۲	P 3 Y	طَرَخْشَقُون
	٦	371	ا ظبَّة	٦	787	طَرَخْشَقُون أَسْنَان الْأَسَد
133	٦	737	طين العرب طين أخمَر طين أرمينيا طين أرمينيا طيون الذباب طبين الذباب طبين الذباب	٦	787	طَرَخْشَقُون مَخْزَنِيّ

<u>ح</u>	<u>ص</u> ۱۷٤	مدخل عَرْطَب	3	<u>من</u>	مدخل	ظ ف ي
•	148		٦	737	ظَفِيْرَةً	و ت
7	77	عَرْطَنِيْتَا		187	طَهِيْرَة بِلُورِيَّةِ	
٣	147	عَرْعَر شائِع	١	777	عَارِشَة الكُنْدُوْر	
٤	731	عَرْعَر شائِع		140	عارِشَةِ الوَردِيَّة	
٥	180	تمؤغر فرجينيا	l .	140	عاقِر قَرْحا	
۲	174	عَرْعَر كادِي	1	10	عَاكُوْبِ الحِنْطَةِ	
1	450	عِرْق أكُوْر	1	17	عَاكُوْبِ الخِرْطَال	
٥	180	عِرْق إِنْجِبار	l	١٣	عَاكُوْبِ الدَّيْسِ	
٧	11	عِرْق إنجبار	l	18	عاكُوْب الشَّيْلَم	
1	377	عِرْق الحِلاوَة		131	عانِق جَبَلِيّ 	
٣	179	عِرْق الدَّم		184	عانِق الحُقُول	
١	779	عِرْق الذَّهَب الرَّمَادِيِّ المُحْمَرِ		131	عَبَّاد الشَّمْس	
٧	170	عِرْق الذِّهَبِ المُتَمَوِّجِ		177	عَبَّادُ الشَّمْسِ السَّنَوِيِّ	
1	PYY	عِرْقُ الذَّهَبِ المُحَلَّقِ الصَّغِيْرِ	l	177	عبَّادُ الشَّمْسِ العُسقُوْلِيّ	
٣	18.	عِرقُ الذِّهبِ المُحَلِّقِ الكبير	l	184	عَبْد اللَّاوِي	
1	779	عِرْقِ الذِّهَبِ المَخْزَنيِ الصَّغِيْر	l	97	العَبْس	
٣	18.	عِرْقُ الذِّهبِ المخزيِّيِّ الكبير		1	عَبْل	
٧	١٦٥	عِرْق الذَّهَبِ المُخَطُّطِ الصَّغير		719	عَبَيْثُرَان	
٧	١٦٥	عِرُق الذِّهَبِ المُخَطُّطِ الكبير		109	عَبَيْثُران عِطْرِي	
		عِرْق الدَّهَب النَّــَوِيّ		377	عُبَيْراء سُنْجَلِيَّة	
٧	١٦٥	اللُّون الأبيض		114	عُتْم، عُتُم	
٣	7.8	عُرْقُد شائع		184	عَجُّور	
١	4.4	عَرْقَد يَاسَمِيْنِيّ	١	13	عَجّور إِفريقيّ	
١	70	عَرَقْسُوْس		40	عَجُور الْهْرِيقَيّ	
١	197	عِرْقْشُوس مَخْزَنِيّ		177	عَدَس عُدَيْن ثُلاثيّ التَّذَلُّق	
٤	119	عِرْقُسُوْس مَخْزَنِيّ		10.		
١	771	عُرْقُوْن مَخْزَنيْ	٦	101	عُدَيْن جاڤا	
۲	777	عَروس النِّيل		737	عَرائِسِ النَّيْل	
1	777	ا عُرُوق الصَّبَّاغِيْن	٣	۱۲۷	عَرار قَيْصَرِيّ	
1	777	غُرُوق صُفْر		731	عَراوَة عُسْقُولِيَّة	
7	۸۳	غرينة	١	418	عَراوَة مَلِكَة المُرُوج	
٣	۱۷۲	عَزَقان		175	عَراوَة مَلَكَة المُرُوج	
٦	۸۱	عَسْلَج الأَسَد	۲	140	عَرَبُوَب	
ŧ	19+	عَسَم أَبْيُض عَسَم رَمْبُوْلتْ	٧	104	عَرْصَف جَعْدِي	
١	770	عَسَم رَمْبُوْلتَ	7	101	عَرْصَف جِنيڤ	
٧	177	عَسَم سَنْدَايِق	١	778	عَرْضَف شَائِع عَرْضَف شَنْدَقُوْرَة	
	١٩٠	عَسَم صَغير الزَّهْرِ	١	***		
٣	٤٥	عُشْبَةُ الأَبَارِيْقُ الأَرْجُوانِيَّة		101	عَرْصَف صَّنَوْبَرِيِّ	
۲	٤٥	ا عُشْبَة الأَبُواق الأَرْجُوانِيَّة	1	AYA	عَرْصَف مَدًّاد	733

ع ف ص	<u>خ</u> ۷	<u>ص</u> ٦٧	مدخل	<u>ج</u>	<u>ص</u> ۲۳۱	مدخل عُشْبَةَ الأحْسَر
	٧	٦٧	عُشْبَةً مار الياس	١	177	
	١	777	مُشْبَة مار يُؤخنا	١ ١	177	عُشْبَة الأَعْمَى
	١	777	عُشْبَةَ المُتَسَوِّلِيْن	١	707	عُشْبَةَ أُوپَاتُوْر
	٤	777	عشبة المحشك	١	Y • A	نحشبة البخر
	١	**	عُشْبَة مَغْرِبِيَّة		337	عُشْبَة البَرَاغِيْث
	٧	Y • Y	عُشْبَة مُقَدَّسة	٦	79	عُشْبَة البَراغِيْث
	١	177, 097	عُشْبَة النَّجَار	٦	77	عُشْبَةُ البَراغِيْث الرَّمْلِيَّة
	1	415	عُشْبَة النَّحٰل	۲	1.4	عشبة البَقّ
	٧	371	عُشْبَة الهند	١	777	عُشْبَة البَوَاسِيْر
	١	17	عُشْبَة الوُقُوع	١	174	عُشْبَة البَوَاسِيْرِ العَقْداء
	١	٥٠	عَشَق	٥	٥	عُشْبَة بَيْضاء
	١	777	عَشْقَة حَلَزُوْنِيَّة	۲	44	نحشبة التالول
	1	777	عَشْقَة مَبِذُوْلَة	١	777	عُشْبَة النُّؤْلُول
	١	137	عَصَا الرَّاعي الزَّبَّاء	٥	178	عُشْبَة الجُناب
	۲	AFI	عَصا يَعْقوب	٦	171	عُشْبَة الحَصاة
	٣	18.	<i>عُص</i> اب	١	٣	عُشْبَة حَمْراء
	٣	181	عُصاب إسْبانيّ	١	T.1 . TO7	عُشْبَة الحُمَّى
	٣	181	عُصاب الرُّدُوم	١	727	تحشبة الحبير
	٣	181	غُصاب صغير	١	411	عُشْبَة الخِيْمِيانِيِّين
	٣	18.	عُصاب عَرِيض الوَرَق	١	377	عُشْبَهَ الدَّعَاك
	٧	177	عُصَارَة الخَس	٣	119	العُشْبَة الذَّمَيِيّة
	٦	140	عُصْبَة الشُّوس	١	789	عُشْبَة الرَّبُو
	١	178	عُصْبَةُ القَلْب	٦	٨٩	عُشْبَة الرَّحِم
	4	179	عَصَلَة حَديديّة	۲	79	عُشبة الرَّوَايا
	٤	180	عَصَلَة سيبيريا	١	١٣٣	عُشْبة السَّحَرَة
	٤	731	عَصَلَة الشَّرق القِصيرة النَّمر	1	790	العُشْبَة السَّمْرَاء
	٤	187	عَصَلَة الشَّرق اللُّبنانيَّة	٧	٨٠	عُشْبَةُ الشَّاي
	٤	180	عَصَلَة مَخْزَنية	1	144	عُشْبَة الشَّيْطان
	٣	181	عَصَلة مُشْوِكَة	1	377	عُشْبَة الصَّابُوْن
	7	13	عَصَوِيَّة المَناقِع	1	371	عُشْبَة الصّاعِقَة
	1	٨٨	غصية	٧	VF. V01	عُشْبَة الطُّحال
	1	448	عَصِيْرِ الدُّبِ	ŧ	11	عُشْبَة طَوْقِ الكَلْب
	٥	11	عُصَيْقِيرة	1	737	عُشْبَة العَلَق
	٧	777	عُصَيْفِيْرَة بَرِيَّة	1	771	عُشْبَةَ الغَيْن
	١	111	عَصَلَة مُشْوِكَة عَصَوِيَّة المَناقِع عُصِيْر الدُّبّ عُصَيْنِيرة عُصَيْنِيرة عُصَيْنِيرة عُضْرِس عَضْرِس عَفْص عَفْصَ عَفْصَةً عَفْصَةً	1	707	عُشْبَة الفُقَراء
	٤	١٧٠	عُطْبَ	٦	179	عُشْبَة القِدِّيْسَة صُوْفيا
	٧	188	عَفْص	٤	181	عُشْبَة الفُمَّل عُشْبَة الفُوَى المُتَتَصِبَة
	٧	79	عَفْصَة	٥	180	عُشْبَة القُوَى المُتتَصِبَة
733	۲	VV	عَفْصَةُ البُطْم	١	777	عُشْبَة القُوَى الوَزِّيَّة

<u>ट</u>	ص	<u>مدخل</u> عِناقِیَّة کَبِیْرة	<u>ح</u>	ص	مدخل عَفْصَة السَّنْدِيَان	ع ف ص
٤	<u>ص</u> ۲۵٤	عِناقِيَّةً كَبِيْرة	٧	<u>ص</u> 79		ے س
٦	307	عِنَاقِيَّة لُبُنَانِيَّة	٣	VV	عَفْصَةُ الضَّراوَة	
٣	187	عِنَب عِنَب البَّحْر	۲	٧٦	عَقْداء عِطْرِيَّة	
۲	14.	عِنَب البَّحْر	١	13	عُقْدَة	
١	101	عِنَبِ الثَّعْلَبِ	١	144	عُقْرُبَان	
۲	١٨٣	عِنَبِ الثَّعْلَبِ	٧	711	عَقِيد هِنْدِي	
١	AST	عِنَب الدُّبَ	١	137	عُقَّيْدَة حُمَّيْضِيَّة الوَرَق	
١	101 . 44	عِنَب الذُّبُّب	ì	171	عقَّيْدَة الدَّغْل	
۲	105	عِنَب الغُراب		٤v	عُقَيْدَة الدُّواجن	
٤	107	عِنَب القِطا	٣	٣٣	عقَّيْدة الرِّمال	
1	13	عِنَب هِنْديّ		137	عُقَّيْدَة عَقْدَاء	
٦	70	عِنَب هِنْديّ	٧	198	عَقَّيْدَة مُدَبَّبَة	
٤	40	ُ عَبْدا عَبْر	١	377	عُقَّيْدَة مُفَلِّفَلَة	
٣	189	عَبُر	٤	127	عَكَر أَبُو قُرُون	
٤	٤	عَنْبُر أَبْيَض		191	عَكُنَهُ	
٧	179	مُخْبُوب رُباعيّ البَنَلات	٦	170	عَكْنَة	
٦	100	عُنْبُوب كَبِير الثَّمَر	٣	127	عَلْد سويسرا	
٧	179	عُنبُوب المَناقِع		737	عَلْد مُتَدَلِّي السُّوق	
۲	171	عَنْجَد		١٧٠	عَلْد مُزْدَوِجُ السَّنابِل	
١	77	مُخْنَصُل بَحْرِي		727	عَلْد مَلْوِيّ السُّوْق	
٧	71	عُنْصُل بَحْرِي	٤	184	عَلَق	
٤	197	0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	٤	184	عَلَقَة طِيَّة	
٣	189	عُوْد الأُنْبِياء		111	عَلُوب عُلَّيْق (الثَّمرة)	
١	٦.	عُوْد الخَيْر	۲	171	عُلَّيْق (الثَّمرة)	
٥	1.4	عُوْد الخَيْر			عُلَّبْق (مشروب روحيّ	
١	£ £	عُوْد الرِّيْح		33/	من كبوش العُلّيق)	
٥	78	عُوْد الرِّيْح اللَّبْنانيّ	١	727	عُلِّيْق أَسْوَد	
٣	127	عُوْد القَرْح	۲	331	عُلَّيْق لَذِيْذ الثَّمار	
١	450	غۇد الترتج غۇزۇر غۇستج غۇستج غۇستج اشۇد غۇستج اشۇد	٥	175	عَمَامَة عَمَى الدَّجَاج	
١	444	عَوَذُور	١	171	عَمَى الدَّجَاج	
١	777	غوسج	٧	44	عَمِيْر عَنْكَبُوْتِيْ	
7	171	غۇشج	١	337	عُنَّاب عُنَّاب	
١	۳۷۳	عَوْسَج أَسْوَد	7	301	عُنَّاب	
۲	AFY	عَوْسَج أَسْوَد	٧	100	عُنَّاب بَرِّيّ	
١	770	عَوْسَج إيْدَه	١	337	عُنَّابَة	
١	410	عَوْسَج اِيْدَهُ عَوْسَج جُوِّيٌ عَوْسَج جَوْيٌ عَوْسَج دَفْلِيّ عَوْسَج دَفْلِيّ	7	301	عُنَّابَة	
۲	141	عُوْسَج جَوِّيْ	٥	377	عِنَاقِيَةِ أَمْرِيْكِيَّة	
١	787	عَوْسَج دَغْلِيّ	1	441	عِناقِيَّة صَغِيْرَة	
١	787	عَوْسَج شائِع	٧	771	عِناقِيَّة عُشْبِيَّة	111

غ م ب	<u>ح</u> ۲	<u>صن</u> ۱۷٤	مدخل غالِيُوْن أَصْفَر	<u>E</u>	<u>صن</u> ۱٤٤	مدخل عَوْسَج لَذِيْذ الثَّمار
				1		غۇسج لذِيْذ الثمار
	٤ .	10.	377	٧	114	عَوْف عَطِر
	1	700	غَالِيُوْن لاصِق		77	عُويْنَة
	1	700	غَالِيُوْن هُلْبِيّ لُصَيْقَى	٣	147	عَيْدَم
	٤	10.	غُبَيْراء الحابِلِيْن مُعِيد مِنْ مَنْد	\ .	7 £ A	عَيْسَران عِنَب الدُّبَ
	٧	177	عُبَيْراء مَبْذُوْلَة		٩ _	عَيْن البِزِّ عَيْنُ الثُّدْرُج
	1	137	غَدَّ ار	V	7	
	'	٣٠٩	غِذَاء الله مَدِيدُونَة مَنْ مَنْ	\	4	عَيْنِ الثَّوْرِ
	`	707	غَرَاتِيُوْلَة مَخْزَنِيَّة	٥	\\	عَيْنُ الثَّوْرِ
	1	707	غِرُدِيْبِ أَخْوَيْنِيّ 		737	عَيْن الجَمَل
	١	707	غِرْدِيْب دَلْمَاسِيَا	٧	۲	عَیْنُ الحَجَل
	1	137	ٔ غَرْز د د د	3	140	عَيْنِ الدِّيكِ مِنْ الدِّيكِ
	١	177	غَرْغَاج دَودَ	١ .	181	عَيْنِ الشَّمْسِ
	١	147	غَرْغَار	7	177	عَيْنِ الشَّمسِ
	٦	100	غُوْغَرَة	٤	1 • 8	عَيْنِ القِطِّ
	ξ	101	غَرِنْدالِيا قويَّة		17	عَيْنِ القِطَّ
	£	101	غَرَنْديلِيَة ضَلبعة مُورِي		1.	عَيْنِ الهُدُّهُدِ مور م
	٥	107	ا غُرْنُوق ا مُورِد برور	٥	10+	عَيْنُون تُرْبِد
	۲ -	171	غُرْنوق دَمَوِيّ مُرْمُون بِرَا	0	10.	غَيْنُون عَطِر
	۲	1	ِ غُرْنُوْق عَطِر مُورُد مِن مِ	۲	177	عَیْنُون مَبْدُول مَعْدِی مِعْدِی
	٥	107	عُرْنُوق المُروج		174	عَيْهُوْن مِغْطار
	٥	107	غُرْنُوق مُسْتَدير الوَرَق	٣	101	عَيْهُوْن مِغْطار
	٥	107	غُرْنُوق مُلَطَّخ	1	791	غَاب ءَ يو ب
	ŧ	107	غُرَيْب بَنْدُوقا	1	701	غَار أَيُولُون
		10.	غِسْلَة مُورِد ورَيَّة	۲	3.7	غار پیشُورِیْم
	١	۲۰٦	غُضْرُوْف مُتَقَلِّص	۲	٧١٠	غار سامً
	٥.	18	غَ مْل ُرَب مَدِّ مِنْ	1	۳۱٦	غار لَوْذِيّ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	1	117	غَفَث إبن سِيْنَاء	1	717	غار مَلَكِيّ
	٦	171	عَفَثُ أَرْجُوانِيَ	1	701	غَار نَبِيْل ً
	٧ -	170	غَفَت مَثْقُوب الوَرَق غَفَت المُروج غَفَت نَدْخِيَ الوَرَق	ξ	147	غارِيا ترِي كِ يْليُو مُنْ يُنْ
	٦	171	غفث المروج	۳.	107	غارِيْقُونَ أَبْيَض
	٧	177	عَفْثُ نَدْغِيّ الوّرَقَ	1	707	غاريقُوْن الحَقْل
		107	غُلْطارِيّة كَنْدِيّة		707	غارِيقُوْن مَأْكُوْل
	٥		غُلْطَارِيَة كَنْدِيَّة (زيت ال-الطيّار)	Τ.	107	غارِیْقُون مَخْزَنِیّ
	۲	100	غَلْقَة الدُّك فَلْقَة الدُّك	١.	707	غَارِیْقُوْن مَرِي ۗ
	٣	71	·		111	الغاشول
	٦	337	غُلَنْتَامِیْن برومْهِیْدْرات	1	17.	غَاغَة مَغْرِبِيَّة
	£	777	غليشرة بسيطة	V	١٧٠	غافَث عَطِر رَبِّ مِن
110	۴	301	ا غَمْبِيْر مُكَعَب	1	707	غَافَث غُوْلانِيّ

			1			
ح	ص	مدخل	<u>5</u>	<u>ص</u>	مدخل	غ و ا
1	140	مدخل فِجُل الجِمال	٦	171	<u>مدخل</u> غوارانا	, 5 6
۲	174	فُجْل حارّ	٤	777	غوارَنْهَم البرازيل	
٦	۲0٠	فُجْلَ الخَيْل	٧	171	غواگو	
٣	107	فُجْل زِراعِيّ		١.	غَوَایْکُورُو	
١	Y7.	فَحْم الجَلْهَم	٥	104	غُوْتابَرْشا	
١	۲٦٠	فَحْم الْحَوْر	٦	۲	غَوْلان طُبّاقِيّ	
١	18	فَحْمُ الشَّيْلُم	۴	189	غَيّاك مَخْزَنِيّ	
1	77.	فَحْم نَبَاتِي	١	PAT	غَيْطَل	
١	177	فَراسِيُوْن أَبْيَض	٣	100	فابيانا مُتَراكِبَة الوَرَق	
١	777	فَرَاسِيُوْن أَسْوَد	۲	F01	فارُولا حَرَمُون	
۲	141	فَراسِيون صوفيّ	٤	100	فارُولا العَبجَم	
٤	104	فَراسِيُون عِطْرِيّ	٦	170	فَارُولا مَبْذُولة	
٣	3 • 7	فَراسِيُون فِرْجِينيا	٤	100	فاشِرا بَيْضاء	
٤	104	فَراسِيُون القَلْب	۲	171	فاشِرا سَوْداء	
٤	104	فَراسِيُون مائتي	۲	١٧٦	فاشَرْشِيْن مَبْذُول	
١	777	فَرَاسِيُوْن نَتِن	٦	١٦٥	فَاصُولِيا الكاب	
١	977	فَرامْبُوَاز	٦	١٦٥	فَاصُولِيا لِيما	
۲	141	فرامبُواز	4	۱۷۷	فاصُولياء إسْبانيّة	
١	***	فَرَاوِلَة		١٧٨	فاصُولِياء مَعْروفَة	
۲	109	فَرْبِيازُوْلَة		F01	فاصُوْلِياء مَعْرُوفَة	
٣	109	فَرْبِيُون	٦	١٦٥	فاصُولية التشاد	
١	٤٠١	فَرْبِيُون بِيلُوليّ فربيون عِرْق الذَّهَب	4	١٧٨	فاصُوْلِيَة مَعْرُوْفَة	
٣	109	فربيون عِرْق الذَّهَب	٤	107	فاصُوْلِيَة مَعْرُوْفَة	
٣	109	فَرْبِيُون الغاب		701	فاغارة ثُمانِيَّة الأَسْدِيَة	
١	٤٠٠	فَرْبِيُون الفَجْر		**	فاغِيّة بيّضاء	
٣	109	فَرْبَيون الفَجْر	١	797	فَافْذُنْج جَبَليّ	
٣	109	فربيون كيبيرُس	٧	17.	فاقُوع فِضِّيّ	
7	177	فَرْبِيُوْن لَسِيرُس	٦	117	فَاقُوع فِلَسْطينيّ	
7	177	فَرْبِيُوْن مُتَصالِب	٣	701	فاهام عَذْب	
٣	109	فَرْبَيُونات	٣	107	فاهُوْن عَذْب	
١	144	ا فِرْسِك	٣	700	فاوانبيا كسروان	
١	٦٨	َیْرُضَاد فِرْصاد أَحْمَر	۲	TA0	فاوانيًا مَخْزَنَة	
٧	٥٩	فِرْصاد أَحْمَر	۲	23	نِنهٔ	
١	077	فَرْفارَة	٤	٣٨	فِئْنَة بَيْضاء	
۲	**	فَرْفَحِيْن	٤	٣٨	فِئْنَة خَمْراء	
٧	7.7	۪ فَرُق ؙ فَرُلُوتُورُن	٣	٤٠	فِتْنَة صَفْراء	
٤	109	فَرْلُوتُورُن	*	73	فِئْنَة مُسْتَدِقَة	
7	79	فَرَنْجَمُنك	٦	۲	فَتِيَّة بَرُنُوفِيَّة	
7	19	اً فَرَّنْجَمَشْك	۲	174	فُجْل أَسْوَد	227

ف و ل	<u>ح</u>	من	مدخل	ح	<u>ص</u>	مدخل
	<u>,</u>	<u>صن</u> ۲۷۵	فِلْفِل أَحْمَر	٤	<u>ص</u> ۱۳۰	مدخل فَرَنْدُل حَسَلِيّ الوَرَق
	٥	171	فِلْفِل أَسْوَد	٤	17.	فَرَنْدَل زُوفيَ الوَرَق
	1	***	فِلْفِلَ آثا	١	777	فَوَنْدَل صَفْصافِيّ
	٤	771	فِلْفِل جابُورَنْدِي	١	777	فَرَّنْدَل زُوفِيِّ الوَرَّقَ فَرَنْدَل صَفْصافِيِّ فَرَنْدَل كَبِيْر فَرَنْدَل مَبْذُوْل
	١	740	فِلْفِل رُوْمِيْ	١	777	فَرَنْدَل مَبْذُوْل
	7	307	فَلْفُل السُّودان	١	777	فَرَنْدَل مَخْزَنِيّ
	٤	771	فِلْفِل شَبَكِيّ	١	777	فَرَوْلَة
	۴	177	فِلْفِل طويل	١	777	فريز
	٣	177	فِلْفِلْ عِرْقُ الذَّهَب	٣	189	فریز فَرِیْقَة فِساء الکَلْب فُسْتُق فُسْتُق الأرْض
	٥	171	فِلْفِل عَطِر	١	4.4	فَرِيْقَة
	7	307	فُلْفُل غِيْنيا	٧	١٠٩	فِساء الكَلْب
	1	777	فِلْفِل كاواكاوا	٤	171	فُسْتُق
	١	377	فِلْفِل المّاء	١	779	فُسْتُق الأرْض
	١	777	فِلْفِل مُسْكِر	١	779	فَسْتُق عَبِيْد
	٤	771	فِلْفِل مُعَرَّق	٤	171	صن الأرق فُسْتُقَة فُشَاغ/ فُشاغ فُشَاغ البارا فُشاغ البارا
	١	۳۸۲	ِ فِلْفِل مُعَرَّق فَلْيَة فَلَيْمَا فُلْيُفِلَة زِرَاعِيَّة فُلْيُفِلَة لِامِيَّة فُلْيُفِلَة لِيْفِيَّة	٣	17.	فَشَّاغ/ فَشاغ
	1	177	فِلِيَّة	٧	١٨٠	فُشّاغ
	١	۳۸۲	فُلَيْحَا	٥	17.	فُشاغ الپارا
	١	740	فُلِيْفِلَة زِرَاعِيَّة	٦	١٦٨	فشاغ الجماييك
	٣	۱٦٣	فُلَيْفِلَة لاهِبَة	١	**	فُشَّاغ سَهْمِيْ
	٣	ነ ጊ۳	فُلَيْفِلَة لِيُفِيَّة	٧	١٨١	فشاغ صِیْنی
	۲	174	فناة	١	**	فُشاغ قَاسٍ فُشاغ المَكسِيك
	*	7.47	فَيْلْلَبُهُ مُنْبَسِطة الوَرَق	٣	171	
	٧	3A/	فوافُوتْسِي فواكَنْغا أفْرِيقيا	٤	171	فُشاغ هُنْدُوراس
	٧	۱۸٥	فواكَنْغا أَفْرِيقيا	٥	71	فَص الحِمار
	٧	۱۸٥	فواكَنْغا ثواًرسي	٧	141	فَصّ الحِمار
	1	777	فؤة	٧	١٨٢	فَص الحِمار الحَرْشَفي
	1	***	فَوَّة الصَّبَاغِيْنِ	٧	١٨٣	فص الجمار الخرشوفي
	1	۳۸۲	فُوْتَنْج بَرِّيَ فُوْتَنْج الماء فُوْدَنْج فُودَنْج بَرِّيَ	٧	١٨٣	فَصَ الحِمار المُغايِر الشَّوْك
	7	737	فوتنج الماء	٣	177	فِصَّة مَزْرُوْعَة
	۲	100	فؤدنج	٣	177	فِصْفِصَة مُعروفة
	1	۳۸۲	فُوْدَنْج بَرِّيْ	١	١٤	فُطْرَ الدَّابِرَةُ فُطْرِ الصَّدا الأبْيَضِ
	٦	737	فُودَنْج الماء	١	771	فطر الصَّدا الأبيض
	٧	Y 1 V	فُوفَل	1	777	فُطْرَ الصَّلِيْبِيَّاتِ الأَبْيَضِ
	٣	170	فَوْقَس حَزازِي	1	799	فغُو شائِع رَّهُ
	١	779	فزقس خُوَيْصَلِيّ	٦	١٦٩	فقوس
	٦	181	فؤقس طارد للدود	1	7.47	فقوس الحمير
	1	7.7	فَوْقَس خُوْيْصَلِيّ فَوْقَس طارِد للدُّود فَوْقَس مُجَعَّد	١	717	فَغُو شَائِع فَقُوس الحَمِيْر فَقُوس الحَمِيْر فِقَيْع فُلَ
£ £ V	۲	3.47	ا فُوْل	٥	777	فلّ

<u>ح</u> ۷	<u>ص</u> ۱۹۰	مدخل فَبُرِيَّة جَمِيْلَة	<u>ت</u> ۷	<u>ص</u> ۱۸۵	مدخل فُوْل إِيْنياس فُول بِشُورِيْم فُول تُونْكا	ف و ل
٧	191	فَيُرَيَّة جَوْفاء	٣	3.7	فُول بَيشُورِيْم	
٦	1 .	تُبَرَيَّة صُلْبَة	٤	177	فُول تُونُكا	
٦	١٧٠	قُبُّرِيَّة لُبْنان	١	779	فَوْل شُوْدَانِيّ	
۲	144	تُبَعَّة بَيْضاء	٧	781	فُوْل كالابَارُ	
٣	177	قُبُعَة مَخْزَنِيَّة	١	٧٢	فُوْم	
٥	114	قتاد	۲	٥٥	فُوْم	
7	179	نِقًاء	۲	3 • 7	فيئتاس	
1	۲۸۳	قِثَّاء بَرِّي	٦	111	فَيْجَن	
١	777	قِثّاء الحِمَار	٤	114	فَيْجَن عَرِيْض الوَرَق	
1	777	َ قِثَّاء الْحِمَارِ قِثَّاء مَاسِط	١	140	فَيْجَن عَرِيْضِ الوَرَق فَيْجَن نَيْن فَيْجَن نَيْن	
١	114	قفاء هندي	٦	111	فَيْجَن نَتِن	
٦	179	قِتْم قُحْوَان قُوَّاص ثُنَانِيَ المَسْكَن قُوَّاص غِشانِيَ قُوَّاص فَصِف قُوَّاص كاذِب	۲	140	فِيْرُوْنِيْكَا قُرَّةُ الْعَيْن	
٥	١٦	ئ ُخُوَان	١	109	فَیْکُس ییْکَارِیا حَوْذَانِیَّة	
١	3.47	قُرَّاص ثُنَانِيَ المَسْكَن	١	777	فِيْكَارِيا حَوْذَانِيَّة	
٧	197	قُرّاص غِشائيّ	٥	771	فِيْكُوسُ صَغِيْر الثَّمَر	
7	179	قُرُّاص قَصِف	٥	197	نِيْلاو كُنْبائِيَّة	
١	78.	قُرُّاص كاذِب	١	٩٨	فِيلْزَهْرَج البَرْبَر	
٧	197	قرّاص کاوِ	Γ.	**	فِيْلَنْتُوسُ السُّنانِيْر	
٤	177	فُرَّاص مُخْرِق	٤	175	فيلتثوس الشنانير	
٧	197	قُرّاص مُذَنَّب	١,	441	فيرُوْنِيْكَا ذَكَرِيَّة	
٧	197	ور قُراص مُرِيب قَرانيا حَرِيرِيَّة	١	7.1	فيرُوْنِيكَا مَخْزَنِيَّة	
٧	198	قَرانيا حَرِيرِيَّة	۲	۱۸۵	فيتلازسيا نيثأؤفريته	
٦	174	ُ قُرَّانِياً فَلُورِيدا قَرَانِيا لَوْلَبِيَّة قَرانِيا لَوْلَبِيَّة	۰	174	قات	
٧	198	قِرانِيا لَوْلَبِيَّة	١ ١	3 P Y	قاتِل أَبِيْه	
۲	141	قرانيا مُدَمَّاة	١	77	قاتل البَقِّ	
۲	147	قرانيا مَعْرُوْفَة	١ ١	717	قَاتِل البَقَرِ *	
٦	171	قَرْبانِيَة مُبارَكَة	١ ١	191	قاتِل الكَلْب 	
١	317	أ قَرْبِيْنِيا مُبَارَكة	٦	170	قاتِل الكَلْب	
۲	144	قُرَّة العَيْن		44	قَاتِل النَّمِر	
٧	194	قَرْدَب مُحلو	١,	797	قار 	
٧	195	ِ قِرْدَبِ سِيبُولْدِي	٣.	٤١	فارح قاطِر جَبَّار	
٦	141	قُرْدَب العِيْص قَرْدَب المَنَاقِع قَرْدَب المَنَاقِع	٣	177	قاطِر جَبّار تائی تا ہے۔	
١	137	قَرْدَب المَنَاقِع	٦	787	فَاقُلَّة ذَكَرِيَّة مَنْمُتْ مِعْمُ	
۲	7.4	قَرْدُوْن 	٥	771	قَاقُلَة عُنْقُودِيَّة	
٤	177	قِرْصَعْنَة	7	787	قاقُلَّة مُتَوَسَّطة قانَة بُرْتُقالِيَّة	
٣	175	فِرْصَعَنِّي فِرْصَعَنِّي فِرْصَعَنِّي مِنْجَلِيْ	٧	19.		
٤	177	قِرْ صَعَنِّي	٧	97	قاۇون ھِنْدِيّ ءَو.	
٥	141	قِرْصَعَنِي مِنْجَلِيّ	۲ ا	۲۰۴	قَبَّ ار	8 8 1

6 0.4	<u>ج</u>	ص	مدخل	٤	<u>ص</u>	مدخل
ق ص ع	<u>ج</u> ۱	<u>صن</u> ۱۸۵	فُسُط بَرُّيّ	7	من ۱۰۹	قِرْط
	1	189	أ قُسُط شاميّ	٦	177	قَرْطُم بَرِّيّ
	*	714	قشطل	۲	١٨٨	قُرْطُم الصَّبّاغِيْن
	٦	١٨٨	قَسُطَل	٦	177	قَرْطُم صُوْفِي
	1	7.47	قَسُطُل الخَيْل	١	110	قِّرْطُمَان
	7	144	قَسْطَل قَزَم	٥	17.	قُرْظ
	1	7.47	قسطل جندي	٤	707	قَرْع
	٣	174	قشعلُودِيُوم	٥	١٦٣	قَرْع دُومِي
	٣	194	قشطُوس إقْرِيْطِشي	٦	174	قَرْع سُكْرِي
	1	PAY	قَسْوَر راحِيّ	٦	177	قرع مشكيق
	٤	177	قَسُوس	۲	79.	قَرْعَة
	٤	177	قَسُوس عريض الوَرَق	٥	170	قِرُفَة بيضاء
	1	YYA	قشؤس مُتَسَلِّق	۲	144	قِرْفَة سَرَنْدِيب
	٤	177	قَسُوس مَنقعيّ	٥	170	قِرْفَة الصِّين
	٦	14	القِبَيْس	٥	371	قِرْفَة مَالَابار
	٥	174	قِشْدِيَّات	٤	174	قرفة مَلَبَثْرُوم
	٤	148	فيشر غنبر	١	11	قَرْقَهان
	1	***	قِشْرَة مُقَدَّسَة	١	777	قَرْمَلَة
	۲	**	فِشْرة مُقَدَّسَة	٥	177	قَرْمَنْتِيْن صَدْرِيَّة
	۲	***	قشرة نَبْق پورْش	٧	***	قَرْن الأَيْل
	۲	YV1	قشرة هندوراس	١	T07	قَرْن الغَزال
	٦	۱۷۳	قِشْطَة سكاموزا	٤	174	قَرَنْفُل الزَّهَّارِيْن
	٦	١٧٣	قِشْطَة سَهُفِيّة	٥	177	قَرَنْفُل الشَّرْتَرِيَيْن
	٥	777	قِشْطَة شائِكَة	۲	14.	قَرَنْفُول
	7	178	قِشْطَة شَبَكِيّة	۲	141	قُرْنُوْس أَنْثَى
	٧	190	قِشْطَة شَريمُوْلِيا	٧	198	ڦُرْنُوس حَرِيْرِيّ
	٧	190	قِشْطَة مَنْقِعِيَّة	۲	197	قُرْنُوْس ذَكَرَ
	٥	174	قِشْطِيَّات	٦	174	قُرْنُوْس فلُوريدا
	1	791	تَصَب	٧	198	قُرْنُوسَ مَلْفُوف
	٣	14.	قَصَب قَصَب بَلَدِي قَصَب النَّرِيْرَه	٧	١٨٠	قَرْنُوْنِيَةً طارِدَة للدُّود
	1	7 8 0	قَصَب الذَّرِيْرَه	١	* 3 7	قُرِّيْص أَبْيَضَ
	٣	14.	قَصَب رُومِيّ	٧	197	قُرَّيْصَ رُوْمانِي
	۲	171	قَصَب رُومِيِّ قَصَبُ السُّكْر	٤	177	قُرَّيص العَجُوز
	١	7 2 0	قَصَب عِطرِيّ	١	3.47	قُرَّيْص كَبِيْر
	١	791	قَصَب المَكَانِس	v	44	قُرَيْطَفَة
	٣	14+	قَصَب النَّيْل	٦	۱۸۱	قُرَيْناء
	٤	7 2 2	قَصْعَة الماء الآسويَّة	٣	٨٢١	قُسْت عَرَبِيّ
	۲	۱۷۳	تَصْعِ يْن	٣	٨٦٨	فُسْشُس عَرَبِي
889	٦	178	قَصْعِیْن قَصْعِیْن قَصْعِیْن	٥	3 • 7	قريش المحجور قُرَيْطَفَة قُرَيْناء قُسْت عَرَبِيّ فُسْتُس عَرَبِيّ فَسْتُوس لاذَنِيّ

			İ			
<u>ح</u>	<u>صن</u> ۲۹۷	مدخل فَلَمَنْت الجَبَل	<u>ح</u>	<u>صن</u> ۳۹٦	مدخل قَضَاب صَغِيْر	ق ض ا
١		قَلْمَنْت الجَبَل	١		قضاب صغير	
*	195	قَلَمَنْت صَعْتَرِيّ الوَرَق	٤	307	قَضاب كَيْر قَضَاب لُبُنانِيّ قَضاب مُسَطِّح	
۲	198	قَلَمَنْت صَـنَيْنَ قَلَمَنْت قِرْمِزِيّ قَلَمَنْت مَخْزَيْنٍ	٦	307	قَضَاب لَبْنانِيّ	
٥	14	قَلَمَنْت قِرْمِزِيّ	٧	171	قضاب مُسَطِّح	
١	797	قَلَمَنْت مَخْزَنِيّ	١	797	قَضَاب مِصْرِيّ	
٥	15	قَلَمَنْت مُسْتَدِيْر الوَرَق		197	قَضاب وَرْدِيّ	
٤	14.	فَلَمَنْت نَبَتاوِيّ	٥	377	قَضَاب وَرْدِيَّ أَمْرِيْكِيِّ قَضِيْبُ الذَّمَبِ المَبْذُوْل	
١	۳	ئلۇتە ئلۇتە	٥	177	قَضِيْبُ الذَّهَبِ المَبْذُوْل	
7	10	قَلِي قُمَّام أَلْيَض قِمام أَحْمَر	١	77	قَضِيْب الرَّيِّ	
١	۲.	قُمَّام أَبْيَض	٧	17	قَضِيْب الرَّيِّ	
۲	197	قِمام أَحْمَر	٣	٧٢	قَطَب أبيض	
1	494	ا قمام أَسُوَد	1	797	قَطْران الْخَشَب	
1	487	قِمام آسِيّ	٥	179	قَطْرَان صَنَوْبَر مُصَفَّى	
۲	197	ُ مَامُ آسِيِّ قِمام آسِيِّ (الثَّمرة)	٤	179	قَطْران العَرْعَرِ الكاديّ	
٧	199	قِمام تُرْبِيّ	١	797	قَطْران نَباتِيّ قَطْرَان نَبَاتِي مُصَفَّى	
٧	191	قِمام جَبَلِي				
٦	177	قِمام جبلِيِّ قِمام عُثْكُولِيِّ	٥	179	(دستور ۱۹۲۵)	
٧	179	قِمام عُنْبُوبيّ	١	797	قَطْرَمُ الهِرّ	
٧	199	قِمام المَوْجِل	١	**•	قطع وطل	
٤	78.	قَمْع البَقَر	٤	۲.	قَطْع وَصْل خَيْطِيّ	
٣	337	قَمْع البَقَر الهِنْدِيّ	٣	19	قَطْع وَصْل مَنْقَعِيّ	
۲	197	فَنْح نَخِينَ فَنْح عَرَبِيْ فَمَرِيَّة كَبِيْرَة الزَّمْر تُمْمِيَّة أُرْجُوانِيَّة	١	١٨٠	قَطَفُ أَبْيَض قَطْلَب أو قُطْلُب شائِع	
۲	194	قَمْح عَرَبِيْ	١	3 P Y	قَطْلَب أو قُطْلُب شائِع	
١	7 • 9	قَمَرِيَّة كَبِيْرَة الزَّهْر	٥	14.	قَطْلَب عُنْكُولِيّ	
١	731	تُمْعِيَّة أَرْجُوانِيَّة	٤	1 🗸 •	قُطُن قُطُن مُنا مِن مِن	
٤	171	قنا الهِنْد	٣	۱۷۲	قطن خشِيشِي	
۴	77	قَناوَشَق	٣	174	قُطُن الشَّرْق	
۲	194	ا قُنَّب	٥	171	قُطُن مَنْدِوف خام	
٥	171	ٔ قُنَّب	٥	171	قُطْن مُنَفَّش خام	
٥	171	قنب قُنَّب شَائِع فُنَّب مَانِيْلِيَة فُنَّب مَكْسِيْكِيّ مُ	7	140	قُطْن يُودِيِّ	
٥	70.	أُ قُنَّب مانِيْلِيَة	7	۸٩	ق غب ارُوْن	
7	44	قُنَّب مَكْسِيْكِيّ	۲	7 • 9	قُفْلوط	
١	799	قُنَّب نَسِيْجِيّ	1	790	قُلَّاع شائِع	
٥	171	أُنُّب نَبِيْجِيّ	٦	1 V E	مَلْبِ الثَّوْر	
1	799	قُنْب هِنْدِي	*	177	قِلْقاس رُوْمِيّ	
٥	171	فنب محييكي قُنَّب نَيهْجِيَ فُنَّب فِيْدِيَ قُنَّب هِنْدِيَ قُنَّب هِنْدِيَ	٦	171	قُلْقاس زِرَاعِيّ	
٧	19.	قُنْبُر جَمِيْلُ قَنْبُر قَصِيْر الفَصّ	٦	140	قُلْقاس اَلقُدامَی قُلْقَاس مَاکُول	
7	14.			171		
7	170	ا قِنَة مَبْذُولة		198	قَلَمَنْت جِبال لُبْنان	٤٥٠
						•

				Ī		
كار	<u> </u>	<u>ص</u>	مدخل	<u>ج</u> ۲	<u>صن</u> ۲٦	مدخل
	7	144	فُوَيْسَة قَاسِيَة	٣		نِنَّةً مَهُجُونَة
	٥	177	قُوَيْسَة كَالْسِيَّة	١	7.7	قُنْدَرُوس شَكَّال
	٥	177	قُوَيْسَة مُتَعَدِّدَة السُّوْق	١	7.7	قَنْدَرُوس مُتَقَبِّض
	*	199	ئۇرىسىة مىخىزىيەت	٧	١٨٢	قَنْدَرِيْس خُرْشُوفيّ الرّأس
	٣	148	قُوَيْسَة مَخْزَنِيَّة	٧	١٨٢	قَنْدَرِيس لَبْناني
	۲	7	قُوَيْسَة المُرُوْج	٧	١٨٣	قَنْدَرَيسَ مُغايِرٌ الشَّوْك
	٥	140	قُرِيْتَة مُهَيِّجَة	١	7.47	قَنْدلِي هِنْدِي
	٥	١٧٦	أَوْيْسَة هُرْمِينيَّة	٧	۲0٠	قِنْدِیْد قُنْسُوس
	٣	١٧٢	قُوَيْصة	٥	4 • 8	فَنْشُوس
	7	144	قُويْصَة قَاسِيَة	١	۳	قِنْصُوْر شائِع
	۲	199	قُوَيْصَة مَخْزَنِيَّة	١	4.1	قَنْطارِيُوْن صَغِيْر
	١	797	فير	١	7.7	قَنْطَارِيُوْن فَخُيِّ
	۲	٧	قَيْسُون	٧	Y•1	قَنْطُريُوْن أَسْمَر
	٧	Y • Y	- ق ي سُون	٥	۱۷۴	قَنْطُرْيُون أَنِيْق
	١	3.7	قَیْصُوْم قَیْصُوم أُنْثی	٥	178	فَنْطُرْيُونَ الشَّيلي
	٧	7.7		١	4.1	قَنْطُرْيُوْن صَغِيْر
	٦	۲	قَيْصُوم جَبَلتِ	٥	۱۷۳	قَنْطُرْيُون ظَرِيْف
	1	3.7	أ قَيْصَوم ذَكَر	٥	178	قَنْطُرْيُون كَبِيْر
	٣	140	َ قَيْقَبُ قَيْقَب أَبْيَض	١	317	قَنْطُرْيُوْن مُبَارَك قَنْطُرْيُوْن مُبَارَك
	٣	140	قَيْقَب أَبْيض	٥	100	قَنْطُرْيُونَ مُزَوَّى
	٣	140	قَيْقَب أَخْمَر	١	4.4	قَنْطُرْيُوْن نَجْمِيّ
	۲	140	قيقب پَنْسِلْڤانِيا	٤	171	قُنْفُخ قُنَيْطَسَة ڤالَنْسِيا
	٣	140	قَيْقَب جِمَّيْزِيِّ	٧	44	
	٣	140	قَیْقَب حَرَمُون	٤	177	قُوتُو (قشرة الـ)
	٣	140	قَبْقَب حَقْلِيّ	٣	117	قورس
	٣	140	ُ قَيْفَ دِلْيَ قَيْفَ سُكِّرِي	7	44	قُوْطَة
	٣	171	قَيْقَب سُكِّرِي	٤	194	قُوْقاع صِيْوانيّ
	٣	140	قَيْقَب سُورَيّ	٣	144	قُوْقاع مُستَدير الوَرَق
	٣	140	قَيْقَب طوريد كابُوك خُماسِيّ الأسْدِيَة	٣	174	قُوْقَحان مُنْيات
	٣	۱۷۸	كابُوك خُماسِيّ الأَسْدِيَة	٣	144	قُوَيْسَة
	٧	777	کاپِي	٤	174	قُوَيْسَة بُوْصِيْرِيَّة الوَرَق
	٥	44	کابِي کاجِیبُوت کاجِیبُوت	٦	148	قُوِّيْسَة تُفّاحِيَّة
	۲	120	کاد هِنْدِي	٧	7 • 7	قُوَيْسَة الجَبَل
	٤	178	كاراپًا تُولُوكُونا	٥	140	قُوَّيْسَة خَضْرَاء
	٤	3 V f	كاراپًا جَذَّابَة	٥	171	قُوَّيْسَة خضراء هُرْمِينيَّة
	٤	178	كاراپًا مُلْفِتَة	٤	177	قُوَيْسَة دَبِقيَّة
	١	7.1	گار ّاغَاهِیْن	٤	١٧٢	قُوَيْسَة صَغِيْرَة الفَتْحَة
	١	7.7	كَارًاغِيْن	٦	178	قُوَّيْسَة العَفْص
103	١	414	كارِي أَصْفَر	V	7.7	قُوَيْسَة الغاب

			1			
ح	<u>ص</u>	مدخل	ح	<u>ص</u>	مدخل	ك 1 س
٣	صن ۱۸۲	مدخل کبراشو بیروبا	1	<u>صن</u> ۲۱۱	مدخل كاسِر الحَجَر	U
٤	1 🗸 ٩	كَبْراشُو كُولورادو	٤	140	كاسِيَّة الجَماييْك	
*	3 • 7	كِبْريبادِيوم قَبْقَابِيّ	١	٣.٧	كاسِيَّة مُرَّة كاشم كاشم رُوْمِي	
١	115	گذلت نَاتِين	١ ١	37	گاشّ م	
٣	141	كِبْشُ الْقَرَنْفُول	١	37	كَاشَىم رُوْمِيّ	
7	7	ػؠۣ۠ػؘۼ	١	37	کاشن	
٥	140	كِبْشُ القَرَنْفُوْل كَيْنِكَج كَيُّوْسِيْن صَغِيْرَة كَيُّوْسِيْن صَغِيْرَة	۲	7 • 7	كافور	
١	717	گپُوسِين گبِيْرَة	٣	144	کور کافُور	
۲	3 • 7	كَتَّان بَرِّيّ	٤	177	كافُور طَبِيعيّ	
1	717	كَتَّان زِراعيّ	٤	177	كافُور اليابان	
٤	14.	كَتَّان زَهْرِيّ	٤	177	كافُور يَمِيْن	
٤	14.	كَتَّانَ الزُّيْر	٣	174	كافُوْرات	
١	414	كَتَان شائِع	١	404	كَافُوْرِيَّة دَلْمَاسِيَا	
٤	١٨٠	كَتَّان كبير الزَّهر	٤	144	كافُورِيَّة مُون پوليَيْه	
٧	7.7	كتان مُشهل	٥	141	كافَيِيْن	
٤	179	كَتَّان مُعمَّر	١	4.4	كاكاو	
٤	١٨٠	كَتَلْها شائِعَة		174	كاكاو	
٤	١٨٠	كَتُوابا		144	كاكاو (زُبْدَة الـ)	
٤	١٨٠	كَتُوابا مِيْرانْدُون	٤	١٣٥	كاڭتُوس	
١	707	كُتَيْهَة	١	٣1.	کاکَنْج	
١	100	كَتُاه	۲	7.7	كامالا	
٦	١٢	كُثَيْراء	٦	707	كَانَنْغا عِطْرِيَّة	
٦	141	كَجْنُوس كاجَن		144	كامِئْسَة	
٦	١٨١	كَجْنُوس هِنْديّ	٦	144	كامِنكَة	
٥	10.	کُحْلَی کَذّان	١	***	كاواكاوا	
٣	۸٠	كَذَّان	۰	141	گاو نْشُوك	
٥	144	كُرّاث الدُّبّ	٣	1.4.1	كاوَشِيْر	
٣	3.47	گُڑاٹ رُوٰمِي	٧	7 + 7	كَايَاپُوْنِيَا كُرَوِيَّة	
۲	7 • 9	گُرّاث عَسْقَلون	٥	**	کایُلْمِدُرا کایِنْسَة کَبَابَة کَبًاش	
۲	7 • 9	كُوّات كُرَوِيُّ الرَّأْس	٦	144	كايِنْتَة	
7	148	گُڑاٹ مَعْرُوف	٦	174	كَبَابَة	
٤	141	گُرَّات نَبَعلِيّ	٣	17	كَبَّاش	
٣	140	كَرِّ اغَي ْنات	٤	**	كَبدِيَّة اليَنابِيْع	
١	107	كَرامِيْرِيَا ثُلاثِيَّة الأَسْدِيَة	٣	114	کَبَر جِلْدِيِّ کَبَر شَائِك	
۲	140	گراویا	۲	7.7		
۲	*1.	كَرْبَل عَرِيْض الوَرَق	٥	١٨٣	كَبَر شَائك أَبْيَض	
٥	٨٤	گَرَد	٥	148	كَبَر صَغِيْر الزَّهْر	
٦	148	كَرَز بَرِّي	٣	141	كمبراشُو أبيض	
١	710	كُرَّات الدُّبَ كُرَّات رُوْمِيْ كُرَّات عُسْقَلُون كُرَّات كُرَوِيُّ الرَّأْس كُرَّات مَعْرُوف كُرَّاث نَبْطِيْ كُرَافِيْات كُرافِيا كُرافِيا كُرْبَل عَرِيْض الوَرَق كَرَد بَرِّيْ كَرَز حامِض	٤	149	كَبْراشو أَحْمَر	703

ك ش ك	<u>ح</u>	ص	مدخل	ح	ص	مدخل
د. س د	7	<u>ص</u> ۱۸٦	مدخل گرْمَة الصَّبًاغِيْن	<u>ح</u> ۲	عن ۲۱۱	<u>مدخل</u> گرَز حامِض
	٣	۸V	كَرْمَنْتِيْن صَدْرِيّة	۲	*1.	كَرَز الطَّيْر
	٣	Y • 9	كَرْمَنْتِين عُنْكُوليّ	٦	3.47	كَرَز الطَّيْر
	٤	140	گزنیجیا کرُوتُن الزَّیْت	1	710	کَرَز عادِيّ
	٦	١٨٦		*	711	کَرَز عادِيّ
	٤	140	كرُوتُن صِباغِيّ	٥	114	ك َرَز عُ نْقُودِ ي
	٤	341	گُروتُن عَنْبَريّ	١	717	كَرَز الغار
	7	144	گرُوتُن عَنْبَريّ	١	717	کَرَز غارِيّ
	٦	144	كرُوتُن لَكِّيّ	١	٣١٠	كَرَز القُدْس
	٤	140	كرُوزُوفُور صِباغِيّ	٤	14.	گُراشف کِرْسَنَّة
	٦	311	كرُوسْن اليابان	٣	TAI	كِرْسَنَّة
	1	177	كرُوْكُو	٦	117	ڮڒۺ
	٥	**	كُرُوْكُو كُرُوْنِلَا مُرَفِّضَة	٤	141	کَرَئْس
	٣	140	گرَوْی اء	1	414	كِرْش كَرَفْس كَرَفْس بَرْيّ
	٦	١٨٨	كريْزارُويِيْن	٥	19.	كَرَفْس بَرِّيّ
	٣	7.67	كرِيْزارُوبِيْن كِرِيسَّنْتِيا كُوجِيتَى	٧	7 • 9	كَرَفْس الجَبَل
	١	٤١	كَريْكة بَبَّايا	۲	**	كَرَفْس رُوْمِيّ
	٦	70	كُرِيْكَة بَيَّايا	£	**	كَرَفْس رُوْمِيّ
	*	717	كرّيمات أدَمِيَّة	٦	١٨٥	كَرَفْس لِفْتِيّ
	۲	Y 1 T	كريمات طبية	٧	۲۱.	كَرَفْس الماء
	٧	***	گُرْيَنْتِس يُؤهِمْب	٧	71.	كَرَفْس الماء الضَّيِّق الوَرَق
	١	771	كُوْبَرَة البِيْر	٦	7.47	كَرَفْس الماء العَريْض الوَرَق
	٥	141	كُوْبَرَة البِيْر كُوْبَرَة البِيْر الأَثْيُوبِيّة	٧	71.	كَرَفْس الماء المُنتَصِب
	٥	191	كُزْبَرَة البَيْر البَيْضاء	١	410	كَرَفْس المَناقِع
	٥	141	كُزْبَرَة البَيْر الكَنَدِيّة	٤	١٨٢	كَرَفْس نَبَطِيّ
	٥	197	كُزْبَرَة البَيْر المَكْسِيْكِيَّة	١	717	كَرَفْس نَيْن
	١	07	كُزْبُرَة الثَّعْلَب	٣	۱۷۲	كَرْكاش
	٣	٥٣	گُزْبَرة الحَبَشة	٤	۱۸۳	کَرْکَدي
	۲	144	كُزْبَرَة مَزْرُوْعَة	٤	١٨٢	كَرْكَدِيّة
	٥	197	كَزْوَرِيْنَةَ كُنْبَائِيَّة	1	719	كُرْكُم أَصْفَر
	7	١٨٨	كشتنة	۲	717	كَرْكُويَة كُرْكُم أَصْفَر كُرْكُم جُوِّيّ
	٦	144	كَسْتَنَة صَغِيْرة	٧	711	كُرْكُم صِباغِيّ
	۲	717	كَسْتَنَة مَبْذُوْلَة	1	177	ػؙڒڲۑ۠ؠؘڡٵڛ
	٦	149	كَسْتَنَهُ صَغِيْرة كَسْتَنَهُ مَبْذُولَة كَسْتَنِيَّة ذَهَبِيَّة الوَرَق	٧	717	گُرْکِیْمَاسَ کَرْلِیْن ذَهَبِیْ
	١	197	كُشْفَرَة الحِمَار كَشُوْب تَحْتصَنَوْبَر	Y	717	كَرْلِيْن شائِع
	۲	317	كَشُوْبِ تُحْتَصَنَوْبَر	١	***	كَرْلِيْن عَدِيْم السَّاق
	۲	317	كَشُوْب تَخْصَنَوْبَرِيْ	1	***	گزاین نَجْمِی
	٦	114	كُشْبُر	٦	781	كَرْمَة أَرْجُوَانِيَّة
204	١	44.	ا تحفير كفك الماز	٦	7.87	كَرْمَة حَمْراء

			ı			
ح	<u>ص</u> ۲۰	مدخل کُنْبات اَفْرَع	<u>ح</u> ۲	<u>صن</u> ۲۱۵	<u>مدخل</u> كِشْمِش أَحْمَر	ك ش م
٤	۲.	تُخْبَات أَفْرَعِ	۲		كِشْمِش أَحْمَرِ	10-
٣	14	كُنْباث الحِقْل	۰	195	كِشْمِشُ الاسْقُمْرِي كِشْمِش أَسْوَد	
٣	19	كُنْبات الشِّتاء	١	444	كِشْمِش أَسْوَد	
٤	71	كبات المخفل كُنباث الشّناء كُنباث مُسْتَنفَمِيّ كُنباث مَنفَعِيّ كُنباث المَوْحِل كُنبُاث المَوْحِل كُندُر	٥	195	كِشْمِشْ شانك كِشْمِشْ عُنْقُوديّ	
٣	19	كُنْباث مَنْقَعِيّ	۲	710	كِشْمِشْ عُنْقُوديّ	
٣	٧.	كُنْبات المَوْحِل	٣	781	كُشْنَى كَشُوْت أَوْرُوبُيِّي	
٥	7.7	كُنْدُر	۲	710	كَشُوْت أَوْرُوبِّين	
١	***	كُنْدُوْرَنْغُو	١ ١	78 A	كَشُوْت الزُّعْتَر	
١	***	كُنْسُوْدَة كَبِيْرَة كُنْسُوْدَة مَخْزَنِيَّة	٤	4 • \$	كَشُوث أُحادِيّ البزْرَة	
١	777	كُنْسُوْدَة مَخْزَنِيَّة	٣	11.	كَعْب الغَزال	
٦	184	كُنْسُوْدَة مَلَكِيَّة كَنْكَالِيْبًا رَامْبُوْلْت	١ ١	377	كُعَيْب	
١	740			144	كُعَيْب كُفّ الدُّب كَفّ السَّبْع كَفّ الصَّبَّاغ كَفّ الضَّبْع كَفّ النَّسْر	
٣	144	كَنْكِيْنا	٦	7.7	كَفّ السُّبْع	
٧	717	كَنْكِيْنا پيتايُو	١	190	كُفّ الصَّبَّاغ	
١	777	كَنْكِيْنَا حَمْراء كَنْكِيْنا حَمْراء	٦	77	كَفّ الضَّبْع	
٥	199	كَنْكِيْنَا خَمْراء	١	174	كَفّ النَّسْر	
٤	197	كَنْكِيْنا رَمادِيَّة	١	777	كَفْنَةَ مَدَّادَة	
٦	194	كَنْكِيْنَا صَفْراء مَلَكِيَّة		198	كِڭْسِيَة خَرْشاء	
٦	195	كَنْكِينا كَالِيْزايا		19.	كِلَّاجَه الصَّابُون	
V	717	كَنْكِيْنَا كِولُومْبِيا الصَّفراء		149	كَلادِيُون ثُنَائِيّ اللَّون	
٤	197	كَنْكِينَا لُوكْسَا	٦	19.	كِلَّايا الصَّابُون	
ŧ	99	كَنْكِيْنَا مُنْحَسَة	٦	١٦٥	كِلْخ كَلْخ كَلِيْوُپُودِيُوم شائع كَمادرِيُوس كَمارَة البرازيل كَمانِيْطُوس	
٥	۲	كَنْهَان صِبَاغِيّ	٥	194	كلِينُوپُودِيُوم شائع	
٣	189	كَهْرَمان		*17	کَمْ•	
٣	115	گوبال	7	331	كَمادرِيُوس	
٣	14.	كُوبْتيس	٤	79	كمارة البرازيل	
٣	191	گوبئیس گوبئیس نِکْتا	٧	101	كما فيطُوس	
Ţ	191	كُوبْتِيس ثُلاثيّ الوَرَق	٧	317	كَمالِيَّة البَرِّ	
٣	191	گوبْتِيس غرُوَنْلاند	٧	317	كَمَالِيَّةُ الجُفُول	
٣	191	گوپْنِيس ماميرا	1	444	كَمالِيَّة مَبْذُوْلَة	
٣	191	كُوبْتِيس اليابان	٧	710	كماليَّة مُتَوَّجَة	
٧	*14	كَوْقُلُ الكاشُو	1	777	كَمَالِيَّةُ المُرُوْجِ	
٧	97	گور <u>ُن</u> يشُون	٧	710	كَمالِيَّة مُكَلَّلَة	
٦	71	كُورُونِيلًا عَقْرَبِيّة	٣	171	كَمبُوْجِيا	
٧	44	كوبتيس عرونلاند گوبئيس ماميرا گوبئيس اليابان گورئيشُون گورئونينلا عَقْرَبِيَة گورئونينلا غَبْراء گوري گوري گوري سَن گوزام بُرؤسِيَة مُرَّة	*	٦	كُمَّشُراة	
٤	198	گوري	١	٥	کُئٹری	
٦	77	گۇري سَن	٦	377	كمكام	
٥	7 • 7	كُوْزام بُرُوْسِيَّة مُرَّة	١	417	كَمُّوْن	
٤	198	ا ئۇشو	١	***	كُنُّاث	٤٥٤

				ı		
ل ب ن	ت	ص	مدخل لازَرْپِیْتِیُون عَرِیْض الوَرَق لاصِف	ح	ص	مدخل
0 - 0	٤	<u>ص</u> ۲۰۰	لازَرْبِیْتِیُون عَرِیْض الوَرَق	٤	<u>ص</u> ۱۹۷	كُوسِيْلَانا
	٧	777		٤	٥٩	گۇشاد
	٦	٧٦	لالة	١	V9	گۇشاد أَصْفَر
	*	771	لامِیْنارِیَة سُکَّرِیَّة	۲	٦٠	گۇشاد مَقِر
	*	***	لامِیْنارِیَة کلُوشْتُون	٦	198	كُوْشِيَة المَكَانِس
	٣	۱۹۸	لامينارية مُتَصَبِّعة	Ý	*14	كُوْكا
	٣	۱۹۸	لامينارية مُتَلَوِّيَة السُّويْق	٧	719	كُوْكا
	١	48.	لامِيُوْن أَبْيَض	٧	***	كَوْكَبِيَّة كَبِيْرَة
	٤	۸۲	لاوَنْدَة ذَكَر	٧	719	كَوْكَبِيَّة كَبِيْرَة كُوْكِه كُوْكِه
	*	۸٠	لاوَنْدَة مَخْزَنِيَّة	٧	37	كَوُكُولُس عَرِيْضِ الوَرَق
	٣	٧٨	لاوَنْدَه أَصْلِيَّة	٤	119	كُوكُولُس غاَدِيّ الوَرَق
	٥	٧٤	لَاوَنْدَه بَحْرِيَّة	٧	44	گوڭولُس گونْدُودَنْدَرُون
	٦	7 2 1	ئب	٤	119	گوڭولُس مُختلِف الوَرَق
	٥	7.7	ئب ئيان	١	440	گُؤلا بَلَّايْ
	٥	Y•V	لُبَان حِبَشِي	1	440	كُوْلا دَوَّارِيَّة
	0	7.7	لُبَان ذَكَر	1	440	كُوْلًا دِيُوْلًا
	٥	7.7	لُبَان سَعُوْدِي	١	440	كُوْلًا صَغِيْرَة
	٥	Y•V	لُبَان فِرِيْرْيَان	١	440	كُوْلًا لَامِعَة
	٥	7.7	لُبَان كارْتَر	1	440	كُوْلا مُسْتَدِقَّة الطَّرف
	٥	7.7	لُبَان هِنْدِيّ	١	PAY	كُولُومْبُو راحِيّ
	٥	Y•V	لُبانَةُ المُتَوَسِّط	٤	371	گولُونيا
	۲	171	لُبانَة مَغْربيّة	٤	771	كُوْمَرُوْنَة
	٣	٧١	ا كَبْت	٧	37	كُونْدُودَنْدَرون لِبْدِيّ
	٥	70	كَبْث كَبْخ كَبْخ الجَبْل	٧	۲٥.	گونياك
	٤	114	لَبَحَ الجَبَل	1	441	كِيْس الرَّاعِي
	١	148	لِيْدَان	٤	194	كِيْمَافِيْل صِيْوَانِيّ
	٥	40	ا لَبُك	٣	144	كِيْنا
	1	137	لَبُلابِ أَبْيَض	1	444	كيْنَا حَمْراء
	1	**1	بَبُرِب أَبِيسَ لَبُلاب أَرْضِيَ لَبُلابُ الحُقوْل لَبُلاب خُبَيْزِي الوَرَق	1	١٠	لا تَشْنِي
	*	377	لَبْلابُ الحُقوْل	۲	***	لادَن
	٥	Y • A	لَبْلاب خُبَيْزِيّ الوَرَق	۲	***	لاذَن
	1	137	لَبْلابِ السَّيَاجات	٥	3 • 7	لاذَن إسْبانيّ
	٥	Y • A	لَبُلاب فِضِّي	٣	197	لاذَن إِكْرِيْتِيِّ
	1	721 LTTA	لَبُلَابِ كَبِيْر	٣	197	لاذَن طُوطِيّ
	١	441	لَبُلَابِ كَبِيْر لَبُلَابِ المَجُوْس	٧	777	لاذَن قُوَّيسِيِّ الوَرَق
	٤	Y • •	لَبُلاب مَشْوَكان	*	**1	لاريْس أورُوبَّة
	٣	Y • 1	لُبْنَى لُبُنَى تُونُكان	٤	7	لازَربِيْتِيُون بحرِيّ اللَّون
	*	770	لُبْنَى تُونُكان	٤	7	لازَرْبَيْتَيُون ثلاثَيَ الفُصوص
200	۲	770	لُبْنَى الْمَيْعَة		7	لازَرْبِيْنَيُون سَرْمُنْتانيّ

<u>ح</u> ۲	<u>صن</u> ۱۱۶	مدخل لِفْتِيَّ رُنْ	ج ۱	<u>ص</u> ۳٤۲	مدخل لُكُن المُرُوْح	ل ب ي
ŧ	3 • Y	لَفْلاف أحادِي المِدَقَّة	٤	٨٢	لَبَيْن اَلْمُرُوْج لُبَيْنَهُ لُبَيْنَهُ	
۲	710	لَفْلاف أَوْرُوبَيِّي	١	404	لِيَّةً لَبْمُوْنِيَّة	
١	TEA	لَفْلَاف الزَّعْتَر	۲	770	لِتَّيْن دَبِقَ	
١	457	لَفْلَاف صَغِيْر	٥	۲۱.	لِتَيْن شَائِك	
٣	14	لَقْمَة النَّعْجَة	۲	770	لِتَّيْنَ غِدِّيِّ	
7	7	لَكّ (راتِنْج)	٥	711	لِتَّيْن قَصِيْر الزَّهْر	
٤	3 • 7	لَکُبُّ امْرِیکِیَّ لَکُیُّ مَلِیْسَلِیّه	٥	711	لِئَيْن لَزِج لِئَيْن مَدَّاد	
٥	717	لَكُبُّهُ طَلِبَدلِية	١	737	لِتَّيْن مَدًّاد	
٤	4 • 8	لَكُنَّة عُشارِيَّة الأَسْدِيَة	١	191	لَحْلَاح	
٣	337	لَمَّام لَمْبِسَانَه مَبْذُوْلَة	٦	170	لُخُلَاح	
٣	۸۰	لَمْبِسَانَه مَبْذُوْلَة	٧	140	لَحْلاح دُوْكاين	
۲	140	لِمُشْمِرُم نِيْلُوْفَرِيَّة لَنْج لُوٰبِيَاء شُوْدانِيَّة	1	317	لِحْيَة النَّيْس لِحْيَة النَّيْس	
1	387	لَنْج	۲	148		
7	141	لُوْبِيَاء سُوْدانِيَّة	١	371	لِحْيَة جُوبِينَر	
٣	7.7	لُوبِيْلِيَة زَرْقاء	٣	174	لِحْيَة العَنْز	
٣	7.7	لُوٰبِیٰلِیَة السُّفْلِس	٦	198	لِحْيَة مار الياس	
1	P37	لُوبِيْلِيَة نَافِخَة	١	717	لِحْيَة المَاعِز	
٤	7.7	لُوْتِيا الجِبال	١	397	لَزَّان المَكَانِس	
٦	7.7	لُوْتِيا نافِعَة	٥	717	لِسَان النُّور الأَزْرَق	
*	*1.	لُوْرَة	١	40	لِسَان الثَّوْرِ المَخْزَنِيّ	
1	7.9	لَوْزِ الآلِهَة	٥	717	لِسَان النَّوْرِ الهَجِيْن	
٣	179	لَوْزِ الآلِهَة	1	T\$7	لِسَان حَمَد	
١	70.	لَوْز خُلُو	٤	7.7	لِسان الحَمَل	
۲	744	لَ وْز مُحلو		337	لِسَان الحَمَل الأَفْرِيْقِيَّ لِسَان الحَمَل الأَفْرِيْقِيَ لِسَان الحَمَل البَّرْخُوْثِيِّ لِسَانُ السَّفَوِيِّ لِسَانُ السَّفَوِيِّ لِسَانُ الحَمَل السَّانِيِّ	
۴	7.4	لَوْز مُرّ	1	337	لِسَان الحَمَل البَرْغُوثِينِ	
٦	**	لَوْز هِنْدِي	٥	317	لِسَانُ الحَمَلِ البَيْضُوِيّ	
١	70.	لَوْزَة مُحلُّوة	٦	197	لِسَانُ الحَمَلِ السَّنانِيِّ	
٤	Y•V	لُوْسِيْمانِحُوْس مَعْرُوْف	٧	***	لِسان الحَمَل القَرْنِيّ	
۲	777	لُوْسِيماخُوْس نَقْدِيّ		787	لِسَانِ الحَمَلِ الكبِيْر	
١	707	لُوْطُس الجِبَال		777	لِسانُ الحَمَلِ المُتَوَسَّط	
١	707	لُوْطُس قَرْنِيّ		317	لِسَانُ الحَمَلِ المُرْتَدّ	
۲	***	لُوْطُس النَّيْل		700	لِسَان العُصْفُور	
٣	٧	ا أوف .	*	777	لِسان الغزالِ القَمَرِيّ	
٣	3 • 7	أوف أشطواني	١	787	لِسَان الكَلْب	
٧	117	لُوْف عِطْرِيِّ ﴿ لُوْفٌ مُبَقَّع	۲	AYA	لِسان الكَلْبِ المَخْزَني	
۴	٨	لُوْفٌ مُبَقَّع	1	717	لَشْهَادِيْزَا مُنتَّفِخَة الرَّأْس	
٣	3 • 7	أوف مِصْريَ	١	101	لُفَان	
١	707	لُوْيْزَة لَيْمُوْنِيَّة	۲	77.	لِفْت	203

				ı		
م س ت	<u>ح</u> ب	<u>ص</u>	مدخل مُدَّیْد حِرْجِل	<u>ح</u> ۳	صن ۲۰۶	مدخل
- 0-1	٤	<u>من</u> ۲۱۲	مُدَّيْد حِرْجِل	٣		مدخل لینف لینکوب فرجینیا
	١	4.4	مَوَار	٣	3 • Y	ليْكُوْب فِرْجينِيَا
	١	7.7	مُوَّار	٤	101	لِيْكُوبِ مائتي
	1	4.1	مرارة الخنش	٣	15	لَيْلَك أَزْرَق
	١	1.7	مَرارَة الصَّحارَى	١	73	لَيْمُون أِضاليا
	٣	717	مُرّان زَهْرِيّ	٤	Y • A	لَيْمُوْن أَفَنْدِي
	١	700	مُرَّان شَامِخ	٣	Y • 0	لَيْمُون حامِض
	٣	717	مُرّان شائع	٤	۲.۸	لَيْمُوْن حامِض
	١	700	مُرَّان كَبِيْر	٥	*1*	لَيْمُوْن هِنْدِيّ
	٤	717	مُرَّان مُسْتَلِيْر الوَرَق	٥	198	لِيْنَارِيَة حَرْشَاء
	٣	717	مُرّان مَنّي	٣	Y•V	لينارية صَغِيْرة
	٦	٨٤	مُرَّانِيَّة بَيْضاء	١	AV	لِيْنَارِيَة صِنَاجِيَّة
	Υ	717	مَراهم أَدَمِيَّة	٦	7 • 7	لِيْنَارِيَة عَادِيَّة
	**	717	مَراهِم طَبَيَّة	7	377	الماء / ماء
	٧	777	مِرّة الثَّوْر	٧	70.	ماءُ الحَياة
	٣	717	مَرْجان البَحْر	١	17	مَاتي
	٦	181	مَرْجانِيَّة سَوْداء	٧	777	ماتینکا
	٤	719	مَرْجانِيَّة مَخْزَنِيَّة	٧	AAA	ماتینگو
	Y	137	مَرْدَكوش	٤	1 1 1	مارْزُوان
	٣	717	مَرْدَكُوش	٥	17	مَارُوْت
	٤	**	مَرْشَشِيَة شَكَالَة	٧	101	مَارُوم
	٧	707	مَرْعان	٥	۸۲	مَازَرْيُون
	٧	104	مَرْمَاخُور	٧	444	مازَرْيُوْن
	۲	737	مزهم شنعي	۲	۲۱	ماشو
	٣	*14	مَرُوخ	1	777	مَاطَرْشِلْبَه
	٤	777	مَرُوخ الغليشرين	٣	Y • 9	ماناكا
	١	7.7	مَرُوخَ الغليشرين مُرَّيْر	٣	Y • 9	ماهاليتا
	١	3 • Y	وکاه ر مریزه د کار	٥	**	ماهُوغُون
	٤	111	ا مُأْنَّة تشاد	٤	377	ماھُؤن
	٧	١٢٥	مُرَّيْرَة الغابُون مُرَّيْرَة كُمْب مُرَّيْرَة كُمْب	٥	**	ماهُون
	٤	111	مُرَّيْرَة كُمْب	٥	۸۲	مَثْنَان
	٧	140	مُرَّيْرَة لَطِيفَة	٥	٤٤	مِجْزَاعَة
	٣	١٠٨	مِرْيْس	٧	177	مِجْزاعَة بَرِّيَّة
	۲	199	مَرْيَمِيَّة	٤	711	مِحْجِيْن عَرِيْضُ الوَرَق
	٣	771.371	مِرْيْس مَرْيَمِيَّة مَرْيِمِيَّة مَرْرِيْطَة	7	T • V	مَحْلَب
	٧	1 • 9	مَزْرِيْطَة	4	141	مَحْمُودَة
	4	787	ا مزمار الراعي السّنانيّ	١	400	مِخْلَبُ الشَّيْطَان
	٥	777	مِزْمَارُ الرَّاعِي المَاثِيّ	٦	7.7	مُخَلَّصة
٤٥٧	٣	770	مُشْتَخْلَص الْخَسَ (عَصير)	١	411	سبن مِجْزَاعَة مِجْزِاعَة بَرِّيَّة مِحْجِيْن عَرِيْضُ الوَرَق مَحْمُودَة مِخْلَبُ الشَّبْطَان مُخَلِّصة مُخْلَصة مُخِلَّصة

چ	<u>ص</u> ۳٦٠	مدخل مَغْث غَرَوِيٌ	<u>ج</u> ۱	<u>صن</u> ٦٤	مدخل مُسْتَدِرَّة شائِعة	م س ت
1		مغت عروِي - اند انداره	٤		مستيرة سايعه مُسْتَدِرَة مُرَّة	,
١	7 2 0	مَغْث مِنْشَارِيّ . :		73	مىنتىرە مرە مَسْخُوق غُوا	
,	101	مَغْد مَغْد أَسْوَد	٠ س	0 P77	مستحوق عوا مِسْك	
٤	777	معد اسود مُغَلْسَرَة النَّشاء	``	7.5	مِست مِسْك الجِنّ	
٤	772	المعلسرة النساء	\ \ \	77	مِسْك الجِن مِسْك الجِنّ	
٨	***	مَنْنَة مَنْنَة	•	**	مِسْكَ (مُصادِره الحيوانيَّة	
٧	Y08	منت مَغْنُولية بَحْريَّة اللَّون		771	مِسَّت رَعْمُهُ الرَّهُ الْعُمُوالِيَّةِ والنَّبَاتِيَّةِ المُختلِفةِ)	
*	701	مَغْنُولِيَة كَبِيْرَة الزَّهْرِ مَغْنُولِيَة كَبِيْرَة الزَّهْر		77	مُشكِر الحُوت	
1	179	مفويه كبيره الومر	۲	£ £	مُشْكِر الحوت	
٣	117	مِفْتَی مَفْر مَفْر	٠	18.	حسير .لحوت مِشْواك الرّاعي	
, V	70	سر منان	٥	107	مِسُونے مِسَّيْکَة	
,	٣١	مَعْر حَقَة -	ź	7 £ £	مُشْتَرِكَة فِيرْجِيْنِيَّة	
۲	Y7.	مَقْرُ حَقِيقِيّ مُقْل (صَمْع ال)	١	T0V	مُشْطُ الذِّنْبِ	
١	771	مُقْل الصَّيْف	۲	Y 0 &	مُشْط الرَّاعِي	
٤	170	مُقْلَة القاضي		707	ر يي مُشْط الرَّاعِي البَرِّي	
٧	19.	مَكْلُورَة بُرْتُقالِيَّة	٥	757	ربي بري مُشْطُ الزَّهْرَاءِ الطَّوِيْل	
٦	١٥٠	مَكْلُوْرَة ثُلاثِيَّة التَّذَلُق		727	مشكطرا	
٦	101	مَكْلُوْرَة كاليدونيا		787	مشكطرا مشيرزور	
١	471	مَكْنالَةً مَخْزَيَّةً		701	مِشْمِسْ	
٦	7.7	مِکْنَــَة		701	مِشْمِثَة	
۲	٤٥	مِكْنَسَة الأنْدَر		700	مِشْمِشَة مُشْمَلَة مَبْذُولَة	
٤	79	مُلابار	۴	١٢	مِشْيُطَة	
4	177	مَلاكِيَّة جَبَلِيَّة	١	787	مَصَّاصَة	
۲	771	مَلاكِيَّة خُرْجِيَّة	٧	777	مَطَّاصَة صَغِيْرة	
٤	AFI	مَلَبَثُرُوم	٣	171	مُصَّان	
٧	717	ملعٌ لأماني	٦	377	مُصْطَقَى	
*	771	مَلَزَ أُورُوبَّةً		377	مُصْطَكَاء	
١	717	مُلْسَج	1	۲۷۷	مُصَيْرِيْنَة	
١	777	مِلْعَقِيَّة	٦	770	مُصَيْرِيْنَة مُضَاض أرْجُوانيّ	
٤	747	مَلْسَج مِلْمَقِیَّة مَلْعَی مَلْعَی جَزیرة بُوربُون مَلْعَی جَزیرة بُوربُون	٦	770	مُضَاض أَسْوَد	
٥	A37	مَلْعَى جَزيرة بُوربُون	٦	777	مُضَاض أُورُوبِي	
٥	A37	مُلْعَى زُرْقاء	٦	777	مُضَاض مَبْذُول مَضْعَف	
١	777	مَلْعَی سَامَّة مَلْعَی عَرَبِیَّة	١	١٦٨	مَضْعَف	
٥	AST	مَلْعَى عَرَبِيّة	٦	104	مُضْمُضَة	
٧	707	ملئی عَنیِی مَلْعی مُنتَصِبة مَلْفُوف مَلْفُوف أَحْمَر	٥	141	مَطَّاط	
۲	777	مُلِعِي مُنتَصِبَة	١	٨٣	مَعْبَلَة مُعَسَّل مَغْث أَرْمُد	
۲	777	مَلْفُوف	٤	97	مُعَسَّل	
۴	17.	ا مَلْفُوف أَخْمَر	۲	707	مَغْث أَرْمَد	Yo 3

_	_		مدخل	_		مدخا
ن ب ق	<u>ج</u> ۷	<u>صن</u> ۲۵٦	<u> </u>	ح	<u>ص</u> ۳٦٤	مدخل مَلِكَة المُرُوج
	٥	70.	مَوْز قزم	٧	127	مَلُّه ل
	٥	70.	مور کرا مَوْز کاقَنْدِیش	1	*77	مَلُّول مَلِيْسَّة مَلَيْطُة
	٥	70.	مَوْدَ لِيْفِيّ	٥	٦٥	ملَنفقة
	١	779	مۇز مَبْذُول مَوْز مَبْذُول	V	177	مَلِيْنَةَ صَغِيْرة
	٧	707	مَوْز الهِنْد	٧	177	مَلِيْنَة كَبِيْرَة
	٧	Y 0 Y	مَوْز اليابان	١	7 77	مِيرًّان
	٥	Y0.	مُؤْزَة	۲	777	مَنَّ المُرَّان
	٤	٤١	مُوسّينا	١	* 77A	مَثْثُور أَصْفَر
	٣	4	مُولُونْغُو	۲	PAY	مَنْدَراجُؤْرا كَأَنْثَى
	٧	181	مُوْم	۲	PAY	مَنْكَراجُوْرا ذَكَر
	٤	777	مُونَازِيا مُونَازِيا	٤	Y • A	مَنْدَرين
	٥	701	مِيْتْراجِيْنَا سَوْحَة	1	AY	مَثْنُوب
	٧	177	مِيكَانيًا غواكُو	1	188	مَثْلَرِين مَشُمُوب مُشْيِيَه مَنْغا
	٥	119	مِیْمُوزا	٤	70	مَنْفا
	٧	١٣٣	مِيمُوزا بَيِّضاء	٤	70	مَنْغُو
	٦	178	مِيْمُوزا العَنْبَر	4	14	مِنْقار الكركي
	۲	77 A	نارَجِيْل	٦	777	مَنِيْهُوت
	٣	YTY	نارَجِيْل بَحْرِي	٦	777	مَنِيْهُوت حُلو
	٣	177	نارَجِيْل سَيْشَل	٦	777	مَنِيهُوت مُرّ
	7	747	نَارَجِيْل مَعْرُوف	7	777	مَنِيُوك
	١	TV1	نارِدِيْن بَرِّيّ	٦	771	مَنِيُوك حُلو
	١	71	نارْدِيْن بَرِّي	7	777	مَنيُوك مُرّ
	٥	707	نارِدين ثلاثيَّة الأجْنحة	1	18	مِهْمَاز الجَوْدَر
	٣	744	ناردِين الطِّيب	٥	v	مِهْمَاز الجَوْدَر
	١	441	نارِدِیْن مَخْزَنِیِّ	7	7	مِهْماز الجَوْدَر
	٣	777	ناردين هِنْدِي	1	10	مِهْماز القَمْح
	٣	744	نارَنْج	٧	181	مُو
	٤	744	نارَنْج ناعِمَة	٣	٩	مُورُونُغُو
	۲	174	ناعِمَة	٤	***	مُوْرِينْدا
	7	199	ناعمة مَخْزَنِيَّة	٦	777	مَوْز أَنْيُوبِيا
	١	177	نَانِخُوَاه نَانُوْخَه	٧	Y0Y	مَوْز باشجُو
	١	177		١	414	مَوْزِ الجَنَّة
	٣	78.	نَبات (تَسِمُم)	٦	747	مَوْز الجَنَّة
	٥	Y7.	نَبَات الشَّيْخ	٦	777	مَوْز الحَبَشَة
	٧	197	نَبات النار	١	414	مَوْز الرُّشْد
	١	777	نَبْق إَسْوَد		807	مَوْز السَّغْد
	۲	AFY	نَبْق أَسْوَد (قِشْرة)	٧	707	مَوْز الصِّيْن
१०९	١	440	ا نَبْق پُورْش	١	414	مَوْز العُقَلاء

ح	مس	ملخل نَرْجِسُ الشُّعَراء نَرْجِس كَاذِب نَرْجِس المُروج نِشْرِيْن نَشْفَة نَشَاء	ے	ص	مدخل	ن ب ق
٣	<u>صن</u> ۲٤۳	مدخل نَرْجِسُ الشُّعَراء رَرْجِسُ الشُّعراء	Y	<u>صن</u> ۲۷۰	نَبْق پورْشِيانا اقشرة؛	O ÷ O
١	٣٨٠	نَرْجِس كَاذِب	٥	1.4	نَبْق مُتَزَادَف نَبْق مُسْهِل نَبْق المَسِيْح	
١	٣٨٠	نَرْجِس المُروج	١	777	نَبْق مُسْهِل	
١	۳۸۱	نِسْرِ <u>ي</u> ْن	۲	140	نَبْق المَسِيْح	
٣	۸۰	نَسْفَة	٦	111	- 11 - 15	
7	137				بق المسيع نَيْن نَجْم نَجْمِيَّة نَجِيْل نِجِيْل نَجِيْلِيَّات عِطْرِيَّة نَحْلَة	
٥	YOA	نَشَاءُ البَطاطا		٤٩	نَيْن	
٧	418	نشاء البطاطا		***	نُجْم	
7	737	نَشَاءُ الذَّرَةِ الصَّفْراء		700	نُجْمِيَّة	
٧	478	نَشَاءُ الرُّزَ		***	نجير زاجف	
٤	779	نَشاءُ القَمْح		***	نِجِيْل	
4	***	ا نَشاءات		**1	نَجِيْلِيًّات عِطْرِيَّة	
4	7 V 9	نَشاءات مَخْزَنيَّة		***	نُخْلَة	
۲	***	ُ نَشاوات نَضَم شائِع	۲	777	نَحْلة إيطاليّة	
٤	78.	نَضَم شائِع نَضَم هِنْدِيَ نَعْنَاع الجَبَل نَعْنَاع المَنَافِع نَعْنَاع المَنَافِع نَعْنَم أَخْضَر نَعْنَم أَخْضَر	۲	777	نَحْلة عَرَبيّة	
۴	337	نَضَم هِنْدِي	۲	***	نَحْلة مِصْريّة	
4	۲۸۰	أنغناع	١	444	نُخَالَة	
1	797	نغناع الجبل	۴	737	نَخْلُ كَرَنْبِينِ (جُمَّارَة)	
1	۲۸۲	نغناع المناقع	۲	777	نَخْل كَرَنْبِيّ (زيت)	
7	44.	نغنع	۲	777	نَخْل مَعْروف رَوْمُ مَ	
٥	709	نغنع أثيض	٧	3 7 7	نَخْلُ مَلَكِيّ	
۴	337	أنفنع أنحضر	۲	777	نَ خِيْ ل رَبَّ	
٦	737	نَعْنَع أَطْحَلُ نَعْنَع البَرّ	۲	3 7 7	نَدَّ سُ <u>بُّلِيَ</u> نَدَّاف بَرُّيّ	
1	Y 9 V	نغنع البَرّ	1	T 0V	نَدَّاف بَرُّيَّ 	
٤	137	نَعْنَعَ بَرُيّ	7	779	نَدْغ إِنْحِرِيتي نَدْغ ٱلْبِي	
٦	737	نَعْنَع بَرُي	۲	440		
٣	037	نَغْنُع بُسْتَانِيّ	7	7 .	نَدْغ بَرِّيّ	
۳	7 & 0	نغنَع جَعْدِي	۲	440	نَدْغ بُسْتانِيّ نَدْغُ جِبال كُبْنان	
1	۳۸۲	نغنع الحقل	٥	707	ندغ جِبال لبنان	
٣	7 2 0	نغنع زراعي	٦	7 8 •	نَدْغ الْجَبَل نَدْغ صَعْتَرِيّ ندغ مِسْمارِيّ الشَّكُل	
Ł	137	نَعْنَع سُنَبُلِيّ طُوِيْلِ الْوَرَق	٦	779	ندغ صَغْتَرِي	
ξ	137	نغنَع صَغَتَرِي	٥	707	ندغ مِسْمارِي الشَّكُلُ	
٤	137	نغنع طويل الوَرْق	٥	707	نَدْغ مِسْمادِيّ الوَرَق	
1	474	نغنع القنل	۲	777	نَدَى البّحْر	
7	737	نغنع الماء	٣	7 2 7	نَدَى البَحْر رَبِّ وَعَلَيْهِ الْمَحْرِ	
8	709	نعتم بري نَعْتَم بَرُيّ نَعْتَم بُسْتانِيْ نَعْتَم جَعْدِيّ نَعْتَم الحَقْل نَعْتَم صَعْتَرِيّ نَعْتَم صَعْتَرِيّ نَعْتَم القَمْل نَعْتَم القَمْل نَعْتَم مُسْتَدِيْر الوَرَق نَعْتَم مُسْتَدِيْر الوَرَق نَعْتَم مُسْتَدِيْر الوَرَق نَعْتَم مُسْتَدِيْر الوَرَق	1	77.7	نَدَى الشَّمْس	
۳	7 8 0	نَعْنَع مُفَلْقَلَ نَعْنَع يابانِيّ انَعْن مِنْشارِيّ	1	7A7	نَدْيَان	
٤	137	نغنع يابانتي	1		نَوْجِس بَرُّيِّ م	
٥	7 8 0	ا نغث مِنشارِي	١	۳۸۰	نَوْجِس جَبَلِيْ	٤٦٠

ه و ش	<u>ح</u>	<u>ص</u> ۲۸۳	مدخل	ح	<u>ص</u>	<u>مدخل</u> ع
	۲		مِدْراشْتِس گندِيْ	٣	747	نفاس ت. عد
	٥	177	هَدْيوم دَبَّابِيِّ	۲	۲۸۰	نَفُل أَبْيَض
	٧	144	هَرَاس	٦	737	نَفَل البَرِّ
	٧	770	هُرْبُون مُقَلِّس	Y	077	نَفَل بَنَفْسَجِيّ نَدَ تَعْد
	٧	711	ا مُرْد	1	707	نَفُل قَرْنِيً
	١	110	هَرْطَمَان 	١	۳۸۳	نَفُل المَاء
	٧	***	هُرْقَل	Y	470	نَفَلُ المُرُوجِ
	١	PAT	هِرَقْلِيَّة نافِعَة	١	TAT	نَفَل المَناقِع المَخْزَنيّ
	٥	199	هَشَاب ما د عربه	1	144	نفِيْر ت
	۴	198	هَلْتِي مُضادَّة للزُّحار	۲	. ^^	نَفِيْر نَفِير نِلْك
	٥	777	هَلْتَى وَافِرَةُ الزَّهْرِ	٦	١٠٠	
	7	7 2 7	َ مَلَج مُلْمُوْش	*		نَمَّاءَة أَكِيْلاجِيَّة الوَرَق
	١	444		٣	7 2 7	نَمْلَة كُلُفاء
	۴	198	مَلْی افریقیّة	٦	144	نَمْوَارُون أَنِيسُونِيّ رَوْدِرُون مِدْدِهِ
	٦	787	مَلِيْج ن	7	144	نَمْوَارُون فِيَيَّارُد رَّ
	۴	P 3 Y	هِلْيُوْتروب أوروبِّي	٤	٥٨	نَنْزِي رين اص
	١	44.	هَلْيُون مَخْزَنتِ	١	444	نَوَّارِ أَبْيَضِ
	١	44.	هَلْيُون مَغْرُوف	١	440	نَوْفَر أَصْفَر
	٤	7 £ £	هَمامِلِيْس فِيْرجِيْنِيَّة	•	77.	نَوْمَان أَمْرَد
	٤	٨٢	هَنان	٤	737	نَوْمان أَهْلُب
	۲	7 2 9	مِنْدَ ب	١	۲۸٦	نَيْدَِمان
	٧	777	<u>م</u> ِنْدَب	٦	337	نِيْقُالِيْن
	٧	AFY	هِنْدَبِ أَسْمَانِي	٣	7 8 7	ني <i>ٺل</i> نيئلة
	٦	787	مِنْدَب أَسْنَان الأَسَد	٣	7 5 7	نِيْلة
	٣	70.	هِنْدَب سوريا	٦	**	نيلة صينية
	٣	70.	هِنْدَب صَغير الرَّأس	٤	737	نَيْلُوْفَر أَبْيَضِ
	٣	70.	هِنْدَب قَصير المِنقار	١	440	يْئْنُوْفَر أَصْفَر
	٣	۲٥٠	هِنْدَب لبنان		177	هال حَمَامًا
	7	757	هِنْدَب مَخْزَنِيّ	٦	787	هال ذُكَرِ
	٣	Y0.	هِنْدَب مِئْخار		757	هَال سِيْلَان
	۲	3.47	هِنْدَباء بَرِّيَّة		7.47	هال صَغِيْر
	٥	777	هِنْدَباء مُتَشَعَّبَة		737	هال طَوِيْل
	٤	1771	هِنْدَباء مُرَّة	٥	177	هَال عُنْقُودِي
	٧	171	هواكو	٦	737	هال کَبِیْر
	٧	774	هُوَانْغ نَان	7	737	هَالِ مُتَوَسَّط
	۲	VV	هُوْپِرْزِيَا	٣	٥٥	هالُوك كَبِيْر
	٧	414	هُوْرا البرازيل	٦	7 8 7	مَجُلِيْج
	٦	789	هُوْرا مُفَرُقِعَة	١	***	هَدَال
173	٦	7 £ 9	هُوْشِيْرًا أَمْرِيكَيَّة	۴	٧٢	هَدَبَة

			ı			
ے	<u>ص</u> ۲۵۵	مدخل وَرُد مِثوِيّ البَتَلات	2	<u>صن</u> ۲7۲	مدخل هُوَلَارِيْنَا وَافِرَةُ الزَّهْر	ه و ل
٣		ورَد مِئْوِيَ البتلات	•			
۳	707	وَرْد النَّيْل رَبِّ اللهِ مِنْ أَ	٦	198	هَيْثُم المَكانِس	
٤	701	وَرَق اليُّوزَاغُو مَدِّنا		198	هَيْثَم هَرَمِيّ و دُ هُ عَد اللّه	
٤	707	وَزَّالُ وَزَّالُ الشَّرْق		788	هِيْدرُوكُوتِيْل آسيويّ 	
٤ ١	707 79 8	=	l	70.	هِيراسيُوم هِيْرَاسِيُوْم أَزْغَب	
٤	707	وزَّال الشَّيْح مَنَّال الشَّيْح		797		
٤	707	وَزَّال صِباغِيِّ وَزَّال مُجَنَّع	`,	70° 70•	چِيْراسِيُوم رِئَوِيِّ خَيْضَمان	
٤	707	وران مجنع وَزَال مُسَهِّل		۱۸۲	ميصمان هِيْفِيَة البرازيل	
١	498	وران منتهل وَزَّال المَكَانِس		141	هِيْقِية البرازيل هِيْفِيّة الغُوّيان	
,	744	وران المحارس وَزِّيَّة فِضًّيَّة	٧	779	هِيلُونِيا صَفْراء هِيلُونِيا صَفْراء	
, T	707	وريه يِصيه وَسْمَة الصَّبَّاغَيْن	V	779	مِينُونِيا کارُولِينا هِيلُونِيا کارُولِينا	
,	**1			۸۴	ھِيُونيا کارونيا ھِيُوفارِيقُون مَخْزَنِي	
۲	77	وَصِیْف وَلْف	,	14.5	ھِيُوفارِيقُون مُعْرُوف ھيُوفارِيْقُون مَعْرُوف	
,	778	وت وِنْکَا أَمْرِیْکِیَّة	7	307	ميودريقون معروف وات الحَبَشَة	
١	797	وِنْک امْرِیْتِ ونْکا صَغِیْرَة		799	وات الحبيب وثافيّة	
· V	771	وِلَّٰتُ عَشِيرً. وِنْكَا عُشْبِيَّة		107	وِں بینہ وَٹیٹر مَڈاد	
٤	307	وِنْکا کَیِیْرہ وِنْکا کَیِیْرہ	0	108	ويير مدار وَثِير مَدَّاد (زيت الـ–الطيّار)	
7	708	رِبُّت جِبِرَ وِنْكَا لُبُنَانِيَّة	,	780		
Υ	7.4.7	َ رِبِيْنَ عِنْهِ وَنِيْلَيْهَ مُنْبَسِطة الوَرَق		700	وَجَّ وَدَح كسروان	
٣	٥٤	یا غزال دُور دُور یا غزال دُور دُور		7.0	وت تشرون وَدُح مَخْزَنيٌ	
٥	105	یا غَزَال دُور دُور یا غَزَال دُور دُور		701	وقع عامر <i>ي</i> وَدَك	
٧	***	ياجَه	7	VV	ُ وَدُنَة حِرِّيْفَة	
١	799	يَاسَم مَعْرُوف	٧	٨٦	وِّدْنَة مِكْرارَة	
٥	777	ياشمُون		17	وُڈنه	
٥	777	ياسَمِيْن		307	وَرْخَة البَواسِيْر	
٥	***	ياسمين أبيض		408	وَرْخَة الحُقُول	
٥	777	ياسمين إشباني		7.47	وَرُد أَخْمَر	
٥	777	ياسمين أضفر		700	ورد باهِت	
١	777	ياسَمِيْن البَرّ		441	وَرْد بَرِّيّ	
٥	YTV	ياسمين البر	١	397	وَرْد بَلَدِي	
٥	777	ياسَمين زَنْبَقيّ		3.27	وَرْد جُوْرِيّ	
١	777	يَاسَمِيْن عَرَاتِلِيّ	1	189	وَرْد الجِمَار	
٥	777	ياسَمِين عُطْرِيّ		441	وَرْد السُّيَاج	
٥	777	ياسمين كَبيرُ الزَّهْر		397	وَرُّد شَامِيَّ	
٥	777	ياسمين مَخْزَنيّ	١	77.7	وَرُد الشُّمْس	
٤	197	ياسَمِيْن مِزْهار	١	۲۸۱	وَرُد الصِّينِيّ	
٥	777	ياسَمين مُزَوّى الوَرَق	١	441	وَرُد الغَابُ	
٥	777	كاشمين معروف	١	441	وَرُد الكِلاب	277
						• • •

	_	-4	مدخل	-		مدخل
ي و ه	<u>ج</u> ٤	<u>ص</u> ۱۳۹		ي	<u></u>	
76	٤	179	يَوْز	7	73	ياسَمِيْن هِنْدِي
	1	44.	يَرْمَع	٤	٣٨	ياسَمِيْن هِنْدِي أَبْيَض
	۲	۲۱	يُشر	٤	47	ياسَمِيْن هِنْدِي أَحْمَر
	٣	**	يُسْر دُهْنِيّ	٣	٤٠	ياسَمِيْن هِنْدِي أَصْفَر
	٤	140	يغفرية	۲	73	ياسَمِيْن هِنْدِي مُسْتَدِقَ
	٧	1 • A	يغييصا	4	***	يانْسُوْن
	٤	707	يَقْطِيْن	٣	71	يانْسُوْن صَغِيْر
	٦	171	يَقْطِيْن سُكَّرِي	Y	**	يانْسُوْن كَبِيْر
	Y	79.	يقطينة	١	٣٨	يائشون نَجْميّ
	٦	707	يَلانْج يَلانْج	4	744	يَبْرُوْح
	٧	٣٠	يَنْبُوت نَتِن	4	PAY	يَبْرُوْحِ أَنْثَى
	٦	371	يَنْك	۲	PAY	يَبْرُوْح ذَكَر
	٦	707	يُنُون عَذْب	١	£ • •	يَتُّوعَ السُّحُور
	٦	Y 0 V	يُوپُون	1	٤٠١	يَتُوْعَ مُحَبُّحَب
		777	يُوكُّو	1	11	يَرْبَامَاتِي
	٧	***	گۇھِمْب مُعاپِش	٦	77	يُربُع

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	ziz
Yellow Jasmine	4	3	Yew tree	163	2	73
Yellow Jasmine	267	5	Ylang-ylang tree	256	6	
Yellow loosestrife	207	4	Yog(h)urt	208	5	
Yellow navelwort	12	6	Zachum oil tree	247	6	
Yellow pagoda tree	40	3	Zanzibar balsam	44	5	
Yellow rhizome	319	1				
Yellow rocket	77	1	Zedoary	111	7	
Yellow temple tree	40	3	Zibeth	106	4	
Yellow thistle	5	6	Zizyphus	244	1	
Yellow water-lily	385	1	Zizyphus	154	6	

wil	Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol
72	Wild carrot	59	2	Wisdom hedge mustard	129	6
	Wild celery	317	1	Woad	256	3
	Wild celery	190	5	Wolf's bane	28	1
	Wild chervil	113	6	Wolf's bane	23	2
	Wild chicory	131	4	Wolf's-claw	113	1
	Wild jasmine	152	4	Wood	79	6
	Wild jujube	155	7	Wood	90	7
	Wild leek	182	4	Wood avens	85	1
	Wild leek	189	5	Wood night-shade	72	1
	Wild linden	171	1	Wood-oil	35	3
	Wild liquorice	135	6	Wood-sorrel	101	1
	Wild marjoram	155	2	Wood stachys	115	6
	Wild marsh beet	11	7	Wood tar	292	1
	Wild may apple	46	7	Wood-tar creosote	186	4
	Wild mint	242	6	Wood tree	203	l
	Wild narcissus	380	1	Woodloose	67	3
	Wild nard	21	1	Woolf's onion	191	1
	Wild olive tree	118	7	Woolly milfoil	4	6
	Wild passion flower	30	1	Woolly rockrose	197	3
	Wild purslane	12	5	Woolly safflower	172	6
	Wild rue	61	3	Worm grass	124	7
	Wild savager	79	4	Worm-killer	160	1
	Wild savager	73	5	Worm-killer of Brasil	96	6
	Wild spinach	22	1	Worm wood	1	1
	Wild strawberry	222	1	Wound-wort	48	1
	Wild tansy	237	1	Wound-wort	202	6
	Wild teasel	357	1	Yaourt	208	5
	Wilhelm's milfoil	4	6	Yarrow	7	1
	Willow thorn	5	1	Yellow bedstraw	174	2
	Willow weed	241, 267	1	Yellow bee wax	130	5
	Windhoek root	355	1	Yellow bugle	158	7
	Wine	76	5	Yellow chamomile	17	5
	Winter cherry	310	1	Yellow curcuma	319	1
	Winter cress	77	1	Yellow flowered gentian	79	1
	Winter-green	152	4	Yellow germander	67, 157	7
	Winter's bark	81	5	Yellow gilliflower	368	1
279	Winter's cinnamon	81	5	Yellow iris	138	2

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	<u>wil</u>
Water horehound	158	4	White iris	194	1	71
Water melon	31	4	White king's rod	27	6	
Water mint	243	6	White lily	167	1	
Water parsley	186	6	White maidenhair	191	5	
Water parsnip	186	6	White mallow	111	1	
Water pepper	274	1	White melaleuca	54	1	
Water robin	8	3	White melilot	73	2	
Water sorrel	71	3	White mint	245	3	
Wattles	119	5	White mint	259	5	
Wax flower	127	7	White mistletoe	388	1	
Wax tree	142	7	White mulberry-tree	68	1	
Waybread	346	1	White mustard	79	2	
Wayfaring tree	15	6	White myrtle	30	1	
Wayfaring tree	19	7	White nettle	340	1	
Welsh onion	52	4	White oak	131	7	
West indian gherkin	92	7	White opium poppy	119	1	
West indian sumach	295	1	White Pagoda tree	38	4	
Wheat ergot	15	1	White poplar	75	4	
Whey	241	2	White poppy	119	1	
White acacia	118	5	White ramee grass	96	5	
White acacia	133	7	White sandalwood	159	2	
White asphodel	27	6	White spiny caper	183	5	
White bindweed	341	1	White temple tree	38	4	
White birch	42	1	White thorn	161	1	a ^{ger}
White blister of crucifers	338	1	White thorn	114	7	4)
White bryony	155	4	White veratrum	79	2	MI.
White capillaire	191	5	White water-lily	243	•	
White cedar	60	7	White willow	227	1	j ⁴ .
White chickweed	377	1	White worm wood	5	5	
White common caper-busch	183	5	Whorled heather	75	5	
White dittany	84	6	Whortle-berry	298	1	
White flowered jasmine	266	5	Wild angelica	261	2	
White fraxinella	84	6	Wild artichok	21	5	
White ginseng root	63	6	Wild baie tree	15	6	
White goose-foot	2	5	Wild balsam	167	7	
White henbane	44	7	Wild basil	198	5	
White horehound	261	1	Wild caper	167	6	٤٧

tur	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
70	Turbeth	54	6	Violet	40	4
	Turf cotton-wool	171	3	Violet	38	6
	Turf wadding	171	3	Viper's bugloss	4	6
	Turgid wheat	197	2	Virginia snake-root	112	7
	Turkey wheat	147	1	Virginian witch hazel	244	4
	Turk's herb	260	5	Viscous rest-harrow	211	5
	Turmeric	211	7	Voa-Fotsy	184	7
	Turnesole	185	4	Wahoo	225	6
	Turnip rooted celery	185	6	Wake robin	8	3
	Turnip rooted chervil	114	6	Wall-flower	368	1
	Turpentine	50	2	Wall germander	144	6
	Tutsan	83	6	Wall goose-foot	109	7
	Twitch grass	378	1	Wall pepper	77	6
	Ukranian scabious	130	7	Wall rocket	58	2
	Upright hedge nettle	109	5	Walnut tree	81	1
	Useful nettle	96	5	Walnut tree	62	2
	Uva-ursi	248	1	Walnut tree	59	4
	Varec	279	1	Wart-grass	400	1
	Variegated aconite	16	6	Wart-wort	400	1
	Varnish-tree	16	3	Water	234	2
	Vegetable-glue plant	235	1	Water avens	58	3
	Vegetable-glue plant	190	4	Water betony	62	6
	Vegetable pitch	292	1	Water butter-cup	8	2
	Vegetable sponge	204	3	Water caltrops	146	4
	Vegetable wax	146	7	Water celery	85, 210	7
	Venerate star anis tree	31	7	Water chestnut	146	4
	Venetian sumach	135	2	Water cress	187	2
	Venomous sumach	119	6	Water dock	71	3
	Venus's comb	242	5	Water dock	74	4
	Venus's hair	321	1	Water drop-wort	145	7
	Venus's navelwort	15	2	Water figwort	82	6
	Venus's navelwort	12	6	Water forget me not	10	1
	Vermifuge albizzia	22	7	Water germander	12	4
	Vernonia vermifuge	180	7	Water germander	143	6
	Vervain	154	1	Water hemlock	218	1
10 mg 11 mg	Vesicatory hellebore	89	7	Water hemlock	145	7
₹ ∀***	Vine-tie ergot	13	1	Water hemp	112	1

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>	tur
Sweet marjoram	213	3	Thorow-wax	69	5	68
Sweet maudlin	4	7	Thouarsi's voacanga	185	7	
Sweet rocket	82	1	Three foliate sumach	118	6	
Sweet scented basil	69	6	Thym scented basil	64	5	
Sweet-sop	173	6	Thyme	97	6	
Sweet-tangle	221	2	Thyme dodder	348	1	
Sweet violet	38	6	Thymelaea	83	5	
Sweet woodruff	22	1	Thymifoliate St-John's W	ort89	2	
Swiss-Ephedra	143	3	Tinctorial oak	123	6	
Sycamine	68	1	Toad flax	203	6	
Sylvan-cricket	63	7	Tomato	36	6	
Syrian organy	138	6	Tomentous germander	143	6	
Tabacco	52	6	Tonka-bean	162	4	
Tale-wort	102	1	Tooth-ache tree	87	3	
Tall nasturtium	312	1	Tooth-ache tree	156	4	
Talladonis	6	7	Toothpick	122	1	
Tamarind	55	6	Toothwort	88	1	
Tamarind tree	55	6	Torch thistle	135	4	
Tamarisk	1	6	Tormentil	145	5	
Tamarisk salt tree	1	6	Traveller's joy	362	1	
Tambayang stinking tree	58	7	Traveller's tree	103	4	
Tamepoison	157	2	Travelling eryngo	213	1	
Tanner's sumach	112	5	Trebizond tea	198	7	
Tansy	39	1	Tree of heaven	142	2	
Tapeworm plant	195	4	Trembling poplar	75	2	
Taro plant	58	7	Trilobate birth wort	112	7	
Tassel hyacinth	83	7	Trilobate worm-killer	112	7	
Tatarian buckwheat	244	3	Tripoli mullein	45	5	
Гауиуа	52	6	True jalap	77	1	
Tea plant	197	1	True lavender	80	2	
Temple tree	42	2	True lavender	78	3	
Textile hemp	299	1	Truffle	217	2	
The James	122	4	Trumpet grass	161	6	
Thirsty thorn	124	6	Trumpet tree	136	4	
Thorn	99	5	Tuberous stachys	114	6	
Thorn-apple	133	1	Tulip tree	142	7	
Thorn tree	247	6	Turban	76	6	٤٧

_	Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol
	Speckled alder	256	2	Stinking ground-pine	178	4
	Spignel	141	7	Stinking hellebore	77	3
	Spilanthes	81	7	Stinking mayweed	16	5
	Spinach-dock	104	1	Stinking rue	175	1
	Spinage	10	3	Stinking wood	30	7
	Spiny burdock	141	7	Stinking worm-killer	96	6
	Spiny burrweed	141	7	Stone clover	243	6
	Spiny gooseberry	193	5	Strained basil	65	5
	Spiny rest-harrow	210	5	Strawberry tree	294	1
	Spiny sarsaparilla	270	1	Strong corydalis	170	6
	Spiny sumach	118	6	Styrax tree	225	2
	Spirit	96	3	Styrax tree	201	3
	Spogel plantain	12	3	Succory	284	2
	Spogel plantain	214	5	Succory	131	4
	Sponge tree	124	6	Sugar-apple	173	6
	Spoon-wort	363	1	Sugar gourd	172	6
	Spurge	159	3	Sulphur weed	43	3
	Spurge flax	82	5	Sumach	112	5
	Spurge laurel	82	5	Summer Adonis	6	7
	Spurge nettle	86	4	Summer-cypress	194	6
	Spurge olive	229	7	Summer pheasant's eye	6	7
	Squirting cucumber	283	1	Sun-flower	141	1
	St. Ignatus bean	185	7	Sun-flower	166	2
	St. John's bread	116	1	Sun spurge	400	1
	St. John's wort	219	1	Sundew	386	1
	Stag-horn moss	113	1	Surinam wood	308	1
	Star anis tree	38	ı	Swallow tailed willow	227	1
	Star of earth	223	7	Swallow wort	233	1
	Star thistle	303	1	Swamp-oak	192	5
	Starch	277	2	Sweet basil	65	5
	Stavesacre	141	4	Sweet-bay	251	1
	Ste Lucie cherry	207	6	Sweet chestnut	213	2
	Steep grass	90	1	Sweet chestnut	188	6
	Stemless carlina	320	1	Sweet fennel	127	4
	Stinging nettle	284	1	Sweet-flag	72, 245, 251	l
	Stinking celery	317	1	Sweet grass	22	1
	Stinking chamomile	16	5	Sweet marjoram	241	2

spe

Eng. Page Vol Eng. Page Vol Shepherd's burse 336 1 Small-flowered milfoil 4 5 Shepherd's clock 134 2 Small fruited fig tree 162 5 Shepherd's needle 152 5 Small honey-wort 127 7 Shepherd's rod 357 1 Small leaves linden 171 1 Shittah tree 124 6 Small leaves linden 171 1 Shittim wood 124 6 Small worm-killer 99 5 Sikerian rhododendron 145 4 Small worm-killer 99 5 Sike wort 295 1 Small worm-killer 99 5 Sike wort 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Sike cotton tree 178 3 Smooth thapsia 94 7 Silky dogberry 194 7 Snake flower 169 6 Silky dogwood 194 <			ı				
Shepherd's clock 134 2 Small fruited fig tree 162 3 Shepherd's needle 152 5 Small honey-wort 127 7 Shepherd's rod 357 1 Small leaves linden 171 1 Shittan tree 124 6 Small leaves linden 171 1 Shittim wood 124 6 Small sorrel 70 3 Showy milfoil 3 6 Small worn-killer 99 5 Sicke wort 295 1 Small worn-killer 99 5 Sicke wort 295 1 Small worn-killer 99 5 Sicke wort 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Sikeve 231 3 Smooth May tree 101 6 Silk cotton tree 178 3 Smooth thapsia 94 7 Silky dogberry 194 7 Snake flower 169 6 Silky dogberry 194 7	Eng.	Page	Vol	Emg.	Page	Vol	
Shepherd's needle 152 5 Small honey-wort 127 7 Shepherd's rod 357 1 Small leaved basil 76 7 Shittah tree 124 6 Small leaves linden 171 1 Shittah tree 124 6 Small leaves linden 171 1 Shittah tree 124 6 Small leaves linden 171 1 Shittah tree 124 6 Small sorrel 70 3 Showy milfoil 3 6 Small worm-killer 99 5 Sicke wort 295 1 Small worm-killer 99 5 Sicke wort 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Silke cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silky done 38 7 Snake bryony 176 2 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 <	Shepherd's burse	336	1	Small-flowered milfoil	4	5	
Shepherd's rod 357 1 Small leaved basil 76 7 Shittah tree 124 6 Small leaves linden 171 1 Shittim wood 124 6 Small nettle 166 4 Showy milfoil 3 6 Small sorrel 70 3 Siberian rhododendron 145 4 Small worm-killer 99 5 Sickle wort 295 1 Small worm-killer 99 5 Sieve 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Silter cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silky cornel tree 194 7 Snake bryony 176 2 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake flower 4 6 Silver wordwood 6 3 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow	Shepherd's clock	134	2	Small fruited fig tree	162	5	
Shittah tree 124 6 Small leaves lindem 171 I Shittim wood 124 6 Small nettle 166 4 Showy milfoil 3 6 Small sorrel 70 3 Siberian rhododendron 145 4 Small worm-killer 99 5 Sicke wort 295 1 Small worm-killer 99 5 Sicke wort 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Sifter 231 3 Smooth May tree 101 6 Silk cotton tree 178 3 Smooth thapsia 94 7 Silky cornel tree 194 7 Snake bryony 176 2 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake flower 4 6 Silver weed daphne 84 5 Sneezewort 3 7 Silver scabious 130 7 Soaps	Shepherd's needle	152	5	Small honey-wort	127	7	
Shittim wood 124 6 Small nettle 166 4 Showy milfoil 3 6 Small sorrel 70 3 Siberian rhododendron 145 4 Small worm-killer 99 5 Sickle wort 295 1 Smaller ringed ipecacuanha 229 1 Sieve 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Silk cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogberry 194 7 Snake-weed 32 1 Silky dogwood 194 7 Snake-weed 32 1 Silky wormwood 6 3 Sneezwort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree	Shepherd's rod	357	1	Small leaved basil	76	7	
Showy milfoil 3 6 Small sorrel 70 3 Siberian rhododendron 145 4 Small worm-killer 99 5 Sickle wort 295 1 Smaller ringed ipecacuanha 229 1 Sieve 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Silk cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky cornel tree 194 7 Snake flower 169 6 Silky dogberry 194 7 Snake-weed 32 1 Silky dogwood 194 7 Snake-weed 32 1 Silky dogwood 194 7 Snake-weed 32 1 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver wattle 119 5 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort	Shittah tree	124	6	Small leaves linden	171	1	
Siberian rhododendron 145 4 Small worm-killer 99 5 Sickle wort 295 1 Smaller ringed ipecacuanha 229 1 Sieve 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Silkr cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky dogberry 194 7 Snake cucumber 169 6 Silky dogwood 194 7 Snake flower 4 6 Silky wormwood 6 3 Sneezwort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft accia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil	Shittim wood	124	6	Small nettle	166	4	
Sickle wort 295 1 Smaller ringed ipecacuanha 229 1 Sieve 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Sifter 231 3 Smooth May tree 101 6 Silk cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky cornel tree 194 7 Snake dlower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake flower 4 6 Silky wormwood 6 3 Sneezewort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver wattle 119 5 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69	Showy milfoil	3	6	Small sorrel	70	3	
Sieve 231 3 Smooth hawthorn 101 6 Sifter 231 3 Smooth May tree 101 6 Silk cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky dogword 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake flower 4 6 Silky wormwood 6 3 Sneezewort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver wattle 119 5 Soaps 128 3 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 </td <td>Siberian rhododendron</td> <td>145</td> <td>4</td> <td>Small worm-killer</td> <td>99</td> <td>5</td> <td></td>	Siberian rhododendron	145	4	Small worm-killer	99	5	
Sifter 231 3 Smooth May tree 101 6 Silk cotton tree 178 3 Smooth May tree 101 6 Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake flower 4 6 Silky wormwood 6 3 Sneezzwort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver wattle 119 5 Soft haired basil 69 6 Simulo 118 3 Soft haired basil 69	Sickle wort	295	1	Smaller ringed ipecacuanha	229	1	
Silk cotton tree 178 3 Smooth thapsia 94 7 Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky cornel tree 194 7 Snake cucumber 169 6 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake flower 4 6 Silky wormwood 6 3 Sneezwort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161	Sieve	231	3	Smooth hawthorn	101	6	
Silk vine 38 7 Snake bryony 176 2 Silky cornel tree 194 7 Snake cucumber 169 6 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake-weed 32 1 Silky wormwood 6 3 Sneezing flower 16 1 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184	Sifter	231	3	Smooth May tree	101	6	
Silky cornel tree 194 7 Snake cucumber 169 6 Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake-weed 32 1 Silky wormwood 6 3 Sneezewort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 South american holly	Silk cotton tree	178	3	Smooth thapsia	94	7	
Silky dogberry 194 7 Snake flower 4 6 Silky dogwood 194 7 Snake-weed 32 1 Silky wormwood 6 3 Sneezewort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour-cherry 167 <td< td=""><td>Silk vine</td><td>38</td><td>7</td><td>Snake bryony</td><td>176</td><td>2</td><td></td></td<>	Silk vine	38	7	Snake bryony	176	2	
Silky dogwood 194 7 Snake-weed 32 1 Silky wormwood 6 3 Sneezewort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 <td>Silky cornel tree</td> <td>194</td> <td>7</td> <td>Snake cucumber</td> <td>169</td> <td>6</td> <td></td>	Silky cornel tree	194	7	Snake cucumber	169	6	
Silky wormwood 6 3 Sneezewort 3 7 Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour-cherry 184 6 Single powders 222 3 Sour-cherry 184 6 Single powders 222 3 Sour-cherry 167 5 Single powders 222 3 South american holly 61 1 Siris tree 25 5 Southern wood	Silky dogberry	194	7	Snake flower	4	6	
Silver leaved daphne 84 5 Sneezing flower 16 1 Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Simulo 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 <	Silky dogwood	194	7	Snake-weed	32	1	
Silver nettle 96 5 Snow ball tree 17 2 Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 222 3 South american holly 61 1 Single powders 225 4 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 <t< td=""><td>Silky wormwood</td><td>6</td><td>3</td><td>Sneezewort</td><td>3</td><td>7</td><td></td></t<>	Silky wormwood	6	3	Sneezewort	3	7	
Silver scabious 130 7 Soaps 128 3 Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Similo 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica hawthorn 100 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 222 3 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish red thyme 113 <t< td=""><td>Silver leaved daphne</td><td>84</td><td>5</td><td>Sneezing flower</td><td>16</td><td>1</td><td></td></t<>	Silver leaved daphne	84	5	Sneezing flower	16	1	
Silver wattle 119 5 Soapwort 224 1 Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish red thyme 113 <td>Silver nettle</td> <td>96</td> <td>5</td> <td>Snow ball tree</td> <td>17</td> <td>2</td> <td></td>	Silver nettle	96	5	Snow ball tree	17	2	
Silver weed 237 1 Soft acacia 118 5 Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 </td <td>Silver scabious</td> <td>130</td> <td>7</td> <td>Soaps</td> <td>128</td> <td>3</td> <td></td>	Silver scabious	130	7	Soaps	128	3	
Simulo 118 3 Soft haired basil 69 6 Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Silver wattle	119	5	Soapwort	224	1	
Sinaica hawthorn 100 5 Soja bean 161 2 Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Silver weed	237	1	Soft acacia	118	5	
Sinaica mullein 44 5 Sour-cherry 184 6 Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Simulo	118	3	Soft haired basil	69	6	
Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Sinaica hawthorn	100	5	Soja bean	161	2	
Sinaica white thorn 100 5 Sour orange 238 3 Single powders 222 3 Soursop 167 5 Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Sinaica mullein	44	5	-	184	6	
Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Sinaica white thorn	100	5	•		3	
Single powders 225 4 South american holly 61 1 Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Single powders	222	3	Soursop	167	5	
Single powders 229 5 South-sea rose 139 1 Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1				•			
Siris tree 25 5 Southern wood 304 1 Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1		229	5	_		1	
Skivert 139 7 Soya bean 161 2 Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	- •	25	,			1	
Skull cap 267 7 Spadic busch 219 7 Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Skivert					2	
Sky-blue bugloss 212 5 Spanish broom 253 4 Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	Skull cap	267		-			
Sloe tree 131 1 Spanish oak 123 6 Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1	-						
Small bulrush 47 7 Spanish red thyme 113 7 Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1				•		6	
Small burnet 53 1 Sparrow-grass 390 1				•			11.0
The state of the s		53	ļ	-			
			5	Spearmint	244	3	

sal	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Vol</u>
66	Salomon's seal	76	2	Scenanth	7	7
	Salsify	134	2	Scordium	143	6
	Saltwort	15	6	Scorpioïd coronilla	21	6
	Samphire	208	1	Scorpion astragal	14	7
	Sand carex	180	1	Scorpion grass	10	1
	Sand sedge	180	1	Scotch pine	139	4
	Sandarach	113	3	Scotch thistle	21	5
	Sandarach tree	122	6	Scurvy-grass	363	1
	Sandbox	249	6	Sea algae	26	5
	Sand's centinode	33	3	Sea artemisia	2	1
	Sand's flea-wort	31	6	Sea buck thorn	5	1
	Sannine's herb	193	2	Sea eryngo	123	3
	Santoninum	135	2	Sea grape	170	2
ar a series	Sarrasin corn	240	4	Sea lavender	11	7
	Sarsaparilla	270	1	Sea-oak	279	1
red lighting	Sarsaparilla	160	3	Sea onion	23	1
	Sarsaparilla	180	7	Sea oinon	16	7
es renedate Georgia	Sarsaparilla of Jamaīque	168	6	Sea rose	139	1
	Sassafras tree	120	2	Sea wormwood	2	1
	Sauce-alone	89	1	Sea wrack	279	1
y tani Tili.	Saudi incense tree	206	5	Seaside balsam	184	4
	Savin	1	4	See fennel	208	1
	Savory of Crete	239	6	See weed	279	1
	Saw alder	245	5	Self-heal	295	1
	Saxifrage	132	2	Semen contra vermes	2	2
	Scabious	110	3	Senna	112	3
	Scabious	116	4	Senna	114	5
	Scalefern	119	3	Septfoil	145	5
	Scaly spleenwort	119	3	Serrulate sabal	173	1
	Scammony	109	3	Sesame	119	6
Hill Juli	Scammony of Alep	116	4	Sesban	117	3
	Scammony of Mexico	117	6	Setwall	111	7
7	Scammony of Smyrna	110	5	Shallot	209	2
	Scammony plant	132	2	Shave grass	19	3
1 44 ¹⁰ 141	Scammony plant	212	4	She-oak	192	5
$j \sim n p d$	Scarlet oak	132	7	Shea butter	95	6
in the principal	SCALLET DAK	132	, ,	Dille Catter	,,,	•

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Vol</u>	sal
Red oak	189	1	Roselle	183	4	65
Red pepper	275	1	Rosemary	276	2	
Red pimpernel	342	1	Rosemary	243	3	
Red quinin bark	338	1	Rosery pea	135	6	
Red raspberry	265	1	Rough bindweed	270	1	
Red-rot	386	1	Rough horsetail	19	3	
Red sand spurry	3	1	Rough sage	177	6	
Red sand wort	3	1	Roundfoliate mint	259	5	
Red sea aloe	27	7	Rowan	150	4	
Red sorrel	72	4	Royal fern	125	2	
Red temple tree	38	4	Royal herb	65	5	
Reed-mace	47	7	Royal laurel	316	1	
Resin	104	7	Royal wine palm	264	7	
Rest-harrow	343	1	Rue	111	6	
Rest-harrow	225	2	Running myrtle	396	1	
Rhapontic	97	5	Rupture-wort	260	5	
Rhododendron	179	2	Rustyback	119	3	
Rhodophyceae	18	6	Rye ergot	14	1	
Rhubarb	99	4	Sabin	1	4	
Rhubarb	90	6	Sacred bark	375	1	
Rhubarb	105, 108	7	Saddle tree	142	7	
Rhubarb of Palestine	98	5	Safflower	188	2	1.
Rib-grass	197	6	Saffron	162	1	the state
Ribwort	197	6	Saffron	101	5	H_{i}
Rice plant	3	3	Sage	173	3	
Rocket	155	1	Sage apple	174	6	iliga ostas
Rockfoil	130	2	Sage-leaved rockrose	222	7	
Roman chamomile	26	1	Sage of Bethlehem	93	1	
Roman laurel	251	1	Sago	124	7	g ad glyf 14. glyfair 14.
Roman nettle	192	7	Saint-Jacob's groundsel	125	4	
Roman wormwood	148	2	Saint Mary's thistle	324	1	$-\frac{1}{2}(r_{ij}^{-1})^{-2r_{ij}^{-1}}$
Roquette	155	1	Saint Peter's wort	165	1	
Rose-bag willow-herb	274	2	Sainte Sophie's grass	129	6	TH (1-41)
Rose-bay	139	1	Salad burnet	53	1	$\frac{\langle v_{ij} \rangle}{h^{\dagger}}$.
Rose-gall	149	5	Salad mustard	79	2	100% 6,
Rose mallow	75	3	Salep	126	7	<i>*</i> 1,

pri	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
64	Prickly avens	65	6	Purslane	38	2
	Prickly cedar	168	2	Pythagorean bean	233	2
	Prickly custard-apple	167	5	Quadrangular passion flow	ver 17	6
	Prickly ivy	270	1	Quassia	308	1
	Prickly poppy	5	6	Quassia of Jamaïque	175	4
	Prickly water celery	210	7	Queen of meadows	364	1
	Priests'cap	226	6	Queen of meadows	163	7
	Prim	399	1	Quenn's gilliflower	82	1
	Privet	399	1	Quick	114	7
	Privy	399	1	Quince	115	4
	Pruinose dyer's grape	216	5	Quince tree	129	2
	Pruinose pocke	216	5	Quinin bark	189	3
	Prune tree	85	2	Quinsy-berry	322	1
	Prunus evernia	85	2	Quitch grass	378	1
	Pubescent bachelor's butte	ons 8	7	Racemose elder	48	7
	Pudding grass	382	1	Radicant sumac	119	6
	Pudding pipe tree	118	1	Radish	157	3
	Pulverisation mode	106	3	Raimbault combretum	235	1
	Pumice	80	3	Raimbault kinkelibah	235	1
	Pumpkin	290	2	Ramping fumitory	196	1
	Pumpkin	256	4	Ramsons	189	5
	Punk tree	39	5	Rape	230	2
	Purging buckthorn	376	1	Raspberry bush	265	1
	Purging cassia	118	1	Raspberry-bush	182	2
	Purging flax	206	7	Raspberry cane	265	1
	Purified water	238	2	Ratanhia	153	1
	Purple-apple	195	7	Rattle-root	26	1
	Purple clover	265	7	Rattlesnake milk-wort	41	6
	Purple crocus	191	1	Rea puccoon	139	3
	Purple crocus	125	6	Red cedar	145	5
	Purple ergot	14	1	Red cinchona	338	1
	Purple grape vine	186	6	Red clover	265	7
	Purple loosestrife	267	1	Red columbine	24	2
	Purple spindle tree	225	6	Red-Currant bush	215	2
	Purple spurge	12	5	Red grape vine	186	6
	Purple willow	156	2	Red Juniper	145	5
£VV	Pursch tree	375	1	Red mulberry tree	59	7

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol	pri
Paullinia	161	6	Pine-apple	37	1	63
Peach	92	2	Pink	167	5	
Peach tree	137	1	Pinnate leaved pilocarpus	57	2	
Peanut	269	1	Pipperidge	44	1	
Pear	6	2	Pistachio tree	161	4	
Pear tree	5	1	Plant (Intoxication)	240	3	
Pearl plant	211	1	Plantain	202	4	
Pellitory of Spain	137	3	Plantain-doronic	94	2	
Pennyroyal	382	1	Pocke	204	4	
Pennywort	13	6	Pæstum rose	394	1	
Peony	285	2	Poet's daffodil	243	3	
Peony of Kesrouane	255	3	Pointed leaved toad-flax	194	5	
Peppermint	245	3	Pointed persicaria	193	7	
Pepperwort	140	3	Poison hemlock	216	1	
Perfoliate honeysuckle	226	1	Poisonous hemlock	218	1	
Perfoliate St. John's wort	134	1	Poisonous sumach	130	7	
Perfumed cherry	207	6	Pollen	170	, 7	
Periwinkle	396	1	Pollitory of the wall	93	1	
Periwinkle	192	2	Polypody wall fern	25	1	
Pernod's wood	132	6	Pomegranate	104	2	
Perry's aloe	27	7	Pomegranate tree	156	1	
Persian buttercup	76	6	Pomelo tree	217	5	
Persian cyclamen	26	6	Poor man's herb	256	_	
Persian giant fennel	155 ;	4			1	
Persley piert	214	7	Poor man's weather-glass	342	1	
Peter's cress	208	1	Popinac	124	6	
Peyotl	50	6	Poplar charcoal	260	1	
Phaeophyceae	18	6	Possumwood	249	6	
Pichi	155	3	Pot-herb thyme	97	6	
Picktooth	122	1	Pot marigold	11	1	
Pigeon-pea	181	6	Potato	3	3	
Pigeon's-grass	154	1	Potentilla	58, 237	1	i
Pilewort	236	1	Poterium	37	3	
Pill '	235	4	Poterium	34	4	
Pin-cushion flower	110	- 3	Powder	227	3	
Pin grass	54	3	Prangos of Hermon	136	6	
Pinaster	160	2	Prick-wood	225	6	£VA

off	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
62	Officinal erysimum	185	1	Pagoda tree	42	2
	Officinal gratiola	256	1	Paigle	165	1
	Officinal loosestrife	267	1	Pale flowered flax	204	2
	Officinal opium	12	4	Pale persicaria	241	1
Totalia post Totalia	Officinal opium	14	5	Palestine scabious	117	6
	Officinal primula	165	1	Palm-marrow	68	7
10.	Officinal rue	175	1	Palma Christi	118	1
	Officinal saffron	162	1	Palma Christi	79	4
	Officinal Simaruba	186	1	Paniculate arbute	170	5
	Officinal veronica	281	1	Pansy	59	1
	Oil lettuce	81	2	Panther strangler	94	2
2.14	Old man	304	1	Pao-Pereira	25	6
	Old man's beard	362	1	Papaw	12	7
	Oleander	139	1	Papaw apple	41	1
	Olibanum tree	206	5	Papaw apple	25	6
	Olive tree	170	1	Papaya	41	1
	Olive tree	115	2	Papaya	32	2
	Onion	36	2	Papaya	25	6
	Onion	30	3	Paper reed	30	4
	Opiate	227	6	Papyrus	30	4
	Opiate	251	7	Para cress	81	7
	Opium	15	3	Paradise banana	232	6
	Opopanax	181	3	Paradise banana tree	369	1
	Orache	180	1	Paraguay tea	61	1
	Orange	33	2	Para's sarsaparilla	160	5
	Orange melon	148	6.	Pareira brava	34	7
	Orbicular cyclamen	130	6	Paris mushroom	252	1
	Orchis	123	2	Park-leaves	83	6
	Organy	129	3	Parsley	37	2
	Oriental hellebore	89	7	Parsley	32	4
	Oriental patience	74	6	Parsnip	140	2
	Oriental whortle-berry	198	7	Parsnip chervil	114	6
	Orpine	86	7	Pasque flower	207	1
	Orris-root plant	194	1	Pass flower	207	1
	Orthosiphon	30	5	Patchouly oil plant	28	3
	Osage orange	190	7	Patience	104	1
£ 4	Ox-eye	9 /	1	Patience	68	3

			ı			
Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol	off
Moon hedge cactus	209	1	Myrrh	108	3	61
Moschus	229	3	Myrtle sedge	245	1	
Moschus	231	4	Myrtle spurge	167	6	
Moschus eryngo	112	5	Nabk tree	111	6	
Moschus root	112	5	Naked ladies	191	1	A.
Moschus sumbul	112	5	Naked ladies	125	6	Sa.
Mossberry	199	7	Nard	237	3	
Mother wort	219	1	Navelwort	12, 13	6	
Mother's heart	336	1	Neapolitan medlar	100	6	
Mothmulleine	47	7	Nectandra perchury-mayor	24	3	
Mountain alkanet	16	1	Nept	293	1	
Mountain arnica	16	1	Nettle leaved basil	64	5	
Mountain ash	150	4	Nettle leaved goose-foot	109	7	
Mountain avens	63	4	New Zealand spinach	51	2	
Mountain hemlock	34	1	Nicker tree	41	3	
Mountain laburnum	138	7	Nicotiana	52	6	
Mountain laurel	210	2	Night scented cestrum	124	4	
Mountain lotus	352	1	Nile papyrus	30	4	
Mountain parsley	209	7	Ninzi	58	4	
Mountain savory	240	6	Noble hawthorn	161	1	
Mountain spinach	180	1	Noble laurel	251	1	
Mountain tobacco	16	1	Norway-spruce	4	2	
Mouse ear	392	1	Nose bleed	7	1	
Mouse-thorn	303	1	Noxious hemlock	218	1	
Mugget	168	1	Nut gall oak	132	7	
Mugwet	22	1	Nut-grass	128	İ	
Mugwort	219	1	Nutmeg tree	61	2	, 35
Mullein	63	1	Nux vomica tree	132	6	. Water die
Mullein	44, 45	2	Oats ergot	13	1	
Mullein	44	3	Odoriferous agrimony	170	7	
Mushrooms	183	2	Odoriferous graminaceae	271	2	
Musk - erodium	152	5	Odoriferous milfoil	5	5	
Musk mallow	67	4	Odoriferous olive tree	119	7	
Musk milfoil	7	2	Odoriferous osmanthus	119	7	
Musky bugle	158	7	Odorous wormwood	159	4	
Musky gourd	172	6	Officinal charcoal	180	2	
Мутоbalan	22	3	Officinal creosote	186	4	EA *

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
Marsh trefoil	383	1	Medium plantain	223	7
Marsh wound-wort	114	4	Melaleuca	39	3
Martagon-lily	108	2	Melaleuca	37	4
Marum germander	158	7	Meleguetta pepper	246	6
Maryland's spigelia	111	4	Melilot	105	1
Masterwort	51	1	Melon	146	2
Masterwort	220	7	Melon tree	25	6
Mat sedge	116	6	Membranaceous nettle	192	7
Maté	61	1	Menthol	267	2
Matico plants	228	7	Meu	141	7
May bush	114	7	Mexican capillaire	192	5
May lily	168	1	Mexican sabal	173	1
May thorn	161	1	Mexican sarsaparilla	161	3
Maypop	30	1	Mexican tea	5	2
Meadow bitter-cress	67	5	Mezereon	82	5
Meadow bitter-cress	78	7	Mezereon	229	7
Meadow clover	265	7	Midsummer men	86	7
Meadow narcissus	380	1 ,	Milfoil	7	1
Meadow parsnip	389	1	Milfoil	3	5
Meadow saffron	191	1	Milk thistle	324	1
Meadow saffron	125	6	Milk weed	64	1
Meadow 'saffron	133	7	Milk-wort	64	1
Meadow-sweet	364	1	Millet	90, 91	2
Meadow-sweet	163	7	Minor bachelor's buttons	9	5
Medical cigarettes and cigars	121	2	Mint	280	2
Medical cigarettes and cigars	126	7	Mixture	246	2
Medicinal beer	46	5	Mixture	244	4
Medicinal bread	79	6	Mixture	227	5
Medicinal candles	148	7	Mixture	239	7
Medicinal cream	213	2	Mock-cypress	194	6
Medicinal hemlock	216	1	Mock privet	143	7
Medicinal leech	148	4	Money-wort	232	2
Medicinal squill	23	.1	Monk's basil	64	5
Medicinal squill	16	7	Monks hood	28	1
Medicinal tea speedwell	281	1	Monogynous dodder	204	4
Mediterranean false orpine	207	5	Monogynous hawthorn	161	1
Mediterranean medlar	100	6	Moon-fern	227	2

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Vol</u>	mar
Lippi's verbena	353	1	Mahogany tree	234	4	59
Liquorice plant	192	1	Mahogany tree	22	5	
Liquorice plant	119	4	Maidenhair	321	1	
Little chestnut tree	189	6	Maidenhair tree	83	1	
Little indian cress	185	5	Maize	147	1	
Little leafed star anis	31	7	Major honey-wort	127	7	
Livelong	86	7	Major wax flower	127	7	
Liver anemony	206	1	Malabar cinnamon	164	5	
Liver tree	203	1	Malabar nightshade	29	4	
Liver windflower	206	1	Malabar nut tree	2	3	
Liver wort	253	1	Male fern	176	1	
Liverleaf	206	1	Male nephrodium	176	1	
Locust tree	116	1	Male polypody	176	1	
Log wood	37	7	Mallow bindweed	208	5	
Long birthwort	99	5	Mandarin orange	208	4	
Long pepper	162	3	Mandioc plant	231	6	
Long rooted curcuma	211	7	Mandrake	288	2	
Long worm-killer	99	5	Mandrake	46	7	
Longwort	96	1	Mango tree	25	4	
Loosestrife	267	1	Manila hemp	250	5	
Lotus jujube	155	7	Manipulate flowers heath	75	5	
Lotus tree	155	7	Manna	266	2	
Lousewort	141	4	Manna-ash	212	3	
Lovage	34	1	Manna-ash	213	4	
_	36		Maple-tree	175	3	
Love apple		6	March flower	38	6	
Lucern	162	3	Marchant's hepatic	220	4	
Lucky banana	256	7	Margosa tree	103	6	
Lung-wort	93	1	Marine cineraria	126	3	
Lustwort	386	1	Marocco gum tree	124	6	
Lyre tree	142	7	Marsh betony	114	4	
Macassar-oil tree	256	6	Marsh œlery	317	1	
Mackerel gooseberry	193	5	Marsh crowfoot	85	7	
Mad-dog weed	226	5	Marsh mallow	110, 111	1	
Madder	277	1	Marsch pestle	41	6	
Madonna-lily	167	1	Marsh rosemary	122	4	

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
Knot-weed	47	1	Lebanon barberry	34	5
Knotted figwort	129	1	Lebanon periwinkle	254	6
Kola-nut trees	335	1	Lebanon pipperidge	34	5
Kombes strophanthus	111	4	Lebanon poppy	91	7
Korean ginseng	78	1	Lebanon savory	256	5
Kotschy's milfoil	5	5	Lebanosyrian organy	137	5
Krameria root	153	1	Lebbek tree	25	5
Kusso	195	4	Leek	209	2
Laburnum	1	4	Leek	184	3
Ladanum	220	2	Lemon-balm	366	1
Ladanum-resin tree	204	5	Lemon grass	80	7
Ladies' gloves	35	7	Lemon tree	205	3
Ladie's smock	78	7	Lemon tree	208	4
Lady fern	80	5	Lemon verbena	353	1
Lady's fingers	202	6	Lent lily	380	1
Lady's mantle	327	1	Lent rose	380	1
Lake weed	274	1	Lentil	167	2
Lamb's quarters	2	5	Lespedeza clover	347	1
Lamb's tongue	223	7	Lesser bindweed	224	2
Lanceolate plantain	197	6	Lesser cardamom	282	2
Lanceolate water plantain	246	2	Lesser celandine	236	1
Larch	221	2	Lesser dodder	348	1
Large nettle	284	1	Lesser galangal	84	4
Large rampion	6	1	Lesser hemlock	128	4
Larger astrantia	220	7	Lesser ringed ipecacuanha	229	1
Latifoliate water celery	186	6	Lesser snapdragon	128	6
Laurel	251	1	Levant cotton plant	172	3
Laurustine	15	6	Libanotus herb	193	2
Lavender cotton	3	6	Lich-wort	93	1
Lavender cotton	202	7	Lignum-vitae	149	3
Leadwort	88	1	Lily of the valley	168	1
Leaf-beet	184	1	Lima bean	165	6
Lebanese chervil	108	5	Ling	187	1
Lebanese daphne	85	5	Liniment	218	3
Lebanese donkey fart	182	7	Lion's foot	327	1
Lebanese organy	135	4	Lion's-leaf	81	6
Lebanese sorrel	70	3	Lion's-turnip	81	6

)kmo

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>	kno
Indian hemp	299	1	Jelly	239	2	57
Indian jujube	244	1	Jelly	210	4	
Indian jujube	154	6	Jelly	219	5	
Indian laburnum	118	1	Jelly	205	6	
Indian pink	124	7	Jelly	230	7	
Indian tobacco	349	1	Jerusalem thorn	131	6	
Indian wheat	244	3	Jew's ear	2	3	
Indicus color	247	3	Job's tears	17	3	
Inebriating Ava	272	1	Judas ear	2	3	
Inga	26	4	Jujube tree	244	1	
Inga	29	5	Jujube tree	154	6	
Inga	27	6	Jupiter's beard	124	1	
Insecticide plant	258	1	Jupiter's beard	84	2	
Intertwine fruit albizzia	17	6	Jupiter's beard	92	7	
Inula	103	2	Kamala	202	2	
Iris	115	3	Kapok	178	3	
Italian alkanet	35	1	Kât	163	5	
Italian arum	9	4	Kauri	194	4	
Italian may	143	4	Kauri's dammar	83	3	
Italian millet	91	2	Kawa-kawa pepper	272	1	
Italian poplar	108	1	Kawa-kawa schrub	272	1	
Italian stone pine	133	3	Kelp	279	1	
Ivy-leaved	87	1	Kenilworth-ivy	87	1	
Jaborandy of Pernambuco	76	1	Kermes oak	132	7	
Jack by the hedge	559	1	Khât	163	5	
Jalap plant	77	1	Kidney beans	178	2	
Jamaica dogwood	36	7	Kidney beans	156	4	
Japanese banana	257	7	Kidney-vetch	202	6	
Japanese ginseng	58	4	Kidneywort	12	6	
Japanese pagoda tree	157	2	King mithridates herb	253	1	
Japanese star anis tree	31	7	King's clover	105	1	
Jasmine	266	5	King's consound	147	6	
Jasmine boxthorn	98	1	King's rod fistulosous	28	6	
Jasmine of poetry	266	5	Kinkelibah	235	1	
Jatropha	87	4	Knee holly	182	1	
Java cudrania	151	6	Knight's-spur	147	6	
Javatea	30	5	Knot-grass	47	1	£A£

hep	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Vol</u>
56	Hen-bell	56	1	Hore radish tree	27	3
	Henbane	56	1	Horehound	181	2
	Henna plant	72	3	Horehound	157	4
	Нергоѕе	381	1	Horned lotus	352	1
	Herb-bennet	85	1	Horse chestnut tree	286	1
	Herb Christopher	17	2	Horse-elder	149	1
	Herb ivy	158	7	Horse pipe	17	3
	Herb Louisa	353	1	Horse sorrel	74	4
	Herb of grace	175	1	Horse-thyme	198	5
	Herb of grace	111	6	Horsetail	330	1
	Herb of patience	104	1	Hound's berry	151	1
	Herb Paris	183	2	Hound's tongue	228	2
	Herb Robert	1	2	Huaco	176	7
	Herb Trinity	59	1	Hulwort	67	7
	Herba britannica officinalis	71	3	Huskiness plant	185	1
	Herbaceous periwinkle	271	7	Hybrid bugloss	213	5
	Herb'Alia	45	5	Hyoscyamus	56	1
	Hermon's aphrodisiac root	156	3	Hyoscyamus	40	3
	Heterospiny donkey's fart	183	7	•	92	3
	Heterospiny onopordum	183	7	Hypocist		, 4
	Hip	140	1	Hyssopifoliate loosestrife	160	-
	Hoary plantain	223	7	Iboga	25	3
	Hog-berry	189	5	Ice plant	146	6
	Hog's fennel	43	3	Iceland lichen	174	1
	Hogweed	389	1	Iceland moss	174	1
	Holarrhena	262	5	Imperial fritillary	137	3
	Holly	60	1	Incense	204	5
	Holly oak	123	6	Incense tree	206, 207	5
	Holm	60	1	Indian almond tree	23	6
	Holm oak	123	6	Indian banana	256	7
	Holy basil	64	5	Indian berry	118	4
	Holy-herb	154	1	Indian Chestnut	286	1
	Honduras's sarsaparilla	161	4	Indian Civet cat	106	4
	Honey lotus	105	1	Indian corn	147	1
	Honey-balm	49	3	Indian cress	312	1
	Hooded bindweed	341	1	Indian fig	134	4
840	Hooked horehound	261	1	Indian hemp	171	5

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol	hen
Grain of paradise	246	6	Gum-cistus	204	5	55
Granulated rockfoil	181	1	Gum-tragacanth plant	12	6	
Grapes	146	3	Gum tree	119	5	
Gravel grass	161	6	Gutta-percha	157	5	
Gravel saxifrage	181	1	Guyanese caoutchouc tree	182	5	
Great ben plant	197	6	Hachisch	299	1	
Great burnet	41	2	Hack-berry	189	5	
Great centaury	174	5	Hairy cucumber	148	6	
Great flowered sesban	140	7	Hare's ear	69	5	
Great pilewort	129	1	Hare's foot clover	243	6	
Great reed-mace	41	6	Harmal	61	3	
Great sanicle	327	1	Hart's tongue fern	179	1	
Great snapdragon	120	4	Hawkweed	392	1	
Greater ash-tree	355	1	Hawkweed	253	3	
Greater bindweed	341	1	Hawthorn	161	1	
Greater celandine	233	1	Hawthorn	99	5	
Greater plantain	346	1	Hawthorn	114	7	
Green frog	134	3	Hazel-nut tree	58	1	
Green hellebore	88	7	Hazel-nut tree	43	2	
Green mustard	140	3	Headed thyme	113	7	
Green ramee grass	96	5	Heart's ease	59	1	
Green sage	175	5	Heather	187	1	
Grindelia	151	4	Hedge-herry	184	6	
Gromwell reed	17	3	Hedge hyssop	256	1	
Ground cypress	202	7	Hedge maids	326	1	
Ground elder	126	· ·	Hedge mustard	185	1	
Ground ivy	326	1	Hedge pink	224	1	
Ground needle	152		Hedge-vine	362	1	
Ground needle Ground nut	269	5	Heliotrope	249	3	
Ground nut Ground oak		1	Helix	71	4	
	144	6	Helmet flower	28	1	
Ground pine	158	7	Helmet orchid	272	7	
Guaco	176	7	Hemlock	216	1	
Guaiacum gum tree	149	3	Hemorrhoids plant	236	1	
Guanabana	167	5	Hemp	299	1	
Guarana	161	6	Hemp agrimony	112	1	
Guinea pepper	254	6	Hemp weed	112	1	
Gum arabic tree	120	5 i	Hen and chikens	11	ì	የለ3

-	Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol
i T	Fumigation	49	2	Germander	156	7
	Fumiterre	196	1	Giant birthwort	113	7
	Fumitory	196	1	Giant fennel	165	6
	Gagroot	349	1	Giant reed-cane	170	3
	Galangal	84	4	Gingelly	119	6
	Galbanum	26	3	Gingili	119	6
	Galbanum plant	26	3	Ginkgo	83	1
	Galeopsis	56	3	Ginseng	78	1
	Galeopsis	58	4	Gipsywot	158	4
	Galingale	109	5	Glabrous strophanthus	125	7
	Gall	232	7	Glacier wormwood	6	3
	Gall oak	132	7	Glandular albizzia	17	6
	Garden balsam	44	5	Glass-wool	197	7
	Garden caprifoly	226	1	Glasswort	15	6
	Garden cress	102	4	Glaucous coronilla	29	7
	Garden iris	195	1	Globularia	150	5
	Garden nasturtium	312	1	Glossy buckthorn	373	l
	Garden pea	35	2	Glutinous alder	360	1
	Garden sage	199	2	Gnidium	82	5
	Garden sage	174	3	Goat blue weed	2	6
	Garden sorrel	72	2	Goat's rue	361	1
	Garden thyme	97	6	Goat's thorn	12	6'
	Garland thorn	131	6	Gold flower	25	2
	Garlic	89	1	Golden chamomile	26	3
	Garlic	55, 209	2	Golden flower of Peru	141	1
	Garlic mustard	B9	1	Golden locks	25	1
	Garlic-wort	89	1	Golden margaret	17	5
	Gas plant	84	6	Golden-rod	168	5
	Gean cherry	210	2	Golden shower	118	1
	Gean cherry	184	6	Goldenleaves chestnut	189	6
	Geneva bugle	151	6	Good king Henry	22	1
	Gentian	60	2	Goose grass	237, 255	1
	Gentian	59	4	Gooseberry bush	193	5
	Geranium	174	2	Gooseberry currant	108	7
	Geranium	152	5	Gourd	290	2
	German chamomile	29	2	Gourd	256	4
	German iris	195	1	Gourd	163	5

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Vol</u>	ful
Falcate eryngo	131	5	Fish-poison mullein	45	5	53
Falcate milfoil	5	7	Fistulous asphodel	28	6	
False acacia	105	2	Flea-bane	35	7	
False hellebore	9	1	Flea-mint	382	1	
False horsetail	17	3	Flea plantain	344	1	
False narcissus	380	1	Flea-wort	344	1	
False rhubarb	53	3	Flea-wort	29	6	
Fat-hen	2	5	Flea-wort	35	7	
Felonwort	72	1	Florentine iris	194	1	
Female oak	189	1	Florida cornelberry	173	6	
Female polypody	80	5	Florida dogberry	173	6	
Fenugreek	98	1	Florida dogwood	173	6	
Fetid dragon's wort	63	3	Florida star anis tree	22	6	
Fetish banana	256	7	Floss blue flower	2	6	
Feuberry	169	7	Flour	141	5	
Fever-few chrysanthemum	173	3	Flower of St. Macarius	204	1	
Fever-wort	301	1	Flowering-ash	212	3	
Ficary	236	1	Flowering flag	195	1	
Field agaric	252	1	Flowering flax	180	4	
Field agrimony	253	1	Foetid horehound	263	1	
Field clover	243	6	Fool's parsley	128	4	
Field elm	138	1	Foxglove	142	1	
Field eryngo	213	1	Foxtail sedge	116	6	
Field eryngo	167	4	Fragile ephedra	242	1	
Field larkspur	147	6	Fragile nettle	169	6	
Field mint	241	4	Frangipani	38	4	
Field poppy	121	1	Frankincense	206	5	
Field worm wood	151	7	Frankincense tree	206	5	
Figwort	129	1	Fraxinella	84	6	
Filbert	58	1	French lavender	74	5	
Finger flower	142	1	French mercury	100	1	
Finger flower	102	2	French plum	82	3	
Finger flower	94	4	French rose	286	2	
Finger flower	88	5	Frerean incense tree	207	5	
Finger flower	87	6	Fringe-tree	99	3	
Finger flower	101	7	Fuller's herb	224	1	
Fish mint	243	6	Fuller's teasel	254	2	٤٨

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>
Dwarf laurel	82	5	Embelia tanterakala	55	5
Dwarf nasturtium	185	5	Emblic-myrobalan	163	4
Dwarf stinger	120	4	English elm	138	1
Dyer's Anthemis	17	5	English galingale	109	5
Dyer's grapes	204	4	English mercury	22	1
Dyer's litmus paper	185	4	English plantain	197	6
Dyer's madder	277	1	Ergot	14	1
Dyer's oak	132	7	Ergot	7	5
Dyer's rocket	81	4	Ergot	6	6
Dyer's vine	186	6	Erigeron of Canada	19	1
Eagle fern	88	3	Ers	186	3
Earth almond	116	6	Ervil	186	3
Earth-gall	301	1	Eryngo	123	3
Earth nut	269	1	1	9	3
Edelweiss	97	4		10	4
Edible cyperus	116	6			2
Edible mushroom	252	1			6
Egg	46	2			5
Egg-plant	41	1	_		5
Egyptian acacia	120	5			2
Egyptian arum	176	6			3
Egyptian balsam	247	6			2
Egyptian chard beet	184	1		_	1
Egyptian colocasia	176	6			1
Egyptian lupine	51	2			
Egyptian towel gourd	204	3	· ·		2
Ehrenberg organy	152	7			2
Elaterium	283	1	<u>-</u>		- 7
Elder tree	64	1	_		1
•	149	1			6
Elegant aloe	20	6			1
Elegant centaury	173	5	_		7
	20	2	_		7
	16	6			6
Elixir	22	7		155	3
Elm tree	138	1	Faham	156	3
Embelia	29	3	Fair-haired hyacinth	83	7
	Dwarf laurel Dwarf nasturtium Dwarf stinger Dyer's Anthemis Dyer's grapes Dyer's litmus paper Dyer's madder Dyer's oak Dyer's rocket Dyer's vine Eagle fern Earth almond Earth-gall Earth nut Edelweiss Edible cyperus Edible mushroom Egg Egg-plant Egyptian acacia Egyptian arum Egyptian balsam Egyptian balsam Egyptian chard beet Egyptian colocasia Egyptian lupine Egyptian towel gourd Ehrenberg organy Elaterium Elder tree Elecampane Elegant centaury Elixir Elixir Elixir Elixir Elm tree	Dwarf laurel 82 Dwarf nasturtium 185 Dwarf stinger 120 Dyer's Anthemis 17 Dyer's grapes 204 Dyer's litmus paper 185 Dyer's madder 277 Dyer's oak 132 Dyer's rocket 81 Dyer's vine 186 Eagle fern 88 Earth almond 116 Earth-gall 301 Earth nut 269 Edelweiss 97 Edible cyperus 116 Edible mushroom 252 Egg 46 Egg-plant 41 Egyptian acacia 120 Egyptian arum 176 Egyptian balsam 247 Egyptian chard beet 184 Egyptian clocasia 176 Egyptian lupine 51 Egyptian lupine 51 Egyptian towel gourd 204 Ehrenberg organy 152 Elaterium 283 Elder tree 64 Elecampane 149 Elegant aloe 20 Elegant centaury 173 Elixir 20 Elixir 16 Elixir 16 Elixir 22 Elm tree 138	Dwarf laurel 82 5 Dwarf nasturtium 185 5 Dwarf stinger 120 4 Dyer's Anthemis 17 5 Dyer's grapes 204 4 Dyer's grapes 204 4 Dyer's madder 277 1 Dyer's madder 277 1 Dyer's oak 132 7 Dyer's rocket 81 4 Dyer's vine 186 6 Eagle fern 88 3 Earth almond 116 6 Earth-gall 301 1 Earth nut 269 1 Edelweiss 97 4 Edible cyperus 116 6 Edible mushroom 252 1 Egg 46 2 Egg-plant 41 1 Egyptian acacia 120 5 Egyptian balsam 247 6 Egyptian chard beet 184 1 <td>Dwarf laurel 82 5 Embelia tanterakala Dwarf nasturtium 185 5 Emblic-myrobalan Dwarf stinger 120 4 English elm Dyer's Anthemis 17 5 English galingale Dyer's grapes 204 4 English mercury Dyer's litmus paper 185 4 English plantain Dyer's madder 277 1 Ergot Dyer's rocket 81 4 Ergot Dyer's vine 186 6 Erigeron of Canada Eagle fern 88 3 Ers Earth almond 116 6 Eryul Earth nut 269 1 Eryngo Edelweiss 97 4 Erythrina Edelweiss 97 4 Erythrina Edge 46 2 Erigeron Edible mushroom 252 1 Ethiopian bahana Egg 46 2 Ethiopian olibanum tree Egyptian acacia 120 5 Eucalyptol Egyptian balsam 247 6 Eugyptian balsam 247 6 Egyptian colocasia 176 6 Egyptian lupine 51 2 European campanula Enrenberg organy 152 7 European leadwort Elecampane 149 1 European spindle tree Elegant centaury 173 5 Evergreen cak Elixir 20 2 Evergreen cak Elixir 22 7 Fabiana Elim tree 138 1 Faham</td> <td>Dwarf laurel 82 5 Embelia tanterakala 55 Dwarf nasturtium 185 5 Emblic-myrobalan 163 Dwarf stinger 120 4 English elm 138 Dyer's Anthemis 17 5 English elm 138 Dyer's grapes 204 4 English galingale 109 Dyer's grapes 204 4 English galingale 109 Dyer's grapes 204 4 English galingale 109 Dyer's dader 277 1 Ergot 14 Dyer's madder 277 1 Ergot 7 Dyer's oak 132 7 Ergot 6 Dyer's rocket 81 4 Ergot 6 Dyer's vine 186 6 Erget 6 Eagle fern 88 3 Er Er 8 Earlh almond 116 6 Ervil 186 Ervil 186 Ervil 186 Ervil</td>	Dwarf laurel 82 5 Embelia tanterakala Dwarf nasturtium 185 5 Emblic-myrobalan Dwarf stinger 120 4 English elm Dyer's Anthemis 17 5 English galingale Dyer's grapes 204 4 English mercury Dyer's litmus paper 185 4 English plantain Dyer's madder 277 1 Ergot Dyer's rocket 81 4 Ergot Dyer's vine 186 6 Erigeron of Canada Eagle fern 88 3 Ers Earth almond 116 6 Eryul Earth nut 269 1 Eryngo Edelweiss 97 4 Erythrina Edelweiss 97 4 Erythrina Edge 46 2 Erigeron Edible mushroom 252 1 Ethiopian bahana Egg 46 2 Ethiopian olibanum tree Egyptian acacia 120 5 Eucalyptol Egyptian balsam 247 6 Eugyptian balsam 247 6 Egyptian colocasia 176 6 Egyptian lupine 51 2 European campanula Enrenberg organy 152 7 European leadwort Elecampane 149 1 European spindle tree Elegant centaury 173 5 Evergreen cak Elixir 20 2 Evergreen cak Elixir 22 7 Fabiana Elim tree 138 1 Faham	Dwarf laurel 82 5 Embelia tanterakala 55 Dwarf nasturtium 185 5 Emblic-myrobalan 163 Dwarf stinger 120 4 English elm 138 Dyer's Anthemis 17 5 English elm 138 Dyer's grapes 204 4 English galingale 109 Dyer's grapes 204 4 English galingale 109 Dyer's grapes 204 4 English galingale 109 Dyer's dader 277 1 Ergot 14 Dyer's madder 277 1 Ergot 7 Dyer's oak 132 7 Ergot 6 Dyer's rocket 81 4 Ergot 6 Dyer's vine 186 6 Erget 6 Eagle fern 88 3 Er Er 8 Earlh almond 116 6 Ervil 186 Ervil 186 Ervil 186 Ervil

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	
Damascus milfoil	5	7	Distaff thistle	172	6	
Damask rose	394	1	Distilled water	238	2	
Dame's violet	82	1	Ditch reed	291	1	
Danchi plant	117	3	Dittander	140	3	
Danchi plant	140	7	Dittany of Crete	39	2	
Dandelion	249	3	Divaricate succory	262	5	
Dandelion	247	6	Dodder	215	2	
Danewort	126	1	Dog briar	381	1	
Daphne	82	5	Dog rose	381	1	
Date	49	3	Dog's fennel	16	5	
Date palm	273	2	Dog's mouth	120	4	
Dead nettle	340	1	Dog's-tooth-grass	53	3	
Deadly nightshade	51	1	Dogwood	191	2	
Deadly nightshade	34	3	Doll	181	6	
Decaisne colchicum	135	7	Donkey cucumber	283	1	
Decaisne meadow saffron	135	7	Donkey-fart	182	7	
Delicious blackberries			Donkey fart's artichoke	183	7	
bramble	144	3	Doria groundsel	121	3	
Depilatory	221	3	Double coco-nut	237	3	
Dermic cream	212	2	Doubtful nettle	192	7	
Derris	95	7	Downy bachelor's buttons	8	7	
Devil's apple	133	1	Drab ant	247	3	
Devil's apple	88	2	Dragon-bushes	203	6	
Devil's-bit scabious	37	7	Dragon gum-tree	51	3	
Devil's claw	355	1	Dragon's-blood	97	7	
Devil's fig	5	6	Dragon's-blood tree	167	3	
Devil's milk	400	1	Drias plant	94	7	
Devil's milk	159	3	Drinking water	236	2	
Devil's trumpet	133	1	Drum head cabbage	230	3	
Devil's trumpet	88	2	Dryas	86	4	
Diadem lady's mantle	215	7	Dutch medlar	255	2	
Diamond ficoïdes	146	6	Dutch rush	19	3	
Dierville	81	5	Dwale	51	1	
Diet bread	77	4	Dwarf banana	250	5	
Dill	201	1	Dwarf bay	82	5	
Dill-seed	201	1	Dwarf elder	126	1	
Diss ergot	13	1	Dwarf laurel	229	7	

cos	Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>
50	Costmary	70	2	Crowned lady's mantle	215	7
	Cotton plant	170	4	Crystal-tea	122	4
	Cotton thistle	21	5	Cubeb pepper	179	6
	Cotton weed	171	4	Cuckoo bread	101	1
	Cotyledon	12	6	Cuckoo flower	67	5
	Couch grass	378	1	Cuckoo flower	78	7
	Cough wort	265	1	Cuckoo-pint	8	3
	Country almond	23	6	Cucumber	86	2
	Cow-bane	218	1	Culin chive	109	, 6
	Cow-berry	196	2	Cumin	328	1
	Cow parsley	113	6	Cundurango	332	1
	Cow-parsnip	389	1	Cuneate savory	256	5
	Cow weed	113	6	Cuneifoliate savory	256	5
	Cow's lungwort	63	1	Cupress tree	126	2
	Cowslip	165	1	Curage	274	1
	Cranberry	169, 199	7	Curare and indian poisons	191	3
	Creeping bugle	228	1	Curare and indian poisons	193	4
	Creeping Jack	77	6	Curare and indian poisons	201	5
	Creeping potentilla	58	1	Curcuma	11	5
	Creeping thyme	128	2	Curcuma	211	7
	Crenate birthwort	99	5	Curled chondrus	306	1
	Creosote	187	3	Curled mint	245	3
	Cretan astragal	11	6	Curled sorrel	73	4
	Cretan cistus	197	3	Currant fruited rhubarb	108	7
	Cretan eryngo	167	4	Ситту	319	1
	Cretan germander	157, 159	7	Curving cucumber	169	6
	Cretan rockrose	197	3	Cuspidate cudrania	150	ő
	Crocus	162	1	Cuspidate maclura	150	6
	Crocus	101	5	Custard-apple	173	6
	Crosswort bedstraw	150	4	Cyanophyceae	18	6
	Crotalus milk-weed	41	6	Cyclamen of Lebanon	121	4
	Croton-oil plant	187	6	Cymbalaria	87	1
	Crotte lichen	79	5	Daffodil	380	1
	Crowberry	153	2	Daisy	55	1
	Crowfoot	73	3	Dalmatian feverfew	258	1
	Crowfoot	75	4	Dalmatian pyrethrum	258	1
91	Crown-vetch	28	5	Daman of Cape	250	4

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol	ÇOS
Common germander	144	6	Common sanicle	117	4	49
Common ginger	109	2	Common service tree	172	7	
Common gromwell	211	1	Common silver fir tree	55	5	1111
Common groundsel	204	1	Common speedwell	281	1	John L
Common heath	187	1	Common strawberry	222	1	
Common hemp	198	2	Common strawberry	149	2	
Common hemp	171	5	Common sugar cane	171	3	120
Common honeysuckle	137	5	Common tansy	94	1	
Common hop	91	1	Common tooth-wort	89	6	
Common horehound	263	1	Common valerian	371	1	
Common horse-radish	250	6	Common vanilla-plant	286	2	
Common house leek	124	ı	Condor plant	332	1	
Common hyssop	100	3	Condurango	332	1	
Common hyssop	106	4	Congo-pea	181	•	
Common inula	149	1	Conserve	243	5	
Common Ivy	238	1	Conserve	252	7	
Common Juniper	138	3	Copal	113	3	
Common Juniper	143	4	Coral	213	3	
Common lavender	82	4	Corallina of the shops	219	4	
Common lettuce	79	3	Cordate lime tree	171	1	
Common lilac	13	3	Coriander	187	3	
Common mallow	110	1	Cork oak	117	5	
Common meadow-rue	53	3	Cork tree	117	5	
Common medick	162	3	Cork wood	195	7	
Common mistletoe	388	1	Corn chamomile	16	5	
Common mother-wort	157	4	Corn-flower	67	1	
Common nipplewort	80	3	Corn poppy	121	1	
Common oats ergot	13	1	Corn rose	121	1	
Common orange tree	45	1	Corn salad	111	3	
Common pick-needle	54	3	Corsican alsidium	141	6	
Common pick-needle	153	5	Corsican moss	141	6	
Common polypody	25	1	Corydalis	191	7	
Common reed	291	1	Corydalis of Lebanon	170	6	
Common rue	175	1	Corymbiferous cranberry	177	6	
Common rue	111	6	Cos's cyclamen	130	6	
Common rye	126	3	Cost	39	1	
Common rye ergot	14	1	Costmary	39	1	٤٩

clo	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
48	Clove	182	3	Common asparagus	390	1
	Clove pink	168	4	Common banana tree	369	1
	Clove scented broom-rape	55	3	Common beech	159	1
	Clove tree	190	2	Common beech (fruit)	108	2
	Clover	280	2	Common blue passion flower	- 24	5
	Clover dodder	348	1	Common borage	102	1
	Clown's all-heal	114	4	Common box tree	50	1
	Club moss	113	1	Common boxthorn	64	3
	Clustered cardamom	261	5	Common bramble		,
	Coca	218	2		247	
	Coca	219	7	Common buckthorn	376	
	Cocaine	193	3	Common bugle	228	1
	Cocculus indicus	118	4	Common calamint	297	1
	Cockle bur	253	1	Common caprifoly	226	1
	Cockles plant	118	4	Common caraway	185	3
	Cocoanut palm	238	6	Common carline	212	7
	Cocos-nut tree	268	2	Common cat's ear	34	1
	Coffee-beans	41	7	Common cat's-foot	34	1
	Coffee tree	55	1	Common centaury	174	5
	Coffee tree	41	5	Common chickweed	377	1
	Coix millet	17	3	Common clinopodium	198	5
	Cola-nut	335	1	Common columbine	36	1
	Colchicum	191	1	Common comfrey	333	1
	Colchicum	125	6	Common cornel tree	192	2
	Colic wort	214	7	Common cultivated oat	115	1
	Colocasia eatable arum	176	6	Common custard-apple	174	6
	Colocynth	106	1	Common cuttle-fish	72	5
	Colombo	289	1			
	Colt's foot	265	1	Common dropwort	143	4
	Columba root	289	1	Common eryngo	213	1
	Common alder	360	1	, -	231	I
	Common alkanet	35	1	Common fennel	145	2
	Common almond tree	350	1	Common fig-tree	69	1
	Common almond tree	232	2	Common fig-tree	54	2
	Common aloe	31	1	Common flax	313	1
793	Common ash-tree	355	1	Common-fleabane	103	2

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>	clo
Cascara	375	1	Cherry laurel	316	1	47
Cashew-nut	177	5	Cherry tree	315	1	
Cashew-nut tree	33	6	Cherry tree	211	2	
Cassia	112	3	Chervil	113	4	
Cassia	124	6	Chestnut foliate oak	132	7	
Cassia tree	165	5	Chick-pea	67	3	, a ₁
Castor oil plant	118	1	Chicocke tree	179	6	
Castor oil plant	79	4	Chilean centaury	174	5	
Castoreum	168	3	China-grass	95	5	
Cat berries	193	5	China smilax	181	7	
Cat-mint	297	1	Chinese wormwood	5	6	
Cat thyme	67	7	Chinese banana	256	7	
Cat's milk	400	1	Chinese cinnamon tree	165	5	
Cat's-tail	41	6	Chinese root	181	7	
Cat's valerian	371	1	Chirimoyas	195	7	
Catalpa	180	4	Chirurgical lamina	196	6	
Catch-weed	255	1	Chlorophyceae	17	6	
Catechu	175	4	Chocolate	124	3	
Catechu tree	137	2	Chocolates	129	4	
Cathartic flax	206	7	Christ's thorn	125	2	
Catmint	293	1	Christ's thorn	111, 131	6	
Catnip	293	1	Christmas	60	1	
Caudate nettle	192	7	Christmas-rose	78	2	
Cautery	262	7	Cinchona	189	3	
Cavendish banana	250	5	Cinnamon	189	2	
Celandine	233	1	Circinate cornel tree	194	7	
Celery	182	4	Circinate dogberry	194	7	
Celery	185	5	Circinate dogwood	194	7	
Celery leaved crowfoot	85	7	Cistus	220	2	
Centaur herb	301	1	Clary	177	6	
Centaury	301	1	Clay	164	2	
Centinode	47	1	Cleavers	255	1	
Cevadilla	129	7	Clematis	262	2	
Chalepens rue	113	4	Clematis	236	4	
Chamomile	26	1	Climbing hedera	238	1	
Charcoal	260	1	Clouston's tange	223	2	
Chate of Egypte	148	6	Clouston's tangle	223	2	191

but	Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>
46	Butter-bur	167	3	Canadopotato	166	2
	Butter leaves	180	1	Canary creeper	312	1
	Butter plant	90	1	Cancerwort	194	5
	Butter wort	90	1	Candian savory	239	6
	Buttercup	74	2	Candle plant	84	6
	Buttermilk	241	2	Candy carrot	55	4
	Buttons	94	1	Cane apple	294	1
	Cable	21	1	Canker rose	381	1
	Cabbage	262	2	Canker-wort	247	6
	Cabbage palm	273	2	Canoe cedar	60	7
	Cabbage palm	242	3	Cantharis	91	3
	Cabbage tree	70	7	Cantharis	96	4
	Cocao tree	309	1	Cantor herb	185	1
	Cacao tree	179	3	Caoutchouc	182	5
	Cachou	175	4	Cap bean	165	6
	Cactus	135	4	Caper-spurge	167	6
	Caffeine	181	5	Caper tree	203	2
	Cafta	163	5	Capillaire	321	1
	Cajan-pea	181	6	Caprifoly	226	1
	Cajeput oil tree	39	5	Caprifoly	154	2
	Calabar bean	186	7		137	5
	Calamint	297	1	Caprifoly		
	Calamint	170	4	Capsicum	275	1
	Calf's foot	8	3	Capsicum	163	3
	Calf's snout	128	6	Carapa oil-tree	174	4
	Calidonian maclura	151	6	Carbon	179	2
	Caltrops	303	1	Cardoon	68	2
	Camamel	26	1	Cardoon's shape donkey-far		7
	Camel's hay	7	7	Cardoon's shape onopordo		7
	Campeachy wood	37	7	Carline acaulous	320	1
	Camphire	72	3	Carline thistle	212	7
	Camphor	179	3	Carnation	168	4
	Camphor tree	202	2	Carob tree	116	1
	Canadian avens	65	6	Carragaheen	306	1
	Canadian capillaire	191	5	Саттадееп	306	1
	Canadian horse-mint	33	4	Carrot	54	3
	Canadian hydrastis	283	2	Carter incense tree	206	5
190	Canadian maidenhair	191	5	Carthaginian apple	156	1

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	<u>Vol</u>	bat
Bloody finger	87	6	Bread-root	74	3	45
Bloody finger	101	7	Break stone	214	7	
Blow-ball	247	6	Brewer's yeast	127	1	
Blue acacia	133	7	Bristle-fern	107	3	
Blue-bottle	67	1	British oak	189	1	
Blue daisy	172	2	Brittle maidenhair	192	5	
Blue flower de Luce	195	1	Brittle seagrapes	242	1	
Blue money	207	1	Broad bean	184	2	
Blue weed	4	6	Broad leaved hog's fennel	51	1	
Bog-bean	383	1	Brook	82	6	The High
Bogberry	169	7	Brook mint	243	6	
Boldo	203	1	Brooklime	185	2	
Bonduc	41	3	Broom cytisus	394	1	
Bonduc	104	4	Broom reed	291	1	
Boon tree	64	1	Broom schrub	394	1	
Borage (flower)	103	5	Brown flower	295	1	
Borage (flowering head)	95	5	Brown rayed knapweed	201	7	
Bottle brush	17	3	Bruise-wort	55	1	
Bourbon-lily	167	1	Brunette	295	1	
Boustani's cyclamen	122	5	Brushwood persicaria	171	6	
Bow-wood tree	190	7	Buck-bean	383	1	
Bowman's root	62	4	Buck wheat	240	4	
Bowman's root	59	5	Buck's horn	68	4	
Box holly	182	1	Buck's-horn plantain	223	7	
Brack fern	88	3	Bug-bane	26	1	
Bracteolate rue	113	4	Bug-bane	18	2	
Bramble	171	2	Bugle weed	228	1	
Bran	379	1	Bugloss	35	1	
Bran mash	3 79	1	Bulbous corydalis	170	6	
Brandy	250	7	Bullace	131	1	hill.
Brandy-bottle	385	1	Bullock's heart	174	6	- 41.41 . 14.11
Brazilian caoutchouc tree	182	5	Burdock	16	1	
Brazilian hevea	182	5	Burnet	53	1	
Brasilian sandbox	269	7	Burrweed	142	2	1919 1 To 1
Brazilian statice	10	3	Bush basil	76	7	-7
Brazilian tea	61	1	Butcher's broom	182	1	
Bread	75	3	Butter and eggs	203	6	197

<u>bil</u>	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
44	Bilberry	298	1	Black currant bush	322	1
	Bilberry	196	2	Black-fellows	62	3
	Bile	232	7	Black health	123	1
	Bine	91	1	Black hellebore	78	2
	Bird-berry	189	5	Black horehound	263	1
	Bird's foot	352	1	Black-horn	18	7
	Bird's foot trifoil	352	1	Black maidenhair	108	5
w_{di}	Bird's nest fern	179	1	Black milfoil	3	6
e day	Birthwort	9	2	Black mulberry	68	1
	Birthwort clematis	160	1	Black mulberry	52	2
ٱ.	Birthwort of Brasil	96	6	Black-mustard	114	1
	Bishop's weed	83	2	Black nightshade	151	1
	Bishop's wort	48	1	Black oak fern	108	5
	Bistort	32	1	Black pepper plant	161	5
$x \in \mathcal{P}_0$	Biting clematis	362	1	Black poplar	108	1
	Biting persicaria	274	1	Black radish	179	2
	Biting stonecrop	77	6	Black salsify	89	2
	Bitter ach	308	l	Black snake-root	26	1
	Bitter apple	106	1	Black spindle tree	225	6
	Bitter asch	42	4	Black spleenwort	108	5
#1111111111111111111111111111111111111	Bitter gourd	106	1	Black thorn	131	1
	Bitter milk-weed	42	4	Black wort	333	1
H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H	Bitter milk-wort	42	4	Bladder herb	310	1
	Bitter orange	238	3	Bladder-senna tree	300	1
	Bitter orange	239	4	Bladder wrack	279	1
	Bitter simaruba	186	1	Bleeding heart	368	1
	Bitter-sureet	72	1	Blessed carbenia	171	6
	Bituminous bread-root	76	4	Blessed centaury	214	1
	Black alder	373	1	Blessed thistle	214	1
	Black alder «bark»	268	2	Blessed thorn	214	1
	Black alder charcoal	260	1	Blind nettle	340	1
	Black anacardium	23	5	Blister hellebore	8.0	7
	Black berry	247, 298	1	Blood-root	139	3
	Black berry bush	68	1	Blood-root	145	5
1104 <u>1</u>	Black bryony	176	2	Blood-wort	139	3
i i	Black centaury	201	7	Bloody finger	142	1
E 9 V	Black cumin	147	2	Bloody finger	88	5

Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	<u>Vol</u>	big
Azedarach	103	6	Bear's breech	19	2	43
Azerole tree	100	6	Bear's garlic	189	5	
Bachelor buttons	67	1	Bear's grape	248	1	ing.
Bachelor's buttons	11	2	Beautiful corydalis	190	7	
Bael tree	42	6	Beautiful sorrel	76	6	
Balm-leaf	366	1	Bee	272	2	
Balm melittis	49	3	Bee-balm	366	1	
Balsam	40	2	Beech tree	159	1	- 1904 - 2545 - 2544 - 5546
Balsam	34	6	Beef-wood tree	192	5	
Balsam	39	7	Beergherkin	92	7	
Balsam of Mecca	39	3	Bees plant	364	1	
Balsam tree of Peru	35	4	Beet	118	6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Banana tree	369	1	Beet-root	210	1	
Banewort	51	1	Beggar's buttons	7	4	
Baobab	31	2	Bell heather	123	1	
Barbados aloe	31	1	Belote oak	123	6	
Barbary boxthorn	98	1	Belvedere	194	6	
Barbary fig	151	2	Ben-oil tree	31	2	
Barbary worm wood	151	7	Bent ephedra	242	1	
Barber's brushes	357	1	Benzine	42	3	
Barberry	44	1	Benzoin	42	5	
Barley	134	6	Berberry	44	1	
Barometer plant	320	1	Bergamot orange tree	46	1	
Barosma	43	2	Berry bearing glasswort	24	4	
Barren privet	103	5	Betel-nut palm	217	7	
Basil	88	1	Betony	48	1	i ja
Basil	65	5	Bidistilled water	237	2	$= \lim_{n \to \infty} a_n a_n a_n a_n$
Basjoo banana	257	7	Bieberstein's milfoil	4	5	
Bastrad balm	49	3	Big basil	65	5	
Bastard blue agrimony	2	6	Big bogberry	155	6	
Bastard nigella	73	5	Big cranberry	155	6	
Bastard pellitory	3	7	Big flowering torch thistle	209	1	
Bdellium	260	2	Big flowering worm-killer	113	7	
Bead tree	135	6	Big hemlock	216	1	
Bean-clover	30	7	Big horsetail	21	4	
Bean of Malacca	33	6	Big periwinkle	254	4	
Bear berry	248	1	Big Tayove	58	7	ESA

American erythrina							
42 American erythrina 11 4 Areca-palm 217 7 American ginseng 60 2 Argemone poppy 80 6 American heuchera 249 6 Arghel 67 4 American indian hemp 83 4 Argil 164 2 American aloe 27 3 Armitree 64 1 American periwinkle 264 5 Armica 16 1 American star anis 31 7 Arbotto 34 4 Anemone 144 2 Arnotta tree 34 4 Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anetica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 10 2 Anjular centaury 175 5 Artichoke 3 3 Animal wax 137 6 Asafoetida 65 3							
American ginseng 60 2 Argemone poppy 80 6 American heuchera 249 6 Arghel 67 4 American indian hemp 83 4 Argil 164 2 American aloe 27 3 Armstrong 47 1 American aloe 27 3 Arm tree 64 1 American star anis 31 7 Armotto 34 4 Anemone 144 2 Armotta tree 34 4 Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Annial wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual savory 275 3 Asphodel 30 4 Apricot 358 1 Astragal 13 2 Apricot 358 1 Astragal 13 2 Apricot 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arbotus 294 1 Avens 881 1	ame	Eng.	Page	Vol	Eng.	Page	Vol
American heuchera 249 6 Arghel 67 4 American indian hemp 83 4 Argil 164 2 American oak 131 7 Armstrong 47 1 American aloe 27 3 Arn tree 64 1 American periwinkle 264 5 Armica 16 1 American star anis 31 7 Armotto 34 4 Anemone 144 2 Armotta tree 34 4 Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Annimal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Astmagul 13 2 Arabica tea plant 163 5 Astragal 13 2 Arabica tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avocado pear 40 1	42	American erythrina	11	4	Areca-palm	217	7
American indian hemp 83 4 Argil 164 2 American oak 131 7 Armstrong 47 1 American aloe 27 3 Arn tree 64 1 American periwinkle 264 5 Arnica 16 1 American star anis 31 7 Arnotto 34 4 Anemone 144 2 Arnotta tree 34 4 Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 Anjular centaury 175 5 Artichoke 3 3 Anisina<		American ginseng	60	2	Argemone poppy	80	6
American oak 131 7 Armstrong 47 1 American aloe 27 3 Arn tree 64 1 American periwinkle 264 5 Arnica 16 1 American star anis 31 7 Arnotto 34 4 Anemone 144 2 Arnotta tree 34 4 Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anet 201 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Assi's foot 265 1 Apricot 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 13 2 Arabia tea plant 163 5 Astragal 13 2 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arabic excert 15 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avocado pear 40 1		American heuchera	249	6	Arghel	67	4
American aloe 27 3 Arn tree 64 1 American periwinkle 264 5 Arnica 16 1 American star anis 31 7 Arnotto 34 4 Anemone 144 2 Arnotta tree 34 4 Anemone 126 4 Artow-root 6 3 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Astragal 13 2 Arabia tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arbote scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens 84 1		American indian hemp	83	4	Argil	164	2
American pertwinkle 264 5 Arnica 16 1 American star anis 31 7 Arnotto 34 4 Anemone 144 2 Arnotta tree 34 4 Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Anjustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Anistifoliate water celery 210 7 Arum 7 2 <td></td> <td>American oak</td> <td>131</td> <td>7</td> <td>Armstrong</td> <td>47</td> <td>1</td>		American oak	131	7	Armstrong	47	1
American star anis 31 7 Arnotto 34 4 Anemone 144 2 Arnotta tree 34 4 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic ginseng 78 1 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrod		American aloe	27	3	Arn tree	64	1
Anemone 144 2 Arnotta tree 34 4 Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Asasfoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RII 1		American periwinkle	264	5	Arnica	16	1
Anemone 126 4 Arrow-root 6 3 Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astma weed 349 1 Arabiac costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens III 1 Avocado pear 40 1		American star anis	31	7	Arnotto	34	4
Anet 201 1 Arsenic 97 6 Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Aubergine 41 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RII 1		Anemone	144	2	Arnotta tree	34	4
Angelica 96 1 Artichoke 10 2 Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens 81 1		Anemone	126	4	Arrow-root	6	3
Angular centaury 175 5 Artichoke 3 3 3 Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens 81 1		Anet	201	1	Arsenic	97	6
Angustifoliate water celery 210 7 Arum 7 3 Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens Ril 1		Angelica	96	1	Artichoke	10	2
Aniline 22 6 Asafoetida 65 3 Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbute 294 1 Avens RI 1		Angular centaury	175	5	Artichoke	3	3
Animal wax 137 6 Asarabacca 21 1 Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avens RI 1		Angustifoliate water celery	210	7	Arum	7	3
Anise 288 2 Ash of Jerusalem 256 3 Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avens RI 1		Aniline	22	6	Asafoetida	65	3
Annato dye plant 34 4 Asiatic crowfoot 76 6 Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 13 2 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RII 1 Arbores 294 1 Avens RII 1		Animal wax	137	6	Asarabacca	21	1
Annual Adonis 7 2 Asiatic ginseng 78 1 Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 13 2 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RII 1 Arbores 294 1 Avens RII 1		Anise	288	2	Ash of Jerusalem	256	3
Annual mercury 100 1 Asiatic white-rot 244 4 Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avens RI 1		Annato dye plant	34	4	Asiatic crowfoot	76	6
Annual pepper 275 1 Asp 14 5 Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens 8		Annual Adonis	7	2	Asiatic ginseng	78	1
Annual savory 275 2 Aspargine 13 5 Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avens RI 1		Annual mercury	100	1	Asiatic white-rot	244	4
Annual succory 262 5 Asphodel 30 4 Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens № ■ 1 Arocado pear 40 1		Annual pepper	275	1	Asp	14	5
Antilles aloe 31 1 Assafoetida plant 26 2 Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Annual savory	275	2	Aspargine	13	5
Aphrodisiac prangos 136 6 Asse's pepper 240 6 Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Annual succory	262	5	Asphodel	30	4
Apple tree 50 4 Ass's foot 265 1 Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens R. 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Antilles aloe	31	1	Assafoetida plant	26	2
Apricot 358 1 Asthma weed 349 1 Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Aphrodisiac prangos	136	6	Asse's pepper	240	6
Apricot tree 358 1 Astragal 13 2 Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Apple tree	50	4	Ass's foot	265	1
Arabian tea plant 163 5 Astragal 15 7 Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Apricot	358	1	Asthma weed	349	1
Arabic costus 168 3 Aubergine 41 1 Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Apricot tree	358	1	Astragal	13	2
Arabic kust-root 168 3 Autumn colchicum 133 7 Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Arabian tea plant	163	5	Astragal	15	7
Arar tree 115 5 Autumn crocus 191 1 Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Arabic costus	168	3	Aubergine	41	1
Arborescent basil 64 5 Autumn crocus 125 6 Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Arabic kust-root	168	3	Autumn colchicum	133	7
Arborescent scented basil 69 6 Ava pepper 272 1 Arbute 294 1 Avens RJ 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Arar tree	115	5	Autumn crocus	191	1
Arbute 294 1 Avens RI 1 Arbutus 294 1 Avocado pear 40 1		Arborescent basil	64	5	Autumn crocus	125	6
Arbutus 294 l Avocado pear 40 l		Arborescent scented basil	69	6	Ava pepper	272	1
		Arbute	294	1	Avens	8.0	1
Eqq Archangel 96 1 Ayapana 27 4		Arbutus	294	l	Avocado pear	40	1
	199	Archangel	96	1	Ayapana	27	4

English Index

Eng.	Page	<u>Vol</u>	Eng.	Page	Vol
Abaca plant	250	5	Alaternus	103	5
Abelmosk	67	4	Albizzia anthelminthica	41	4
Abraham's balm	119	3	Alcohol	187	5
Abrotanum	304	1	Alder buckthorn	373	1
Absinth	1	1	Alexander's foot	137	3
Absinth tree	132	6	Alexander's horse parsley	190	5
Absinthium	1	1	Alfalfa	162	3
Abyssinian aloe	20	6	Alkalies and Alkaloids	198	7
Abyssinian banana	233	6	Alkanet	200	5
Abyssinian capillaire	191	5	Alkekeng	310	1
Abyssinian maidenhair	191	5	All-heal	295, 371	1
Acetone	14	2	All-heal	181	3
Acid	64	2	All Saint's-wort	83	6
Acinos	275	2	Alleluia	101	1
Aconite	28	1	Allgood	22	1
Aconite	21	2	Alligator apple	195	7
Acrid lettuce	82	4	Alligator pear	40	1
Acuminate Pagoda tree	42	2	Almond	350	1
Adam's fig	232	6	Aloes	139	2
Adder wort	32	1	Aloes	116	3
African civet cat	99	3	Aloes	25	7
African millet grass	164	2	Alphabet plant	1	2
African pepper tree	254	6	Alpine caprifoly	138	6
African plantain	344	1	Alumroot	249	6
African voacanga	185	7	Alypo globe daisy	150	5
Ageratum milfoil	4	7	Amber	149	3
Agreeable strophanthus	125	7	Amee	1.3	2
Ague grass	69	4	American cress	77	1

Sc.	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	<u>Vo</u>	ziz
Vernonia nigritiana	35	7	Vitis nigra	362	1	37
Veronica beccabunga	185	2	Vitis vinifera	146	3	
Veronica officinalis	281	1	Vitis vinifera (vigne)	186	6	
Viburnum gallorum	362	1	Viverra civetta	99	3	
Viburnum lantana	19	7	Viverra zibetha	106	4	
Viburnum opulus	17	2	Voacanga africana	185	7	
Viburnum prunifolium	18	7	Voacanga thouarsii	185	7	
Viburnum tinus	15	6	Winterana Canella	165	5	
Vicia faba	184	2	Xanthium spinosum	141	7	
Villarsia nymphaeoides	185	2	Xanthium strumarium	142	2	
Vinca herbacea	271	7	Ximenia ægyptiaca	247	6	
Vinca herbacea var. libanoti	ica 254	6	Xylopia æthiopica	254	6	
Vinca libanotica	254	6	Zanthoxylum (Xanthoxylum)			
Vinca major	254	4	fraxineum	87	3	
Vinca minor	396	1	Zea myas	147	1	
Vinca rosea	264	5	Zingiber officinale	109	2	
Vincetoxicum officinale	157	2	Zizyphus jujuba	244	1	
Vinum	76		Zizyphus jujuba	154	6	
		5	Zizyphus jujuba	155	7	
Viola calcarata	40	4	Zizyphus lotus	155	7	
Viola odorata	38	6	Zizyphus officinarum	244	1	
Viola tricolor ssp. arvensis	59	1	Zizyphus officinarum	154	6	
Vipera aspis	14	5	Zizyphus sativa	244	1	
Vipera berus	14	5	Zizyphus sativa	154	6	
Viscum album	388	1	Zizyphus spina-Christi	111	6	
Visnaga vera	122	1	Zizyphus vulgaris	244	1	
Vitex Agnus-castus	119	3	Zizyphus vulgaris	154	6	

10	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	Vol
36	Tropæolum majus	312	1	Urtica membranacea	192	7
	Tropæolum minus	185	5	Urtica pillulifera	192	7
	Tuber	217	2	Urtica urens	166	4
	Turnera aphrodisiaca	86	4	Usnea plicata	78	7
	Turnera diffusa	8ĕ	4	Vaccinium arctostaphylos	198	
	Tussilago farfara	265	1	Vaccinium corymbosum	177	(
	Typha angustata	47	7	Vaccinium myrtillus	298	1
	Typha angustifolia	47	7	Vaccinium myrtillus	196	2
	Typha australis	47	7	Vaccinium oxycoccus	169	•
	Typha latifolia	41	6	Vaccinium uliginosum	199	
	Ulmaria palustris	364	1	Vaccinium vitis idæa	196	:
	Ulmaria palustris	163	7	Vaillantia cruciata	150	
	Ulmus campestris	138	1	Valeriana elatior sylvestris	371	
	Ulmus glabra	138	1	Valeriana officinalis	371	
	Ulmus nuda	138	l	Valeriana tripteris	256	;
	Ulmus procera	138	1	Valeriana yatamansi	237	
	Umbilicus	12	6	Valerianella olitoria	111	:
	Umbilicus erectus	12	6	Vanilla planifolia	286	
	Umbilicus rupestris	15	2	Variolaria amara	68	•
	Uncaria Gambieri	154	3	Variolaria discoidea	68	
	Uncaria inermis	254	5	Veratrum album	79	:
	Unedo edulis	294	1	Verbascum	44	:
	Ungula caballina	265	1	Verbascum (Species)	63	
	Unona æthiopica	254	6	Verbascum gileadense	47	4
	Unona odorantissima	256	6	Verbascum phomoides	41	4
	Unona piperita	254	6	Verbascum Sinaiticum	44	;
	Uragoga granatensis H. Bn.	140	3	Verbascum sinuatum	47	•
	Uragoga ipecacuanha	229	1	Verbascum Somaliens	44	:
	Urechites suberecta	23	6	Verbascum ternacha	44	:
	Urginea maritima	23	ì	Verbascum thapsiformes	44	;
	Urginea maritima	16	7	Verbascum thapsus	45	2
	Urginea scilla	23	1	Verbascum tripolitanum	45	:
	Urginea scilla	16	7	Verbascum undulatum	47	•
	Urtica caudata	192	7	Verbena officinalis	154	1
	Urtica dioica	284	i	Verbena recta	154	1
	Urtica dubia	192	7	Verbena triphylla	353	1
)	Urtica fragilis	169	6	Vernonia anthelminthica	180	7

So.	D 1	./_∎	S-	Dose	Val	
Sc. Teucrium chamædrys	Page \ \ \ 144	<u>⁄ol</u> 6	Sc. Tilia cordata	Page 105	<u>Vol.</u>	<u>tri</u> 35
Teucrium chamæpitys	158	7		103	3	
Teucrium creticum	157, 159	7	Tilia europaea var. platyphyllos	119	7	
Teucrium flavum	67, 157	7	Tilia europaea var. ulmifolia	105	5	
Teucrium iva	158	7	Tilia grandiflora	119	7	
Teucrium marum	158	7	Tilia microphylla	105	5	
Teucrium montanum	158	7	Tilia parvifolia	171	1	
		7	Tilia parvifolia	105	5	
Teucrium polium Teucrium rosmarinifolium	67, 157		•		-	
	157, 159	7	Tilia pauciflora	119	7	
Teucrium scordium ssp. palustre	12	4	Tilia platyphyllos	119	7	
Teucrium scordium ssp.	12	•	Tilia sylvestris	171	1	
palustre	143	6	Tilia sylvestris	105	5	
Thalictrum aquilegifolium	55	2	Tilia ulmifolia	171	1	
Thalictrum flavum	53	3	Tilia ulmifolia	105	5	
Thapsia garganica	94	7	Tithymatus lathyris	167	6	
Thea camellia	197	1	Tormentilla erecta	145	5	
Thea sinensis	197	1	Tormentilla officinalis	145	5	
Thea viridis	197	1	Tournefortii	81	5	
Theobroma cacao	309	1	Toxylon pomifera Rafin.	190	7	
Theobroma cacao	179	3	Tragopogon	134	2	
Thevetia nereifolia	52	2	Tragopogon pratensis	134	2	
Thlapsis bursa pastoris	336	1	Trapa natans	146	4	
Thridax	225	3	Tremella auriculae-judae	2	3	
Thuya articulata	122	6	Trianosperma tāyuya	52	6	
Thuya occidentalis	60	7	Trifolium acetosum	101	1	
Thymbra capitata	113	7	Trifolium arvense	243	6	
Thymelæa mezereum	229	7	Trifolium corniculatum	352	1	
Thymelæa præcox	229	7	Trifolium fibrinum	383	1	
Thymelæa tartonraira	84	5	Trifolium melilotus	105	1	
Thymus capitatus	113	7	Trifolium palustre	383	1	
Thymus creticus	113	7	Trifolium pratense	265	7	
-			Trifolium repens	280	2	
Thymus graveolens	13	5	Trigonella fænum-græcum	98	1	
Thymus graveolens	239	6		378	1	
Thymus serpyllum	128	2	Triticum repens		_	
Thymus tragoriganum	239	6	Triticum turgidium	379	1	
Thymus vulgaris	97	6	Triticum vulgare	379	1	
Tilia cordata	171	1	Triticum vulgare	197	2	٥٠٦

spi	_ <u>Sc.</u>	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	Vol
34	Spiroea trifoliata	62	4	Symphytum officinale	333	1
	Spondylium branca-ursina	389	1	Syringa vulgaris	13	:
	Stachys betonica	48	1	Syzygium aromaticum	182	:
	Stachys officinalis	48	1	Tabernanthe iboga	25	;
	Stachys palustris	114	4	Tamarindus indica	55	
	Stachys procumbens	1 09	5	Tamarindus officinalis	55	
	Stachys recta	109	5	Tamarix gallica	1	
	Stachys sieboldii	114	6	Tamus communis	176	;
	Stachys sylvatica	127	2	Tanacetum balsamita	39	
	Stachys sylvatica	115	6	Tanacetum balsamita	70	
	Stachys tuberifera	114	6	Tanacetum vulgare	94	
	Statice brasiliensis	10	3	Taraxacum	249	
	Statice limonium	11	7	Taraxacum assemanii	268	
	Stellaria media	377	1	Taraxacum bessarabicum	267	
	Sterculia acuminata	335	1	Taraxacum brevirostre	250	
	Sterculia Lychnophora	33	2	Taraxacum dens leonis	247	
	Sterculia staphigera	58	7	Taraxacum kurdiciforme	247	
	Sticta pulmonaria	69	2	Taraxacum laxum	247	
	Streptopus amplexifolius	211	4	Taraxacum libanoticum	250	
	Strophanthus gratus	125	7	Taraxacum microcephalum	250	
	Strophanthus hispidus	120	2	Taraxacum officinale	247	
	Strophanthus Kombe	111	4	Taraxacum officinarum	247	
	Strychnos gaultheriana	268	7	Taraxacum serotinum	250	
	Strychnos ignatii	185	7	Taraxacum syriacum	249	:
	Strychos nux vomica	132	6	Taraxacum vulgare	247	
	Styrax officinal	201	3	Taxus baccata	163	:
	Styrax tonkinensis	225	2	Terminalia	22	:
	Succisa pratensis	37	7	Terminalia bellerica	22	
	Sumbulus moschatus	232	4	Terminalia catappa	23	
	Sumbulus moschatus	112	5	Terminalia Chebula	22	:
	Swietenia	21	5	Terminalia Citrina	22	:
	Swietenia febrifuga	23	5	Terminalia horrida	22	
	Swietenia mahagoni	234	4	Tetraclinis articulata	122	
	Swietenia mahagoni	22	5	Tetragonia expansa	51	2
	Swietenia Senegalensis	22	5	Teucrium	156	-
	Symphocarpus fætidus	63	3	Teucrium aureum	67, 157	-
Y	Symphytum consolida	333	1	Teucrium capitatum	157	

<u>Sc.</u>	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	<u>spi</u>
Sesamum radiatum	119	6	Smilax sp.	168	6	33
Sesbania	117	3	Smyrnium olusatrum	190	5	
Sesbania grandiflora	140	7	Soja hispida	161	2	
Seseli graveolens	317	1	Solanum (Sensu lato)	139	5	
Setaria italica	91	2	Solanum dulcamara	72	1	
Setigerum et glabrum	15	3	Solanum furiosum	51	1	
Siler Montanum	200	4	Solanum lethale	51	1	
Siler trilobum	200	4	Solanum lycopersicum	36	6	
Silybum Marianum	324	1	Solanum maniacum	51	1	
Simaba cedron	117	3	Solanum melongena	41	1	
Simaruba amara	186	1	Solanum nigrum	151	1	
Simaruba officinalis	186	1	Solanum tuberosum	31	3	
Sinapis alba	79	2	Solenostemma Argel	67, 212	4	
Sinapis nigra	114	l	Solidago virga-aurea	168	5	
Sinomenium acutum	119	4	Sophora japonica	157	2	
Sison ammi	13	3	Sorbus aucuparia	150	4	
Sisymbrium alliaria	89	1	Sorbus domestica	172	7	
Sisymbrium officinale	185	1	Soymida sebrifuga	23	5	
Sisymbrium Sophia	129	6	Sparattosperma lithontripticum	n 115	3	
Sium	210	7	Spartium junceum	253	4	
Sium angustifolium	210	7	Spergularia marina	3	1	
Sium apium	317	1	Spergularia rubra	3	1	
Sium berula	210	7	Spermaceti	4	4	
Sium erectum	210	7	Sphacœlia segetum	14	1	
Sium graveolens	317	1	Sphærococcus helminthocorto	n 141	6	
Sium latifolium	186	6	Spigelia anthelmia	124	7	
Sium ninzi	58	4	Spigelia marylandica	111	4	
Sium sisarum	139	7	Spilanthes oleracea	81	7	
Sium visnaga	122	1	Spilanthes	1	2	
Smilax	160	3	Spilanthus acmella	1	2	
Smilax	180	7	Spinacia oleracea	10	3	
Smilax aspera	270	1	Spiræa filipendula	143	4	
Smilax aspera var. genuina	270	1	Spiræa ulmaria	364	1	
Smilax china	181	7	Spiræa ulmaria	163	7	
Smilax sp.	161	3	Spiritus aeruginis	66	2	
Smilax sp.	161	4	Spiritus vini	250	7	
Smilax sp.	160	5	Spiroea stipulacea	59	5	٥٠٨

san	. <u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
32	Santolina incana	202	7	Scyphophorus pyxidatus	69	2
	Sapon	128	3	Sebum	251	4
	Saponaria officinalis	224	1	Secale cereale	14	1
	Sarcopoterium spinosum	38	5	Secale cereale	126	3
	Sarothamnus scoparius	394	1	Secale cornutum	7	5
	Sarracenia purpurea	45	3	Secale cornutum	6	6
	Sassafras officinale	120	2	Sedum acre	7 7	6
	Satureia capitata	113	7	Sedum anglicum	77	6
	Satureia cuneifolia	256	5	Sedum purpureum	86	7
	Satureia hortensis	275	2	Sedum rhodiola	87	7
	Satureia montana	240	6	Sedum roseum	87	7
	Satureia thymbra	239	5	Sedum telephium	86	7
	Saxifraga callosa	131	2	Sedum tertium	77	6
	Saxifraga cordifolia	131	2	Sedum vulgare	86	7
	Saxifraga granulata	181	1	Selenicereus grandiflorus	209	1
	Saxifraga granulata	130	2	Selinum anethum	201	1
	Saxifraga rotundifolia	132	2	Selinum angelica	96	1
	Saxifraga tridactylites	108	3	Selinum palustre	109	6
	Scabiosa argentea	130	7	Semecarpus	21	5
	Scabiosa arvensis	110	3	Semecarpus atra	23	5
	Scabiosa palaestina	117	6	Semecarpus vitiensis	23	5
	Scabiosa succisa	116	4	Sempervivum arachnoideum	92	7
	Scabiosa ucranica	130	7	Sempervivum Gaudinii	84	2
	Scandix pecten-veneris	242	5	Sempervivum tectorum	124	1
	Scaphium scaphigerum	58	7	Senebiera coronopus	68	4
	Schinopsis Lorentzii	179	4	Senecio Doria	121	3
	Schenocaulon officinalis	129	7	Senecio jacobaea	125	4
	Scilla maritima	23	1	Senecio maritima	126	3
	Scilla maritima	16	7	Senecio vulgaris	204	1
	Sclerotium clavus	14	1	Sensu lata	112	3
	Scolopendrium officinale	179	1	Sepia officinalis	72	5
	Scolopendrium officinarum	179	1	Septinerva	346	1
	Scolopendrium vulgare	179	1	Serjania curassavica	59	7
	Scorzonera hispanica	89	2	Serpentaria phylla	18	2
	Scropfularia aquatica	82	6	Serratula arvensis	254	6
	Scropfularia nodosa	129	1	Sesamum indicum	119	6
٩	Scutellaria galericulata	267	7	Sesamum orientale	119	6
	-					

<u>Sc.</u>	Page Vol		<u>Sc.</u>	Page	Vol	san
Rumex acetosella (= Rumex			Saccharum officinarum	171	3	31
acetoselloide)	70	3	Salicornia europæa	15	6	
Rumex acutus	69	3	Salicornia herbacea	15	6	
Rumex angustifoliu ssp.			Salisburia adiantifolia	83	1	
Libanoticus	70	3	Salix alba	227	1	
Rumex aquaticus	71	3	Salix libanotica	227	1	
Rumex bucephaloporus	69	3	Salix purpurea	156	2	
Rumex chalepensis	69	3	Salvia	173	3	
Rumex conglomeratus	71	3	Salvia acetabulosa	176	5	
Rumex crispus	73	4	Salvia glutinosa	172	4	
Rumex dentatus	74	4	Salvia horminum	176	5	
Rumex hydrolapathum	74	4	Salvia microstegia	173	4	
Rumex lacerus	70	5	Salvia multicaulis	176	5	
Rumex nepalensis	74	4	Salvia municauns Salvia nemorosa	202	7	
Rumex obtusifolius	84	7	Salvia officinalis		•	
Rumex occultans	70	5	Salvia officinalis	199	2	
Rumex orientalis	74	6		174	3	
Rumex patientia	104	1	Salvia pomifera	174	6	
Rumex patientia ssp. orientalis	74	6	Salvia pratensis	200	2	
Rumex pulcher	76	6	Salvia sclarea	177	6	
Rumex sanguineus	72	4	Salvia sylvestris	202	7	
Rumex Syriacus	69	3	Salvia verbascifolia	173	4	
Rumphius	232	4	Salvia viridis	175, 176	5	
Ruscus aculeatus	182	1	Sambucus ebulus	126	1	
Ruta	111	6	Sambucus humilis	126	1	
Ruta bracteosa	113	4	Sambucus nigra	64	1	
Ruta chalepensis L.	86	4	Sambucus racemosa	48	7	
Ruta graveolens	175	1	Sandaracha	113	3	
Ruta graveolens	111	6	Sanguinaria canadensis	139	3	
Ruta hortensis	175	1	Sanguisorba minor	53	1	
Ruta hortensis	111	6	Sanguisorba muricata	39	5	
Ruta latifolia	113	4	Sanguisorba officinalis	41	2	
Ruta sylvestris	175	1	Sanguisorba spinosa	38	5	
Sabadilla officinarum	129	7	Sanguisuya	148	4	
Sabal Mexicana	173	ı	Sanicula europaea	117	4	
abal serrulata	173	1	Santalum album	159	2	
Sabbatia angularis	175	5	Santalum spicatum	139	4	
accharomyces cerevisiae	127	1	Santolina chamæcyparissus	202	7	٥١٠

	Sc.	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	Vol
'	Retama rætam	94	3	Rhus radicans	119	6
	Rhamnus alaternus	103	5	Rhus toxicodendron	130	7
	Rhamnus carbo ligni	260	1	Rhus tripartita	118	6
	Rhamnus cathartica	376	1	Ribes grossularia	193	5
	Rhamnus frangula	373	1	Ribes nigrum	322	1
	Rhamnus frangula	268	2	Ribes rubrum	215	2
	Rhamnus lotus	155	7	Ribes uva-crispa	193	5
	Rhamnus paliurus	125	2	Richardia	165	7
	Rhamnus paliurus	131	6	Richardsonia brasiliensis	165	7
	Rhamnus Purshiana	375	1	Ricinus communis	118	1
	Rhamnus Purshiana	270	2	Ricinus communis	79	4
	Rhamnus spina-Christi	111	6	Robinia pseudacacia	105	2
	Rhamnus tripartita	118	6	Rosa (Sensu lato)	140	1
	Rhamnus zizyphus	244	1	Rosa canina	140, 3	81 1
	Rhamnus zizyphus	154	6	Rosa centifolia	255	3
	Rhaponticum calcitrapa	303	1 ,	Rosa damascena	394	1
	Rheum	99	4	Rosa gallica	286	2
	Rheum	90	6	Rosa glauca	381	i
	Rheum	105	7	Rosa leucochroa	381	1
	Rheum officinale	108	7	Rosella rotundifolia	386	1
	Rheum palaestinum	98	5	Rosmarin	276	2
	Rheum palmatum	92	6	Rosmarinus officinalis	276	2
	Rheum palmatum L. var.		'	Rosmarinus officinalis	243	3
	tanguticum	92	6	Rossolis rotundifolia	386	1
	Rheum rhaharbatum	91	6	Rubia major	277	1
	Rheum rhaponticum	97	5	Rubia tinctoria	277	1
	Rheum ribes	108	7	Rubia tinctorum	277	1
	Rhodiola rosea	87	7	Rubus caninus	381	1
	Rhododendron Chrysanthum		4	Rubus fruticosus	247	1
	Rhododendron ferrugineum	169	2	Rubus fruticosus	171	2
	Rhododendron hirsutum	141	3	Rubus hedycarpus	144	3
	Rhododendron officinalis	145	4	Rubus idaeus	265	1
	Rhododendron ponticum	1.46	4	Rubus idaeus	182	2
	brachycarpum	146	6	Rubus plicatus	247	1
	Rhodophyceae	18	5	Rubus species	144	
	Rhus coriaria	112 135	2	Rumex	68	3
	Rhus cotinus		_	Rumex acetosa	72	2
	Rhus oxyacantha	118	6	Rumex acciosa	12	2

<u>ret</u>

So	Pega	Vol	Sc.	Page	Vol	***
Sc. Psychotria emetica	Page 165	7	Ouercus lusitanica	132	7	<u>res</u> 29
Psychotria emetica			Ouercus Iusitanica var.	132	,	
Psychotria ipecacuanha	229	1	infectoria	69	7	
Ptarmica vulgaris	3	7	Quercus marina (Pline)	279	1	
Pteridium aquilinum	88	3	Quercus pedunculata	2.7	-	
Pteris aquilina	88	3	(Sensu lato)	189	ì	
Pterocarpus draco	51	3	Quercus racemosa	132	7	
Pterocarpus draco	97	7	Ouercus robur	189	1	
Pterocladia	15	2	Quercus suber	117	5	
Ptychotis fæniculifolia	13	3	Quercus tinctoria	123	6	
Pulegium vulgare	382	1	Quercus velutina	123	6	
Pulicaria dysenterica	103	2	Quillaja saponaria molina	190	6	
Pulmonaria maculata	93	1	Quillaja smegmadermos	190	6	
Pulmonaria officinalis	93	1	Quinquina cuprœa	99	4	
Pulsatilla vulgaris	207	ı	Radiata (var.)	63	3	
Pumex	20	3	Rana esculenta	134	3	
Punica granatum	156	1	Ranunculus	73	3	
Punica granatum	104	2	Ranunculus	75 75	4	
Pyrethrum balsamita	70	2	Ranunculus acris	73 74	2	
Pyrethrum balsamita var.				/	2	
tanacetum	39	1	Ranunculus aquatilis var. sphaerospermus	71	5	
Pyrethrum cinerariifolium	258	1	Ranunculus asiaticus	76	6	
Pyrethrum tanacetum	39	1	Ranunculus ficaria	,,,	•	
Pyrola rotundifolia	172	3	(Scrofularia minor)	236	1	
Pyrola umbellata	198	4	Ranunculus sceleratus	85	7	
Pyrus communis	5	1	Ranunculus sphaerospermus	71	5	
Pyrus communis	6	2	Raphanus niger	179	2	
Quassia amara	308	1	Raphanus sativus	157	3	
Quebrachia Lorentzii	179	4	Ratanhia officinale	153	1	
Quercula	144	6	Rauwolfia serpentina	107	2	
Quercus aesculus	133	7	Ravenala Madagascariensis	103	4	
Quercus alba	131	7	Remijia pedunculata Triana	99	4	
Quercus ballota	123	6	Remijia Purdieana	99	4	
Quercus castaneifolia	133	7	Reseda luteola	81	4	
Quercus coccifera	132	7	Resina	104	7	
Quercus hispanica	123	6	Resina copallina	113	3	
Quercus ilex	123	6	Resina lentisci	224	6	
Quercus infectoria	132	7	Resta bovis	210	5	۱۱٥
Апетсия питестопя	132	,	ixesta uuvis	210	J	0 1

dk	<u>Sc.</u>	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>
8	Polygonatum officinale	76	2	Potentilla tormentilla	145	5
	Polygonatum vulgare	76	2	Poterium	37	3
	Polygonum arenastrum	33	3	Poterium	34	4
	Polygonum aviculare	47	1	Poterium compactum	33	6
	Polygonum bistorta	32	1	Poterium gaillardoti	33	6
	Polygonum cuspidatum	193	7	Poterium muricatum	39	5
	Polygonum dumetorum	171	6	Poterium officinale	53	1
	Polygonum fagopyrum	240	4	Poterium polygamum	39	5
	Polygonum hydropiper	274	1	Poterium sanguisorba	53	1
	Polygonum lapathifolium	241	1	Poterium spinosum	38	5
	Polygonum nodosum	241	1	Poulo oblongatum	157	5
	Polygonum persicaria	193	7	Poulo percha	157	5
	Polygonum sieboldii	193	7	Prangos Hermonis	136	6
	Polygonum tataricum	244	3	Prangos meliocarpoides	136	6
	Polygonum tinctorium	32	6	Primula officinalis	165	1
	Polygonum tomentosum	241	1	Primula veris	165	1
	Polypodium Barometz	52	4	Primula vulgaris	165	1
	Polypodium Filix-mas	176	1	Prunella vulgaris	295	1
	Polypodium vulgare	25	1	Prunus acida	315	1
	Polyporus fomentarius	161	2	Prunus amygdalus	350	1
	Polyporus igniarius	161	2	Prunus armeniaca	358	1
	Polyporus officinalis	153	3	Prunus avium	210	2
	Polystichum Filix-mas	176	1	Prunus avium	184	6
	Populus alba	75	4	Prunus cerasus	315	1
	Populus balsamifera	77	6	Prunus cerasus	211	2
	Populus carbo ligni	260	1	Prunus communis	350	1
	Populus nigra	108	1	Prunus domestica	85	2
	Populus tremula	75	2	Prunus domestica	82	3
	Porrum Cepa	30	3	Prunus dulcis	350	1
	Porrum sativum	73	1	Prunus Laurocerasus	316	1
	Portulaca oleracea	20	2	Prunus mahaleb	207	6
	Potalia amara	43	3	Prunus padus	189	5
	Potentilla anserina	237	1	Prunus persica	137	1
	Potentilla argentea	237	1	Prunus spinosa	131	1
	Potentilla argentina	237	1	Pseudevernia furfuracea	79	5
	Potentilla erecta	145	5	Psoralea bituminosa	76	4
	Potentilla reptans	58	1	Psoralea glandulosa	74	3

Picramnia Antidesma Picrasma excelsa Pigmentum indicum Pigmentum urucu Pilocarpus jaborandi	271 175 247 96 76	2 4 3	Pisum sativum Pithecolobium anareinotemo	35	2	27
Pigmentum indicum Pigmentum urucu	247 96	•	Pithecolobium anareinotemo			digit 10
Pigmentum urucu	96	3	- moononan manemotello	27	6	านให้เลา และให้เ
•			Pix Cadi	169	4	
Pilocarpus jaborandi	76	3	Pix liquida (sensu lato)	292	1	
	70	1	Pix liquida depurata	169	5	
Pilocarpus microphyllus	54	4	Plantae	240	3	
Pilocarpus pennatifolius	57	2	Plantago	202	4	
Pilocarpus racemosus	55	4	Plantago afra	344	1	
Pilocarpus spicatus st-Hil	55	4	Plantago afra	29	6	
Pilocarpus trachylophus			Plantago arenaria	31	6	, J
Holmes	55	4	Plantago coronopus	223	7	
Pimpinella anisum	288	2	Plantago decumbens	12	3	Naj
Pimpinella magna	27	2	Plantago decumbens	214	5	J. J. B.
Pimpinella saxifraga	21	3	Plantago ispaghula	12	3	
Pimpinella sisarum	139	7	Plantago ispaghula	214	5	11.44 11.4 T
Pinguicula vulgaris	90	1	Plantago lanceolata	197	6	130 m 130 m
Pinus laricio	50	2	Plantago major	346	1	ing it.
Pinus maritima	50	2	Plantago media	223	7	
Pinus palustris	50	2	Plantago ovata	12	3	
Pinus pinaster	160	2	Plantago ovata	214	5	
Pinus pinea	133	3	Plantago psyllium	344	1	
Pinus sylvestris	50	2	Plantago psyllium	29	6	
Pinus sylvestris	139	4	Platyopuntia ficus-indica	134	4	
Piper angustifolium	228	7	Pleomele draco	167	3	
Piper aromaticum	161	5	Plumbago europæa	88	1	1000
Piper camphoriferum	228	7	Plumeria	42	2	illing Tilling
Piper cubeba	179	6	Plumeria acuminata	42	2	
Piper elongatum	228	7	Plumeria alba	38	4	
Piper longum	162	3	Plumeria lutea	40	3	
Piper methysticum	272	1	Plumeria rubra	38	4	
Piper nigrum	161	5	Podophyllum peltatum	46	7	
Piper reticulatum	162	4	Pogostemon patchouly	28	3	
Pirus aucuparia	150	4	Polygala amara	42	4	
Piscidia erythrina	36	7	Polygala amarella	42	4	
Pistacia Palaestina	77	3	Polygala chamæbuxus	46	5	
Pistacia Terebinthus	77	3	Polygala senega	41	6	

рар	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	Vol
26	Papaver somniferum L.			Peruvianum	170	4
	var. album	15	3	Petasites albus	187	2
	Papaverum somniferum albu	m 119	1	Petasites hybridus	167	3
	Papaya carica	41	1	Petroselinum sativum	37	2
	Papaya carica	25	6	Petroselinum sativum	32	4
	Papyrus antiquorum	30	4	Peucedanum graveolens	201	1
	Papyrus domesticus	30	4	Peucedanum officinale	43	3
	Paraguayensis	61	1	Peucedanum ostruthium	51	1
	Paraguensis	61	1	Peucedanum palustre	109	6
	Parietaria erecta	93	1	Peumus boldus	203	1
	Parietaria officinalis	93	1	Peziza auricula	2	3
	Paris quadrifolia	183	2	Phaeophuceae	18	6
	Parmelia parietina	78	7	Phaseolus coccineus	177	2
	Parnassia palustris	34	2	Phaseolus coccineus	156	4
	Passiflora (var.)	3	2	Phaseolus lunatus	165	6
	Passiflora caerulea	24	5	Phaseolus multiflorus	177	2
	Passiflora incarnata	30	1	Phaseolus vulgaris	178	2
	Passiflora quadrangularis	17	6	Phaseolus vulgaris	156	4
	Pastinaca anethum	201	1	Phellandrium aquaticum	145	7
	Pastinaca opopanax	181	3	Phillyrea latifolia	143	7
	Pastinaca sativa	140	2	Phillyrea media	143	7
	Paullinia cupana	161	6	Phænix dactylifera	273	2
	Paullinia pinnata	59	7	Phœnix dactylifera	49	3
	Paullinia scarlatina	268	5	Phragmites communis	291	1
	Paullinia sorbilis	161	6	Phyllanthus emblica	22	3
	Pausinystalia yohimba	272	7	Phyllanthus emblica	163	4
	Pedicularia staphisagria	141	4	Phyllitis scolopendrium	179	1
	Peganum Harmala	61	3	Physalis alkekengi	310	1
	Pelargonium odorantissimum	172	2	Physalis francheti	310	1
	Pelargonium odorantissimum	151	3	Physica Islandica	174	1
	Peltigera canina	78	7	Physica nivalis	78	7
	Pereira	25	6	Physostigma venenosum	186	7
	Periploca græca	38	7	Phytolacca americana	204	4
	Persea americana	40	1	Phytolacca decandra	204	4
	Persea gratissima	40	1	Phytolacca pruinosa	216	5
	Persica vulgaris	137	1	Picea excelsa	4	2
٥	Persicaria lapathifolia	241	1	Picræna excelsa	45, 175	4
	•					

Sc.	Page	<u>Vol</u>	<u>Sc.</u>	Page	Vol	lini den
Ononis leiosperma	210	5	Ornithogalum maritima	23	1	25
Ononis repens	343	1	Ornithopus scorpioides	21	6	
Ononis spinosa	210	5	Orobanche major	55	3	
Ononis viscosa	211	5	Orthosiphon grandiflorus	30	5	
Ononix natrix	225	2	Orthosiphon stamineus	30	5	
Onopordum	182	7	Oryza sativa	3	3	
Onopordum acanthium	21	5	Osmanthus fragrans	119	7	
Onopordum carduiforme	182	7	Osmunda regalis	125	2	
Onopordum cynarocephalum	183	7	Ourouparia Gambir	154	3	as Malayed
Onopordum floccosum	182	7	Ovum gallinaceum	46	2	
Onopordum heteracantha	183	7	Oxalis acetosella	101	1	$=\frac{1}{2}\frac{h_{ij}}{h_{ij}}(1+J_{ij})\frac{h_{ij}}{h_{ij}}$
Onopordum libanoticum	182	7	Oxalis anthelminthica	196	4	
nopordum telavivense	182	7	Oxycoccus macrocarpa	155	6	$-g_{1}$. A
popanax Chironium	181	3	Oxycoccus palustris	169	7	
Opuntia	135	4	-	169	7	ill y i,
puntia ficus-indica	134	4	Oxycoccus quadripetala		·	
Opuntia monacantha	151	2	Padus avium	189	5	
puntia vulgaris	151	2	Padus laurocerasus	316	1	
rchis	126	7	Paeonia Kesruanensis	255	3	
rchis mascula	123	2	Paeonia officinalis	285	2	
rchis morio	124	2	Pagiantha cerifera	142	7	
rchis morio var. Libani	124	2	Palicourea densiflora	172	4	
reodoxa oleracea	273	2	Paliurus aculeatus	131	6	
Dreodoxa oleracea	242	3	Paliurus australis	131	6	
Dreodoxa regia	264	7	Paliurus simachristi	131	6	
Driganum	129	3	Panax ginseng	78	1	
Origanum dictamnus	39	2	Panax ginseng	63	6	
Driganum Ehrenbergii	152	7	Panax quinquefolium	60	2	
Origanum Libanoticum	135	4	Panax sessiliflorum	43	7	
Origanum Libanoticum	137	5	Panicum	90	2	
Origanum majorana	241	2	Panicum miliaceum	91	2	
Origanum majorana	213	3	Panis	75	3	
Driganum maru	138	6	Papaver argemone	80	6	
Origanum Syriacum	137	5	Papaver bracteatum	82	2	
Origanum Syriacum	138	6	Papaver libanoticum	91	7	
Origanum vulgare	155	2	Papaver rhœas	121	1	$= \frac{H_{\rm supple}^{\rm supp}}{H_{\rm supple}^{\rm supple}} f_{\rm supple}^{\rm supple}$
Orleana	96	3	Papaver somniferum	12	4	

mus	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
24	Musa ensete	233	6	Nox juglans	81	1
	Musa japonica	257	7	Nuphar luteum	385	1
	Musa paradisiaca	369	1	Nymphæa alba	243	4
	Musa paradisiaca	232	6	Nymphæa lutea	385	1
	Musa religiosa	256	7	Obtusifolium	170	4
	Musa sapientum	369	1	Ocimum L.	88	1
	Musa sinensis	256	7	Ocimum basilicum	65	5
	Musa textilis	250	5	Ocimum crispum	65	5
	Muscari comosum	83	7	Ocimum filamentosum	64	5
	Muscari longissimum	83	7	Ocimum grandiflorum	30	5
	Muscus islandicus	174	1	Ocimum gratissimum	64	5
	Muscus marinus	141	6	Ocimum minimum	76	7
	Myosotis palustris	10	1	Ocimum pilosum	69	6
	Myosotis scorpioides	10	1	Ocimum suave	69	6
	Myristica fragrans	61	2	Ocimum urticifolium	64	5
	Myrrhis odorata	108	3	Ocimum viride	75	7
	Myrtus leucocarpa	20	1	Ocotea pichurim	24	3
	Naja tripudians	113	5	Ocymum Auct.	88	1
	Narcissus poeticus	243	3	Enanthe phellandrium	145	7
	Narcissus pseudonarcissus	380	1	Enothera biennis	6	1
	Narcissus sylvestris	380	1	Olea europæa	170	1
	Nardosachys yatamansi	237	3	Olea europæa	115	2
	Nasturtium officinale	187	2	Olea fragrans	119	7
	Nauclea africana	254	5	Olea lancifolia	170	1
,1	Nauclea inermis	254	5	Olea oleaster	118	7
	Nectandra Rodiei schumb.	29	4	Olea sativa	170	1
	Nelumbo nucifera	233	2	Olea sylvestris	118	7
	Nemuaron Vieillardii	132	6	Oleum gaultheriæ	154	5
	Nepeta cataria	293	1	Oleum hepatis morrhuae	109	4
	Nepeta glechoma	326	1	Oleum jecoris aselli	10 9	4
	Nephrodium Filix-mas	176	1	Oleum jecoris gradui(s)	109	4
	Nerium oleander	139	1	Oleum morrhuum	109	4
	Nerium rhododendrum	139	1	Oleum ricini	102	3
	Nicotiana tabacum	52	6	Oniscus Armadilla	8	4
	Nigella arvensis	125	3	Oniscus Asellus	67	3
	Nigella damascena	131	4	Ononis antiquorum	210	5
۱۷	Nigella sativa	147	2	Ononis brevislora	211	5

			I			
<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	<u>Vol</u>	mus
Mater silvana	137	5	Mentha sylvestris	241	4	23
Matricaria aurea	26	3	Mentha sylvestris	242	6	
Matricaria chamomilla	29	2	Mentha viridis	244	3	
Matricaria discoidea	29	2	Menyanthes trifoliata	383	1	
Medicago sativa	162	3	Mercurialis annua	100	1	
Melaleuca cajaputi	39	5	Mercurius terrestris	274	1	
Melaleuca leucadendron	54	1	Mesembryanthemum			
Melaleuca quinquenervia	54	1	crystallinum	146	6	
Melaleuca viridiflora	39	3	Mespilus germanica	255	2	
Melaleuca viridiflora	37	4	Mespilus oxyacantha	114	7	
Melia azedarach	103	6	Meum athamanticum	141	7	
Melilotus alba	73	2	Mezereum officinale	229	7	
Melilotus arvensis	105	1	Micromeria thymbra	239	6	
Melilotus officinalis	105	1	Milium effusum	92	2	
Melissa calamintha	297	1	Milium nigricans	164	2	
Melissa clinopodium	198	5	Milium Solis	211	1	
Melissa officinalis	366	1	Mimosa cochliocarpos	29	5	
Melittis melissophyllum	49	3	Mimosa farnesiana	124	6	
Mellite	92	4	Mimulus moschatus	231	4	
Melocactus	135	4	Mitragyna africana	245	5	
Meloe vesicatorius	91	3	Mitragyna inermis	245	5	
Menispermum palmatum	289	1	Momordica elaterium	283	1	
Mentha	280	2	Monotropa hypopitys	214	2	
Mentha aquatica	243	6	Morinda sp.	237	4	
Mentha arvensis	241	4	Moringa aptera	31	2	
Mentha calamintha	297	1	Moringa pterygosperma	27	3	
Mentha canescens	242	6	Morsus gallina	377	1	
Mentha crispata	245	3	Morus alba	68	1	
Mentha hirsuta	243	6	Morus nigra	68	1	
Mentha longifolia	241	4	Morus nigra	52	2	
Mentha microphylla	242	6	Morus rubra	59	7	
Mentha piperita	245	3	Moschus	229	3	
Mentha pulegium	382	1	Moschus	231	4	
Mentha rotundifolia	259	5	Musa	250	5	
Mentha rotundifolia	243	6	Musa basjoo	257	7	
Mentha sieberi	242	6	Musa cavendishii	250	5	
Mentha spicata var. longifolia		4	Musa chinensis	250	5	٥١٨
The second services and the services and the services are		•			-	- 1/4

liq	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	<u>Sc.</u>	Page	Vol
22	Liquiritia officinalis	192	1	Lythrum hyssopifolia	160	4
	Liquiritia officinalis	119	4	Lythrum salicaria	267	1
	Liriodendron tulipifera	142	7	Lytta vesicatoria	91	3
	Lithospermum officinale	211	1	Lytta vesicatoria	96	4
	Lobaria pulmonaria	69	2	Maclura aboinensis	151	6
	Lobelia inflata	349	1	Maclura aurantiaca	190	7
	Lobelia syphilitica	203	3	Maclura pomifera	190	7
	Lodoicea callipyge	237	3	Maclura tricuspidata	150	6
	Lodoicea maldivica	237	3	Macropiper methysticum	272	1
	Lodoicea sechellarum	237	3	Magnolia glauca	254	7
	Lonicera	81	5	Magnolia grandiflora	258	2
	Lonicera alpigena	138	6	Magnolia Virginiana	254	7
	Lonicera caprifolium	226	1	Majorana syriaca	138	6
	Lonicera periclymenum	137	5	Majoranamaracus zernyi	137	5
	Lonicera webbiana	138	6	Mallotus philippinensis		
	Lonicera xylosteum	154	2	(= Rottlera tinctoria)	202	2
	Lophophora Williamsii	50	6	Malus communis	50	4
	Lotus alpinus	352	1	Malva alcea	88	7
	Lotus brachyodon	352	1	Malva mauritanica	76	2
	Lotus corniculatus	352	1	Malva moschata	231	4
	Loxopterygium Lorentzii	179	4	Malva moschata	72 	5
	Lucifer lacea	132	3	Malva neglecta	77	4
	Luffa aegyptiaca	204	3	Malva rotundifolia	77	4
	Lupinus albus	51	2	Malva sylvestris	110	1
	Lupinus termis	51	2	Mandragora autumnalis Bertol.	289	2
	Lychnis githago	73	5	Mandragora officinarum	288, 289	_
	Lycium barbarum	98	1	Manettia ignita	165	7
	Lycium halimifolium	64	3	Mangifera indica	25	4
	Lycium vulgare	64	3	Manihot	231	6
	Lycopersicum esculentum	36	6	Manioc aipi	231	6
	Lycopodium clavatum	113	1	Manioc utilissima	232	6
	Lycopodium selago	77	2	Maranta galanga	84	4
	Lycopus europæus	158	4	Marchantia polymorpha	220	4
	Lycopus virginicus	204	3	Marrubium vulgare	261	1
	Lysimachia adænis	342	1	Marsdenia condurango	332	1
	Lysimachia nummularia	232	2	Marum verum	158	7
4	Lysimachia vulgaris	207	4	Maruta cotula	16	5
•	Lysimacina vuigaris	201	•	ou ovidiu	••	-

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	<u>lip</u>
Lapis pumicis	80	3	Leontopodium alpinum	97	4	21
Lappa minor	9	5	Leonurus cardiaca	157	4	
Lappa minor pubescens	8	7	Leonurus lanatus	181	2	
Lapsana communis	80	3	Lepidium	140	3	
Larix decidua	221	2	Lepidium iberis	141	3	
Larix europaea	221	2	Lepidium latifolium	140	3	
Laser trilobum	200	4	Lepidium ruderale	141	3	
Laserpitium glaucum	200	4	Lepidium sativum	102	4	
Laserpitium latifolium	200	4	Lespedeza capitata	347	1	
Laserpitium Siler	200	4	Leucadendron cajeputi	39	5	
Laserpitium trilobum	200	4	Levisticum officinale	34	1	
Lastrea Filix-mas	176	1	Lichen faginus	68	4	
Lathræa clandestina	89	6	Lichen islandicus	174	1	
Laurocerasus officinalis	316	1	Lichen pulmonarius	69	2	
Laurus cassia	165	5	Lichen pyxidatus	69	2	
Laurus nobilis	251	1	Ligusticum levisticum	34	1	
Laurus persea	40	1	Ligusticum meum	141	7	
Laurus pichurim	24	3	Ligustrum vulgare	399	1	
Lavendula latifolia	82	4	Lilium candidum	167	1	
Lavendula officinalis	80	2	Lilium convallium	168	1	
Lavendula officinalis	78	3	Lilum martagon	108	2	
Lavendula spica	82	4	Limnanthemum nymphaeoides	185	2	
Lavendula stœchas	74	5	Linaria cymbalaria	87	1	
Lawsonia alba	72	3	Linaria elatine	194	5	
Lawsonia inermis	72	3	Linaria minor	207	3	
Lecanora affinis	71	6	Linaria spuria	128	6	, ľ
Lecanora esculenta	71	6	Linaria vulgaris	203	6	76. J. 10.
Ledum	122	4	Linimenta	218	3	
Ledum Groenlandicum	122	4	Linum angustifolium	204	2	
Ledum latifolium	122	4	Linum catharticum	206	7	
Ledum palustre	122	4	Linum grandiflorum	180	4	
Lens esculenta	167	2	Linum humile	313	1	
Leonina herba	55	3	Linum perenne	179	4	
Leontice leontopetalum	81	6	Linum usitatissimum	313	1	
Leontodon bulbosus	2	5	Lippia aloysia	353	1	
Leontodon officinale	247	6	Lippia citrata	353	1	
Leontodon taraxacum	247	6	Lippia citriodora	353	1	04.0

ing	<u>Sc.</u>	Page	Vol	Sc.	Page	<u>Vol</u>
20	Inga barbatimão	26	4	Jatropha curcas	87	4
	Inula campana	149	1	Juglans regia	81	1
	Inula conyza	35	7	Juglans regia	62	2
	Inula helenium	149	1	Juglans regia	59	4
	Inula montana	103	2	Juniperus communis	138	3
	Inula vulgaris	35	7	Juniperus communis	143	4
	Ipomœa jalapa	77	1	Juniperus oxycedrus	168	2
	Ipomœa orizabensis	56	4	Juniperus sabina	1	4
	Ipomœa orizabensis	117	6	Juniperus Virginiana	145	5
	Ipomœa purga	77	1	Justicia paniculata	209	3
	Ipomœa simulans	62	6	Justicia pectoralis	87	3
	Ipomœa turpethum	54	6	Justicia pectoralis	166	5
	Iris	115	3	Kalmia latifolia	210	2
	Iris florentina	194	1	Khaya	21	5
	Iris fætidissima	116	3	Khaya Senegalensis	22	5
	Iris germanica	195	1	Kichxia elatine	194	5
	Iris pallida	194	1	Kochia scoparia	194	6
	Iris pallida	116	3	Krameria argentea	98	4
	Iris pseudacorus	138	2	Krameria iscina L. var.		
	Iris versicolor	195	1	granatensis Triana	93	3
	Iris versicolor	116	3	Krameria triandra	153	1
	Isatis tinctoria	256	3	Laburnum alpinum	138	7
	Isonandra gutta	157	5	Laburnum anagyroides	1	4
	Ixora bandhuca	152	4	Lactuca sativa	79	3
	Jacaranda brasiliana	56	4	Lactuca sativa	166	7
	Jacaranda procera	56	4	Lactuca serriola	81	2
	Jacea communis	201	7	Lactuca virosa	52	4
	Jasminum	266	5	Lactuca virosa	166	7
	Jasminum angustifolium	267	5	Laminaria cloustoni	223	2
	Jasminum floribundum	196	4	Laminaria digitata	198	3
	Jasminum fruticans	267	5	Laminaria flexicaulis	198	3
	Jasminum grandiflorum	267	5	Laminaria hyperborea	223	2
	Jasminum odoratissimum	266	5	Laminaria saccharina	221	2
	Jasminum officinale	266	5	Lamiun album	340	1
	Jasminum sambac	267	5	Lantana brasiliensis	69	4
	Jasminum suaveolens	266	5	Lanugo gossypi cruda	171	5
071	Jateorrhiza columba	289	1	Lapathum aquaticum	71	3

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	ing
Helleborus officinalis	59	7	Hyacinthus comosus	83	7	19
Helleborus orientalis	89	7	Hydrastis canadensis	283	2	
Helleborus vesicarius	89	7	Hydrocotyle asiatica	244	4	
Helleborus viridis	11	7	Hyoscyamus	40	3	
Helonia dioica	269	7	Hyoscyamus albus	44	7	
Hepatica nobilis	206	1	Hyoscyamus aureus	41	5	1 phi
Hepatica triloba	206	1	Hyoscyamus Falezlez	36	6	
Heracleum sphondylium	389	1	Hyoscyamus muticus	39	4	
Herba capillorum-veneris	321	1	Hyoscyamus niger	56	1	
Herba Doria	121	3	Hypericum Androsæmum	83	6	
Herba sideritis hirsuta	109	5	Hypericum perforatum	134	1	
Herbaceum	170	4	Hypericum serpillifolium	89	2	
Herniaria glabra	260	5	Hypericum thymifolium	89	2	
Herniaria hirsuta	242	4	Hypericum vulgare	134	1	
Herniaria microcarpos	260	5	Hypochæris glabra	76	3	
Hesperis matronalis	82	1	Hypochæris maculata	76	3	
Heuchera americana	249	6	Hyptis suaveolens	157	4	
Hevea brasiliensis	182	5	Hyrax capensis	250	4	
Hevea guianensis	182	5	Hyssopus officinalis	100	3	
Hibiscus abelmoschus	67	4	Hyssopus officinalis	106	4	
Hibiscus sabdariffa	183	4	Ignatia amara	185	7	
Hieracium murorum	253	3	Ilex aquifolium	60	1	
Hieracium pilosella	392	1	Ilex cassine	257	6	
Hippocastanus vulgare	286	1	Ilex paraguariensis	61	1	
Hippophae rhamnoides	5	1	Illicium anisatum	38	1	
Hirsutum	170	4	Illicium floridanum	22	6	
Hirudo	148	4	Illicium parviflorum	38	1	
Hirudo medicinalis	148	4	Illicium parviflorum	31	7	
Holarrhena africana	194	3	Illicium religiosum	38	1	
Holarrhena antidysenterica	194	3	Illicium religiosum	31	7	
Holarrhena floribunda	262	5	Illicium verum	38	1	
Hordeum vulgare	135	6	Imbricaria parietina	78	7	
Horminum (var.)	176	5	Impatiens balsamina	44	5	
Humulus lupulus	91	1	Impatiens nolitangere	167	7	
Huperzia selago	77	2	Imperatoria ostruthium	51	1	
Hura brasiliensis	269	7	Indicum	170	4	
					•	

gen	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
18	Gentiana Chirayta	59	4	Glycyrrhiza glabra	192	<u> </u>
	Gentiana lutea	79	1	Glycyrrhiza glabra	119	4
	Gentiana lutea	64	6	Glycyrrhiza glabra	120	5
	Gentiana pulchella	173	5	Glycyrrhiza glabra var.		
	Gentiana punctata	59	4	glandulifera	126	6
	Gentiana purpurea	59	4	Glycyrrhiza glandulifera	126	6
	Gentiana ramosissima	173	5	Glycyrrhiza lævis	192	1
	Geoffræa	70	7	Glycyrrhiza violacea	120	5
	Geoffræa inermis	70	7	Gnaphalium dioicum	34	1
	Geoffræa surinamensis	70	7	Gonolobus condurango	332	1
	Geoffrœa vermifuga	71	7	Gonus amarissimus	202	5
	Geranium	152	5	Gossypium	170	4
	Geranium cicutarium	153	5	Gossypium herbaceum	172	3
	Geranium maculatum	153	5	Gossypium iodatum	175	6
	Geranium moschatum	152	5	Gramen caninum vulgatius	378	1
	Geranium pratense	152	5	Gramen parnassium	34	2
	Geranium Robertianum	1	2	Gratiola officinalis	256	1
	Geranium rotundifolium	153	5	Grindelia robusta	151	4 7
	Geranium sanguineum	174	2	Gryllus campestris Guaiacum officinale	63 149	3
	Geum canadense	65	6	Guarea trichilioides	149	4
	Geum montanum	63	4	Gummi laccae	200	6
	Geum rivale	58	3	Gummii elasticum	182	5
	Geum strictum	65	6	Gymnogramme officinarum	119	3
	Geum urbanum	85	1	Hæmatoxylon campechianum	37	7
	Gigartina	185	3	Halzebia æthiopica	254	6
	Gigartina helminthocorton	141	6	Hamamelis Virginiana	244	4
	Gillenia stipulacea	59	5	Harpagophytum procumbens	355	1
	Gillenia trifoliata	62	4	Hedeoma pulegioides Pers.	261	5
	Ginkgo adiantoides	83	1	Hedera helix	238	1
	Ginkgo biloba	83	1	Helianthus annuus	141	1
	Githago segetum	73	5	Helianthus annuus	166	2
	Glandulae Rottlerae	202	2	Helianthus tuberosus	166	2
	Glechoma hederacea	326	1	Helichrysum stoechas	25	2
	Globularia alypum	150	5	Heliotropium europæum	249	3
	Globularia vulgaris	172	2	Helix pomatia	71	4
	Glyceritum amyli	233	4	Helleborus fætidus	77	3
٥٢٣	Glycyrrhiza echinata	138	7	Helleborus niger	78	2

			1			
Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	gen
Fabiana imbriquata	155	3	Fraxinus ornus	213	4	17
Fagara octandra	156	4	Fraxinus rotundifolia	213	4	
Fagopyrum esculentum	240	4	Fritillaria imperialis	137	3	
Fagopyrum tataricum	244	3	Fucus crispus	306	1	
Fagus sylvatica	159	1	Fucus lichenoides	135	3	
Fagus sylvatica	108	2	Fucus vesiculosus	279	1	
Farina	141	5	Fuga doemonium	134	1	
Farina tritici	141	5	Fumaria bullosa var. solida	170	6	
Fecula	241	6	Fumaria officinalis	196	1,	
Fecula avow-root	6	3	Furcræa gigantea	39	6	
Fellis bovis	232	7	Galanthus	244	6	
Ferula assa-foetida	26	2	Galega officinalis	361	1	
Ferula communis	165	6	Galeopsis dubia	56	3	
Ferula galbaniflua	26	3	Galeopsis ochroleuca	58	4	
Ferula hermonis	156	3	Galium agreste	255	1	
Ferula persica	155	4	Galium aparine	255	1	
Ficaria ranunculoides	236	1	Galium cruciata	150	4	
Ficus carica	69	1	Galium verum	174	2	
Ficus carica	54	2	Galla quercina	69	7	
Ficus microcarpa	162	5	Galla tinctoria	69	7	
Filipendula hexapetala	143	4	Galla turcica	69	7	
Filipendula ulmaria	364	1	Garcinia sp.	131	3	
Filipendula ulmaria	163	7	Gaultheria procumbens	152	4	
Fæniculum dulce	127	4	Geissospermum vellozii	25	6	
Fæniculum vulgare	145	2	Gelatina	57	3	
Fæniculum vulgare piperitum	121	3	Gelidium corneum	15	2	
Fœnum graecum officinalis	98	1	Gelsemium elegans Benth	6	4	
Formica rufa	247	3	Gelsemium sempervirens	4	3	
Fragaria vesca	222	1	Geranium cicutarium	54	3	
Fragaria vesca	149	2	Genista	253	4	
Fragaria vulgaris	222	1	Genista purgans	253	4	
Franciscea uniflora	209	3	Genista rætam	94	3	
Frangula alnus	373	1	Genista sagittalis	253	4	
Fraxinus bumelia	355	1	Genista tinctoria	253	4	
Fraxinus excelsior	355	1	Gentiana	59	4	
Fraxinus ornus	266	2	Gentiana acaulis	60	2	
Fraxinus ornus	212	3	Gentiana centaurium	301	1	370

eri	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
16	Erica manipuliflora	75	5	Eucalyptus globulus	27	2
	Erica verticillata	75	5	Eucalyptus globulus	24	3
	Erica vulgaris	187	1	Eugenia caryophyllata	190	2
	Erigeron Canadense	19	1	Eugenia caryophyllata	182	3
	Eriodendron anfractuosum	178	3	Euonymus atropurpureus	225	6
	Erodium cicutarium	54	3	Eupatorium aya-pana	27	4
	Erodium cicutarium	153	5	Eupatorium cannabinum	112	1
	Erodium moschatum	152	5	Eupatorium perfoliatum	175	7
	Eruca sativa	155	1	Eupatorium purpureum	161	6
	Eruca vesicaria	155	1	Eupatorium satureiæfolium	176	7
	Ervum Ervilia	186	3	Eupatorium triplinerve	27	4
	Ervum lens	167	2	Euphorbia	159	3
	Eryngium	123	3	Euphorbia cyparissias L.	159	3
	Eryngium campestre	213	1	Euphorbia esula	159	3
	Eryngium creticum	167	4	Euphorbia helioscopia	400	1
	Eryngium falcatum	131	5	Euphorbia helioscopia L.	159	3
	Eryngium maritimum	123	3	Euphorbia hirta	401	1
	Eryngium sumbul	112	5	Euphorbia ipecacuanha L.	159	3
	Erysimum alliaria	89	1	Euphorbia Lathyris	167	6
	Erysimum officinale	185	1	Euphorbia Lathyris L. =		
	Erythraea centaurium	301	I	Tithymatus Lathyris Lank.	159	3
	Erythraea Chilensis	174	5	Euphorbia lathyrus	167	6
	Erythraea pulchella	173	5	Euphorbia palustris	159	3
	Erythraea ramosissima	173	5	Euphorbia peplus L.	159	3
	Erythrina americana	11	4	Euphorbia pilulifera	401	1
	Erythrina corallodendron	9	3	Euphorbia resinifera	171	2
	Erythrophleum	10	4	Euphorbia spongiosa	167	6
	Erythroxylon coca	218	2	Euphorbia sylvatica Jacq.	159	3
	Erythroxylum coca var.			Euphrasia officinalis	231	l
	bolivianum	219	7	Euphrasia stricta	231	1
	Erythroxylum coca var.	210	7	Evernia	71	6
	novo-granatense Erythroxylum coca var.	219	,	Evernia prunastri	85	2
	spruceanum	219	7	Evonymus atropurpurea	225	6
	Esula	12	5	Evonymus europæus	226	6
	Esula cyparissias L.	12	5	Evonymus vulgaris	226	6
	Esula palustris	12	5	Excidias auricula-Judae	2	3
٥٢٥	Esula peplus	12	5	Exogonium purga	7 7	1
	L-L		•	- 0 F O		-

Sc. Page Vol Sc. Page Vol eri Dianthus caryophyllus 168 4 Dulcis (var.) 45 1 15 Dichopsis Gutta 157 5 Dypterix odorata 162 4 Dictamus albus 84 6 Ecbulum humile 126 1 Dictamus fraxinella 84 6 Ecbilum elaterium 283 1 Dievrilla trifoliata 81 5 Echinocactus Ewinii 50 6 Digitalis Canadensis 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis grandiflora 102 2 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis garandiflora 102 2 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium cofficinale 283 1 Digitalis purpurea 87 6 Elettaria cardamonum 282 2 Digitalis purpurea 101 7 Elettaria cardamonum 282 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>							
Dichopsis Gutta 157 5 Dypterix odorata 162 4 Dichroa febrifuga 94 4 Ebulum humile 126 1 Dictamus albus 84 6 Echalium elaterium 283 1 Dictamus fraxinella 84 6 Echalium elaterium 283 1 Dictamus fraxinella 84 6 Echalium elaterium 283 1 Dictamus fraxinella 81 5 Echinocactus Lewinii 50 6 Diervilla trifoliata 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis urifoliata 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis grandiflora 102 2 Elaterium agreste 283 1 Digitalis lanata 94 4 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium ordifoliale 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 87 6 Elettaria major 284 6 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia ribes 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra firagilis campylopoda 242 1 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra firagilis campylopoda 242 1 Dorostenia brasiliensis 49 4 Ephedra firagilis campylopoda 242 1 Dorostenia brasiliensis 49 4 Ephedra firagilis campylopoda 242 1 Dorostenia brasiliensis 49 4 Ephedra firagilis campylopoda 242 1 Dorostenia contrayerva 49 4 Ephedra firagilis campylopoda 242 1 Doracæna draco 167 3 Equisetum arvense 17 3 Dracæna draco 97 7 Equisetum limosum 20 3 Dracæna draco 97 7 Equisetum limosum 20 3 Dracæna rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Drysis winteri 81 5 Echilim humilite 283 1 Divitim aleterium 283 1 Divitim agreste 283 1 Echium vulgare 4 6 Echelarium cordifolium 284 2 Eletterium agreste 283 1 Eletterium agreste 283 1 Eletterium agreste 283 1 Eletterium agreste 283 1 Eletterium agreste 284 2 Eletterium agreste 285 1 Eletterium agreste 284 6 Eletterium agreste 285 1 Eletterium agreste 28	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	eri
Dichroa febrifuga 94 4 Ebulum humile 126 1 Dictamus albus 84 6 Ecballium elaterium 283 1 Dictamus fraxinella 84 6 Echinocactus 135 4 Diervilla Canadensis 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Diervilla trifoliata 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis durata 89 5 Echium vulgare 4 6 Digitalis garandiflora 102 2 Elaterium ordifolium 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia robusta 29 3 </td <td>Dianthus caryophyllus</td> <td>168</td> <td>4</td> <td>Dulcis (var.)</td> <td>45</td> <td>1</td> <td>15</td>	Dianthus caryophyllus	168	4	Dulcis (var.)	45	1	15
Dictamus albus 84 6 Ecballium elaterium 283 1 Dictamus fraxinella 84 6 Echinocactus 135 4 Diervilla Canadensis 81 5 Echinocactus Lewinii 50 6 Diervilla trifoliata 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis grandiflora 102 2 Elaterium agreste 283 1 Digitalis paradiflora 102 2 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium officinale 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus senticosus 43 7 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus senticosus 43 7 Disacus fullonum 254 2 Embelia robersama 54	Dichopsis Gutta	157	5	Dypterix odorata	162	4	
Dictamus fraxinella 84 6 Echinocactus 135 4 Diervilla Canadensis 81 5 Echinocactus Lewinii 50 6 Diervilla trifoliata 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis unu cristallisatum 89 5 Echium vulgare 4 6 Digitalis grandiflora 102 2 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 87 6 Elettaria major 246 6 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3	Dichroa febrifuga	94	4	Ebulum humile	126	1	
Diervilla Canadensis 81 5 Echinocactus Lewinii 50 6 Diervilla trifoliata 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis trifoliata 80 5 Echium vulgare 4 6 Digitalis grandiflora 102 2 Elaterium agreste 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium officinale 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 87 6 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Bribata 2	Dictamus albus	84	6	Ecballium elaterium	283	1	
Diervilla trifoliata 81 5 Echinocactus Williamsii 50 6 Digitalis grandiflora 102 2 Elaterium agreste 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Dipsacus fullonum 254 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia Barbeyana 54 5 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1	Dictamus fraxinella	84	6	Echinocactus	135	4	
Digitalinum cristallisatum Mo	Diervilla Canadensis	81	5	Echinocactus Lewinii	50	6	
Digitalis grandiflora 102 2 Elaterium agreste 283 1	Diervilla trifoliata	81	5	Echinocactus Williamsii	50	6	
Digitalis lanata 94 4 Elaterium cordifolium 283 1 Digitalis purpurea 142 1 Elaterium officinale 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 87 6 Elettaria major 246 6 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia ribes 29 3 Doronicum arnica 16 1 Embelia ribes 29 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorostenia contrayerva 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracæna draco 97 7 Equisetum arvense 17 3 Dracontium foetidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum maximum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum maximum 21 4	Digitalinum cristallisatum	89	5	Echium vulgare	4	6	
Digitalis purpurea 142 1 Elaterium officinale 283 1 Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 87 6 Elettaria major 246 6 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus Senticosus 43 7 Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Embelia robusta 29 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorostenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Equisetum angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fætidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum maximum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum maximum 21 4	Digitalis grandislora	102	2	Elaterium agreste	283	1	
Digitalis purpurea 88 5 Elettaria cardamomum 282 2 Digitalis purpurea 87 6 Elettaria major 246 6 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorscenia contrayerva 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dracæna draco 167 3 Equisetum angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracentia minoris 7 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Digitalis lanata	94	4	Elaterium cordifolium	283	1	
Digitalis purpurea 87 6 Elettaria major 246 6 Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorostenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Equisetum 330 1 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Digitalis purpurea	142	1	Elaterium officinale	283	1	
Digitalis purpurea 101 7 Eleutherococcus Henryi 43 7 Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontium fortidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum maximum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum maximum 21 4	Digitalis purpurea	88	5	Elettaria cardamomum	282	2	
Diotis maritima 171 4 Eleutherococcus senticosus 43 7 Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum maximum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Digitalis purpurea	87	6	Elettaria major	246	6	
Diplotaxis tenuifolia 58 2 Elytrigia repens 378 1 Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum palustre 19 3	Digitalis purpurea	101	7	Eleutherococcus Henryi	43	7	
Dipsacus fullonum 254 2 Embelia Barbeyana 54 5 Dipsacus sylvestris 357 1 Embelia ribes 29 3 Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Diotis maritima	171	4	Eleutherococcus senticosus	43	7	
Dipsacus sylvestris Dipsacus sylvestris Discoidea 17 5 Embelia ribes 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fætidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum maximum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum palustre 19 3	Diplotaxis tenuifolia	58	2	Elytrigia repens	378	1	
Discoidea 17 5 Embelia robusta 29 3 Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fætidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Dipsacus fullonum	254	2	Embelia Barbeyana	54	5	
Doronicum arnica 16 1 Emblica officinalis 22 3 Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fætidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum palustre 19 3	Dipsacus sylvestris	357	1	Embelia ribes	29	3	
Doronicum oppositifolium 16 1 Empetrum nigrum 153 2 Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fætidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Discoidea	17	5	Embelia robusta	29	3	
Doronicum pardalianches 94 2 Ephedra campylopoda 242 1 Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Doronicum arnica	16	1	Emblica officinalis	22	3	
Doronicum plantagineum 94 2 Ephedra distachya 170 2 Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Doronicum oppositifolium	16	1	Empetrum nigrum	153	2	
Dorstenia brasiliensis 49 4 Ephedra fragilis campylopoda 242 1 Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fætidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Doronicum pardalianches	94	2	Ephedra campylopoda	242	1	
Dorstenia contrayerva 49 4 Ephedra helvetica 143 3 Dracæna draco 167 3 Epilobium angustifolium 274 2 Dracæna draco 97 7 Equisetum 330 1 Dracontia minoris 7 3 Equisetum arvense 17 3 Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Doronicum plantagineum	94	2	Ephedra distachya	170	2	
Dracæna draco1673Epilobium angustifolium2742Dracæna draco977Equisetum3301Dracontia minoris73Equisetum arvense173Dracontium fætidum633Equisetum hyemale193Drosera rotundifolia3861Equisetum limosum203Dryas octopetala864Equisetum maximum214Drymis winteri815Equisetum palustre193	Dorstenia brasiliensis	49	4	Ephedra fragilis campylopoda	242	1	
Dracæna draco977Equisetum3301Dracontia minoris73Equisetum arvense173Dracontium fœtidum633Equisetum hyemale193Drosera rotundifolia3861Equisetum limosum203Dryas octopetala864Equisetum maximum214Drymis winteri815Equisetum palustre193	Dorstenia contrayerva	49	4	Ephedra helvetica	143	3	
Dracontia minoris73Equisetum arvense173Dracontium fætidum633Equisetum hyemale193Drosera rotundifolia3861Equisetum limosum203Dryas octopetala864Equisetum maximum214Drymis winteri815Equisetum palustre193	Dracæna draco	167	3	Epilobium angustifolium	274	2	
Dracontium fœtidum 63 3 Equisetum hyemale 19 3 Drosera rotundifolia 386 1 Equisetum limosum 20 3 Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Dracæna draco	97	7	Equisetum	330	1	
Drosera rotundifolia3861Equisetum limosum203Dryas octopetala864Equisetum maximum214Drymis winteri815Equisetum palustre193	Dracontia minoris	7	3	Equisetum arvense	17	3	
Dryas octopetala 86 4 Equisetum maximum 21 4 Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Dracontium fætidum	63	3	Equisetum hyemale	19	3	
Drymis winteri 81 5 Equisetum palustre 19 3	Drosera rotundifolia	386	1	Equisetum limosum	20	3	
	Dryas octopetala	86	4	Equisetum maximum	21	4	
Dryopteris Filix-mas 176 1 Equisetum ramosissimum 20 4	Drymis winteri	81	5	Equisetum palustre	19	3	
	Dryopteris Filix-mas	176	1	Equisetum ramosissimum	20	4	
Duboisia hoopwoodii 45 3 Equisetum ramosum 20 4	Duboisia hoopwoodii	45	3	Equisetum ramosum	20	4	
Duboisia myoporoides 86 3 Equisetum telmateia 21 4	Duboisia myoporoides	86	3	Equisetum telmateia	21	4	
Duboisia myoporoides 93 4 Erica carnea 83 2	Duboisia myoporoides	93	4	Erica carnea	83	2	
Dulce (var.) 182 4 Erica cinerea 123 1 0 7 7	Dulce (var.)	182	4	Erica cinerea	123	1	770

	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
<u>cur</u> 14	Curcas purgans	87	4	Cyperus longus	109	5
	Curcuma	11	5	Cyperus odoratus	109	. 5
	Curcuma domestica	212	2	Cyperus papyrus	30	4
	Curcuma longa	211	7	Cyperus rotundus	128	7
	Curcuma xanthorrhiza	319	1	Cypripedilum calceolus	204	2
	Curcuma zedoaria rosc.	111	7	Cypripedium calceolus	204	2
	Cuscuta epithymum	348	1	Cystopus candidus	338	1
	Cuscuta europaea	215	2	Cytinus Hypocistis	92	3
	Cuscuta minor	348	1	Cytisus cajan	181	6
	Cuscuta monogyna	204	4	Cytisus scoparius	394	1
	Cyanea	94	4	Dactylorhiza maculata	110	6
	Cyanophyceae	18	6	Dammara Lamb.	194	4
	Cyclamen boustanii	122	5	Daphne	82	5
	Cyclamen coum	130	6	Daphne gnidium	82	5
	Cyclamen europæum	133	2	Daphne laureola	82	5
	Cyclamen hederæfolium	26	6	Daphne libanotica Mout.	85	5
	Cyclamen latifolium	26	6	Daphne mezereum	82	5
	Cyclamen Libanoticum	121	4	Daphne mezereum	229	7
	Cyclamen macrophyllum	26	6	Daphne oleifolia lam.	85	5
	Cyclamen punicum	26	6	Daphne oleoides schreb.	85	5
	Cyclamen purpurascens	133	2	Daphne thymelaea	83	5
	Cyclamen pyrolæfolium	26	6	Datura spinosa	133	1
	Cyclamen vernum	130	6	Datura spinosa	88	2
	Cydonia oblonga	129	2	Datura stramonium	133	1
	Cydonia vulgaris	129	2	Datura stramonium	516	2
	Cydonia vulgaris	115	4	Daucus carota	59	2
	Cymbalaria muralis	87	1	Daucus sativus	54	3
	Cymbopogon	271	2	Daucus visnaga	122	1
	Cymbopogon citratus	80	7	Deguelia	95	7
	Cynanchum arghel	212	4	Delphinium consolida	147	6
	Cynara cardunculus	68	2	Delphinium staphisagria	141	4
	Cynara scolymus	10	2	Dentaria pinnata	98	7
	Cynara scolymus	3	3	Derris	95	7
	Cynodon dactylon	53	3	Descurainia Sophia	129	6
	Cynoglossum officinale	228	2	Dianthera pectoralis	87	3
	Cyperus alopecuroides	116	6	Dianthera pectoralis	166	5
٥٢٧	Cyperus esculentus	116	6	Dianthus carthusianorum	167	5

<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	cup
Cornus sanguinea	191	2	Crepis bulbosa	2	5	13
Cornus sericea	194	7	Crescentia cujete	186	3	
Corona regia	105	1	Crithmum maritimum	208	1	
Coronilla glauca	29	7	Crocus officinalis	162	1	illini il
Coronilla scorpioides	21	6	Crocus officinalis	101	5	
Coronilla sempervirens	29	7	Crocus sativus	162	I	
Coronilla varia	28	5	Crocus sativus	101	5	
Cortex pseudo-angusturae	29	5	Croton cascarilla	187	6	Agrica (*)
Cortex pseudo-angusturae	30	7	Croton cascarilla	184	4	. "
Corvisartia helenium	149	1	Croton elutheria	184	4	
Corydalis bulbosa	170	6	Croton lacciferus	188	6	
Corydalis cava	191	7	Croton tiglium	187	6	
Corydalis formosa	190	7	Croton tinctorium	185	4	
Corydalis libanotica	170	6	Cryophytum crystallinum	146	6	
Corydalis solida var.			Cubeba officinalis	179	6	
brachyloba	170	6	Cucumis anguria	92	7	
Corylus avellana	58	1	Cucumis chate	148	6	
Corylus avellana	43	2	Cucumis citrullus	31	4	$\epsilon_{i,j}^{-1}$.
Corynanthe yohimbe	272	7	Cucumis colocynthis	106	1	The transfer of the transfer o
Costus arabicus	168	3	Cucumis flexuosus	169	6	9.
Cotinus coggygria	135	2	Cucumis melo	146	2	V.**
Cotula aurea	26	3	Cucumis melo var. Chate	148	6	
Cotyledon	12	6	Cucumis melo var. flexuosus	169	6	
Cotyledon lusitanica	12	6	Cucumis sativus	86	2	
Cotyledon lutea	12	6	Cucumis sativus var. flexuosu		6	
Cotyledon umbilicus	13	6	Cucumis sylvestris	283	1	
Cotyledon umbilicus-veneris	12	6	Cucurbita citrullus	31	4	
Coumarouna odorata	162	4	Cucurbita moschata	172	6	
Crassula minor	77	6	Cucurbita pepo	290	2	
Cratægus	99	5	Cucurbita pepo	256	4	
Cratægus azarolus	100	6	Cucurbita pepo	163	5	
Cratægus lævigita	101	6	Cucurbita pepo	172	6	
Cratægus monogyna	161	1	Cudrania Javanensis	151	6	
Cratægus monogyna Cratægus oxyacantha	114	7	Cudrania tricuspidata	150	6	
			Cuminum cyminum	328	1	
Cratægus Sinaica	100	5	Cuminum odorum	328	1	

cle	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>
12	Clematis recta	262	2	Combretum altum	235	1
	Clematis vitalba	362	1	Combretum micranthum	190	4
	Clematis viticella	245	5	Combretum Raimbaultii	235	1
	Clinopodium origanifolium	193	2	Combretum sundaicum	166	7
	Clinopodium vulgare	198	5	Commiphora agallocha	260	2
	Cnicus arvensis	254	6	Commiphora mukul	260	2
	Cnicus benedictus	214	1	Commiphora opobalsamum	39	3
	Cnicus benedictus	171	6	Conium maculatum	216	1
	Cocculus chondodendron	34	7	Consolida major	333	1
	Cocculus diversifolius	119	4	Consolida media	228	1
	Cocculus laurifolius	119	4	Consolida regalis	147	6
	Cocculus loæba	118	4	Convallaria maialis	168	1
	Cocculus plathyphylla	34	7	Convolvulus	109	3
	Cochlearia armoracia	250	6	Convolvulus althæoides	208	5
	Cochlearia officinalis	363	1	Convolvulus arvensis	224	2
	Cocos nucifera	268	2	Convolvulus Mechoacana	200	4
	Cocos nucifera	238	6	Convolvulus scammonia	132	2
Coffea Coffea	Coffea	41	5	Convolvulus sepium	341	1
	Coffea	41	7	Convolvulus turpethum	54	6
	Coffea arabica	55	1	_	180	7
	Coffeinum	181	5	Conyza anthelminthica		-
	Coix lacryma-jobi	17	3	Conyza squarrosa	35	7
	Cola acuminata	335	1	Coptis	190	3
	Cola Ballayi	335	1	Coptis groenlandica	191	3
	Cola nitida	335	1	Coptis japonica	191	3
	Cola verticillata	335	1	Coptis mahmira	191	3
	Colchicum autumnale	191	1	Coptis tecta	191	3
	Colchicum autumnale	125	6	Coptis trifoliata	191	3
	Colchicum autumnale	133	7	Corallina officinalis	219	4
	Colchicum decaisnei	135	7	Corallium	213	3
	Collinsonia canadensis	33	4	Cordia	232	4
	Collutoria	157	6	Coriandrum maculatum	216	1
	Colocasia antiquorum	175, 176	6	Coriandrum sativum	187	3
	Colocasia esculenta	176	6	Coridothymus capitatus	113	7
	Colocasia odora	58	7	Cornus circinatus	194	7
	Colutea arborescens	300	1	Cornus florida	173	6
٩	Combretum album	190	4	Cornus mascula	192	2

			I			
<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	<u>Vol</u>	cle
Chlorophyceae	17	6	Cinnamomum Malabathrum	168	4	11
Chondodendron tomentosum	34	7	Cinnamomum obtusifolium	165	5	
Chondrus	185	3	Cinnamomum zeylanicum	189	2	
Chondrus crispus	306	1	Cirsium arvense	254	6	
Chondrus polymorphus	306	1	Cistus	220	2	
Chrozophora tinctoria	185	4	Cistus Creticus	197	3	
Chrozophora tinctoria	188	6	Cistus incanus	197	3	
Chrysanthemum balsamita	39	1	Cistus ladaniferus	204	5	
Chrysanthemum balsamita	70	2	Cistus salviifolius	222	7	
Chrysanthemum cinerariaef-			Cistus villosus	197	3	
olium	258	1	Citrago	366	1	
Chrysanthemum parthenium	173	3	Citrullus colocynthis	106	1	
Chrysanthemum vulgare	94	l	Citrullus vulgaris	31	4	
Chrysophyllum Buranhem	237	4	Citrus aurantium	45	1	
Chrysophyllum glycyphlæum	237	4	Citrus aurantium dulcis	33	2	
Cibotium Barometz	52	4	Citrus aurantium var. amara	238	3	
Cibotium glaucum	52	4	Citrus aurantium var. amara	239	4	
Cicer arietinum	67	3	Citrus aurantium var.			
Cichorium intybus	284	2	bergamia	46	1	
Cichorium intybus	131	4	Citrus aurantium var. sinensis	45	1	
Cichorium pumilum	262	5	Citrus bergamia	46	1	
Cicuta aquatica	218	1	Citrus decumana	217	5	
Cicuta major	216	1	Citrus limonum	208	4	
Cicuta major vulgaris	216	1	Citrus limonum	205		
Cicuta virosa	218	1	= Citrus medica	205	3	
Cimicifuga racemosa	26	: 1	Citrus mandarina	208	4	
Cimicifuga racemosa	18	2	Citrus medica	208	4	
Cinchona	189	3	Citrus nobilis	208	4	
Cinchona calisaya	194		Citrus sinensis	45	1	
•		6	Citrus vulgaris	238	3	
Cinchona condaminea	192	4	Cladonia pyxidata	69	2	
Cinchona pitayensis	216	7	Cladonia rangiferina	78	7	
Cinchona succirubra	338	1	Claviceps purpurea	14, 15	1	
Cinchona succirubra	199	5	Clematis	236	4	
Cinnamomum aromaticum	165	5	Clematis cirrhosa	256	7	
Cinnamomum camphora	202	2	Clematis daphnoides	396	1	
Cinnamomum cassia	164, 165	5	Clematis latifolia dentata	362	1	
Cinnamomum citriodorum	164	5	Clematis mauritiana	248	5	۰۳۰

cec	Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
10	Cecropia hololeuca	152	7	Cerinthe aspera	127	7
	Cecropia peltata	136	4	Cerinthe major	127	7
	Ceiba pentandra	178	3	Cerinthe minor	127	7
	Celastrus edulis	163	5	Cestrum nocturnum	124	4
	Celosia adoensis	196	4	Ceterach officinarum	119	3
	Centaurea benedicta	214	1	Cetraria islandica	174	1
	Centaurea calcitrapa	303	1	Chænorrhinum minus	207	3
	Centaurea centaurium	174	5	Chærophyllum bulbosum	114	6
	Centaurea cyanus	67	1	Chærophyllum Libanoticum	108	5
	Centaurea hippophæstum	303	1	Chamæcissus	326	1
	Centaurea jacea	201	7	Chamædrys	144	•
	Centaurea stellata	303	1	Chamælirium carolinianum	269	7
	Centaurium erythræa	301	1	Chamaemelum arvensis	16	5
	Centaurium minus	301	1	Chamaemelum discoideum	17	5
	Centaurium pulchellum	173	5	Chamaemelum nobile	26	l
	Centaurium ramosissimum	173	5	Chamomilla suaveolens	29	2
	Centaurium umbellatum	301	1	Charta japonica	251	4
	Centella asiatica	244	4	Chasmanthera palmata	289	1
	Cephaelis acuminata Karsten	140	3	Chavica officinarum	162	3
	Cephaelis ipecacuanha	229	1	Cheiranthus cheiri	368	1
	Cephaelis ipecacuanha	25	2	Chelidonium majus	233	1
	Cephalanthus africanus	245	5	Chenopodium album	2	5
	Cerasus acida	315	1	Chenopodium ambrosioides	5	2
	Cerasus avium	184	6	Chenopodium ambrosioides	5	4
	Cerasus caproniana	315	1	Chenopodium Bonus-Henricus	22	1
	Cerasus laurocerasus	316	1	Chenopodium botrys	5	2
	Cerasus mahaleb	207	6	Chenopodium murale	109	7
	Cerasus padus	189	5	Chenopodium scoparium	194	6
	Cerasus vulgaris	315	1	Chicocca anguifuga	179	6
	Cerasus vulgaris	211	2	Chicocca brachiata	179	6
	Cerata	243	2	Chimaphila corymbosa	198	4
	Ceratonia siliqua	116	1	Chimaphila umbellata	198	4
	Cercopia obtusa	138	5	Chinensis	94	4
	Cereus	135	4	Chionanthus virginiana	99	3
	Cereus grandiflorus	209	1	Chironia angularis	175	5
	Cereus grandiflorus	139	7	Chironia centaurium	301	1
041	Cerevisia	46	5	Chironia chilensis	174	5

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol	¢ec
Canna Indica	171	4	Cardamomum medium	246	6	9
Cannabis indica	171	5	Cardamomum racemosum	261	5	
Cannabis sativa	198	2	Cardamomum zeylanicum	246	6	
Cannabis sativa	171	5	Carduus benedictus	214	1	
Cannabis sativa indica	299	1	Carduus Marianus	324	1	
Cannabis sativa vulgaris	299	1	Carex arenaria	180	1	
Cantharis vesicatoria	91	3	Carica papaya	41	1	
Capparis coriacea	118	3	Carica papaya	32	2	
Capparis parviflora	184	5	Carica papaya	25	6	
Capparis retusofolio	184	5	Carlina acaulis	320	1	
Capparis sativa	203	2	Carlina caulescens	320	1	
Capparis sativa	184	5	Carlina chamaeleon	320	1	
Capparis sicula	183	5	Carlina vulgaris Carnegiea	212 135	7 4	
Capparis spinosa	203	2	Carthamus lanatus	172	6	
Capparis spinosa canescens	183	5	Carthamus tinctorius	188	2	
Capparis spinosa parviflora	184	5	Carum carvi	185	3	
Capsella bursa pastoris	336	1	Carum copticum	13	3	
Capsicum annuum	275	1	Cascara amara	271	2	
Capsicum fastigiatum	275	1	Cassia	112	3	
Capsicum fastigiatum	163	3	Cassia	114	5	
Capsicum frutescens	275	1	Cassia fistulosa	118	1	
Capsicum frutescens	163	3	Cassuvium pomiferum	33	6	
•		_	Castanea pumila	189	6	
Capsicum longum	275	1	Castanea sativa	188	6	
Capsicum longum	163	3	Castanea vulgaris	213	2	
Capsicum minium	275	1	Castanea vulgaris	188	6	
Capsicum minium	163	3	Castanopsis chrysophylla	189	6	
Carapa proceras or Carapa touloucouna	174	4	Castor fiber	168	3	
Carbenia benedicta	214	1	Casuarina equisetifolia	192	5	
Carbenia benedicta	171	6	Catalpa bignonioides	180	4	
Carbo ligni	260	1	Catapucia major	73	5	
Cardamine pinnata	98	7	Catha edulis	163	5	
•			Catharanthus roseus	192	2	
Cardamine pratensis	67	5	Cayaponia globosa	206	7	
Cardamine pratensis	78	7	Сесторіа	136	4	
Cardamomum longum	246	6	Cecropia adenopus	152	7	۲۳٥

bra	Sc.	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	Vol
8	Brassica oleracea capitata	230	3	Calamintha officinalis	297	1
	Brassica vesicaria	155	1	Calamintha origanifolia	193	2
	Brayera anthelminthica	195	4	Calamintha purpurascens	13	5
	Bromelia ananas	37	1	Calamintha rotundifolia	13	5
	Brucea amarissima	202	5	Calamintha vulgaris	198	5
	Brucea antidysenterica	31	4	Calamus draco	97	7
	Brucea ferruginea	31	4	Calcitrapa lanuginosa	214	1
	Brucea gracilis	202	5	Calendula officinalis	11	1
	Brucea sumatrana	202	5	Callitris	115	5
	Brunella vulgaris	295	1	Callitris arenosa	115	5
	Brunfelsia Hopeana	209	3	Callitris calcarata	116	5
	Bryonia alba	155	4	Callitris cupressiformis	116	5
	Bryonia dioica	176	2	Callitris drumnondii	116	5
	Bryonia tayuyia	52	6	Callitris glauca	116	5
	Buphthalmum	16	5	Callitris gracilis	116	5
	Bupleurum perfoliatum	69	5	Callitris intratropica	116	8
	Bupleurum rotundifolium	69	5	Callitris macleayan	116	5
	Butyrospermum Parkii	95	6	Callitris oblonga	116	5
	Butyrum theobroma cacao	178	4	†	116	5
	Buxus sempervirens	50	1	Callitris propinqua		
	β -violacea (var.)	120	5	Callitris quadrivalvis	122	6
	Cachrys maritimum	208	1	Callitris rhomboidea	116	5
	Cactus	135	4	Callitris robusta	116	5
	Cactus ficus-indica	134	4	Callitris tasmanica	116	5
	Cactus grandiflorus	209	1	Callitris verucose	116	5
	Cactus grandiflorus	139	7	Calluna ciliaris	187	1
	Cactus opuntia	151	2	Calluna erica	187	1
	Caesalpinia bonducella	41	3	Calluna vulgaris	187	1
	Caesalpinia bonducella	104	4	Caltha palustris	8	2
	Cajan inodorum	181	6	Calystegia sepium	341	1
	Cajanus cajan	181	6	Camellia chinensis	197	1
	Cajanus indicus	181	6	Camellia thea	197	1
	Caladium bicolor	189	6	Campanula rapunculus	168	2
	Caladium esculentum	176	6	Camphora	179	3
	Caladium odorum	58	7	Camphora naturalis	177	4
	Calamintha clinopodium	198	5	Camphorosma monspelliaca L.	178	4
	Calamintha graveolens	13	5	Cananga odorata	256	6
	Calamintha nepetoides	170	4	Canella alba	165	5

Sc.	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	<u>Vol</u>	bra
Ballota vulgaris	263	1	Beta vulgaris rapa	210	1	7
Balsamina hortensis	44	5	Beta vulgaris rapacea	210	1	
Balsamita suaveolens	39	1	Betonica officinalis	48	1	
Balsamodendron africanum	260	2	Betula alba	42	1	
Balsamodendron gileadense	39	3	Betula alnus	360	1	
Balsamodendron Roxburghii	260	2	Betula glutinosa	360	1	
Balsamodendrum			Bidens	62	3	
opobalsamum	39	3	Bidens cernua	63	3	ettjelde My
Balsamum benivivum	42	5	Bidens frondosa	63	3	17
Balsamum gurjunae	38	3	Bidens pilosa	63	3	
Balsamum peruvianum	35	4	Bidens tripartita	63	3	
Banisteria caapi	272	7	Bignonia Leucantha	115	3	
Baptisia	247	3	Bittera febrifuga	42	4	
Barbadense	170	4	Bixa orellana	34	4	
Barbarea vulgaris	77	1	Blumea balsamifera	40	5	
Barosma betulina	43	2	Blumea lacera	41	5	
Basella alba	29	4	Bæhmeria Jacq.	95	5	
Bassia longifolia	95	6	Bæhmeria tenacissima	96	5	
Bdella	148	4	Bæhmeria (urtica) Nivea	96	5	
Bellis perennis	55	1	Bæhmeria utilis	96	5	
Benedicta officinalis	214	1	Boldoa fragrans	203	1	
Benthamia florida	173	6	Bolus orientalis	135	3	
Benzoe	42	5	Borago officinalis	102	1	
Berberis cretica	34	5	Borogo officinalis	95, 103	5	
Berberis Libanotica	34	5	Boswellia	206	5	
Berberis vulgaris	44	1	Boswellia carterii	206	5	
Bergenia cordifolia	131	2	Boswellia floribunda	207	5	
Berula angustifolia	210	7	Boswellia frereana	207	5	
Berula erecta	210	7	Boswellia papyrifera	207	5	
Beta bourgæi	118	6	Boswellia serrata	206	5	
Beta cicla	184	1	Botrychium lunaria	227	2	
Beta macrocarpa	118	6	Bowdichia virgilioides	16	3	
Beta rapa	210	1	Brassica alba	79	2	
Beta rubra	210	1	Brassica eruca	155	1	
Beta vulgaris	210	i	Brassica napus	230	2	
Beta vulgaris cicla	184	1	Brassica nigra	114	1	

	Sa	D		1.0		
<u>art</u> 6	Sc.	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>
•	Artemisia aragonensis	151	7	Aspidium rhæticum	191	5
	Artemisia campestris	151	7	Aspidosperma Peroba	182	3
	Artemisia chinensis	5	6	Aspidosperma Quebracho-blanco	102	•
	Artemisia Cina	151	7		182	3
	Artemisia dracunculus	163	2	Asplenium Adiamtum-nigrum		5
	Artemisia glacialis	6	3	Asplenium ceterach	119	3
	Artemisia herba-alba	5	5	Asplenium scolopendrium	179	1
	Artemisia maritima	2	1	Asplenium trichomanes	107	3
	Artemisia maritima	3	2	Aster argophyllus	232	4
	Artemisia mutellina vill	7	4	Aster helenium	149	1
	Artemisia pontica	148	2	Aster officinalis	149	1
	Artemisia species	120	6	Astragalus creticus	11	6
	Artemisia spicata	7	7	Astragalus exscapus	15	7
	Artemisia verlotorum	159	4	Astragalus gummifera	13	2
	Artemisia vulgaris	219	1	Astragalus mareoticus	14	7
	Arum dracunculus	7	3	Astragalus massiliensis	12	6
	Arum esculenta	8	3	Astragalus species	159	2
	Arum italicum	9	4	Astragalus tragacantha	12	6
	Arum maculatum	7, 8	3	Astrantia major	220	7
	Arum seguinum	8	3	Athamanta cretensis	55	4
	Arum vulgare	7	3	Athamanta oreoselinum	209	7
	Arundo Donax	170	3	Athyrium or Asplenium		_
	Arundo phragmites	291	1	or Polypodium filix-femina	80	5
	Arundo vulgaris	291	1	Atriplex hortensis	180	l
	Asa dulcis	42	5	Atropa belladonna	51	I -
	Asa fœtida	65	3	Atropa belladonna	34	3
	Asarum europæum	21	1	Atropa mandragora	288	2
	Asimina triloba	12	7	Auricula judae	2	3
	Asparagus altilis	390	1	Auricularia sambucina	2	3
	Asparagus officinalis	390	1	Avena orientalis	115	1
	Asperula odorata	22		Avena sativa	13, 115	1
			1	Avena sativa var. contracta	115	1
	Asperula (Rubia) cynanchica	11	4	Baccharoides ascaricida	180	7
	Asphodelus albus	27	6	Balanites ægyptiaca	247	6
	Asphodelus fistulosus	28	6	Ballota foetida	263	1
	Asphodelus microcarpus	30	4	Ballota lanata	181	2
	Asphodelus ramosus	30	4	Ballota nigra	263	1
070	Aspidium Filix-mas	176	1	Ballota suaveolens	157	4

Sc.	Page	<u>Vol</u>	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	art 5
Anona triloba	12	7	Aralia quinquefolia	60	2	3
Anonaceae	168	5	Arboreum	170	4	
Antennaria dioica	34	1	Arbutus andrachne	170	5	
Anthelminticum (var.)	5	4	Arbutus unedo	294	1	
Anthemis arvensis	16	5	Arbutus uva-ursi	248	1	
Anthemis cotula	16	5	Archangelica officinalis	96	1	
Anthemis discoidea	17	5	Arctium (species)	16	1	
Anthemis nobilis	26	1	Arctium major	11	2	
Anthemis pyrethrum	137	3	Arctium minus	9	5	
Anthemis tinctoria	17	5	Arctium minus pubescens	8	7	
Anthriscus cerefolium	113	4	Arctium tomentosum	7	4	
Anthriscus sylvestris	113	6	Arctostaphylos officinalis	248	1	
Anthyllis montana	206	4	Arctostaphylos uva-ursi	248	1	
Anthyllis prior	202	6	Areca catechu	217	7	
Anthyllis vulneraria	202	6	Areca faufel	217	7	
Antirrhinum cymbalaria	87	1	Arenaria rubra var. marina	3	1	
Antirrhinum elatine	194	5	Arenaria salina	3	1	
Antirrhinum majus	120	4	Argemone Mexicana	5	6	
Antirrhinum minus	207	3	Argentina vulgaris	237	1	
Antirrhinum orontium	128	6	Aristolochia clematitis	160	1	
Aparine hispida	255	1	Aristolochia cymbifera	96	6	
Aphanes arvensis	214	7	Aristolochia fætida	96	6	
Aphloia sp.	184	7	Aristolochia gigas	113	7	
Apiastrum	366	1	Aristolochia grandiflora	113	, 7	
Apis arabica	272	2	Aristolochia longa	99	5	
Apis fasciata	272	2	Aristolochia pistolochia	99	5	
Apis ligustica	272	2	Aristolochia rotunda	9		
Apis mellifica	272	2		-	2	
Apium graveolens	317	1	Aristolochia serpentaria	112	7	
Apium graveolens	182	4	Aristolochia trilobata	112	7	
Apium graveolens var.			Armeniaca vulgaris	358	1	
rapaceum	185	6	Arnica montana	16	1	
Apocynum cannabinum	82	4	Arnoglossa	346	1	
Aqua	234	2	Arsenicum	97	6	
Aquilegia akata	24	2	Artabotrys odoratissimus	256	6	
Aquilegia vulgaris	36	1	Artemisia abrotanum	304	1	
Arachis hypogæa	269	1	Artemisia absinthium	1	1	770

amp	Sc.	Page	<u>Vol</u>	Sc.	Page	Vol
4	Ampelodesma tenax	13	1	Anchusa italica	212	5
	Ampelodesmos tenaæ	9	5	Anchusa officinalis	35	1
	Amygdalus amara	203	3	Anchusa paniculata	35	1
	Amygdalus communis	350	1	Anchusa tinctoria	200	5
	Amygdalus communis	232	2	Andira	70	7
	Amygdalus dulcis	350	1	Andira araroba	5	4
	Amygdalus persica	137	1	Andira araroba	188	6
	Amygdalus persica	92	2	Andira inermis	70	7
	Amyla	277, 2	79 2	Andira surinamensis	70	7
	Amylum marantae	9	4	Andira vermifuga	71	7
	Amylum maydis	242	6	Andrachne rotundifolia	207	5
	Amylum oryzae	264	7	Andrachne telephioides	207	5
	Amylum solani	258	5	Andrographis paniculata	209	3
	Amylum solani	264	7	Andropogon citratus	80	7
	Amylum tritici	239	4	Andropogon hirtus	21	6
	Amyris gileadensis	39	3	Andropogon schænanthus	7	7
	Anabasis aphylla	24	4	Androsæmum officinale	83	6
	Anacardium	21	5	Anemone	126	4
	Anacardium occidentale	33	6	Anemone hepatica	206	1
	Anacyclus pyrethrum	137	3	Anemone nemorosa	144	2
	Anacyclus velentinus	29	7	Anemone pratensis	146	7
	Anagallis arvensis	342	1	Anemone pulsatilla	207	1
	Anagallis caerula	342	1	Anemopægma mirandum	180	4
	Anagallis latifolia	342	1	Anethum graveolens	201	1
	Anagallis phoenicea	342	1	Angelica archangelica	96	1
	Anagallis repens	342	1	Angelica officinalis	96	1
	Anagyris fætida	30	7	Angelica sativa	96	1
	Anamirta cocculus	46	3	Angelica Sylvestris	261	2
	Anamirta paniculata	46	3	Angræcum fragrans	156	3
	Anamirta paniculata	118	4	Anhalonium Lewinii	50	6
	Ananas comosus	37	1	Anhalonium Williamsii	50	6
	Ananas sativus	37	1	Anona asiatica	195	7
	Ananassa sativa	37	1	Anona cherimolia	195	7
	Anchusa azurea	35	1	Anona muricata	167	5
	Anchusa azurea	212	5	Anona palustris	195	7
	Anchusa hybrida	213	5	Anona reticulata	174	6
٥٣٧	Anchusa italica	35	1	Anona squamosa	173	6

<u>Sc.</u>	Page	Vol	<u>Sc.</u>	Page	<u>Vol</u>	amo
Albizzia anthelminthica	41, 197	4	Alnus glutinosa	360	1	3
Albizzia anthelminthica	22	7	Alnus incana	256	2	
Albizzia glandulosa	17	6	Alnus serrulata	245	5	
Albizzia lebbek	25	5	Alnus vulgaris	360	1	
Albizzia streptocarpa	17	6	Alocasia macrorrhiza	58	7	
Albugo candida	338	1	Aloe	116	3	
Alcea rosea	75	3	Aloe	25	7	
Alchemilla arvensis	214	7	Aloe barbadens	31	1	
Alchemilla diademata	215	7	Aloe Berryi	120	4	
Alchemilla vulgaris	327	1	Aloe linguaeformis	127	6	
Alchemilla xanthochlora			Aloe succotrina	120	4	
(Sensu lato)	327	1	Aloe vera	31	1	
Aletris farinosa	69	4	Aloe vulgaris	31	1	
Aleurites	16	3	Aloë abyssinca	20	6	
Aleurites cordata	16	3	Aloē camperi	20	6	
Aleurites Japonica	16	3	Aloë candelabrum	140	2	
Aleurites moluccana	16	3	Aloē elegans	20	6	
Algues	185	3	Aloë ferox	139	2	
Alisma lanceolatum	246	2	Aloë peacockii	20	6	
Alisma plantago-aquatica	226	5	Aloe perryi	27	7	
Alkanna tinctoria	200	5	Aloysia citriodora	353	1	
Alkekengi halicacabum	310	1	Alpinia officinarum Alsidium helminthocorton	84	4	
Alkekengi officinarum	310	1	Alsine media	141 377	6 1	
Alliaria officinalis	89	1	Althaea officinalis	111	1	
Allium ampeloprassum	182	4	Althaea rosea	75	3	
Allium ascalonicum	209	2	Amaracus dictamnus	39	2	
Allium Cepa	36	2	Amaracus libanoticus	135	4	
Allium Cepa	30	3	Ambra cinerea	149	3	
Allium fistulosum	52	4	Ammi dilatatum	122	1	
Allium porrum	184	3	Ammi majus	83	2	
Allium sativum	73	i	Ammi visnaga	122	1	
Allium sativum	55	2	Amomum cardamomum	261	5	
Allium schænoprasum	109	6	Amomum cardamon	261	5	
Allium sphaerocephalon	209	2	Amomum curcuma	211	7	
Allium ursinum	189	5	Amomum granum paradisi	246	6	

Sc.		Page	Vol	Sc.	Page	Vol
Achille	a odorata Subsp.			Actaea racemosa	26	;
Kots	chyi	5	5	Adamia versicolor	94	•
Achille	a odorata var. grata	5	5	Adansonia digitata	31	:
Achille	a ptarmica	3	7	Adhatoda vasica	2	
Achille	a santolina	4	6	Adiantum aethiopicum	191	;
Achille	a sulphurea	5	7	Adiantum boreale	191	
Achille	a teretifolia	4	6	Adiantum capillus-veneris	321	
Achille	a uromoffii	5	5	Adiantum nigrum	108	
Achille	a viscosa	4	7	Adiantum pedatum	191	
Achille	a Wilhelmsii	4	6	Adiantum tenerum	192	
Acidun	1	64	2	Adonis æstivalis	6	
Acidun	chlorhydricum	65	4	Adonis annua	7	
Acinos	alpinus	275	2	Adonis pyrenaica	6	
Acinos	rotundifolius	13	5	Adonis vernalis	9	
Aconit	um	21	2	Adoxa moschatellina	231	
Aconit	um anthora	21	2	Aegle marmelos	42	
Aconit	um balfourii	22	2	Aeschrion excelsa	175	
Aconit	um cammarum	21	2	Aesculus hippocastanum	286	
Aconit	um deinorrhizum	22	2	Aetherolea	96	
Aconit	um ferox	22	2	Aethorrhyza bulbosa	2	
Aconit	um heterophyllum	22	2	Aethusa cynapium	128	
Aconit	um karakolicum	22	2	Agaricus campestris	252	
Aconit	um lucidusculum	22	2	Agaricus edulis	252	
Aconit	um napellus	28	1	Agathis salisb.	194	
Aconit	um neomontanum	21	2	Agave americana	27	
Aconit	um paniculatum	21	2	Agave fœtida	39	
Aconit	um pyramidale	28	1	Ageratum conyzoides	2	
	um sachalinensis	22	2	Agrimonia eupatoria	253	
Aconit	um stoerkianum	21	2	Agrimonia odorata	170	
	um talassicum	23	2	Agropyron repens	378	
	um variabile	28	1	Agrostemma githago	79	
	um variegatum	16	6	Agrostemma githago	73	
	um vulparia	23	2	Ailanthus altissima	142	
	aromaticus	245	1	Ajuga chamæpitys	158	
	calamus	245	1	Ajuga genevensis	151	
	odoratus	245	1	Ajuga iva	158	
	spicata	17	2	Ajuga reptans	228	

Scientific Index

Sc.	Page	Vol	Sc.	Page	Vol
Abies alba	50	2	Acer	175	3
Abies alba	55	5	Acer campestris	175	3
Abies pectinata	50	2	Acer hermoneum	175	3
Abrus precatorius	2	2	Acer pensylvanicum	175	3
Abrus precatorius	135	6	Acer platanoides	175	3
Acacia albida	133	7	Acer pseudo-platanus	175	3
Acacia arabica	120	5	Acer rubrum	175	3
Acacia astringens	26	4	Acer saccharinum	175	3
Acacia catechu	137	2	Acer saccharum	176	3
Acacia cyanophylla	133	7	Acer syriacum	175	3
Acacia dealbata	118	5	Acer tauricolum	175	3
Acacia decurrens	119	5	Achillea	3	5
Acacia decurrens. var.			Achillea ageratum	4	7
dealbata	118	5	Achillea atrata	3	6
Acacia decurrens var. mollis	118	5	Achillea biebersteinii	4	5
Acacia farnesiana	124	6	Achillea damascena	5	7
Acacia gummifera	124	6	Achillea eriocarpa	4	6
Acacia lebbek	25	5	Achillea falcata	5	7
Acacia mellifera	124	6	Achillea fragrantissima	3	6
Acacia mollissima	118	5	Achillea herba-rotas	4	7
Acacia Senegal	119	5	Achillea Kotschyi	5	5
Acacia seyal	124	6	Achillea krascheninnikovii	4	6
Acacia vera	120	5	Achillea macrocephala	3	7
Acanthopanax	43	7	Achillea micrantha	4	5
Acanthopanax Henryi	43	7	Achillea millefolium	7	1
Acanthopanax senticosus	43	7	Achillea moschata	7	2
Acanthopanax sessiliflorum	43	7	Achillea nana	4	7
Acanthus mollis	19	2	Achillea nobilis	3	6

01.

MICHEL HAYEK

ENCYCLOPEDIA OF MEDICINAL PLANTS

ARABIC - ENGLISH - FRENCH - GERMAN - LATIN

7

313 plants - 44 coloured illustrations 3 appendices - 8 glossaries

